

抗凝血藥 注意事項



COFARIN外觀



商品名: COFARIN

學名: warfarin

中文名: 可化凝錠

劑量: 5MG

外觀描述:

粉橘色圓型錠，標記

GP//183 5



COFARIN用途

抗凝血劑，防止血栓形成

適應症: 靜脈栓塞、肺栓塞、手術引起的血栓



COFARIN用法

1. 初劑量:
一開始每日
2mg~5mg，並依**INR**
測量值調整劑量
2. 維持劑量:
每日2mg~10mg
3. 使用時間:
持續使用直到脫離血
栓可能發生的危險期



COFARIN副作用

出血
皮膚受損
腸胃不適



用藥的注意事項

1. 飲食避免

抵銷藥物作用

- 綠葉蔬菜（青花椰菜、芽甘藍、芥藍菜、菠菜或萵苣）
- 肝臟（牛肝、豬肝）
- 綠茶
- 輔酶 Q10

加重藥物作用

- 木瓜酵素
- 人參、當歸
- 大蒜及銀杏
- 抗生素



不要突然改變飲食組成

2. 忘記服藥

- 如果在預定服藥時間 12 小時內想到，請儘快補服。
- 如果在預定服藥時間 12 小時後才想到，則不必再補服，也不可服用雙倍劑量。
- 如果第二天才想到，只需服用當天醫師指示的藥量即可，請不要服用兩天份的藥量，因為容易造成出血
- 如果忘記服藥兩天或更多天，請立即告知醫師



孕婦和哺乳者 可以使用嗎？

- 孕婦分級：X級
孕婦及待懷孕者禁用
- 哺乳者可使用

對於症狀的處置

1. 回診告知

- 皮疹或搔癢、頭暈疲倦、有寒冷感
- 胃腸不適
- 手腳麻木或刺痛
- 掉髮

2. 盡速就醫

- 異常出血（例如：血便、血尿、咳血、經血量過多、牙齦出血、割傷後長時間才止血）
- 眼睛、唇或喉頭水腫，呼吸困難
- 持續發燒、噁心、嘔吐、腹瀉
- 嚴重頭痛