Omgangssyke: råd ved hjemreise

Det er slitsomt når barnet er sykt. Dette skrivet hjelper dere de første dagene hjemme.

Barnets navn	Fødselsdato	Vekt ved hjemreise (kg)	Dato for hjemreise	Sykdomsdag ved hjemreise

Forordnende barnelege	Sykepleier	Kontroll hos fastlege, dato	Åpen retur til barnemottaket	
			☐ Nei ☐ Ja, til og med	

Hva er omgangssyke?

- Omgangssyke er en virusinfeksjon i magen som gir oppkast og diaré. Den går over av seg selv.
- Det viktigste dere kan gjøre, er å hjelpe barnet med å få i seg nok drikke.

Slik hjelper du barnet hjemme

- **Små slurker ofte:** en teskje hvert 1–2 minutt, også etter oppkast. Gi mer når barnet holder på det.
- **Amming og flaske:** fortsett, gjerne oftere og kortere.
- **Drikke:** vann eller tynn saft. Ved mye oppkast og diaré: væskeerstatning fra apoteket.
- **Mat:** vanlig mat når barnet vil. Faste er ikke nødvendig.
- **Smitte:** vask hendene med såpe og vann. Håndsprit virker dårlig.
- **Barnehage og skole:** hjemme til 48 timer etter siste oppkast eller diaré.

Slik er det vanlige forløpet

Dag 1–2	Dag 2–5	Opptil 1–2 uker
Mest oppkast	Diaré	Løs avføring kan vare

- Det er vanlig at barnet spiser lite noen dager. Drikke er viktigere enn mat.

Dette hjelper ikke ved omgangssyke

- Stoppende medisin mot diaré, antibiotika og probiotika.
- Brus, juice og sportsdrikk. Mye sukker kan gi mer diaré.

Barnets mål for drikke og tiss

Vi fyller ut sammen før dere reiser hjem.

Drikke per døgn, minst		ml
Ekstra etter hver diaré		ml
Ved oppkast: gi		ml hvert 1–2 minutt
Tiss / våte bleier, minst		ganger per døgn

GRØNN
Fortsett hjemme

Tegn
- Kaster opp eller har diaré, men holder på noe av drikken.
- Når målet for drikke og tiss.
- Er våkent og interessert innimellom.

Gjør dette
- Fortsett med små slurker ofte.
- Følg ekstra godt med på barn under 6 måneder.
- Er dere usikre, er det alltid riktig å kontakte lege.

GUL
Kontakt lege

Ett eller flere av disse tegnene
- Kaster opp nesten alt, eller når ikke målet for drikke.
- Ingen tiss eller våt bleie på 8 timer.
- Tørr munn, gråter uten tårer eller innsunkne øyne.
- Blod i avføringen eller diaré i mer enn 7 dager.

Gjør dette
- **Kontakt fastlege eller legevakt 116 117 samme dag.**
- Har dere åpen retur, kom direkte til barnemottaket.

RØD
Ring 113

Ett eller flere av disse tegnene
- Svært slapt eller vanskelig å vekke.
- Kald, blek eller marmorert hud.
- Kaster opp grønt eller har sterke magesmerter.

Gjør dette
- **Ring 113 med en gang.**

Kvalmestillende medisin

Fylles ut av lege hvis barnet får med seg medisin hjem.

☐ **Zofran (ondansetron)** Dose _____ mg, inntil _____ ganger per døgn.

Lege: 0,1–0,2 mg/kg, inntil 3 ganger

- Gis når barnet kaster opp mye. Vent 15–30 minutter, og start så med små slurker igjen.
- Medisinen kan gi litt mer diaré. Det er ikke farlig.

Notater og spørsmål

Andre avtaler: _____ **Signatur barnelege:** _____

Kilder: Klingenberg C, Størdal K, Qadori MR, Kaasa EV. Akutt gastroenteritt og dehydrering, kap. 5.3 i Akuttveileder i pediatri (Norsk barnelegeforening, helsebiblioteket.no), sist faglig oppdatert 2021 · Smittevernveileder for barnehager (Folkehelseinstituttet, fhi.no).

Utarbeidet av Alexander Aalberg, overlege, spesialist i barnesykdommer
Lunge- og allergipoliklinikken, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital