

Exercises 15.6

3.)

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^2 \int_0^{z^2} \int_0^{y-z} (2x - y) dx dy dz = \int_0^2 \int_0^{z^2} [x^2 - xy]_0^{y-z} dy dz \\
 &= \int_0^2 \int_0^{z^2} (y - z)^2 - (y - z)y dy dz = \int_0^2 \int_0^{z^2} y^2 - 2yz + z^2 - y^2 + yz dy dz \\
 &= \int_0^2 \int_0^{z^2} z^2 - yz dy dz = \int_0^2 \left[yz^2 - \frac{1}{2}y^2z \right]_0^{z^2} dz = \int_0^2 z^4 - \frac{1}{2}z^5 dz \\
 &= \left[\frac{1}{5}z^5 - \frac{1}{12}z^6 \right]_0^2 = \frac{32}{5} - \frac{64}{12} = \frac{384}{60} - \frac{320}{60} = \frac{64}{60} = \frac{16}{15}
 \end{aligned}$$

7.)

$$\begin{aligned}
 &\int_0^\pi \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z^2}} z \sin x dy dz dx = \int_0^\pi \int_0^1 [yz \sin x]_0^{\sqrt{1-z^2}} dz dx \\
 &= \int_0^\pi \int_0^1 z\sqrt{1-z^2} \sin x dz dx = -\frac{1}{2} \int_0^\pi \int_0^1 \sqrt{u} \sin x du dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int_0^\pi \left[\frac{2}{3} \sqrt{(1-z^2)^3} \sin x \right]_0^1 dx = \frac{1}{3} \int_0^\pi \sin x dx = \left[-\frac{1}{3} \cos x \right]_0^\pi = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

11.)

$$I = \int_1^4 \int_y^4 \int_0^z \frac{z}{x^2 + z^2} dx dz dy = \int_1^4 \int_y^4 z \int_0^z \frac{1}{x^2 + z^2} dx dz dy$$

19.) First, find bounds for z :

$$2x + y + z = 4 \implies 0 \leq z \leq 4 - 2x - y$$

Then find bounds for x and y :

$$2(0) + y + 0 = y = 4$$

$$2x + 0 + 0 = 2x = 4 \implies x = 2$$

Thus the triangular region is bounded by the first quadrant and $y = 4 - 2x$, thus

$$0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4 - 2x$$

Evaluate the integral:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^2 \int_0^{4-2x} \int_0^{4-2x-y} dz dy dx = \int_0^2 \int_0^{4-2x} (4 - 2x - y) dy dx \\
 &= \int_0^2 \left[4y - 2xy - \frac{1}{2}y^2 \right]_0^{4-2x} dx = \int_0^2 (-8x + 16 + 4x^2 - 8x - \frac{1}{2}(4x^2 - 16x + 16)) dx \\
 &= \int_0^2 (2x^2 - 8x + 8) dx = \left[\frac{2}{3}x^3 - 4x^2 + 8x \right]_0^2 = \frac{16}{3} - 16 + 16 = \frac{16}{3}
 \end{aligned}$$

21.) First, find bounds for z :

$$x + y = 1 \implies 0 \leq z \leq 1 - y$$

Then find bounds for x and y :

$$z = 0 \implies y = 1 \implies 1 = x^2 \implies x = \pm 1$$

Thus

$$-1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1$$

Evaluate the integral:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 \int_0^{1-y} dz dy dx &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 (1-y) dy dx = \int_{-1}^1 \left[y - \frac{1}{2}y^2 \right]_{x^2}^1 dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{2} - x^2 + \frac{1}{2}x^4 dx = \left[\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

54.)

Exercises 15.7

1.) a.)

$$\begin{aligned} x = r \cos \theta &= 4 \cos(\pi/3) = 2, y = r \sin \theta = 4 \sin(\pi/3) = 2\sqrt{3}, z = -2 \\ \therefore (4, \pi/3, -2) &\rightarrow (2, 2\sqrt{3}, -2) \end{aligned}$$

b.)

$$\begin{aligned} x = 2 \cos(-\pi/2) &= 0, y = 2 \sin(-\pi/2) = -2, z = 1 \\ \therefore (2, -\pi/2, 1) &\rightarrow (0, -2, 1) \end{aligned}$$

3.) a.)

$$\begin{aligned} x = -1, y = 1, r &= \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2}, \theta = \tan^{-1}(-1) = 3\pi/4 \\ \therefore (-1, 1, 1) &\rightarrow (\sqrt{2}, 3\pi/4, 1) \end{aligned}$$

b.)

$$\begin{aligned} x = -2, y = 2\sqrt{3}, r &= \sqrt{4 + 12} = 4, \theta = \tan^{-1}(-\sqrt{3}) = 2\pi/3 \\ \therefore (-2, 2\sqrt{3}, 3) &\rightarrow (4, 2\pi/3, 3) \end{aligned}$$

9.) a.)

$$x^2 - x + y^2 + z^2 = r^2 - x - z^2 = r^2 - r \cos \theta - z^2 = 1 \implies z^2 = 1 - r \cos \theta + r^2$$

b.)

$$z = x^2 - y^2 = r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = r^2 \cos(2\theta)$$

- 17.) Since $x^2 + y^2 = 16$ represents a circle with radius 4, $0 \leq r \leq 4$, and $0 \leq \theta \leq 2\pi$. In addition, $-5 \leq z \leq 4$. Evaluating the integral:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-5}^4 \int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2 dr d\theta dz = \int_{-5}^4 \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^4 d\theta dz = \int_{-5}^4 \int_0^{2\pi} \frac{64}{3} d\theta dz \\ &= \int_{-5}^4 \left[\frac{64}{3} \theta \right]_0^{2\pi} dz = \int_{-5}^4 \frac{128\pi}{3} dz = \frac{128\pi}{3} (4 + 5) = 3(128\pi) = 384\pi \end{aligned}$$

- 23.) z is bounded above $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ and below $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$. The intersection of these two manifolds

24.)

29.)