

177. Stabpendel mit Kugeln

$$L = 0.3 \text{ m}; \quad r_1 = 0.02 \text{ m}; \quad r_2 = 0.03 \text{ m}$$

$$m_0 = 0.1 \text{ kg}; \quad m_1 = 0.1 \text{ kg}; \quad m_2 = 0.3 \text{ kg}$$

$$\text{a) } I_{ges} = I_{Stab} + I_{Kugel_1} + I_{Kugel_2}$$

$$I_{Stab} = \frac{1}{12} m_0 L^2 = 7.5 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$$

$$I_{Kugel_1} = \frac{2}{5} m_1 r_1^2 + m_1 \left(\frac{L}{2} + r_1 \right)^2 = 2.9 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

$$I_{Kugel_2} = \frac{2}{5} m_2 r_2^2 + m_2 \left(\frac{L}{2} + r_2 \right)^2 = 9.8 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

$$\Rightarrow I_{ges} = \underline{\underline{1.3 \cdot 10^{-2} \text{ kg m}^2}}$$

b)

$$x_{Stab_{sp}} = 0 \text{ m}$$

$$x_{Kugeln_{sp}} = \frac{m_1 \left(-\frac{2r_1+L}{2} \right) + m_2 \left(\frac{2r_2+L}{2} \right)}{m_1 + m_2} = 0.0925 \text{ m}$$

$$x_{sp} = \frac{x_{Stab_{sp}} \cdot m_0 + x_{Kugeln_{sp}} \cdot (m_1 + m_2)}{m_0 + m_1 + m_2} = \underline{\underline{0.074 \text{ m}}}$$

$$\text{c) } T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgl}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{(m_0 + m_1 + m_2) g \left(\frac{2r_2 + L}{2} \right)}}$$

$$= \underline{\underline{0.69 \text{ s}}}$$

184. Resonanzverhalten einer Stimmgabel

$$f_0 = 440 \text{ Hz}; \quad \omega_0 = 2\pi f_0; \quad x(\tau) = x_m e^{-\beta\tau/2}; \quad x(5) = \frac{1}{10} x(0)$$

a)

$$\frac{x_m}{10} = x_m e^{-\beta 5/2}$$

$$\beta = -\frac{2}{5} \ln(0.1)$$

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \underline{\underline{1.09 \text{ s}}}$$

$$\text{b) } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\beta^2}{4}}$$

$$\omega = 2764.6 \text{ Hz}$$

$$(\omega_0 \approx \omega)$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 440 \text{ Hz}$$

$$(f_0 \approx f)$$

$$f * \tau = \underline{\underline{477.7}}$$

c) $Q = \frac{\omega}{\beta}$

$$Q = \underline{\underline{3001.63}}$$

d) $\delta f = \frac{f}{Q}$

$$\delta f = \underline{\underline{0.15 \text{ Hz}}}$$

e)