Kleinräumige extrapolation von Umfragedaten

Kai Husmann, Alexander Lange

Georg-August-Universität Göttingen

5. Juni 2016

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Datengrundlage

Bürgerumfrage

Zensus

Melderegister

Methoden

Binäre Modelle

Kategorielle Modelle

Splines

Modellwahl

Referenzen

Einleitung

Einleitung

- Daten zur Bevölkerungsstruktur von Stuttgart aus unterschiedlichen Erhebungen
- Datensätze sowohl der Grundgesamtheit, als auch der Stichproben
- Verwendung von sowohl strukturellen- als auch r\u00e4umlichen Informationen
- Ziel: Durch geeignete Modelle und der Stichproben die Informationen der Grundgesamtheit schätzen

Bürgerumfrage


Anzahl Beobachtungen Grundgesamtheit: 470.190

Anzahl Beobachtungen Stichprobe: 4.082

Datengrundlage

• o o o o o o

Variable	Skalenniveau	Modus		Verteilung
		G	S	
Altersklasse	Ordinal	18-25	30-35	Kum. Logit
Geschlecht	Nominal	Frau	Frau	Binom.
Nationalität	Nominal	Deutsch	Deutsch	Binom.
Familienstand	Nominal	Ledig	Verheiratet	Multinom.
Haushaltsgröße	Ordinal	2	2	
Wohndauer	Ordinal	>10	>10	
ALG II Quote	Ordinal	4% - 6%	4% - 6%	
Ein/Zweifamilienhäuser	Ordinal	7	7	
Eigentümer	Nominal	(Nicht enthalten)	Mieter	Binom.
Gauß-Krüger X				
Gauß-Krüger Y				




Datengrundlage



Zensus

Anzahl Beobachtungen Grundgesamtheit: 380.238
Anzahl Beobachtungen Stichprobe: 14 671

Variable	Skalenniveau	Modus		Verteilung
		G	S	
Altersklasse	Ordinal	18-25	30-35	
Geschlecht	Nominal	Mann	Mann	Binom.
Nationalität	Nominal	Deutsch	Deutsch	Binom.
Familienstand	Nominal	Verheiratet	Verheiratet	Multinom.
Haushaltsgröße	Ordinal	2	2	Multinom.
Wohnfläche	Ordinal	70 - <75	75 - <80	
Stellung Beruf	Nominal	Selbstst. o. Beschäftigte	Angestellte	
Beamter	Nominal	Nein	Nein	Binom./Pois.
Gebäudetyp	Nominal	Mehrfamilienh. 3-6 W.	Mehrfamilienh. >13 W.	
Gebäudenutzung	Nominal	Wohnzwecke vermietet	Wohnzwecke vermietet	
Gauß-Krüger X				
Gauß-Krüger Y				



Einleitung

Binäre Modelle

Methoden

- Logit Modell $h(\eta) = \frac{e \times p(\eta)}{1 + e \times p \eta}$,, logistic cdf
- Probit Modell $\Phi(\eta) = \int_{-\infty}^{\eta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp(-\frac{1}{2}x^2) dx$, standard normal cdf
- Komplementäres Log-Log Modell $h(\eta) = 1 exp(-exp(-\eta))$, extreme value cdf

Kategorielle Modelle

- Multinomiales Logit Modell (sl.106) $h(\eta) = \frac{exp(\eta)}{1+exp\eta}$, logistic cdf
- Kumulatives geordnetes Logit Modell (sl. 117) = Prop. Odds Modell
 - $\Phi(\eta) = \int_{-\infty}^{\eta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp(-\frac{1}{2}x^2) dx$, standard normal cdf

Splines

Methoden 00

- Penalised-Spline (Elmar slides)
- Tensor Penalised spline (Elmar slides)

Modellwahl

Einleitung

Quellen & Literatur

- Beamer Paket
 http://latex-beamer.sourceforge.net/
- User's Guide to the Beamer
- DANTE e.V. http://www.dante.de