



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA**

**FRENILECTOMÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  
COMPROMETIDOS SISTEMICAMENTE.REPORTE DE CASOS.**

Trabajo de Grado para optar al título de  
ODONTÓLOGO GENERAL

Autoras:  
Prosdocimi Alessandra.  
V-29.574.463  
Reyes Nathacha.  
V-29.727.024

Tutor: Pino Rodrigo.

San Diego, noviembre del 2023



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA DE ODONTOLOGIA**

**FRENILECTOMÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS**  
**COMPROMETIDOS SISTEMICAMENTE. REPORTE DE CASOS**

**Autor(es):** Br. Prosdocimi Alessandra

Br. Reyes Nathacha

**Línea de Investigación:** Odontología Clínica y Correctiva

**Tutor:** Od. Rodrigo Pino

**Fecha:** Noviembre, 2023

**RESUMEN INFORMATIVO**

**Introducción:** La frenilectomía es el acto quirúrgico empleado para la remoción del frenillo labial superior o frenillo lingual, específicamente al tejido blando basado en una plastificación anatómica donde se secciona el frenillo que une la lengua o labios a la encía. **Objetivo General:** Describir las mejores técnicas empleadas para el abordaje quirúrgico del frenillo de inserción baja superior en dos pacientes pediátricos comprometidos sistémicamente. **Metodología:** El presente trabajo es un estudio de casos en dos pacientes pediátricos comprometidas sistémicamente de género femenino, tomando en cuenta que una de las pacientes posee un trastorno de la coagulación (Trombofilia) y otra paciente posee una alteración en los niveles de glicemia, donde se les realizó la remoción del frenillo labial de inserción baja, empleando así la técnica z-plastia y técnica con electrobisturí, comparando de tal manera ambas técnicas y eficacia o rapidez de cicatrización de los tejidos y cómo influye en sus tratamientos ortodónticos actuales y futuros. **Resultados:** estos fueron satisfactorios en ambos casos, donde el proceso de cicatrización de los tejidos es eficaz y se logra evidenciar el cierre del diastema posterior al acto quirúrgico, por lo que se concluye que ambas técnicas pueden ser empleadas y no conllevan un estado de riesgo para el paciente si se aplican siguiendo todos los pasos operatorios adecuados.

**Descriptor:** Cirugía Bucal, Compromiso Sistémico, Frenectomía, Frenotomía, Odontopediatría.