



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÉ
ANTONIO PÁEZ FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD ESCUELA DE
ODONTOLOGÍA
CARRERA: ODONTOLOGÍA



ULCERA LINGUAL DE ORIGEN TRAUMÁTICO RELACIONADO CON LA DENTICIÓN (SÍNDROME DE RIGA- FEDE)

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de
odontólogo.

Autoras:

Br. Sabrina, León

C.I 30.426.216

Br. Alejandra, Pérez

C.I 30.005.242

Tutora: Od. Verónica Ruiz

San Diego, noviembre de 2023



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA



**ULCERA LINGUAL DE ORIGEN TRAUMÁTICO RELACIONADO CON LA
DENTICIÓN (SÍNDROME DE RIGA-FEDE)**

Autora: Br. Sabrina León

Autora: Br. Alejandra Pérez

Tutor: Od. Verónica Ruiz

Fecha: octubre 2023

Línea de investigación: Odontología Clínica y Correctiva

RESUMEN INFORMATIVO

Introducción: La enfermedad de Riga-Fede se caracteriza por una ulceración persistente de la mucosa bucal a traumatismos repetidos de la lengua por los dientes primarios anteriores durante el movimiento hacia adelante y hacia atrás, generalmente causado por los bordes incisales cortantes de los incisivos inferiores. **Objetivo General:** Examinar las causas que ocasionan la ulcera lingual de origen traumático relacionado con la dentición (síndrome de Riga- Fede). **Metodología:** Se aplicó una revisión bibliográfica de modalidad documental y un nivel de profundidad analítico descriptivo, utilizando motores de búsqueda como google académico, donde fueron consultadas las bases de datos, se aplicaron palabras clave en idioma español e inglés. Para la recolección de la información se empleó la ficha bibliográfica, y se llevó a cabo la técnica análisis de contenido. **Resultados:** Se encontraron estudios que reportaron casos clínicos sobre la enfermedad de Riga-Fede determinando que la causa principal son los dientes natales y neonatales, entre otras causas menos comunes está el trauma con otros dientes temporales y permanentes y problemas neurológicos. **Conclusiones:** La úlcera de Riga-Fede es mayormente evidenciada en bebés a causa del trauma durante la lactancia relacionado al diente natal o neonatal y se trata con exodoncia en caso de que el diente esté móvil o con terapias menos invasivas como el recubrimiento de los incisivos según lo considere el odontólogo y de acuerdo a la severidad de la lesión.

Descriptor: Cavidad oral, ulcera lingual, dientes natales y neonatales

- Analizar las alternativas de tratamiento de la ulcera lingual (síndrome Riga-Fede).

1.4 Justificación de la investigación.

El síndrome de Riga-Fede en la cavidad oral supone un tema de relevancia a nivel académico, ya que permitiría no sólo al profesional médico un enfoque diferente a la terapéutica implementada para su origen y prevención que integre la atención odontológica, sino que también estimularía al Odontólogo a tomar una actitud más crítica ante la etiología de la patología y como esta se puede agravar. La presencia de la ulcera lingual Riga-Fede puede tener otras etiologías que incluyen alergias, infecciones bacterianas, trastornos inmunológicos y condiciones metastásicas.

Así mismo, la presente investigación se justifica académicamente porque se encuentra enmarcada en la línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Odontología de la Universidad José Antonio Páez denominada Odontología Clínica y Correctiva. En este sentido, se pondrá en práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera haciendo especial énfasis sobre función del odontólogo al atender a un paciente pediátrico que tenga una ulcera lingual síndrome Riga-Fede.