



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
ODONTOLOGÍA CLÍNICA Y CORRECTIVA**



**DIENTES DE HUTCHINSON COMO MANIFESTACIÓN
ORAL PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE SÍFILIS CONGÉNITA
TARDÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar por el título de Odontólogo

Autores:

Montilla Grecia C.I V-29.930.574

Suárez María C.I V-29.517.782

Tutora:

Od. Janeth Rodríguez

San Diego, Octubre 2023



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
ESCUELA DE ODONTOLOGÍA.
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
ODONTOLOGÍA CLÍNICA Y CORRECTIVA



DIENTES DE HUTCHINSON COMO MANIFESTACIÓN ORAL PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE SÍFILIS CONGÉNITA TARDÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Autoras: Montilla Grecia
Suárez María

Tutora: Od. Janeth Rodríguez

Fecha: Octubre 2023

RESUMEN

Introducción: Los dientes de Hutchinson forman parte de las manifestaciones y secuelas tardías de la sífilis congénita. Este tipo de dientes están caracterizados por la alteración en la forma de los incisivos centrales superiores, aunque también pueden estar afectados los dientes centrales y laterales inferiores. Ciertamente, esta enfermedad en etapa tardía es una patología sistémica que puede conducir a varios problemas de salud a largo plazo. **Objetivo:** analizar la malformación de los dientes de Hutchinson como manifestación oral para el diagnóstico temprano de sífilis congénita tardía en pacientes pediátricos. **Metodología:** investigación Tipo documental, de nivel descriptivo. Se realizó una revisión de artículos publicados sobre el tema objeto de estudio utilizando como fuente de información: MedLine, y el motor de búsqueda de Google Académico. **Resultados:** uno de los signos más importantes de la sífilis congénita es la presencia de dientes de Hutchinson, una anomalía dental que afecta al esmalte dental y se presenta como pequeñas muescas o ranuras en los bordes de los dientes incisivos superiores y/o inferiores. **Conclusión:** Se resalta la importancia del diagnóstico precoz, mediante los métodos y características tanto clínicas como radiológicas, la presencia de factores desencadenantes y concurrentes de las diversas patologías bucales fisiológicas e histológicas.

Descriptores: Dientes de Hutchinson, Diagnóstico Temprano Sífilis Congénita Tardía, Pacientes Pediátricos