

L7 - A inversa no simplex & Dual Simplex

1 A inversa no simplex

1. Um modelo de PL na forma padrão pode ser escrito na forma matricial:

$$\begin{aligned}\min z &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0\end{aligned}$$

Ainda, considerando um conjunto de variáveis básica em uma solução qualquer, podemos reescrever esse modelo separando todos os coeficientes referentes às variáveis básicas (B) e não básicas (N), como:

$$\begin{aligned}\min z &= \mathbf{c}_B^T \mathbf{x}_B + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N \\ \mathbf{Bx}_B + \mathbf{Nx}_N &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq 0\end{aligned}$$

Em que:

- \mathbf{c}_B^T e \mathbf{c}_N^T são os vetores dos coeficientes das variáveis básicas e não básicas na função objetivo.
- \mathbf{B} e \mathbf{N} são as submatrizes da matriz tecnológica, referentes às colunas das variáveis básicas e não básicas.
- \mathbf{b} é o vetor dos recursos.

Considere o modelo de PL a seguir, e faça o que se pede:

$$\begin{aligned}\max z &= 5x_1 + 2x_2 \\ 10x_1 + 12x_2 &\leq 60 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 6 \\ x_1, x_2 &\geq 0\end{aligned}$$

- Escreva o modelo na forma matricial (encontre os elementos $\mathbf{c}^T, \mathbf{x}, \mathbf{A}, \mathbf{b}$ e reescreva o sistema com eles \rightarrow primeira forma matricial acima).
- Considerando a solução básica $\mathbf{x}_B^T = (x_1, x_2)$, reescreva o sistema na forma matricial com a separação das variáveis básicas (segunda forma matricial acima).
- A solução básica $\mathbf{x}_B^T = (x_1, x_2)$ é factível? (use a inversa de B para verificar os valores atualizados de \mathbf{b} , e verifique se eles são ≥ 0).
- Sabe-se que a solução ótima é dada por $\mathbf{x}_B^T = (x_3, x_1)$. Reconstrua todo o quadro Simplex com essa informação (use a inversa de B para recuperar todo o quadro).

2 Dual Simplex

2. Uma empresa produz dois produtos 1 e 2, e ambos são produzidos a partir de duas matérias primas, A e B. Uma unidade do produto 1 demanda 2 unidades da mp A e 1 da B. Já uma unidade do produto 2 demanda 4 unidades da MP A e 5 da B. Existe um estoque de 5 unidades

de A e 15 de B. Cada unidade do produto 1 é vendida a 10 reais e cada unidade do produto 2 a 7. Faça o que se pede:

- Encontre a solução ótima do problema pelo método Simplex e mostre a solução na região factível (modelo já resolvido na lista de Simplex Fase 2).
- A empresa teve o espaço físico reduzido, de forma que consegue armazenar no máximo 1 unidade do produto 1. A solução ótima encontrada anteriormente continua ótima? Mostre graficamente (represente a nova região factível). Se ela não continuar ótima, reotimize o problema usando o método dual Simplex.

3. Considere o modelo do sapateiro, dado por:

$$\begin{cases} x_1 : \text{Quantidade sapatos produzidos/hora} \\ x_2 : \text{Quantidade cintos produzidos/hora.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & Z(x_1, x_2) = 5x_1 + 2x_2 \\ \text{Sujeito à} \quad & 10x_1 + 12x_2 \leq 60 \\ & 2x_1 + 1x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \in R^+ \end{aligned}$$

Cujo quadro Simplex ótimo é dado pela Tabela 1

	x_1	x_2	x_3	x_4	$-z$
VB	0	1/2	0	5/2	15
x_3	0	7	1	-5	30
x_1	1	1/2	0	1/2	3

Tabela 1: Tabela ótima modelo do sapateiro

O sapateiro fechou um contrato com um cliente que exige que a quantidade de sapatos + cintos seja de exatamente 2 unidades.

- A solução ótima atual que o sapateiro possui satisfaz essa nova restrição? Mostre graficamente.
- Encontre a nova solução ótima a partir da antiga usando o método dual Simplex. DICA: Lembre-se que uma equação pode ser escrita como duas inequações, use essas inequação para dar início no dual Simplex:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \end{cases} \quad \text{é equivalente à:} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \geq 2 \end{cases}$$

- O método dual Simplex pode ser utilizado para encontrar a solução de um PL quando não temos uma solução inicial factível, ou seja, aplicamos o Dual-Simplex ao invés do método das variáveis artificiais (nem sempre isso é vantajoso, cada problema deve ser avaliado isoladamente). Considerando o modelo de PL:

$$\begin{array}{ll}\max & Z(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{Sujeito à} & x_1 + x_2 \geq 10 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 16 \\ & x_1, x_2 \in R^+\end{array}$$

Encontre a solução ótima por meio do método dual Simplex, e em seguida represente a região factível e a solução ótima graficamente.