

Appunti Analisi 1

Alexandru Gabriel Bradatan

Data compilazione: 27 settembre 2019

Indice

1 Insiemi

Vedi appunti di geometria e algebra lineare.

2 Numeri

2.1 Numeri naturali

Sono tutti i numeri interi positivi incluso lo 0.

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Può essere costruito a partire da un solo numero: basta aggiungere un'unità ogni volta.

Ha la proprietà di contenere sempre il successore a un numero: ci permette di usare il principio di induzione. Tutti i sottoinsiemi di \mathbb{N} godono del principio del minimo intero. Poiché è valido il principio del minimo intero, \mathbb{N} è un insieme ben ordinato.

Il principio di induzione Sia $S \subseteq \mathbb{N}$ un sottoinsieme tale che:

- $0 \in S$
- $\forall n \in S \implies n + 1 \in S$ (S ha sempre un successore)

Allora S coincide con \mathbb{N} .

Il principio di induzione ha una traduzione in termini logici. Il principio di induzione può essere usato per dimostrare teoremi in \mathbb{N} .

Il principio di induzione (logica) Sia $P(n)$ un predicato (proposizione) che dipende da $n \in \mathbb{N}$ tale che:

- quando $P(0)$ è vero
- $\forall n \in \mathbb{N} P(n) \implies P(n + 1)$: assumendo $P(n)$ come vero, riesco a dimostrare che il successore è vero

Esempio Dimostra $P(n) = 2^n > n \forall n \in \mathbb{N}$. $P(0)$ è vera: $2^0 > 0$. Suppongo che $P(n)$ sia vera, dimostro $P(n + 1)$: $2^n \cdot 2 > 2n \geq n + 1$ quindi $P(n + 1)$ è vera. Se $P(n + 1)$ è vera, allora vale il principio di induzione e tutto il predicato è vero in \mathbb{N} .

Principio del minimo intero Ogni sottoinsieme di \mathbb{N} ha un elemento minimo (più piccolo di tutti gli altri).

Definizioni delle operazioni in \mathbb{N}

Somma

$$+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$
$$somma(n1, n2) \rightarrow n1 + n2 \in \mathbb{N}$$

Prodotto

$$* : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$
$$prodotto(n1, n2) \rightarrow n1 \cdot n2 \in \mathbb{N}$$

Proprietà delle operazioni

commutativa $n_1 + n_2 = n_2 + n_1$

associativa $n_1 + (n_2 + n_3) = (n_1 + n_2) + n_3$

distributiva $n_1 \cdot (n_2 + n_3) = n_1 \cdot n_2 + n_1 \cdot n_3$

2.1.1 Sommatoria

Si indica con la sigma maiuscola:

$$\sum_{i \in I} a_i$$

Dove:

- I è un insieme finito. I suoi elementi sono chiamati indici (segnaposti: indicano una posizione)
- $(a_i)_{a \in I}$ è una famiglia di numeri che dipendono da i

Esempio Dati $I = 1, 2, 3, a_i = 2^i$, possiamo scrivere $\sum_{i \in I} a_i = 2^1 + 2^2 + 2^3$

Alcune sommatorie famose

Formula di Gauss $\sum_{i=1}^n (i) = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$

Somma di una progressione geometrica

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n a_i &= \sum_{i=0}^n a q^i = a \sum_{i=0}^n q^i = \\ &= a \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) \\ \text{se } q &= 1 \quad = a(n+1) \end{aligned}$$

Dimostrazione:

$$\sum_{i=0}^n q^i = \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$$

Dimostriamo che: $(1 - q) \sum_{i=0}^n q^i = 1 - q^{n+1}$

$$\begin{aligned} (1 - q) \sum_{i=0}^n q^i &= \sum_{i=0}^n q^i - q \sum_{i=0}^n q^i \\ &= \sum_{i=0}^n q^i - \sum_{i=0}^n q^{i+1} \\ &= \sum_{i=0}^n q^i - \sum_{i=1}^{n+1} q^i \\ &= (q^0 + \sum_{i=1}^{n+1} q^i) - (\sum_{i=0}^n q^i + q^{n+1}) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{n+1} q^i - \sum_{i=0}^n q^i - q^{n+1} \\ &= 1 - q^{n+1} \implies \text{è dimostrato} \end{aligned}$$

Le proprietà della sommatoria

- La sommatoria è un operatore lineare
- l'indice è muto: non importa il nome dell'indice
- traslando gli indici, la sommatoria non cambia: è importante che il numero di elementi sia uguale
- si definiscono sommatorie anche su due o più famiglie di indici: prima sommo una famiglia, poi l'altra: $\sum_{i \in I, j \in J} a_{ij}$

Esempio: $\sum_{i \in I, j \in J} (i)^j = \sum_{i=1}^2 (\sum_{j=0}^3 (i)^j)$

- vale la proprietà dissociativa: $\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i$
- le costanti possono essere portate fuori: $\sum_{i \in I} K a_i = K \cdot \sum_{i \in I} a_i$
- scomposizione di una sommatoria: $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^k a_i + \sum_{i=k+1}^n a_i$
- riflessione degli indici: $\sum_{i=0}^n = \sum_{i=0}^n a_{n-i}$

2.1.2 La produttoria

Si indica con un grande pi greco. E' uguale alla sommatoria ma al posto di fare la somma fa il prodotto.

Proprietà

- $\prod_{i \in I} k a_i = k^{\#I} \prod_{i \in I} a_i$ - Non vale la dissociativa