



FICHE ENSEIGNEMENT SUAP 2019-5

Arrêt des hémorragies: c'est le résultat qui compte!



EVENEMENT : Les secours sont envoyés pour un accident de la circulation sur le périphérique avec notion d'un motard ayant une fracture ouverte de la cheville . A l'arrivée du PSE, compliquée par une circulation dense, il y a deux victimes, le conducteur blessé à la cheville et sa passagère qui présente de légères contusions. Il s'agit d'une fracture ouverte de la cheville droite, assez délabrée et déformée avec un écoulement de sang en nappe. Un garrot tourniquet est posé au plus près de la plaie. Malgré un bon serrage, le saignement n'est pas stoppé. Un deuxième garrot tourniquet est posé au dessus du premier, toujours sur la jambe. Lui aussi est inefficace. Un point de compression à distance en fémoral est immédiatement effectué et le saignement s'arrête. L'équipe médicale garde la compression fémorale et évacue rapidement la victime.

POINT POSITIF:

- L'arrêt du saignement (même si le geste commandé n'est plus enseigné)

POINT NÉGATIF :

- Inefficacité des garrots tourniquets posés l'un au dessus de l'autre sur la jambe. Vaisseaux sanguins non compressibles? Saignement osseux?

ENSEIGNEMENTS- POINTS CLES

- **L'arrêt d'une hémorragie** en zone garrotable fait partie du bilan primaire et **doit être réalisée dès l'abord de la victime**
- **La pose d'un garrot en segment distal** (avant-bras, jambe) **est priorisée** car s'il est efficace cela permet de réduire la zone du corps non vascularisée
- **S'il n'est pas efficace:**
 - **Soit** on ne peut pas le serrer suffisamment (manque un quart de tour) et un deuxième garrot, quel qu'il soit, est positionné **juste au dessus;**
 - **Soit** il est bien serré et le deuxième garrot est préférentiellement posé **en proximal** (bras, cuisse) car cela permet de stopper l'alimentation du segment distal.
- Ne pas oublier l'utilisation possible du pansement hémostatique avec PCU.
- Le recours à la compression à distance si aucune méthode n'est efficace n'est pas répréhensible , surtout si la victime a déjà beaucoup saigné. **Il s'agit alors d'une violation de procédure nécessaire à la réalisation de l'objectif de sauvegarde.**