

2023년 2학기 수학2

제12장 다변수 벡터함수

2023년 9월 23일

1 야코비 행렬

다음과 같은 함수를 다변수 벡터 함수라 부른다.

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m : F(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

Recall : $f(X) \approx f'(P)(X - P) + f(P)$ = (가로벡터) $\begin{pmatrix} \text{세} \\ \text{로} \\ \text{벡} \\ \text{터} \end{pmatrix}$ + 실수.

그러므로

$$F(X) \approx \begin{pmatrix} f_1'(P)(X - P) + f_1(P) \\ \vdots \\ f_m'(P)(X - P) + f_m(P) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1'(P) \\ \vdots \\ f_m'(P) \end{pmatrix}_{(m \times n)} (X - P)_{(n \times 1)} + \begin{pmatrix} f_1(P) \\ \vdots \\ f_m(P) \end{pmatrix}_{(m \times 1)} := F'(P)(X - P) + F(P).$$

이 때, 행렬 $F'(P)$ 를 점 P 에서 함수 F 의 야코비 행렬 (Jacobi matrix)라 부른다.

(표현)

$$F' = \frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{(m \times n)}$$

(야코비행렬의 사이즈)

$$(\text{성분함수의 갯수}) \times (\text{변수의 갯수}) = (\text{공역공간의 차원}) \times (\text{정의역공간의 차원}) = (\text{뒤}) \times (\text{앞})$$

(야코비행렬의 행과 열)

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

• (p537)

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^x \cos y \\ e^x \sin y \\ x + y \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow F' = \frac{\partial(e^x \cos y, e^x \sin y, x+y)}{\partial(x, y)} = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow F' \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow F \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \approx F' \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-0 \\ y-0 \end{pmatrix} + F \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+1 \\ y \\ x+y \end{pmatrix}$$

이래 놓고 보니 **non-linear** 함수인 F 를 점 $(0, 0)$ 근방에서 선형변환과 평행이동의 합성으로 근사하였다.
이것이 미분의 본연의 목표인것이고 *Newton* 선생님의 로망인 것이다. 이래서 선형변환의 수학인 선형 대수를 수학의 절반 이라고 하는것이다.

- $F = AX$ 인 선형변환으로 주어져 있다.

$$\Rightarrow F'(X) \equiv A.$$

선형변환 복습, 정의

선형변환 $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 은

$$L(ax + by) = aL(x) + bL(y), \quad \Leftrightarrow \quad L(x) = Ax, \text{ for some } (m \times n) \text{ matrix } A.$$

이 때, 행렬 A 는 기본단위벡터들의 상을 세로로 써서 나열한 것이다:

$$A = \begin{pmatrix} L(e_1) & L(e_2) & \cdots & L(e_n) \end{pmatrix}$$

선형변환의 기하적 성질

1. 평평한 object \rightarrow 평평한 object.
2. colinear 한 세 점의 거리비를 보존한다.
3. 평행성을 보존한다.

정사각행렬

정의공간과 공역공간의 차원이 같은 선형변환 $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 에 대응되는 행렬은 정사각행렬이다.

$$\bullet \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc. \quad \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} =$$

- $\det A \neq 0 \Leftrightarrow$ 역행렬 A^{-1} 가 존재 \Leftrightarrow 넓이 또는 부피가 있는 물건 \rightarrow 넓이 또는 부피가 있는 물건
정사각형 \rightarrow 평행사변형, 정육면체 \rightarrow 평행육면체

- $\det A > 0 \Leftrightarrow$ 향orientation을 보존. 즉, 상image는 거울상이 아니다.

- $|\det A| =$ 부피의 변화율.

야코비행렬식(Jacobian determinant or Jacobian)과 국소적 부피변화율.(p539)

일차근사 = 선형변환과 평행이동의 합성.

그러므로 함수 $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 에서

$$F : \text{점 } P \text{의 (한없이) 작은 근방} \rightarrow \text{점 } F(P) \text{의 (한없이) 작은 근방}$$

인데 이 때, 국소적 부피 변화율은 $|\det F'(P)|$ 이다.

중요한 예들 이 예들은 제14장 다중적분 에서 치환적분을 할 때 중요한 예 들이다.

- (극좌표 치환)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \text{det } \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r.$$

- (기둥좌표 치환)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = r.$$

- (구면좌표 치환)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \rho \sin \varphi \sin \theta \\ \rho \cos \varphi \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} = \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} = \rho^2 \sin \varphi.$$

2 연쇄법칙

연쇄법칙 (chain rule)

- 종속량 u 는 x, y 의 함수이고 x, y 는 t 의 함수이다 :

$$t \mapsto (x, y) \mapsto u.$$

위의 합성함수의 연쇄법칙을 보자.

$$\frac{du}{dt} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \frac{\partial u}{\partial(x, y)} \frac{d(x, y)}{dt}.$$

- 종속량 u 는 x, y, z 의 함수이고 x, y, z 는 α, β, γ 의 함수이다 :

$$(\alpha, \beta, \gamma) \mapsto (x, y, z) \mapsto u.$$

위 합성함수 미분법을 잘 적용해 보자.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} &= \left(\frac{\partial u}{\partial \alpha}, \frac{\partial u}{\partial \beta}, \frac{\partial u}{\partial \gamma} \right) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial \alpha}, \frac{\partial u}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial \beta}, \frac{\partial u}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial \gamma} \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial(x, y, z)} \left(\frac{\partial(x, y, z)}{\partial \alpha}, \frac{\partial(x, y, z)}{\partial \beta}, \frac{\partial(x, y, z)}{\partial \gamma} \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \end{aligned}$$

- u_1, u_2, u_3 는 x, y, z 의 함수이고 x, y, z 는 α, β, γ 의 함수이다 :

$$(\alpha, \beta, \gamma) \mapsto (x, y, z) \mapsto (u_1, u_2, u_3).$$

위 합성함수 미분법을 잘 적용해 보자.

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u_1, u_2, u_3)}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \\ \frac{\partial u_2}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \\ \frac{\partial u_3}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \\ \frac{\partial u_2}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \\ \frac{\partial u_3}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial(x, y, z)} \\ \frac{\partial u_2}{\partial(x, y, z)} \\ \frac{\partial u_3}{\partial(x, y, z)} \end{pmatrix} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \\ &= \frac{\partial(u_1, u_2, u_3)}{\partial(x, y, z)} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\alpha, \beta, \gamma)} \end{aligned}$$

- 일반적으로 합성

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_l) \mapsto (\beta_1, \dots, \beta_m) \mapsto (u_1, \dots, u_n).$$

에 대해

$$\frac{\partial(u_1, \dots, u_n)}{\partial(\alpha_1, \dots, \alpha_l)} = \frac{\partial(u_1, \dots, u_n)}{\partial(\beta_1, \dots, \beta_m)} \frac{\partial(\beta_1, \dots, \beta_m)}{\partial(\alpha_1, \dots, \alpha_l)}, \quad ((n \times l) = (n \times m)(m \times l)).$$

(증명). 이 사실의 증명은 위에서 이미 했는데 위에서는 쓸데없이 친절하게 한 느낌이 있다. 행렬곱의 규칙과

야코비행렬의 정의와 합성함수 미분법 1을 안다면 당연한 것이다.

$$\frac{\partial u_i}{\partial \alpha_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial u_i}{\partial \beta_k} \frac{\partial \beta_k}{\partial \alpha_j} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_i}{\partial \beta_1} & \cdots & \frac{\partial u_i}{\partial \beta_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \beta_1}{\partial \alpha_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial \beta_m}{\partial \alpha_j} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial(u_1, \dots, u_n)}{\partial(\beta_1, \dots, \beta_m)} \text{의 } i\text{-th 가로} \right) \left(\frac{\partial(\beta_1, \dots, \beta_m)}{\partial(\alpha_1, \dots, \alpha_l)} \text{의 } j\text{-th 세로} \right).$$

□

주의할 점은 순서를 바꾸면 안된다는 것이다. 일단 두 행렬을 곱하는 순서를 바꾸려 하면 행렬의 사이즈조차 맞지 않는다 : 아래 식의 우변의 두 행렬은 곱할 수 없다. 설령 $l = m = n$ 인 경우라 할지라도, 일단 행렬의 곱하기는 교환법칙이 성립하지 않을뿐 더러 선형사상의 적용순서에 대한 문법에도 맞지 않는다.

$$\frac{\partial(u_1, \dots, u_n)}{\partial(\alpha_1, \dots, \alpha_l)} \neq \frac{\partial(\beta_1, \dots, \beta_m)}{\partial(\alpha_1, \dots, \alpha_l)} \frac{\partial(u_1, \dots, u_n)}{\partial(\beta_1, \dots, \beta_m)}$$

연쇄법칙 (chain rule)을 거칠게 설명하면

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{F} \mathbb{R}^m \xrightarrow{G} \mathbb{R}^l \quad \Rightarrow \quad (G \circ F)'(P) = G'(F(P))F'(P)$$

왜냐하면 (아주 거칠게 설명하여)

$$F(\mathbf{X}) \approx F'(P)(\mathbf{X} - P) + F(P).$$

$$G(F(\mathbf{X})) \approx G'(F(P))(F(\mathbf{X}) - F(P)) + G(F(P)) \approx G'(F(P))F'(P)(\mathbf{X} - P) + G(F(P)).$$

- $u = x^2 + y^2$, $v = x^2 - y^2$, $x = t + s$, $y = t - s$ 일 때, $\frac{\partial(u, v)}{\partial(t, s)}$ 를 구하시오.
(풀이)

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(t, s)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(t, s)} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 2x & -2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- $u = xy$, $v = x$, $x = t^2 + s^2$, $y = t^2 - s^2$ 일 때, $\frac{\partial(u, v)}{\partial(t, s)}$ 를 구하시오.
(풀이)

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(t, s)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \frac{\partial(x, y)}{\partial(t, s)} = \begin{pmatrix} y & x \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2t & 2s \\ 2t & -2s \end{pmatrix}$$

- $u = xy$, $v = x$, $x = t^2 + s^2$, $y = t^2 - s^2$ 일 때, $\frac{\partial(u, v)}{\partial(t, s)} \Big|_{(t, s) = (3, 2)}$ 를 구하시오.
(풀이)

$$(t, s) = (3, 2) \quad \Rightarrow \quad (x, y) = (13, 5).$$

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(t, s)} \Big|_{(t, s) = (3, 2)} = \begin{pmatrix} y & x \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Big|_{(x, y) = (13, 5)} \begin{pmatrix} 2t & 2s \\ 2t & -2s \end{pmatrix} \Big|_{(t, s) = (3, 2)} = \begin{pmatrix} 5 & 13 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}.$$

제12장 끝.