



UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

MATEMÁTICAS

ÁLGEBRA LINEAL II

Taller 2

Alexander Mendoza

12 de abril de 2024

Taller 2

1. Si $A \in M_{n \times n}(F)$ es invertible y $\deg m_A(x) = P$. Demostrar que A^{-1} es una combinación de $I_n, A, A^2, \dots, A^{P-1}$.

Sea A una matriz invertible de $n \times n$. Dado que A es invertible, $\det(A) \neq 0$, lo que implica que el polinomio característico $P_A(\lambda) \neq 0$, es decir, $\lambda \neq 0$. Por el teorema de Cayley-Hamilton, $P(A) = 0$. Si escribimos $P(A)$ de forma general como $b_0 I + b_1 A + \dots + b_n A^n = 0$, entonces A^{-1} se puede expresar como:

$$A^{-1} = \left(\frac{-b_1}{b_0} \cdot I - \frac{b_2}{b_0} \cdot A - \dots - \frac{b_n}{b_0} A^{n-1} \right)$$

2. Determine el polinomio característico y el polinomio mínimo de cada una de las siguientes matrices.

a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_A(\lambda) = -(1-\lambda)(1-\lambda)(1-\lambda)$$

$$P_A = -(A - I)^3 = 0$$

$$1) (I - A)^2 = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$2) (I - A)^2 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por el teorema, $(I - A)^3 = 0$, por lo tanto, el polinomio característico es el mismo que el minimal.

b) Sea la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{bmatrix}$$

La suma $A + D$ es:

$$A + D = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 & 0 \\ -1 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & -1 - \lambda \end{bmatrix}$$

El polinomio característico se calcula como:

$$\begin{aligned} \det(A + D) &= (1 - \lambda)((\lambda^2 - 2) - 1 - \lambda) \\ &= -\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 3 \\ &= (\lambda + 1, 3593)(\lambda - 1, 1797 + 0, 9030i)(\lambda - 1, 1797 - 0, 9030i) \end{aligned}$$

donde $\alpha = 1 + 1, 3593$, $\beta = 1 - 1, 1797 + 0, 9030i$, y $\gamma = 1 - 1, 1797 - 0, 9030i$.

Para la posibilidad 1:

$$(A + 1, 3593I)(A - 1, 1797I + 0, 9030iI) = \begin{bmatrix} 2, 36 & 0 & 0 \\ -1 & 2, 36 & 0 \\ 0 & 0 & -0, 64 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0, 1797 & 1 & 0 \\ -1 & -0, 8571 & 1 \\ 0 & 1 & -2, 1797 \end{bmatrix}$$

= Resultado de la suma

c) Sea la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

d) Sea la matriz y sean $a, b \in \mathbb{R}$

$$\begin{bmatrix} b & a & 0 \\ 0 & b & a \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} b & a & 0 \\ 0 & b & a \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$$

Dado que A es triangular superior, su polinomio característico es $(b - \lambda)^3$.

Para encontrar el polinomio minimal, consideramos las potencias de $(b - \lambda)$:

1) $(b - \lambda)$:

$$(bI - A) = \begin{bmatrix} b - \lambda & -a & 0 \\ 0 & b - \lambda & -a \\ 0 & 0 & b - \lambda \end{bmatrix}$$

Si $a = 0$, el polinomio minimal es $(b - \lambda)$. Si $a \neq 0$, continuamos.

2) $(b - \lambda)^2$:

$$(bI - A)^2 = \begin{bmatrix} 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3) $(b - \lambda)^3 = (b - \lambda)^2 \cdot (bI - A)$:

$$(bI - A)^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b - \lambda & -a & 0 \\ 0 & b - \lambda & -a \\ 0 & 0 & b - \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Con esto, el polinomio minimal de A es el mismo que su polinomio característico.

e) Sea la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Calcular el polinomio característico de A es equivalente a calcular el de las submatrices que lo conforman.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 8 \\ 0 & 2 - \lambda \end{bmatrix} &= (2 - \lambda)^2 - 8(0) = (2 - \lambda)^2 \\ \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 1 & 3 - \lambda \end{bmatrix} &= (4 - \lambda)(3 - \lambda) - (1)(2) = (\lambda - 5)(\lambda - 2) \\ \begin{bmatrix} 0 - \lambda & 3 & 0 \\ 0 & 0 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix} &= -\lambda \begin{bmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Realizando los cálculos, obtenemos que:

$$P_A(\lambda) = (2 - \lambda)^2(\lambda - 5)^2(\lambda - 2)(-\lambda)^2$$

Posibilidades:

$$\begin{bmatrix} 4 & 32 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & 14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 11 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 25 \end{bmatrix}$$

Minimal: $(-\lambda)^2(\lambda - 5)^2(\lambda - 2)$

Minimal: $(-\lambda)^2(\lambda - 5)^2(\lambda - 2)$

$$\begin{bmatrix} 4 & 32 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & 14 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 11 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 25 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 32 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 50 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 25 & 25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 75 \end{bmatrix}$$

$$= (\lambda^2)(\lambda - 2)$$

$$(\lambda - 5)$$

$$\begin{bmatrix} -3 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = (\lambda - 5) \Rightarrow \begin{bmatrix} 9 & -48 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = (\lambda - 5)^2$$

Por lo tanto, el polinomio minimal es $(-\lambda)^2(\lambda - 5)^2(\lambda - 2)$.

3. Demuestre que la transpuesta A^t de una matriz A tienen el mismo polinomio minimal.

Para demostrar que la matriz transpuesta A^T de una matriz A tiene el mismo polinomio minimal, observamos que

$$\begin{aligned}
\lambda_A(\lambda) &= \det(\lambda \text{In} - A) \\
&= \det(\lambda(\text{In}^T) - A) \\
&= \det(\lambda \text{In} - A^T) = \lambda^t(A)(\lambda)
\end{aligned}$$

Esto muestra que el polinomio minimal de A es igual al de A^T . Por lo tanto, A y A^T tienen el mismo polinomio minimal.

4. Demuestre que el término constante en el polinomio característico de A es $\det(A)$

Según la definición, tenemos:

$$P(\lambda) = \det \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} = (-1)^n (\lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + c_2 \lambda^{n-2} + \cdots + c_n)$$

Sustituimos $\lambda = 0$:

$$P(0) = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = (-1)^n (0^n + c_1 \cdot 0^{n-1} + c_2 \cdot 0^{n-2} + \cdots + c_n)$$

Simplificando, obtenemos:

$$\det(A) = c_n$$