BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1950 Ausgegeben am 10. Februar 1950 8. Stück

40. Verordnung: Maßnahmen zur Hintanhaltung der Weiterverbreitung der weißen Kückenruhr und des Geflügeltyphus.

41. Kundmachung: Ermächtigung der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zur Einrichtung der erweiterten Vormundschaft für die Sprengel der Bezirksgerichte Feldkirch und Dornbirn.

40. Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 15. Dezember 1949, betreffend Maßnahmen zur Hintanhaltung der Weiterverbreitung der weißen Kückenruhr und des Geflügeltyphus.

Auf Grund des § 1, zweiter Absatz, des Gesetzes vom 6. August 1909, RGBl. Nr. 177, in der geltenden Fassung, betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen, wird im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministerien verordnet, wie folgt:

§ 1. (1) Geflügelzüchter und Geflügelhalter dürfen Bruteier an Brütereien, die Kücken in Brutapparaten erbrüten, nur abgeben, wenn ihre Geflügelbestände nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen der Blutuntersuchung auf weiße Kückenruhr und Geflügeltyphus unterzogen worden sind und sie sich mit einer Bescheinigung nach § 4 dieser Verordnung ausweisen können.

(2) Brütereien der im Abs. 1 bezeichneten Art dürfen zum Ausbrüten Eier aus eigenen oder fremden Beständen nur dann verwenden, wenn diese Bestände nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen der Blutuntersuchung auf weiße Kückenruhr und Geflügeltyphus unterzogen worden sind.

§ 2. (1) Die Richtlinien für die Verfahrensarten (Frischblutschnellagglutination und Serumlangsamagglutination, im folgenden kurz Schnell-, bzw. Langsamverfahren genannt), nach welchen die Blutuntersuchung vorzunehmen ist, werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft festgelegt.

(2) Zur Feststellung der Keimträger kann das Schnell- oder Langsamverfahren angewendet werden. Die Wahl des Verfahrens ist dem von der Bezirksverwaltungsbehörde hiezu beauftragten Tierarzte im Einvernehmen mit dem Verfügungsberechtigten des Geflügelbestandes überlassen.

(3) Das Schnellverfahren darf nur von Tierärzten vorgenommen werden. Die Blutentnahme beim Langsamverfahren ist in der Regel von Tierärzten vorzunehmen; Ausnahmen hievon können vom Landeshauptmann festgesetzt werden.

(4) Die Blutuntersuchung darf nicht vor Legereife der weiblichen Tiere, frühestens ab 15. Oktober, und die der männlichen Tiere nicht vor dem 5. Lebensmonat vorgenommen werden.

§ 3. (1) Ergibt das Blutuntersuchungsverfahren in einem Bestande, daß mehr als 10 v. H. (ab 15. Oktober 1954 mehr als 5 v. H.) des Geflügels Keimträger sind, so dürfen aus diesem Bestande Bruteier nicht abgegeben werden.

(2) Es bleibt dem Besitzer anheimgestellt, nach sofortiger dauernder Beseitigung des als Keimträger erkannten Geflügels aus dem Bestande eine neue Blutuntersuchung mit dem Langsamverfahren vornehmen zu lassen, jedoch nicht vor Ablauf von fünf Wochen nach der ersten Blutuntersuchung.

(3) Nach Entfernung der Keimträger ist sofort die Desinfektion der Aufenthaltsräume und deren Einrichtungsgegenstände sowie der Geflügelausläufe durchzuführen (Anlage C, Abschnitt B).

§ 4. (1) Ergibt die Blutuntersuchung die Unbedenklichkeit des Geflügelbestandes (keine oder eine geringere Verseuchung als 10 v. H. [ab 15. Oktober 1954 eine geringere als 5 v. H.]), so ist dies dem Geflügelzüchter, bzw. Geflügelhalter von dem mit der Untersuchung beauftragten Tierarzt mit einer Bescheinigung nach Anlage A zu bestätigen.

(2) Die Bescheinigung darf erst ausgestellt werden, wenn bei einem festgestellten Befall von weniger als 10 v. H. (ab 15. Oktober 1954 von weniger als 5 v. H.) des Bestandes das als Keimträger erkannte Geflügel dauernd aus dem Bestande entfernt und die vorgeschriebene Desinfektion durchgeführt wurde sowie Vorkehrungsmaßnahmen getroffen sind, daß dieser Bestand von nichtuntersuchten Tieren aus fremden Beständen dauernd abgesondert gehalten wird.

(3) Alle Tiere in Geflügelbeständen, aus denen Eier in Brütereien verwendet werden sollen, sind mit geschlossenen, numerierten Fußringen,

die im Alter von zehn bis zwölf Wochen anzulegen sind, zu kennzeichnen.

(4) In der Brutsaison 1950 ist auch die Kennzeichnung der über zwölf Wochen alten Tiere mit Flügeldruckknopfmarken zulässig.

(5) Den als Keimträger erkannten Tieren sind sofort nach der Feststellung der Seuche die Schwanzfedern kurz abzuschneiden.

§ 5. (1) Brütereien der im § 1 Abs. 1 bezeichneten Art sind verpflichtet, ihren Betrieb bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzumelden und ein Brutbuch zu führen, in das alle Eingänge an Bruteiern in der Reihenfolge der Einlage in die Brutapparate unter Anführung des Namens und der Anschrift der Bruteierlieferanten, der Stückzahl der übernommenen Bruteier und des Lieferdatums sowie des Datums der tierärztlichen Bescheinigung (Anlage A) samt Namen des Ausstellers einzutragen sind.

(2) Die Brutapparate sind nach jedem Schlupf zu reinigen und zu desinfizieren (Anlage C, Abschnitt A).

§ 6. Die Brütereien unterliegen besonders während der Brutsaison der veterinärbehördlichen Überwachung durch die Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt).

§ 7. (1) Die Kosten der Kennzeichnung des Geflügels (§ 4 Abs. 3) und des diagnostischen Verfahrens (Blutuntersuchung) fallen den Besitzern der zur Gewinnung von Bruteiern bestimmten Geflügelbestände zur Last.

(2) Die Höhe der Kosten für die Durchführung des Schnellverfahrens, für Blutentnahmen zum Zwecke der Einsendung der Blutproben an die Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung oder an eine Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen zur Feststellung der Keimträger mit dem Langsamverfahren und für die Ausstellung der tierärztlichen Bescheinigung (Anlage A) ist vom Landeshauptmann nach Anhörung der landwirtschaftlichen Hauptkörperschaft und der Berufsvertretung der Tierärzte des Landes festzusetzen und in der amtlichen Landeszeitung zu verlautbaren.

(3) Die Kosten für die laboratoriumsmäßige Untersuchung von Blutproben in der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung oder in einer Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen festgesetzt und verlautbart.

§ 8. Eier von Wildgeflügel dürfen nur in gesonderten Apparaten erbrütet werden; das gemeinsame Erbrüten von Wild- und Hausgeflügeleiern ist verboten.

§ 9. Übertretungen der Bestimmungen dieser Verordnung werden nach § 64 des Gesetzes vom 6. August 1909, RGBl. Nr. 177, in der geltenden Fassung, betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen, bestraft.

§ 10. Die Belehrung über die Erscheinungen der weißen Kückenruhr sowie des Geflügeltyphus und über deren wirksame Bekämpfung ist in der Anlage B enthalten.

Kraus

41. Kundmachung des Bundesministeriums für Justiz vom 2. Jänner 1950 über die Ermächtigung der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zur Einrichtung der erweiterten Vormundschaft für die Sprengel der Bezirksgerichte Feldkirch und Dornbirn.

Das Präsidium des Oberlandesgerichtes Innsbruck hat auf Grund des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1928, BGBl. Nr. 194, und der Verordnung vom 23. Jänner 1929, BGBl. Nr. 54, in der Fassung der Verordnung vom 28. September 1932, BGBl. Nr. 302, die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch zur erweiterten Vormundschaft für die Sprengel der Bezirksgerichte Feldkirch und Dornbirn ermächtigt und ihr die in § 3 des Bundesgesetzes vom 13. Juli 1928, BGBl. Nr. 194, angeführten Befugnisse übertragen.

Tschadek

Anlage A
zu BGBl. Nr. 40

Tierärztliche Bescheinigung

zur Durchführung der Verordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 15. Dezember 1949, BGBl. Nr. 40/1950, betreffend Maßnahmen zur Hintanhaltung der Weiterverbreitung der weißen Kückenruhr und des Geflügeltyphus.

Der nachstehend angeführte Geflügelbestand, und zwar (Angabe der Geflügelarten, hievon männlich, weiblich) .....
des ....., in ..... wurde
am ..... 19.....

*) und am ..... 19 .... dem diagnostischen Blutuntersuchungsverfahren (Frischblutschnellprobe, Serumlangsamprobe) unterzogen und.

*) seuchenfrei befunden.

*) Bei der ersten — zweiten — Untersuchung mit weniger als 10 v. H. ab 15. Oktober 1954 mit weniger als 5 v. H. des Bestandes verseucht befunden.

Das positiv reagierende (angesteckte) Geflügel wurde sofort nach Feststellung der Infektion geschlachtet — aus dem Bestande dauernd entfernt und die vorgeschriebene Desinfektion durchgeführt. Es sind entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen getroffen, daß das Geflügel dieses Bestandes von nichtuntersuchten Tieren aus fremden Beständen dauernd abgesondert gehalten wird.

Aus diesem Bestande dürfen sohin Bruteier an Brütereien, die Kücken abgeben, neun Monate lang, vom Tage der Ausstellung dieser Bescheinigung an gerechnet, geliefert werden.

....., am ..... 19.....

.....
Unterschrift des Amtstierarztes oder des beauftragten Tierarztes.)

*) Nichtzutreffendes streichen!

Anlage B
zu BGBl. Nr. 40

Belehrung

über die Erscheinungen der weißen Kückenruhr sowie des Geflügeltyphus und über die Bekämpfung dieser Seuchen.

1. Die weiße Kückenruhr (Pullorumseuche der Hühner) ist eine übertragbare Hühnerseuche, die durch einen besonderen Spaltpilz (Bakterium) verursacht wird.

Die Krankheit wird von Althennen, die selbst nicht sichtbar erkrankt zu sein brauchen, durch das Ei auf die Kücken übertragen. Nach Bebrütung von einigen Tagen lassen sich in einem hohen Prozentsatze der von angesteckten Hennen stammenden Eier die Krankheitserreger mikroskopisch nachweisen. Die stärkste Erregerausscheidung in die Eier erfolgt in der Hauptlegezeit. In diesen Eiern sterben die Kücken zum großen Teile noch in der Schale. Andere schlüpfen, erkranken an der Seuche, scheiden mit den Abgängen massenhaft Erreger aus und stecken so die Kücken aus gesunden Eiern an. Die Mehrzahl der Kücken stirbt, die andern erholen sich und sorgen, wenn sie erwachsen sind, für die Weiterverbreitung der Seuche durch Legen erregerhaltiger Eier. Auch erwachsene Hühner können sich untereinander anstecken. Der Hahn kann durch den Tretakt die Seuche übertragen. Die weiße Kückenruhr wird auch durch Eierfressen, Verfütterung ungekochter ausgebrüteter Eier, Schliereier, Windeier und besonders über die Brütereien, die Bruteier aus verseuchten Hühnerbeständen beziehen und Kücken abgeben, verbreitet.

Die Kücken erkranken an der weißen Ruhr in der Regel innerhalb der ersten zwei Lebenswochen, und zwar in den ersten drei Tagen, wenn sie die Krankheit aus dem Ei mitbringen, etwas später, wenn sie sie erst von ihren Gefährten erwerben. Die Zahl der Todesfälle schwankt zwischen 15 und 100 v. H. der Schar.

Die Kücken sind matt, lassen die Flügel hängen und nehmen Futter nicht mehr auf. Es stellt sich grünlicher oder bräunlichweißer Durchfall ein. Die Kotmassen verkleben die Flaumfedern am After. Es kommt zum Ansatz weißer, gips- oder mörtelähnlicher Massen, die den weiteren Kotabsatz behindern. Die Kücken schließen die Augen und sperren auch manchmal den Schnabel auf. Der Tod tritt bald ein.

Bei Seuchenausbrüchen in Kückenscharen, die älter als zwei Wochen sind, sind Todesfälle weniger häufig. Der Durchfall kann fehlen; manchmal sind blutige Ausscheidungen zu beobachten.

Die überlebenden Kücken wachsen heran und zeigen als legereife Hennen oft keine Krankheitserscheinungen, sie beherbergen aber häufig den Krankheitserreger, und zwar Hennen in den Eierstöcken, Hähne in den Hoden. Angesteckte Hennen legen im allgemeinen schlechter als gesunde und leiden häufig an Legenot. Weitere Krankheitserscheinungen bei alten Hühnern sind: Umfangsvermehrung des Bauches, aufrechte Körperhaltung (Pinguinstellung), Mattigkeit, schlechte Freßlust und Durchfall.

An lebenden und toten Hühnern läßt sich die Ansteckung durch Blutuntersuchungen (Ballungsproben) nachweisen; an verendeten Tieren kann die Seuche durch Sektion und bakteriologische oder histologische Untersuchung festgestellt werden.

Bei angesteckten toten Hennen finden sich häufig mißgebildete und dunkel verfärbte Dotteranlagen.

2. Der Geflügeltyphus ist eine der weißen Kückenruhr nahe verwandte, übertragbare Hühnerseuche, die am häufigsten bei den erwachsenen Tieren vorkommt, jedoch auch bei Kücken angetroffen wird.

Die Krankheit wird wahrscheinlich durch die Eier, sicher aber durch das mit dem Kot kranker Tiere verunreinigte Futter, Streu usw. übertragen. Außer Hühnern können Truthühner, Fasane, Enten und Perlhühner erkranken. Im Herbst wird die Krankheit am häufigsten beobachtet.

Bei den erwachsenen Tieren beobachtet man oft ganz plötzlich eine Erkrankung mit tödlichem Ausgang, wie etwa bei der Geflügelcholera oder bei der Geflügelpest. Dies sind aber die Ausnahmefälle, und in der Regel dauert die Erkrankung zwei bis zwölf Tage. Die Krankheitserscheinungen sind oft nicht charakteristisch und bestehen in Schläfrigkeit, Freßunlust, Sträuben des Gefieders sowie in einer Blässe des Kammes und der Kehllappen, die aber auch mitunter blaurot verfärbt sein können. In der Regel tritt dann Durchfall auf, wobei die Tiere einen grünlichgelben stinkenden Kot absetzen. Die Körperschwäche nimmt immer mehr zu und schließlich sterben die Tiere. Bei einem Teil des erkrankten Geflügels sind die Krankheitserscheinungen milder ausgeprägt. Sie kommen mit dem Leben davon und bleiben dann als Träger, beziehungsweise Ausscheider des Krankheitserregers im Bestand zurück. Bei den chronisch verlaufenden Fällen kommt es auch zu Veränderungen in den Eierstöcken, wodurch eine verminderte Legeleistung eintritt. Bei den Kücken verläuft die Krankheit ganz ähnlich wie bei der weißen Kückenruhr.

Am lebenden Geflügel läßt sich die Krankheit mit Hilfe der Blutuntersuchungsproben, am toten Tier durch die Sektion und den Nachweis des Krankheitserregers feststellen.

Bekämpfung der Seuche: Durch die Blutuntersuchung können die scheinbar gesunden Tiere als Keimträger ermittelt werden; ihre Ausmerzung aus dem Bestande hat sich als das beste Bekämpfungsverfahren erwiesen. Seuchenausbrüche überlebende Kücken, die meist Keimträger sind, dürfen als Zuchttiere nicht verwendet oder mit solchen zusammen gehalten werden. Man schlachtet sie am besten im Backhuhnalter.

Die Ausbreitung der Seuche in einer angesteckten Kückenschar kann durch Aufteilung in kleine Gruppen, Trennung der Gesunden von den Kranken, Beigabe von geeigneten Desinfektionsmitteln ins Trinkwasser oder Befeuchten des Futters mit solchem Trinkwasser (Anlage C, Abschnitt C), Wechselstall, tägliche Desinfektion erschwert, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grade verhindert werden.

Impfungen gegen die Seuche sind nicht bekannt.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Reinigung und Desinfektion der Brutapparate nach jedem Schlupf (Anlage C, Abschnitt A).

Anlage C
zu BGBl. Nr. 40

Desinfektionsbestimmungen.

A. Desinfektion der Brutapparate.

1. Mechanische Entfernung der Eireste.
2. Gründliche Reinigung des Apparates durch Abbürsten mit heißer zweiprozentiger Sodalösung.
3. Entseuchung des Apparates durch Formalindämpfe:
   a) In den leeren, ausgekühlten Brutapparat stellt man eine Porzellan- oder emaillierte Blechschale, in der man unmittelbar vorher Kaliumpermanganat und Formalin (vierzigprozentige wässerige Formaldehydlösung) gemischt hat. Für etwa 2·5 m^3 Rauminhalt benötigt man eine Mischung von 60 g Kaliumpermanganat und 100 cm^3 Formalin. Sogleich nach dem Einbringen der Schalen wird der Brutapparat dicht abgeschlossen und erst nach etwa drei Stunden entlüftet.
   b) Man kann die Brutapparate auch mit Formalindämpfen begasen, wenn noch darin Eier bebrütet werden. Man verwendet in diesem Falle für 2·5 m^3 Rauminhalt 17·5 g Kaliumpermanganat und 35 cm^3 Formalin. Es wird nur eine Stunde lang begast.

B. Desinfektion der Aufenthaltsräume des Geflügels und deren Einrichtungsgegenstände sowie der Ausläufe.

Zunächst wird die Streu und der Kot gründlich entfernt, wobei man den Boden, die Wände, Futtertröge und Sitzstangen mit einem Spatel gründlich abkratzt. Daraufhin werden der Stall und seine Einrichtungsgegenstände gründlich mit Wasser abgespült, beziehungsweise abgespritzt. Erst nach dieser Vorbereitung darf man zur eigentlichen Entseuchung ein Desinfektionsmittel anwenden. Es eignen sich dazu zweiprozentige wässerige Formaldehydlösung (fünf Teile Formalin auf 100 Teile Wasser) oder zweiprozentige wässerige Lösungen von Karbolsäure, Kreolin, Kresolseifenlösung, Caporit (Calciumhypochlorit), fünfprozentige Chlorkalkmilch oder zehnprozentige Kalkmilch. Der Boden und die Wände werden mit diesen Lösungen abgebürstet (Schrubber) oder aber noch zweckmäßiger mit einer Baumspritze abgespritzt. Weiters ist es angezeigt, die Geflügelausläufe tief umzugraben, größere Flächen umzuackern, beziehungsweise — wo die Möglichkeit besteht — sie in ein Gebiet zu verlegen, das bisher noch nicht als Geflügelauslauf verwendet wurde. Streu und Kot sind zu verbrennen oder mit Chlorkalkmilch vermischt mit Stalldünger zu packen.

C. Entseuchung des Trinkwassers durch Beigabe von Desinfektionsmitteln.

Diese kann erfolgen:

1. durch Zusatz von Chinosol (Orthochinolinkaliumsulfat) in einer Konzentration von 0·01 % zum Trinkwasser, was gleich ist 1 g der Substanz auf 10 l Wasser,
2. durch Zusatz von Kaliumpermanganat zum Wasser, und zwar 2 g der Substanz auf etwa 10 l Wasser,
3. durch Zusatz von Chloramin (Paratoluolsulfonchloraminnatrium) und zwar 1 g auf 10 l Brunnenwasser, wobei es zweckmäßig ist, außerdem noch 0·2 g sekundäres Natriumphosphat hinzuzufügen,
4. durch Zusatz von 1·5 g Caporit (Calciumhypochlorit) auf 10 l Wasser oder
5. durch Zusatz von 1·5 g Chlorkalk und 2·5 g Zitronensäure auf 10 l Wasser.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei