ЛП-N=(008861)-(РГ-RU) от 14.02.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Рексетин®, 20 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Действующее вещество: пароксетин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша
1. Что из себя представляет препарат Рексетин® и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Рексетин®.
3. Прием препарата Рексетин®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Рексетин®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Рексетин® и для чего его применяют

Препарат Рексетин® содержит действующее вещество *пароксетин*, который относится к группе лекарственных препаратов под названием *психоаналептики, антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина* (СИОЗС).

Показания к применению
Препарат Рексетин® применяется у взрослых в возрасте 18 лет и старше для лечения следующих заболеваний:
- депрессивные эпизоды средней и тяжелой степени тяжести, рекуррентное депрессивное расстройство;
- обсессивно-компульсивное расстройство;
- паническое расстройство, в том числе связанное с боязнью открытых пространств (*агорафобия*);
- социальная фобия (генерализованное тревожное расстройство или беспокойство, вызванное такими ситуациями, как социальное общение или публичные выступления);
- генерализованное тревожное расстройство;
- посттравматическое стрессовое расстройство.

Такие состояния могут возникать, когда в головном мозге уменьшается количество вещества под названием серотонин.

Способ действия препарата Рексетин®

Пароксетин способствует повышению уровня серотонина в головном мозге и тем самым помогает справляться с этими состояниями.

Рексетин® входит в группу препаратов, называемых СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). До конца не выяснено, как действуют Рексетин® и другие

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

СИОЗС, но они могут улучшать Ваше состояние, повышая уровень серотонина в головном мозге.
Препарат Рексетин® не уменьшит Ваши симптомы сразу: всем антидепрессантам требуется время для наступления эффекта. Некоторые люди начинают чувствовать себя лучше в течение двух недель, а другим может потребоваться немного больше времени. Некоторые люди, принимающие антидепрессанты, отмечают ухудшение самочувствия перед наступлением улучшения. Через две недели после начала терапии необходимо обратиться за повторной консультацией к лечащему врачу.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через две недели, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Рексетин®

Противопоказания

Не принимайте препарат Рексетин®:

- если у Вас **аллергия** на пароксетин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы принимаете или недавно принимали (в течение последних двух недель) **препараты от депрессии** под названием **ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО),** в том числе **моклобемид**, **линезолид** и **метилтионииния хлорид (метиленовый синий)**;
- если Вы применяете препараты под названием **тиоридазин** или **пимозид** (обычно применяемые для лечения шизофрении);
- если Вам меньше 18 лет

Если Вы считаете, что что-либо из вышеперечисленного может относиться к Вам, не принимайте препарат Рексетин® до консультации с Вашим врачом.

Препарат Рексетин® противопоказан детям и подросткам младше 18 лет, поскольку исследования не показали его эффективность у этой возрастной группы. Кроме того, лекарственные препараты, применяемые для лечения депрессии и других психических нарушений, могут повышать риск суицидальных мыслей и суицидального поведения у детей и подростков младше 18 лет. Информация о безопасности длительного приема препарата Рексетин® у данной возрастной группы отсутствует.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Рексетин® проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Перед приемом препарата Рексетин® сообщите лечащему врачу:

- если у Вас когда-либо отмечались приступы **повышенной активности, бурной радости и раздражительности** (мании);
- если у Вас когда-либо отмечались периоды **мании, чередующиеся с периодами депрессии** (биполярное расстройство);
- если Вы принимаете **тамоксифен (препарат для лечения или профилактики рака молочной железы)**;
- если у Вас **сахарный диабет**;
- если Вы ранее принимали **препараты для лечения депрессии** под названием **ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО),** в том числе **моклобемид, линезолид** и **метилтионииния хлорид (метиленовый синий)**, и дату, когда Вы прекратили их принимать;
- если у Вас есть **заболевание почек** или **печени**;
- если у Вас **эпилепсия** или случаются **судороги**;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- если вы проходите курс лечения тяжелой депрессии под названием **электросудорожная терапия (ЭСТ)**;
- если у Вас есть **глаукома** (заболевание, вызванное повышением внутриглазного давления);
- если у Вас пониженный уровень натрия в крови (гипонатриемия);
- если у Вас ранее были **проблемы, связанные с кровотечениями**, или если Вы принимаете препараты, которые повышают риск кровотечений;
- если у Вас есть **заболевание сердца**.
- если у Вас имеются **изменения на электрокардиограмме (ЭКГ)** в виде удлинения интервала QT или Вы принимаете препараты, которые могут повлиять на интервал QT на ЭКГ.

Проконсультируйтесь с Вашим врачом, если Вы считаете, что что-либо из вышеперечисленного может относиться к Вам. Ваш врач примет решение, подходит ли Вам препарат Рексетин® или Вам потребуются дополнительные обследования.

Состояния, на которые следует обращать внимание

Мысли о суициде или ухудшение Вашего состояния
Если Вы находитесь в состоянии депрессии, у Вас могут появляться мысли о суициде или о причинении себе вреда. Поскольку таким препаратам, как Рексетин®, требуется время для развития эффекта (обычно около 2 недель, но иногда больше), в течение этого периода у Вас могут сохраняться или усиливаться мысли о суициде или о причинении себе вреда, особенно в начале приема препарата Рексетин®.
Вы можете обладать повышенной склонностью к появлению таких мыслей, если:
- Вам менее 25 лет;
- у Вас ранее появлялись подобные мысли;
- у Вас недавно была изменена доза препарата.

Если у Вас появляются беспокоящие мысли или ощущения, или если Вы заметили ухудшение или появление новых симптомов во время применения препарата Рексетин®: **немедленно обратитесь к Вашему врачу или в медицинское учреждение.**

Возможно, Вам поможет, если Вы расскажете родственнику или близкому другу о том, что у Вас депрессия, и попросите их прочитать этот листок-вкладыш. Вы можете попросить их сообщить Вам, если они считают, что Ваша депрессия усиливается, или если их беспокоят изменения Вашего поведения.

Серотониновый синдром и/или *злокачественный нейролептический синдром*
Такие препараты, как Рексетин®, которые применяются для лечения психических заболеваний, могут в редких случаях приводить к серьезным состояниям под названием *серотониновый синдром* и/или *злокачественный нейролептический синдром*. Вы должны обращать внимание на появление определенных симптомов во время терапии препаратом Рексетин®, чтобы уменьшить риск возникновения каких-либо осложнений (см. «Состояния, на которые следует обращать внимание» *в* разделе 4 листка-вкладыша).

Акатизия
Лекарственные препараты, применяемые для лечения некоторых психических заболеваний, могут вызывать ощущение внутреннего беспокойства и постоянное желание двигаться (*акатизия*). Это редкая нежелательная реакция на препарат Рексетин®, чаще всего она возникает в течение первых нескольких недель лечения.
Если у Вас появились данные симптомы, **немедленно сообщите об этом Вашему врачу**.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Сексуальная дисфункция
Такие препараты, как Рексетин® (*селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или СИОЗС*), могут вызывать симптомы сексуальной дисфункции (см. раздел 4 листка-вкладыша). В некоторых случаях эти симптомы сохранялись даже после прекращения лечения.

Переломы костей
При приеме таких препаратов, как Рексетин®, существует повышенный риск переломов костей. Наиболее высоким этот риск является в начале лечения.

Дети и подростки
Детям и подросткам в возрасте младше 18 лет не следует принимать препарат Рексетин® вследствие повышения риска возникновения суицидальных мыслей и суицидального поведения.

Другие препараты и препарат Рексетин®
Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это также относится к препаратам растительного происхождения и другим препаратам, в том числе приобретенным без рецепта.

Некоторые препараты нельзя принимать одновременно с препаратом Рексетин®, см. подраздел «Не применяйте препарат Рексетин®» в начале раздела 2.

Одновременный прием препарата Рексетин® с другими препаратами, которые могут повышать уровень серотонина в головном мозге, может увеличивать риск возникновения нежелательных реакций (см. подраздел «Состояния, на которые следует обращать внимание» раздела 4 листка-вкладыша). К таким препаратам относятся:
- триптаны (препараты для лечения **мигрени**);
- трамадол (препарат для **обезболивания**);
- триптофан или другие препараты группы СИОЗС (препараты для лечения **депрессии**);
- зверобой продырявленный (препарат растительного происхождения, применяемый для лечения **депрессии**);
- литий (препарат для лечения **некоторых психических заболеваний**);
- фентанил (препарат для проведения **анестезии** или для лечения **хронической боли**).

Сообщите Вашему врачу, если Вы принимаете какие-либо из этих препаратов. Вы должны находиться под тщательным наблюдением врача, пока принимаете эти препараты одновременно с препаратом Рексетин®.

Некоторые лекарственные препараты могут оказывать влияние на эффективность препарата Рексетин®. Препарат Рексетин® в свою очередь также может оказывать влияние на действие некоторых других препаратов. К таким лекарственным препаратам относятся:
- карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин (препараты для лечения судорог (**судорожных припадков или эпилепсии**));
- рифампицин (препарат для лечения **туберкулеза**);
- фосампренавир и ритонавир (препараты для лечения **ВИЧ-инфекции**);
- прициклидин (препарат для лечения **болезни Паркинсона**);
- мивакурий и суксаметоний (применяются при проведении **анестезии**);
- амитриптилин, нортриптилин, имипрамин и дезипрамин (препараты для лечения **депрессии**);
- перфеназин, рисперидон, тиоридазин, пимозид (препараты для лечения некоторых **психических заболеваний**);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- атомоксетин (препарат для лечения **синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)**);
- пропафенон и флекаинид (препараты для лечения **нерегулярного сердцебиения**);
- метопролол (препарат для лечения **повышенного артериального давления**);
- тамоксифен (препарат для лечения или профилактики **рака молочной железы** или **бесплодия**);
- терфенадин, алпразолам (препараты для лечения **аллергических реакций**);
- пероральные антикоагулянты (применяются для **предотвращения образования тромбов**);
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), ацетилсалициловая кислота (применяются для лечения **воспалений**);
- правастатин (препарат **для снижения уровня «плохого» холестерина**).

Если Вы принимаете какой-либо из этих препаратов, сообщите об этом Вашему лечащему врачу. Ваш врач может принять решение об изменении Вашей дозы препарата Рексетин®.

Препарата Рексетин® с алкоголем
Не рекомендуется употреблять алкоголь во время лечения препаратом Рексетин®.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность
Препарат Рексетин® обычно не рекомендуется применять во время беременности. Если Вы беременны, думаете, что забеременели, или планируете беременность, немедленно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Ваш врач оценит пользу для Вас и риск для Вашего ребенка при применении препарата Рексетин® во время беременности.

В некоторых исследованиях было отмечено повышение риска возникновения врожденных пороков развития, в частности, пороков сердца, у детей, матери которых принимали препарат Рексетин® в течение первых нескольких месяцев беременности. В этих исследованиях примерно у 1 из 50 детей грудного возраста (2 %), матери которых получали препарат Рексетин® в начале беременности, был обнаружен порок сердца, по сравнению с нормальной частотой у 1 из 100 детей (1%), наблюдаемой в общей популяции.

У детей, матери которых получали во время беременности антидепрессанты, в том числе препарат Рексетин®, наблюдалось послеродовое осложнение под названием персистирующая легочная гипертензия новорожденных (ПЛГН). При ПЛГН у ребенка повышено артериальное давление в кровеносных сосудах, находящихся между сердцем и легкими. Риск развития ПЛГН у детей, матери которых в конце беременности применяли антидепрессанты, такие как препарат Рексетин®, был в 4–5 раз выше, чем риск ПЛГН, наблюдаемый в общей популяции, который составляет примерно 1–2 случая на 1000 беременностей.

Зарегистрированы сообщения о преждевременных родах у женщин, получавших препарат Рексетин® во время беременности. Неизвестно, связаны ли эти случаи с применением препарата Рексетин®.

Если Вы применяете препарат Рексетин® в конце беременности, у Вас может быть повышен риск обильного вагинального кровотечения вскоре после родов, особенно если ранее у Вас

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

были случаи нарушения свертываемости крови. Ваш врач должен быть осведомлен о том, что Вы принимаете препарат Рексетин®, чтобы дать Вам соответствующие рекомендации.

При применении беременной женщиной препарата Рексетин® вплоть до момента родов, у детей были зарегистрированы следующие симптомы сразу или в течение первых 24 часов после рождения. Также неизвестно, связаны ли эти симптомы с применением препарата Рексетин®. Эти симптомы включают:
• затруднение дыхания;
• синюшность кожи, или слишком горячую или холодную кожу;
• рвоту или трудности с кормлением;
• сильную усталость, невозможность заснуть или постоянный плач ребенка;
• чрезмерную скованность или вялость мышц;
• дрожание, нервное возбуждение или судороги.
Если при рождении у Вашего ребенка присутствует любой из этих симптомов, или Вас беспокоит здоровье Вашего ребенка, **обратитесь к Вашему врачу за консультацией**.

Грудное вскармливание
Компоненты препарата Рексетин® могут проникать в грудное молоко. Если Вы кормите ребенка грудью, Вы должны проконсультироваться с Вашим врачом, прежде чем принимать препарат Рексетин®.

Фертильность у мужчин
Препараты, подобные препарату Рексетин®, могут повлиять на качество Вашей спермы.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Препарат Рексетин® может вызывать у Вас головокружение или спутанность сознания, а также может влиять на Ваше зрение.
Не управляйте транспортными средствами и не работайте с механизмами, если у Вас возникли подобные нежелательные реакции.

3. Прием препарата Рексетин®
Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача.
При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза
Начальная доза препарата Рексетин® зависит от Вашего заболевания. Обычно она составляет 10 мг (в этом случае Вам понадобится разделить таблетку пополам, чтобы принять правильную дозу препарата) или 20 мг один раз в сутки. Ваш врач может постепенно изменять Вашу дозу, чтобы улучшить контроль симптомов Вашего заболевания, максимум до 50 мг или 60 мг один раз в сутки.
Если вам больше 65 лет или у вас есть проблемы с печенью или почками, максимальная доза может быть снижена.

Применение у детей и подростков (младше 18 лет)
Применение препарата Рексетин® у детей и подростков (младше 18 лет) противопоказано.

Путь и способ введения
Таблетку следует проглатывать, запивая водой. Не следует разжевывать таблетку.
Препарат Рексетин® следует принимать утром во время еды.
На таблетку нанесена риска для более легкого разламывания, чтобы получить дозу 10 мг.

Продолжительность терапии

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Продолжительность лечения будет зависеть от Вашего заболевания. Несмотря на то, что некоторое улучшение обычно ощущается в течение двух недель после начала лечения, для развития полноценного эффекта препарата может понадобиться более продолжительное время.
Даже после того, как Вы начнете чувствовать себя лучше, важно продолжать принимать препарат Рексетин® так долго, как рекомендует Ваш врач, для предотвращения возобновления симптомов. После выздоровления от депрессии лечение может продолжаться на протяжении нескольких месяцев, а в случае панического расстройства или обсессивно-компульсивного расстройства еще дольше.

Если Вы забыли принять препарат Рексетин®
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Просто примите следующую дозу в обычное время.
Если у Вас есть сомнения, посоветуйтесь с лечащем врачом.

Если Вы приняли препарата Рексетин® больше, чем следовало
Если Вы приняли слишком большое количество препарата Рексетин®, у Вас с большей вероятностью могут появиться нежелательные реакции (см. раздел 4 листка-вкладыша). Помимо таких нежелательных реакций, прием слишком большого количества препарата Рексетин® может вызывать изменения артериального давления, неконтролируемые сокращения мышц, тревожность, повышенную температуру и учащенное сердцебиение.
Если Вы приняли слишком большое количество препарата Рексетин®, обратитесь к Вашему врачу за консультацией. По возможности покажите врачу упаковку препарата Рексетин®.

Если Вы прекратили прием препарата Рексетин®
Следует избегать резкой отмены препарата Рексетин®.
Не прекращайте прием препарата Рексетин® без консультации с Вашим врачом. Принимаемую Вами дозу необходимо уменьшать постепенно, в противном случае у Вас могут появиться нежелательные реакции (см. подраздел «Реакции, возникающие при отмене препарата Рексетин®» в конце раздела 4 листка-вкладыша).

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции
Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Состояния, на которые следует обращать внимание

Прекратите прием препарата Рексетин® и немедленно обратитесь за медицинской помощью:
- в случае возникновения одного из следующих признаков **тяжелой аллергической реакции,** которая наблюдалась очень редко (может возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- зудящая сыпь по типу волдырей (крапивница);
- припухлость, иногда на лице или в области рта (*ангионевротический отек*), вызывающая затруднение дыхания;
- резкое снижение артериального давления (*коллапс*) или потеря сознания;

- в случае развитии **тяжелых кожных реакций,** которые наблюдались очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- кожная сыпь, которая может иметь вид волдырей, представляющая собой темные пятна по центру, более бледные по периметру с темным кольцом по внешнему контуру (*полиморфная эритема*);
- обширная сыпь с волдырями и шелушением кожи, особенно вокруг рта, носа, глаз и половых органов (*синдром Стивенса-Джонсона*);
- обширная сыпь с волдырями и шелушением кожи на большей части поверхности тела (*токсический эпидермальный некролиз*).

Немедленно сообщите врачу:

• при появлении признаков **серотонинового синдрома и злокачественного нейролептического синдрома:** препараты, которые повышают активность серотонина в головном мозге, могут стать причиной состояния под названием *серотониновый синдром*. Это очень редкая нежелательная реакция на препарат Рексетин®, которая возникает не более чем у 1 человека из 10 000. Одновременный прием препарата Рексетин® с другими препаратами, которые также могут повышать активность серотонина в головном мозге, может увеличивать риск возникновения данной серьезной нежелательной реакции (см. подраздел «Другие препараты и препарат Рексетин®» в разделе 2 листка-вкладыша). Другое состояние под названием *злокачественный нейролептический синдром* является редкой нежелательной реакцией на препараты, применяемые для лечения психических заболеваний, и может возникать не более чем у 1 человека из 1000.
Симптомы серотонинового синдрома и злокачественного нейролептического синдрома являются сходными. Обычно возникают несколько следующих симптомов:
- непроизвольное дрожание части (или частей) тела (*тремор*);
- внезапные неконтролируемые судорожные движения;
- скованность мышц;
- неспособность спокойно сидеть или стоять;
- ощущение сильного возбуждения или раздражения;
- спутанность сознания;
- ощущение жара или повышенное потоотделение;
- учащение сердцебиения.

Тяжесть симптомов может увеличиваться, приводя к потере сознания.

• при появлении признаков **акатизии:** лекарственные препараты, применяемые для лечения некоторых психических заболеваний, могут вызывать ощущение внутреннего беспокойства и постоянное желание двигаться (*акатизия*). Это редкая нежелательная реакция на препарат Рексетин®, которая встречается не более чем у 1 человека из 1000 и возникает чаще всего в течение первых нескольких недель лечения.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Рексетин®:

Очень часто (могут возникать у более чем 1 человека из 10):
- тошнота;
- изменение полового влечения или половой функции.

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
- снижение аппетита;
- повышение уровня холестерина;
- сонливость, проблемы со сном (бессонница), необычные сновидения (включая кошмарные сновидения);
- чувство возбуждения;
- головокружение;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- непроизвольное дрожание части (или частей) тела *(тремор)*;
- головная боль;
- нарушение концентрации внимания;
- нечеткость зрения;
- зевота;
- сухость во рту;
- запор;
- диарея;
- рвота;
- повышенное потоотделение;
- ощущение слабости;
- увеличение массы тела.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
- синяки или необычные кровотечения, в основном через кожу и слизистые оболочки, такие как полость рта;
- кровотечение из половых путей;
- снижение количества лейкоцитов (лейкопения);
- нарушение контроля уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом;
- спутанность сознания;
- зрительное или слуховое восприятие явлений, которые в действительности не существуют (галлюцинации);
- непроизвольные движения мышц лица, скручивающие движения тела, рук и ног, непроизвольное дрожание части (или частей) тела (экстрапирамидные расстройства);
- расширение зрачка (мидриаз);
- учащение сердцебиения;
- пониженное артериальное давление (может вызвать головокружение, предобморочное состояние или потерю сознания при вставании из положения сидя или лежа);
- временное повышение и снижение артериального давления;
- кожная сыпь, зуд;
- неспособность опорожнить мочевой пузырь (задержка мочеиспускания) или утрата контроля над мочевым пузырем (недержание мочи).

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека 1000):
- снижение уровня натрия в крови, особенно у пациентов пожилого возраста (*гипонатриемия*);
- приступы повышенной активности, бурной радости и раздражительности (мания);
- тревога;
- расстройство самовосприятия личности (деперсонализация);
- панические атаки;
- судороги;
- непреодолимое желание двигать ногами (синдром беспокойных ног);
- замедление пульса (брадикардия);
- повышение уровня веществ (ферментов), вырабатываемых печенью;
- патологическое выделение грудного молока у мужчин или у женщин, которые не кормят грудью (галакторея);
- повышение уровня гормона под названием пролактин (гиперпролактинемия);
- нарушения менструального цикла (включая обильные менструации, кровотечения между менструациями и отсутствие менструаций).
- боли в мышцах (миалгия) и суставах (артралгия).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека 10 000):

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- снижение числа тромбоцитов – клеток, способствующих свертыванию крови (тромбоцитопения);
- повышенное выделение антидиуретического гормона (АДГ), который вызывает задержку воды в организме;
- повышение внутриглазного давления (глаукома);
- кровотечение в пищеварительной системе (примесь крови в стуле или черный стул);
- воспаление печени (гепатит), иногда приводящее к пожелтению кожи и белков глаз (желтуха);
- повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (реакция фоточувствительности);
- болезненная, длительная эрекция, не связанная с сексуальным влечением или возбуждением (приапизм);
- припухлость кистей рук, лодыжек или стоп (периферические отеки).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):
- появление суицидального поведения или мыслей о причинении себе вреда;
- агрессия;
- спазм жевательных мышц, сопровождающийся непроизвольным стискиванием челюстей и их интенсивным движением относительно друг друга с проявлением трения, скрежета и стука зубов (бруксизм);
- шум в ушах;
- воспаление кишечника, которое может вызывать диарею (микроскопический колит).

Симптомы, возникающие при прекращении лечения препаратом Рексетин®
Отмена лекарственных препаратов, применяемых для лечения психических заболеваний, часто приводит к появлению нежелательных реакций. Эти реакции имеют более высокую вероятность возникновения в первые несколько дней после прекращения лечения и обычно исчезают в течение нескольких недель.

Если Вам необходимо прекратить прием препарата Рексетин®, Ваш врач будет снижать Вашу дозу постепенно. Это должно способствовать уменьшению возможных нежелательных реакций и тяжести их проявления.

Часто встречающиеся нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):
- головокружение;
- ощущение покалывания, удара электрическим током и постоянный звон или шум в ушах (*сенсорные нарушения*);
- нарушения сна, включая яркие сны;
- чувство тревоги;
- головная боль.

Нечасто встречающиеся нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):
- ощущение внутреннего беспокойства или нервного возбуждения;
- тошнота;
- непроизвольное дрожание части (или частей) тела (тремор);
- спутанность сознания;
- повышенное потоотделение;
- диарея;
- ощущение сердцебиения;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

- легко развивающаяся психическая реакция в ответ на незначительные раздражители (*эмоциональная лабильность*);
- раздражительность;
- зрительные нарушения.

Сообщите Вашему врачу, если любые из указанных симптомов становятся тяжелыми или начинают причинять беспокойство.

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом> или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012 г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 800 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Интернет-сайт (Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Армения
«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО
Адрес: 0051 г. Ереван, пр. Комитаса 49/5
Отдел мониторинга безопасности лекарств
Телефон: +374 10 20-05-05, +374 96 22-05-05
Электронная почта: vigilance@pharm.am
Интернет-сайт (Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): http://www.pharm.am

Республика Беларусь
Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037 г. Минск, пер. Товарищеский 2а
Отдел фармаконадзора
Телефон: +375 17 242-00-29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Интернет-сайт (Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): https://www.rceth.by

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Адрес: 010000 г. Астана, ул. А. Иманова, 13
Телефон: +7 (7172) 235 135
Электронная почта: pdlc@dari.kz
Интернет-сайт (Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): https://www.ndda.kz

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Кыргызская Республика
Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
Адрес: 720044 г. Бишкек, ул. 3-я Линия, 25
Телефон: +996 312 21-92-88
Электронная почта: vigilance@pharm.kg
Интернет-сайт (Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»): http://www.pharm.kg

5. Хранение препарата Рексетин®
Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Хранить при температуре не выше 30°С.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на блистере и картонной пачке («Годен до:»).
Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовым мусором. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения
Препарат Рексетин® содержит
Действующим веществом является: пароксетина гидрохлорида гемигидрат.
Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой содержит 22,760 мг пароксетина гидрохлорида гемигидрата (эквивалентно 20 мг пароксетина).
Прочими вспомогательными веществами являются: магния стеарат, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), гипромеллоза 2910, кальция гидрофосфата дигидрат.
Состав пленочной оболочки: полисорбат 80, макрогол 400, макрогол 6000, титана диоксид (Е171), гипромеллоза.

Внешний вид препарата Рексетин® и содержимое упаковки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг.
Белые или почти белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой. С риской на одной стороне, и с гравировкой $\frac{X}{20}$ – на другой.
По 10 таблеток в блистере из алюминиевой фольги/ПВХ. По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата (листком-вкладышем) в пачку картонную.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
Венгрия
ОАО «Гедеон Рихтер»
Gedeon Richter Plc.
1103 Gyomroi st. 19-21, Budapest, Hungary
Телефон: +36-1-431-4000
Электронная почта: drugsafety@richter.hu

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.02.2025 № 3370
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Российская Федерация
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва
Адрес: 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский пер., дом 8
Телефон: +7 495 987-15-55
Электронная почта: drugsafety@g-richter.ru

Республика Армения
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» в Республике Армения
Адрес: 0010 г. Ереван, ул. Закяна, д. 2
Телефон: +374 10 53-00-71
Электронная почта: drugsafety@gedeonrichter.am

Республика Беларусь
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» в Республике Беларусь
Адрес: 220004 г. Минск, пр. Победителей, дом 5, офис 505
Телефон, факс: +375 17 272-64-87
Телефон, факс: +375 17 215-25-21
Электронная почта: drugsafety.by@gedeonrichter.eu

Республика Казахстан
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» в Республике Казахстан
Адрес: 050008 г. Алматы, ул. Толе Би 187
Телефон: +7 7272 58-26-23 (претензии по качеству),
+7 7272 58-26-22 (фармаконадзор), +7 701 787-47-01 (фармаконадзор)
Электронная почта: info@richter.kz; pv@richtergedeon.kz

Кыргызская Республика
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» в Кыргызской Республике
Адрес: 720005 г. Бишкек, ул. Игембердиева, 1 "А",
бизнес-центр «Аврора», офис 703
Телефон: +996 312 98-81-16
Электронная почта: drugsafety.ky@gedeonrichter.eu

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации
Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза https://eec.eaeunion.org.