ЛП-№(005387)-(РГ-RU) от 07.05.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Феназепам, 0,25 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Феназепам, 0,5 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Феназепам, 1 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Действующее вещество: бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Феназепам, и для чего его применяют.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Феназепам.

3. Прием препарата Феназепам.

4. Возможные нежелательные реакции.

5. Хранение препарата Феназепам.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Феназепам, и для чего его применяют

Препарат Феназепам содержит действующее вещество бромдигидрохлорфенилбензодиазепин и относится к группе препаратов под названием «психолептики; анксиолитические средства; другие анксиолитические средства».
Препарат оказывает противотревожное (анксиолитическое), успокаивающее (седативное), снотворное, противосудорожное и расслабляющее действие на мускулатуру (миорелаксирующее действие).

Показания к применению

Препарат Феназепам применяется у взрослых от 18 лет для лечения:

- Невротические, неврозоподобные расстройства, сопровождающиеся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью и напряженностью, вегетативными расстройствами, ипохондрическо-сенестопатический синдром (в том числе резистентный к действию других транквилизаторов).
- Расстройства сна (кратковременное лечение).
- В составе комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- В качестве вспомогательного средства для лечения пациентов с височной и миоклонической эпилепсией.

- В неврологической практике лечение повышенного мышечного тонуса, гиперкинезов и тиков, ригидности мышц, вегетативной лабильности при поражении центральной нервной системы (ЦНС).

Способ действия препарата препарата

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин усиливает подавляющее (ингибирующее) действие важного биологически активного химического вещества организма, которое тормозит передачу электрохимического импульса в нервных клетках (гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК)).
Анксиолитическое действие обусловлено влиянием на мозговые структуры, ответственные за регуляцию различных функций, включая эмоции, память, поведение и мотивацию (лимбическая система) и проявляется в уменьшении эмоционального напряжения, ослаблении тревоги, страха, беспокойства.
Седативный эффект и снотворное действие бромдигидрохлорфенилбензодиазепина обусловлено влиянием на особые структуры головного мозга, определяющие частоту нервных импульсов, поступающих к мышцам (ретикулярная формация ствола головного мозга).
Противосудорожное действие реализуется путем подавления распространения судорожного импульса, без влияния на очаг возбуждения в головном мозге.

Центральное миорелаксирующее действие обусловлено ослаблением передачи нервных импульсов к мышцам на уровне головного мозга. Возможно также и прямое торможение на уровне нервных волокон, идущих к мышцам (двигательных нервов), и на функции мышц.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Феназепам

Противопоказания

Не принимайте препарат Феназепам:

- если у Вас аллергия на бромдигидрохлорфенилбензодиазепин или на другие препараты бензодиазепинового ряда или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- при угрожающем жизни состоянии, характеризующееся отсутствием реакции на внешние раздражители (звук, боль и др.) (кома);
- если у Вас тяжёлое нарушение жизненно важных функций, развивающееся в ответ на воздействие чрезвычайных раздражителей (шок);
- если у Вас аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, которое проявляется быстрой утомляемостью и выраженной мышечной слабостью (миастения);
- если у Вас заболевание глаз, характеризующееся внезапными приступами резкого повышения внутриглазного давления, которые проявляются интенсивной болью в глазу, покраснением глаза, снижением зрения, радужными кругами вокруг источников света, головной болью, тошнотой, рвотой (закрытоугольная глаукома (острый приступ или предрасположенность));
- если у Вас острое отравление алкоголем (с ослаблением жизненно важных функций), наркотическими анальгетиками и снотворными средствами;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- если у Вас тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких (возможно усиление дыхательной недостаточности);
- если у Вас острая дыхательная недостаточность;
- если у Вас тяжелая депрессия (могут проявляться суицидальные наклонности);
- если Вы беременны (особенно I триместр);
- если Вы кормите ребенка грудью;
- если Ваш возраст менее 18 лет (безопасность и эффективность не определены).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Феназепам проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите врачу:

- если у Вас имеются заболевания печени и/или почек (печеночная и/или почечная недостаточность);
- если у Вас имеется нарушение согласованности движений различных мышц (церебральная и спинальная атаксия);
- если у Вас имеется лекарственная зависимость в анамнезе;
- если у Вас имеется склонность к злоупотреблению психоактивными лекарственными средствами;
- если у Вас имеются непроизвольные насильственные движения мышц (гиперкинезы);
- если у Вас имеются заболевания головного мозга (органические заболевания головного мозга);
- если у Вас имеется психическое заболевание (психоз) (возможны парадоксальные реакции);
- если у Вас имеется состояние, при котором Вы ощущаете стойкое чувство грусти, потерю интереса к жизни и невозможность выполнять повседневные дела (депрессия);
- если у Вас пониженный уровень белка в крови (гипопротеинемия);
- если у Вас бывают эпизоды остановки дыхания во время ночного сна (ночное апноэ) (установленное или предполагаемое).

При применении таблетки диспергируемые следует брать только сухими руками.

Почечная/печеночная недостаточность

Если у Вас имеется почечная и/или печеночная недостаточность, при длительном лечении Ваш врач назначит Вам прохождение регулярных анализов крови для контроля картины периферической крови и активности печеночных ферментов.

Пациенты, не принимавшие ранее психоактивные лекарственные средства

У пациентов, не принимавших ранее психоактивные лекарственные средства, терапевтический ответ на применение препарата Феназепам наблюдается в более низких дозах по сравнению с пациентами, принимавшими антидепрессанты, противотревожные препараты (анксиолитики) или страдающими алкоголизмом.

Прекращение лечения

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Подобно другим бензодиазепинам, препарат Феназепам обладает способностью вызывать лекарственную зависимость при длительном приеме в больших дозах (более 4 мг/сут). При внезапном прекращении приема препарата у Вас может отмечаться синдром отмены (в т.ч. депрессия, раздражительность, бессонница, повышенное потоотделение), особенно при длительном приеме (более 8–12 недель). Требуется соблюдение особой осторожности при назначении препарата при депрессиях, так как препарат может быть использован для реализации суицидальных намерений.

При возникновении у Вас таких необычных реакций, как повышенная агрессивность, острые состояния возбуждения, чувство страха, мысли о самоубийстве, галлюцинации, усиление мышечных судорог, затруднение засыпания, поверхностный сон, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Дети и подростки

Препарат Феназепам противопоказан для применения у детей в возрасте от 0 до 18 лет (безопасность и эффективность применения препарата у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлена). Данные отсутствуют.

Другие препараты и препарат Феназепам

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали, или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это связано с тем, что препарат Феназепам и другие одновременно принимаемые препараты могут усиливать или ослаблять эффекты друг друга. Это также может увеличить вероятность возникновения нежелательных реакций, описанных в разделе 4 листка-вкладыша.

При одновременном применении препарат Феназепам снижает эффективность леводопы (препарат, применяемый для лечения болезни Паркинсона) у пациентов с паркинсонизмом.

Препарат Феназепам может повышать токсичность зидовудина (противовирусный препарат, применяемый для лечения ВИЧ-инфекции).

Отмечается взаимное усиление эффекта при одновременном применении антипсихотических, противоэпилептических (препаратов для лечения эпилепсии) или снотворных средств, а также центральных миорелаксантов (препаратов для снятия мышечных спазмов), наркотических анальгетиков (наркотических обезболивающих препаратов), этанола (алкоголя).

Препараты для лечения заболеваний печени (ингибиторы микросомального окисления) повышают риск развития токсических эффектов.

Препараты, ускоряющие синтез ферментов в печени (индукторы микросомальных ферментов печени), уменьшают эффективность препарата Феназепам.

Препарат Феназепам повышает концентрацию имипрамина (препарат-антидепрессант) в сыворотке крови.

При одновременном применении с антигипертензивными средствами (препаратами, которые используются для лечения повышенного артериального давления) возможно усиление антигипертензивного действия. На фоне одновременного назначения клозапина (препарат, применяемый для лечения психических расстройств) возможно усиление угнетения дыхания.

Препарат Феназепам с алкоголем

Употребление алкоголя категорически запрещено в течение всего срока приема препарата.

Беременность и грудное вскармливание

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Применение во время беременности противопоказано.

Оказывает токсическое действие на плод и повышает риск развития врожденных пороков при применении в I триместре беременности. Прием в терапевтических дозах в более поздние сроки беременности может вызвать угнетение ЦНС у новорожденного. Постоянное применение во время беременности может приводить к физической зависимости с развитием синдрома отмены у новорожденного. Дети, особенно в младшем возрасте, очень чувствительны к угнетающему ЦНС действию бензодиазепинов.

Применение непосредственно перед родами или во время родов может вызывать у новорожденного угнетение дыхания, снижение мышечного тонуса, гипотонию (понижение давления), гипотермию (снижение температуры) и слабый акт сосания (синдром «вялого ребенка»).

Грудное вскармливание

Прием препарата в период грудного вскармливания противопоказан. При необходимости приема препарата в период лактации на время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период лечения запрещается управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Прием препарата Феназепам

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Разовая доза обычно составляет 0,5–1 мг. Средняя суточная доза – 1,5–5 мг, ее разделяют на 2–3 приема, обычно по 0,5–1 мг утром и днем и до 2,5 мг на ночь. Максимальная суточная доза – 10 мг.

Для лечения невротических, неврозоподобных расстройств, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, эмоциональной лабильностью и напряженностью, вегетативными расстройствами, ипохондрическо-сенестопатического синдрома (в том числе резистентного к действию других транквилизаторов) начальная доза – 0,5–1 мг 2–3 раза в сутки. Через 2–4 дня с учетом эффективности и переносимости доза может быть увеличена до 4–6 мг/сут. При выраженной ажитации, страхе, приступах тревоги по типу панической атаки (сердцебиение, страх, усиленное потоотделение и т.д.) прием препарата начинают с дозы 1–2 мг, повторяя при необходимости прием каждые 1,5 часа по 1 мг до полного купирования симптомов.

При расстройствах сна (кратковременное лечение) – 0,25–0,5 мг за 20–30 мин до сна.

В составе комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома – 2–5 мг/сут.

В качестве вспомогательного средства для лечения пациентов с височной и миоклонической эпилепсией – 2–10 мг/сут.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Для лечения повышенного мышечного тонуса, гиперкинезов и тиков, ригидности мышц, вегетативной лабильности при поражении ЦНС в неврологической практике – 2–3 мг 1–2 раза в сутки.

Особые группы пациентов

Лица пожилого возраста

У пациентов пожилого возраста препарат Феназепам следует применять с осторожностью. Коррекции дозы не требуется.

Пациенты с нарушением функции почек

У пациентов с нарушением функции почек препарат Феназепам следует применять с осторожностью (см. раздел 2). Коррекции дозы не требуется.

Пациенты с нарушением функции печени

У пациентов с печеночной недостаточностью препарат Феназепам следует применять с осторожностью (см. раздел 2). Коррекции дозы не требуется.

Применение у детей и подростков

Препарат Феназепам противопоказан для применения у детей от 0 до 18 лет. Безопасность и эффективность у детей в возрасте от 0 до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Путь и (или) способ введения

Внутрь. Независимо от приема пищи. Таблетку принимают сразу же после ее извлечения из упаковки. Таблетку следует держать на языке до ее полного растворения и затем проглотить, не запивая жидкостью.

Продолжительность терапии

Во избежание развития лекарственной зависимости при курсовом лечении продолжительность применения препарата Феназепам составляет 2 недели (в отдельных случаях длительность лечения может быть увеличена до 2 месяцев). При отмене препарата Феназепам дозу уменьшают постепенно.

Если Вы приняли препарата Феназепам больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата больше, чем следовало, у Вас могут возникнуть следующие симптомы: выраженное угнетение сознания, сердечной-сосудистой и дыхательной деятельности, выраженная сонливость, длительная спутанность сознания, снижение рефлексов, нарушение речи (длительная дизартрия), неконтролируемые ритмичные движения глаз (нистагм), непроизвольные быстрые ритмичные колебательные движения частей тела или всего тела (тремор), замедление частоты сердечных сокращений (брадикардия), одышка или затрудненное дыхание, снижение артериального давления, кома. Если Вы приняли препарата Феназепам больше, чем следовало, обратитесь к врачу, возможно Вам потребуется лечение в зависимости от Вашего состояния и симптомов. Вам могут быть назначены стандартные лечебные мероприятия, направленные на выведение препарата из организма: промывание желудка, прием активированного угля и другие.

Если Вы забыли принять препарат Феназепам

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку. Дождитесь времени очередного приема препарата и примите только очередную дозу препарата.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Если Вы прекратили прием препарата Феназепам

При отмене препарата дозу уменьшают постепенно. При резком прекращении терапии или снижении дозы препарата Феназепам может возникнуть синдром «отмены» (см. раздел 2. «Особые указания и меры предосторожности»). Лечащий врач должен порекомендовать Вам постепенное снижение дозы препарата для того, чтобы свести к минимуму развитие симптомов «отмены».

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Феназепам может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Наиболее серьезные нежелательные реакции

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникли следующие симптомы:

- агрессивные вспышки, состояние, характеризующееся двигательным и психическим беспокойством (психомоторное возбуждение), страх, суицидальная наклонность, мышечный спазм, галлюцинации, возбуждение, раздражительность, тревожность, бессонница (парадоксальные реакции*).

Другие возможные нежелательных реакци, которые могут наблюдаться при приеме препарата Феназепам

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- снижение количества белых кровяных телец крови - лейкоцитов (лейкопения);
- снижение количества особой разновидности лейкоцитов - нейтрофилов (нейтропения);
- снижение количества особой разновидности лейкоцитов - гранулоцитов (агранулоцитоз (симптомами, позволяющими заподозрить агранулоцитоз являются: озноб, повышение температуры тела (гипертермия), боль в горле, чрезмерная утомляемость или слабость));
- пониженный уровень красных клеток крови (эритроцитов) и/или особого вещества, находящегося внутри эритроцитов - гемоглобина (анемия);
- снижение количества тромбоцитов в крови (тромбоцитопения);
- внезапное переживание сильного душевного подъема, веселого настроения, чувства оптимизма (эйфория);
- депрессия;
- подавленность настроения;
- привыкание;
- лекарственная зависимость;
- сонливость*;
- чувство усталости*;
- головокружение*;
- снижение способности к концентрации внимания*;
- атаксия*;
- дезориентация*;
- неустойчивость походки*;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- замедление психических и двигательных реакций*;
- спутанность сознания*;
- головная боль*;
- тремор*;
- снижение памяти*;
- нарушения координации движений**;
- дистонические экстрапирамидные реакции (неконтролируемые движения, в т.ч. глаз)*;
- астения*;
- миастения*;
- дизартрия*;
- эпилептические припадки (у пациентов с эпилепсией)*;
- парадоксальные реакции (агрессивные вспышки, психомоторное возбуждение, страх, суицидальная наклонность, мышечный спазм, галлюцинации, возбуждение, раздражительность, тревожность, бессонница)*;
- нарушение зрения (двоение в глазах (диплопия));
- увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия);
- снижение артериального давления;
- сухость во рту или слюнотечение;
- изжога;
- тошнота;
- рвота;
- снижение аппетита;
- запоры или понос (диарея);
- нарушения функции печени;
- отклонения показателей анализа крови, которые могут помочь врачу оценить функцию печени (высокий уровень аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы);
- окрашивание в желтый цвет кожи и слизистых оболочек (желтуха);
- кожная сыпь;
- зуд;
- недержание мочи;
- задержка мочи;
- нарушение функции почек;
- снижение или повышение сексуального влечения (либидо);
- нарушение менструального цикла (дисменорея);
- снижение массы тела;
- при резком снижении дозы или прекращении приема – синдром «отмены» (раздражительность, нервозность, нарушения сна, болезненно-пониженное настроение (дисфория), спазм гладких мышц внутренних органов и скелетной мускулатуры, нарушение самовосприятия (деперсонализация), усиление потоотделения, депрессия, тошнота, рвота, тремор, расстройства восприятия, в т.ч. повышенная чувствительность к звукам (гиперакузия), нарушение чувствительности кожного покрова (парестезии), светобоязнь, тахикардия, судороги, острый психоз).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

* в начале лечения (особенно у пожилых пациентов)

** в начале лечения (особенно у пожилых пациентов, особенно при высоких дозах)

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Астана, район Байконыр, ул. Амангельды Иманова, д. 13 (БЦ «Нурсаулет 2»).

Телефон: +7 (7172) 235-135

Электронная почта: farm@dari.kz

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.ndda.kz

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики

720044, г. Бишкек, ул. 3-я Линия, д. 25.

Телефон: +996 (312) 21-92-78

Телефон горячей линии: 0800-800-26-26

Электронная почта: pharm@dlsmi.kg

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://dlsmi.kg

5. Хранение препарата Феназепам

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на контурной ячейковой упаковке и пачке из картона.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию.Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Феназепам содержит

Действующим веществом является бромдигидрохлорфенилбензодиазепин.

Феназепам, 0,25 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Каждая таблетка содержит 0, 25 мг бромдигидрохлорфенилбензодиазепина.

Феназепам, 0,5 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Каждая таблетка содержит 0,5 мг бромдигидрохлорфенилбензодиазепина.

Феназепам, 1 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Каждая таблетка содержит 1,0 мг бромдигидрохлорфенилбензодиазепина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: бетадекс (бета-циклодекстрин), маннитол, крахмал кукурузный, магния стеарат.

Внешний вид препарата Феназепам и содержимое упаковки

Таблетки, диспергируемые в полости рта.

Феназепам, 0,25 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской с двух сторон.

Феназепам, 0,5 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской с двух сторон.

Феназепам, 1 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской с двух сторон и риской с одной стороны.

Линия разлома (риска) не предназначена для разделения таблетки.

Содержимое упаковки

По 7 или 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку, по 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку или в контурную ячейковую упаковку с перфорацией из пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3 или 5 контурных упаковок вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту. Препарат подлежит предметно-количественному учету.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

Акционерное общество «Валента Фармацевтика» (АО «Валента Фарм»)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.05.2026 № 9041
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

141108, Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

Телефон: +7 (495) 933-48-62

Электронная почта: info@valentapharm.com

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Акционерное общество «Валента Фармацевтика» (АО «Валента Фарм»)

141108, Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2.

Телефон: +7 (495) 933-48-62

Электронная почта: info@valentapharm.com

Республика Казахстан

Представительство Акционерного общества «Валента Фармацевтика» в Республике Казахстан

050009, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, д. 151, офис № 1106.

Телефон: +7 (727) 334-15-51

Моб. телефон: +7 (701) 946-73-00, +7 (771) 779-79-37

Электронная почта: asia@valentapharm.com

Кыргызская Республика

ООО «Медсервис.KG» («Медсервис.КейДжи»)

720051, г. Бишкек, ул. Курманжан Датка, д. 133.

Телефон: + 996 (312) 36-90-39

Электронная почта: z.abdullaeva@pharmtrade.kg

Прочие источники информации

Листок- вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).