ЛП-№(002093)-(РГ-RU) от 25.06.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Велаксин, 75 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Велаксин, 150 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Действующее вещество: венлафаксин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Велаксин, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Велаксин
3. Прием препарата Велаксин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Велаксин
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

1. Что из себя представляет препарат Велаксин, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Велаксин является венлафаксин. Венлафаксин относится к лекарственным препаратам группы «психоаналептики, антидепрессанты, другие антидепрессанты», которые принимают для лечения депрессии и других состояний, таких как тревожные и панические расстройства.

Показания к применению

Препарат Велаксин применяют у взрослых в возрасте от 18 лет для лечения и профилактики депрессии. Препарат Велаксин капсулы с пролонгированным высвобождением также применяется у взрослых для лечения следующих тревожных расстройств: генерализованные тревожные расстройства, социальные тревожные расстройства (страх или избегание социальных ситуаций) и панические расстройства (панические атаки).

Способ действия препарата Велаксин

Считается, что при депрессии содержание серотонина и норадреналина в мозге снижается. Механизм действия антидепрессантов до конца не изучен, но, предполагается, что они способны увеличивать содержание серотонина и норадреналина в головном мозге. Правильное лечение депрессии и/или тревожных расстройств важно для улучшения Вашего

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

состояния. Если Вы не будете получать необходимое лечение, депрессия или тревожное расстройство не пройдет самостоятельно, но они могут стать более тяжелыми и трудноизлечимыми.

Действие венлафаксина развивается постепенно. Улучшение состояния можно ожидать не ранее чем через 2 недели – несколько месяцев после начала лечения.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Велаксин

Противопоказания

Не принимайте препарат Велаксин:

- если у Вас аллергия на венлафаксин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы принимаете или принимали в течение последних 14 дней любые лекарственные препараты, известные как ингибиторы моноаминоксидазы, которые применяются для лечения депрессии или болезни Паркинсона. Прием некоторых ингибиторов моноаминоксидазы вместе с другими препаратами, в том числе с препаратом Велаксин, может вызвать серьезные, или даже опасные для жизни нежелательные реакции. Также Вам необходимо подождать не менее 7 дней после прекращения приема препарата Велаксин прежде, чем начать принимать любые необратимые ингибиторы моноаминоксидазы (см. также разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами», «Серотониновый синдром» и «Другие препараты и препарат Велаксин»);
- если у Вас есть тяжелые нарушения функции печени и/или почек;
- если Вам менее 18 лет;
- если Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Велаксин проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Обязательно предупредите лечащего врача **до начала лечения**:

- Если Вы принимаете другие препараты, которые при совместном применении с препаратом Велаксин могут повысить риск развития серотонинового синдрома (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).
- если у Вас повышенное внутриглазное давление или есть заболевание глаз, называемое закрытоугольной глаукомой;
- если у Вас ранее было или в настоящее время наблюдается повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия);
- если у Вас имеются или были заболевания сердца (включая недавно перенесенный инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, сердечную недостаточность);
- если у Вас есть заболевания сосудов, питающих сердце (коронарных артерий);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

- если у Вас нарушен сердечный ритм (например, повышена частота сердечных сокращений (тахикардия) или есть изменения на электрокардиограмме (удлинение интервала QT);
- если у Вас когда-либо были судорожные приступы;
- если у Вас есть нарушения электролитного баланса, низкое содержание натрия в крови (гипонатриемия), особенно если Вы старше 65 лет или у Вас есть признаки обезвоживания (на фоне приема мочегонных препаратов (диуретиков), рвоты, диареи);
- если Вы беременны (см. подраздел «Беременность и грудное вскармливание»)
- если у Вас или Ваших родственников имеются или раньше были маниакальные состояния или биполярное расстройство, сопровождающиеся чрезмерно повышенным настроением (эйфорией) и возбуждением с последующим пониженным настроением;
- у Вас когда-либо ранее были попытки самоубийства (суицида) или если есть мысли о причинении себе вреда или самоубийстве (суицидальные мысли) (требуется более тщательное наблюдение за Вашим состоянием);
- у Вас когда-либо было агрессивное поведение (враждебность, конфликтное поведение и гнев);
- у Вас сахарный диабет (может потребоваться изменение дозы инсулина или сахароснижающих препаратов для приема внутрь);
- если у Вас легко появляются синяки или имеется тенденция к повышенной кровоточивости (нарушения свертываемости крови) или Вы регулярно принимаете лекарственные препараты, которые могут повысить риск кровотечения (например, варфарин для предупреждения образования тромбов);
- если у Вас исходно снижена масса тела.

Алкоголь

Не употребляйте алкоголь во время лечения препаратом Велаксин, так как это может привести к угнетению сознания (сонливости, снижению внимания, замедлению мышления и речи и прочее) вплоть до потери сознания и смерти. Одновременное употребление алкоголя и (или) некоторых лекарственных препаратов может усугубить симптомы депрессии и других состояний, например, тревожных расстройств

Мысли о самоубийстве и обострение депрессии или тревожного расстройства

Если у Вас депрессия и/или тревожное расстройство, то Вас могут посещать мысли о самоубийстве или причинении себе вреда. Такие мысли чаще возникают в самом начале лечения антидепрессантами, так как подобные лекарственные препараты действуют не сразу, а обычно через две недели после начала лечения, но иногда и дольше. Эти мысли также могут возникнуть при снижении дозы или при прекращении приема препарата Велаксин.

Вы можете быть более подвержены подобным мыслям:

- если у Вас ранее были мысли о самоубийстве или нанесении себе повреждений;
- если Вы не достигли 25-летнего возраста. Результаты клинических исследований указывают на повышенный риск суицидального поведения у взрослых пациентов в возрасте до 25 лет с психическими расстройствами, получающих антидепрессанты.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Если у Вас возникнут мысли о самоубийстве или нанесении себе повреждений, немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее медицинское учреждение.

Возможно, Вам будет полезно рассказать родственнику или близкому другу, что у Вас депрессия или тревожное расстройство, и попросить их прочитать этот листок-вкладыш. Вы можете попросить их сообщать Вам о том, что, по их мнению, Ваша депрессия или тревожное состояние ухудшаются, или они обеспокоены изменениями Вашего поведения.

Серотониновый синдром

Серотониновый синдром – потенциально опасное для жизни состояние, которое может развиться на фоне лечения венлафаксином, в особенности при совместном применении с другими лекарственными средствами, воздействующими на серотониновую систему (см. раздел «Другие препараты и препарат Велаксин», подраздел «Серотониновый синдром»).

Не рекомендуется одновременный прием пищевых добавок, содержащих триптофан. При необходимости их применения лечащий врач особенно тщательно будет контролировать Ваше состояние, особенно в начале лечения и при повышении дозы.

Серотониновый синдром может включать следующие симптомы: психомоторное возбуждение, галлюцинации, кома, повышение частоты сердечных сокращений, повышение температуры тела (лихорадка), быстрые колебания артериального давления, повышенная активность рефлексов (гиперрефлексия), нарушение координации движений, тошнота, рвота, диарея.

В самой тяжелой форме серотониновый синдром может быть похож на **злокачественный нейролептический синдром, к симптомам которого относятся:** повышение температуры тела (лихорадка), повышение частоты сердечных сокращений, потливость, сильная жесткость (ригидность) мышц, нарушение сознания.
Если Вы считаете, что у Вас развился серотониновый синдром или злокачественный нейролептический синдром, немедленно обратитесь к лечащему врачу или в отделение неотложной помощи ближайшего медицинского учреждения.

Мания

У небольшого числа пациентов, принимающих антидепрессанты, в том числе венлафаксин, может развиться мания. Если у Вас ранее возникали эпизоды мании во время применения венлафаксина или других антидепрессантов, сообщите об этом лечащему врачу.

Судороги

У некоторых пациентов во время применения венлафаксина возможно развитие судорожных приступов. Сообщите лечащему врачу, если у Вас ранее были судорожные приступы.

Нарушения электролитного баланса

Во время применения венлафаксина, особенно в условиях обезвоживания (в том числе у пожилых пациентов и пациентов, принимающих диуретики), может наблюдаться снижение количества натрия в крови (гипонатриемия) или изменение секреции гормона, регулирующего водно-электролитный баланс (антидиуретического гормона). Лечащий врач может рекомендовать Вам регулярно сдавать кровь на анализ для выявления подобных нарушений.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Закрытоугольная глаукома
Венлафаксин может вызывать расширение зрачка (мидриаз). Если у Вас повышено внутриглазное давление или есть риск возникновения закрытоугольной глаукомы (заболевание, при котором повышено внутриглазное давление), проконсультируйтесь с врачом перед приемом препарата Велаксин.

Влияние на сердечно-сосудистую систему
У некоторых пациентов во время применения венлафаксина отмечали повышение артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений или нарушения сердечного ритма (аритмии), поэтому врач может рекомендовать Вам регулярно оценивать артериальное давление и ЭКГ, особенно в период уточнения или повышения дозы венлафаксина.

Если у Вас есть или ранее были тяжелые заболевания сердца, проконсультируйтесь с врачом перед приемом препарата Велаксин.

Влияние на уровень холестерина
Прием венлафаксина может вызывать повышение количества холестерина в крови, поэтому лечащий врач может рекомендовать Вам регулярно сдавать соответствующие анализы.

Патологическое кровотечение
Венлафаксин способен снижать свертываемость крови, что может приводить к появления небольших подкожных кровоизлияний (синяков), гематом, а также носовых и желудочно-кишечных кровотечений, которые в некоторых случаях могут быть серьезными и жизнеугрожающими. Если Вы принимаете средства, способные влиять на свертываемость крови (см. Другие препараты и препарат Велаксин), проконсультируйтесь с врачом перед приемом препарата Велаксин.

Риск послеродового кровотечения
При лечении препаратами из группы селективные ингибиторы обратного захвата серотонина/селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина на позднем сроке беременности (в течение последнего месяца до родов), повышается риск обильного послеродового кровотечения, особенно при наличии нарушения свертываемости крови.

Агрессивное поведение
У небольшого числа пациентов, принимающих антидепрессанты, в том числе венлафаксин, во время лечения, изменения дозы или прекращения терапии может наблюдаться агрессия. Если у Вас ранее возникали эпизоды агрессии во время применения венлафаксина или других антидепрессантов, сообщите об этом лечащему врачу.

Синдром «отмены»
При резком прекращении применения препарата Велаксин возможно появление неприятных симптомов, таких как мыслей о самоубийстве, агрессии, которые называются синдромом «отмены». Поэтому прекращать прием препарата следует постепенно, решение о постепенной отмене препарата примет лечащий врач. (см. раздел 3, Продолжительность терапии).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Двигательное беспокойство (акатизия)
В течение первых нескольких недель лечения препаратом Велаксин может возникать тревожное двигательное беспокойство, часто в сочетании с неспособностью спокойно сидеть или стоять на месте (акатизия). Если Вы испытываете подобные симптомы, сообщите об этом лечащему врачу.

Нарушение сексуальной функции
Венлафаксин может вызывать нарушение сексуальной функции (см. раздел 4). В некоторых случаях эти симптомы сохранялись после прекращения лечения.

Сухость во рту
Сухость во рту наблюдали у 10% пациентов, получавших лечение венлафаксином. Это может увеличить риск возникновения кариеса, поэтому Вам следует уделять повышенное внимания гигиене полости рта.

Сахарный диабет
На фоне лечения препаратом Велаксин у Вас может измениться уровень сахара в крови. По этой причине может возникнуть необходимость изменения дозы препаратов, используемых для лечения сахарного диабета.

Снижение массы тела
Препарат Велаксин не показан к применению для снижения массы тела.

Влияние на результаты анализов
У пациентов, принимающих венлафаксин, результаты анализов мочи на фенциклидин и амфетамин могут быть положительными, даже если они не принимали фенциклидин и амфетамин. Если это произойдет, необходимо провести более специфичный тест.

Дети и подростки
Как правило, препарат Велаксин не следует применять у детей и подростков младше 18 лет. Кроме того, Вы должны знать, что при применении препаратов данного класса пациенты младше 18 лет имеют повышенный риск развития нежелательных реакций, таких как попытка суицида, суицидальные мысли и враждебность (преимущественно агрессивное поведение, конфликтное поведение и раздражение/гнев). Несмотря на это, лечащий врач может принять решение о назначении препарата Велаксин пациентам младше 18 лет, если решит, что это отвечает их интересам. В таком случае пациент будет находиться под строгим наблюдением на предмет возникновения суицидальных симптомов. Если лечащий врач назначил этот препарат пациенту младше 18 лет, и Вы хотите обсудить это решение, обратитесь к лечащему врачу. Если какие-либо из перечисленных выше симптомов развиваются или усугубляются при приеме препарата Велаксин пациентами младше 18 лет, Вы должны сообщить об этом лечащему врачу. Кроме того, еще не получены данные о долгосрочной безопасности приема венлафаксина в этой возрастной группе в отношении роста, созревания, а также когнитивного и поведенческого развития.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Другие препараты и препарат Велаксин
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обратитесь к врачу, прежде чем начать или прекратить применение любых лекарственных препаратов, в том числе отпускаемых без рецепта и растительных препаратов.

- **Не принимайте ингибиторы моноаминоксидазы** (например, моклобенид, селегилин, применяемые для лечения депрессии и болезни Паркинсона, или антибиотик линезолид) **совместно с препаратом Велаксин** (см. раздел «Противопоказания»). Сообщите лечащему врачу, если Вы принимали препараты из этой группы в течение последних 14 дней. Совместное применение необратимых ингибиторов моноаминоксидазы с препаратом Велаксин может вызвать тяжелые или даже угрожающие жизни побочные эффекты. Кроме того, Вы должны подождать не менее 7 дней после окончания приема препарата Велаксин перед началом применения любого препарата из группы ингибиторов моноаминоксидазы.

- **Серотониновый синдром**
  Серотониновый синдром – потенциально опасное для жизни состояние, которое может развиться на фоне лечения венлафаксином, в особенности при совместном применении с другими лекарственными средствами, такими как:
  - триптаны (препараты для лечения мигрени), например, суматриптан, золмитриптан и другие;
  - другие препараты для лечения депрессии (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, трициклические антидепрессанты или средства, содержащие литий);
  - амфетамины (для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, нарушения сна (нарколепсии) и ожирения);
  - линезолид (антибактериальный препарат для лечения инфекций);
  - моклобемид (ингибиторы моноаминооксидазы, применяется для лечения депрессии);
  - препараты, содержащие сибутрамин (применяется для снижения массы тела);
  - растительные лекарственные средства, содержащие зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*) (препараты растительного происхождения для лечения нарушений сна и депрессии);
  - препараты, содержащие опиоиды (бупренорфин (или его комбинации с налоксоном), трамадол, фентанил, тапентадол, петидин или пентазоцин (сильные обезболивающие лекарственные средства);
  - декстрометорфан (для лечения кашля);
  - метадон (для лечения опиоидной зависимости или сильной боли);
  - метиленовый синий (используется, например, для лечения высокого уровня метгемоглобина в крови);
  - биологически активные добавки, содержащие триптофан;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

- антипсихотические препараты (для лечения заболевания с такими симптомами, как слуховые, зрительные или сенсорные галлюцинации, ошибочные убеждения, необычная подозрительность).

- Некоторые лекарственные средства также могут взаимодействовать с препаратом Велаксин и поэтому должны применяться с осторожностью. Особенно важно сообщить лечащему врачу, если Вы принимаете какие-либо препараты из следующего списка:
  - препараты для лечения нарушений сердечного ритма (антиаритмические средства), например, хинидин, амиодарон, соталол, дофетилид;
  - антипсихотические препараты, например, тиоридазин, галоперидол или рисперидон (возможно повышение их концентрации в крови);
  - антибактериальные препараты (антибиотики), например, эритромицин, моксифлоксацин, кларитромицин, телитромицин;
  - антигистаминные препараты, которые используются для лечения аллергии, а также циметидин (средство для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки);
  - противовирусные средства, например, атазанавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир, саквинавир;
  - противогрибковые средства, например, кетоконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол (возможно повышение их концентрации в крови);
  - препараты, содержащие литий;
  - диазепам (противотревожное и снотворное средство);
  - метопролол (препарат для лечения повышенного артериального давления и некоторых заболеваний сердца) - возможно повышение концентрации метопролола в крови);
  - средства, способные влиять на свертываемость крови, к которым относятся антикоагулянты, а также нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), в том числе ацетилсалициловая кислота;
  - средства, снижающие массу тела (например, фентермин);
  - пероральные контрацептивные препараты (отмечались единичные случаи снижения эффективности контрацептивных препаратов).

Препарат Велаксин с пищей и алкоголем

Пища (как правило, с высоким содержанием белка, например, твердые сыры, икра рыб, индейка), а также пищевые добавки и фитнес-рационы, являющиеся повышенным источником триптофана, потенциально способствует большей выработке в организме серотонина, что может усиливать нежелательные реакции на препарат Велаксин.

Не употребляйте спиртные напитки во время лечения препаратом Велаксин. Употребление алкоголя совместно с приемом препарата Велаксин может вызвать выраженную усталость, сонливость, снижение внимания, замедлению мышления и речи и потерю сознания, а также ухудшить симптомы депрессии или других состояний, таких как тревожное расстройство.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Беременность

Убедитесь, что Вашему врачу известно о том, что Вы принимаете препарат Велаксин.

Если Вы планируете беременность или в случае наступлении беременности в период лечения препаратом Вы должны немедленно обратиться к лечащему врачу.

В случае приема во время беременности аналогичных лекарственных препаратов (селективных ингибиторов обратного захвата серотонина) возможно повышение риска развития у новорожденных серьезного состояния - стойкой легочной гипертензии новорожденных, приводящей к учащенному дыханию и посинению кожных покровов новорожденных. Данные симптомы, как правило, развиваются в течение первых 24 часов после рождения ребенка. В подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться к Вашему акушеру и/или врачу.

Если Вы принимали данный препарат во время беременности, то кроме нарушения дыхания у ребенка может наблюдаться нарушение приема пищи. Если у ребенка после его рождения имеются эти симптомы, и Вас это беспокоит, обратитесь к врачу и/или акушеру, которые смогут Вас проконсультировать.

Послеродовое кровотечение

Если Вы принимаете препарат Велаксин на позднем сроке беременности (в течение последнего месяца до родов), у Вас увеличивается риск обильного послеродового кровотечения, особенно если у Вас когда-либо ранее было нарушение свертываемости крови. Сообщите врачу о приеме препарата Велаксин, чтобы получить соответствующие рекомендации.

Грудное вскармливание

Венлафаксин проникает в грудное молоко, что может повлиять на здоровье Вашего ребенка. Обратитесь к лечащему врачу, чтобы решить, следует ли Вам прекратить грудное вскармливание или отменить прием препарата Велаксин.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат оказывает влияние на психофизические способности. Также он может ослаблять реакции (нарушить способность к суждению, мышление и двигательные реакции) у некоторых пациентов. Это следует учитывать при управлении транспортными средствами, механизмами и выполнении задач, требующих повышенного внимания.

Препарат Велаксин содержит натрий

Каждая капсула препарата Велаксин, 75 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением, содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, то есть практически не содержит натрия.

Каждая капсула препарата Велаксин, 150 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением, содержит 1,57 ммоль (36 мг) натрия, что соответствует 1,8% от рекомендуемого для взрослого человека максимального ежедневного поступления соли с пищей. Это необходимо учитывать пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

3. Применение препарата Велаксин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Депрессия Рекомендуемая начальная доза составляет 75 мг один раз в сутки. В дальнейшем лечащий врач может постепенно увеличить дозу препарата на 75 мг с интервалом в 2 недели или больше (но не чаще, чем через 4 дня) до достижения желаемого терапевтического эффекта.
Максимальная суточная доза при лечении депрессии – 375 мг в сутки.

Генерализованные тревожные расстройства и социальные тревожные расстройства
Рекомендуемая начальная доза составляет 75 мг один раз в сутки. В дальнейшем лечащий врач может постепенно увеличить дозу препарата с интервалами в 2 недели или более.
При необходимости лечащий врач может увеличить дозу до максимальной - 225 мг/сутки

При лечении панических расстройств врач должен начинать с более низкой дозы 37,5 мг/сутки. В дальнейшем лечащий врач может постепенно (через 7 дней лечения) увеличить дозу до 75 мг/сутки, затем, при необходимости, с интервалом две недели и больше увеличивать дозу до максимальной.
Максимальная доза при лечении панических расстройств составляет 225 мг/сутки.
Дозу можно увеличивать с интервалом в 2 недели и более.

После достижения необходимого эффекта врач может принять решение о снижении дозы.

Особые группы пациентов

Пациенты с нарушением функции печени или почек
Если у Вас нарушена функция печени или почек, лечащий врач может назначить Вам препарат в меньшей дозе.

Лица пожилого возраста
Если Вы пожилой человек (старше 65 лет), лечащий врач может назначить Вам препарат в меньшей дозе, в зависимости от Вашего состояния.

Переход с таблеток венлафаксина быстрого высвобождения на капсулы с пролонгированным высвобождением
Если Вы принимали венлафаксин в таблетках с немедленным высвобождением, врач может перевести Вас на венлафаксин в капсулах с пролонгированным высвобождением в соответствующей эквивалентной суточной дозе. Например, если Вы принимали таблетки в дозе 37,5 мг два раза в сутки, врач может перевести Вас на венлафаксин в капсулах с пролонгированным высвобождением в дозе 75 мг один раз в сутки. Может потребоваться коррекция дозы в индивидуальном порядке.

Применение у детей и подростков
Не давайте препарат Велаксин детям и подросткам в возрасте до 18 лет.

Путь и (или) способ введения
Внутрь.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Препарат Велаксин принимают один раз в сутки во время еды в одно и то же время. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая жидкостью. Запрещается их разделение, измельчение, разжевывание или растворение их содержимого.

Капсулы венлафаксин с пролонгированным высвобождением содержат пеллеты сферической формы, из которых в пищеварительный тракт медленно высвобождается действующее вещество. Нерастворимая часть этих пеллет выводится с калом.

Продолжительность терапии
Не прекращайте прием препарата без консультации с лечащим врачом. Лечение может продолжаться до 6 месяцев и более. Важно продолжать прием препарата Велаксин на протяжении всего срока, прописанного врачом.
Для предупреждения развития обострения депрессии принимайте препарат в течение не менее 6 месяцев после наступления ремиссии.

Если Вы прекратили прием препарата Велаксин
Не прекращайте прием препарата без указания лечащего врача, даже если Вы чувствуете себя лучше. Прекращение лечения препаратом Велаксин может привести к ухудшению течения Вашего заболевания. Прекращать прием препарата Велаксин следует постепенно. При курсе терапии длительностью 6 недель и более, применение препарата прекращают постепенно, снижая его дозу в течение последующих 2 недель и более. У некоторых пациентов может потребоваться очень медленная отмена препарата в течение нескольких месяцев или дольше.

Резкое прекращение приема препарата или быстрое снижение дозы может привести к развитию таких симптомов «синдрома отмены» как суицидальные мысли, агрессивное поведение, утомляемость, головокружение, нарушение чувствительности (в том числе проявляющееся покалыванием или жжением [парестезией]), нарушения сна (в том числе бессонница и кошмарные сновидения), психомоторное возбуждение или тревога, тошнота и/или рвота, тремор (непроизвольное дрожание), вертиго (потеря равновесия, сопровождающаяся головокружением), головная боль, гриппоподобный синдром, нарушения зрения, повышение артериального давления.

Если у Вас возникли какие-либо из вышеуказанных или другие нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Лечащий врач проконсультирует Вас о постепенном прекращении приема препарата Велаксин в течение нескольких недель или месяцев. Иногда некоторым пациентам может потребоваться еще более постепенное прекращение лечения (в течение нескольких месяцев или более).

Если Вы приняли препарата Велаксин больше, чем следовало
Если Вы приняли препарата Велаксин больше, чем следовало
немедленно **обратитесь в ближайшее медицинское учреждение. -** Возьмите с собой упаковку препарата. Передозировка препаратом может представлять угрозу для жизни, особенно при одновременном приеме с алкоголем и (или) некоторыми препаратами (см. подраздел «Другие препараты и препарат Велаксин»). Возможно, **Вам потребуется медицинская помощь.** Если Вы приняли слишком много капсул препарата Велаксин, у Вас могут возникнуть такие симптомы как учащенное сердцебиение (тахикардия), угнетение сознания (от сонливости до комы), расширение зрачков (мидриаз), судороги,

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

рвота, специфические изменения на электрокардиограмме, внезапно развившееся тяжелое нарушение ритма сердца с учащенным сердцебиением, болью в груди, чувством страха, головокружением, слабостью, вплоть до потери сознания (желудочковую тахикардию), урежение сердечного ритма (брадикардия), снижение артериального давления (артериальная гипотензия); снижение концентрации сахара в крови (гипогликемия), ощущение вращения (вертиго) и смерть.

Не вызывайте рвоту, если есть риск попадания пищи в дыхательные пути. Если после передозировки прошло немного времени (обычно до 2 часов) и есть признаки передозировки, промывание желудка может быть эффективным. Примите активированный уголь для снижения всасывания венлафаксина.

Если Вы забыли принять препарат Велаксин
Если Вы забыли принять дозу в обычное время, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Велаксин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Велаксин и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, если заметите любую из перечисленных ниже серьезных нежелательных реакций – Вам может потребоваться неотложная медицинская помощь:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- тяжелая аллергическая реакция, которая может проявляться такими симптомами как отек губ, языка, гортани и лица, иногда – с затруднением дыхания (ангионевротический отек),
- сильно зудящая сыпь/волдыри на коже (крапивница). кровавая рвота, дегтеобразный стул, слабость (кровотечение из желудочно-кишечного тракта);

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- внезапно возникшая угрожающая жизни аллергическая реакция. Симптомы включают свистящее шумное дыхание, хрипы, одышку и низкое артериальное давление (анафилактическая реакция);
- внезапная тяжелая кожная токсико-аллергическая реакция с высыпаниями и пузырями на коже и слизистых оболочках с последующим отслаиванием, язвами во рту, наружных половых органов и глаз, лихорадкой, болью в мышцах и суставах (синдром Стивенса-Джонсона);
- внезапное тяжелое угрожающее жизни, аллергическое заболевание с образованием обширных волдырей на коже, шелушением и поражением внутренних органов (токсический эпидермальный некролиз);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

- тяжелая реакция со стороны кожи. сопровождающаяся появлением мишеневидных высыпаний на коже (многоформная эритема).

- признаки и симптомы серотонинового синдрома, которые могут включать психомоторное возбуждение, галлюцинации, кому, повышение частоты сердечных сокращений, повышение температуры тела (лихорадку), быстрые колебания артериального давления, повышенную активность рефлексов (гиперрефлексию), нарушения координации движений, тошноту, рвоту и диарею. Серотониновый синдром в наиболее тяжелой форме может напоминать состояние, называемое злокачественный нейролептический синдром. Признаки и симптомы данного синдрома могут включать сочетание повышенной температуры (лихорадки), сильной жесткости (ригидности) мышц, потливости, нарушения сознания, повышенного артериального давления или повышенной частоты сердечных сокращений; слабость мышц, необычные боли в мышцах, продолжающиеся дольше обычного, что может быть признаком угрожающего жизни повреждения мышц, называемого рабдомиолизом: оно приводит к общей слабости, развитию лихорадки и нарушению функции почек.

- внезапно развившееся тяжелое нарушение ритма сердца с учащенным сердцебиением, болью в груди, чувством страха, головокружением, слабостью, вплоть до потери сознания (желудочковая тахикардия, желудочковая тахикардия типа «пируэт»);

- потенциально смертельное нарушение ритма сердца, характеризующееся серией частых (200–300 сокращений в минуту) несогласованных неэффективных сокращений желудочков сердца, приводящее к его остановке (фибрилляция желудочков);

- воспаление поджелудочной железы (панкреатит) с опоясывающей интенсивной болью в животе и спине, сопровождающееся ухудшением самочувствия;

- воспаление печени (гепатит);

Неизвестно (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- суицидальные мысли и суицидальное поведение.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Велаксин

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- бессонница;
- головная боль;
- головокружение;
- сонливость;
- тошнота;
- сухость слизистой оболочки полости рта;
- запор;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

- повышенное потоотделение (в том числе ночная потливость)

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- снижение аппетита;
- спутанное состояние сознания;
- отчужденность от окружающей действительности, близких людей, искажение восприятия окружающего мира – времени, размера и форм предметов, расстояния, ощущение отстраненности от своего тела, разума, ощущений (деперсонализация);
- кошмарные сновидения;
- нервозность;
- состояние сильного эмоционального возбуждения;
- снижение полового влечения (либидо);
- невозможность получить сексуальное удовлетворение (аноргазмия);
- тревожное двигательное беспокойство или неспособность сидеть или спокойно стоять на месте (акатизия);
- нарушение чувствительности, проявляющееся покалыванием или жжением (парестезия);
- непроизвольное дрожание (тремор);
- нарушение вкусовых восприятий (дисгевзия);
- неспособность глаз автоматически менять фокус с дальнего предмета на ближний (нарушение аккомодации), включая нечеткость зрения;
- расширение зрачков (мидриаз);
- нарушение зрения;
- шум в ушах;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- ощущение сильного сердцебиения (пальпитация);
- повышение артериального давления (артериальная гипертензия);
- расширение кровеносных сосудов («приливы» крови);
- одышка;
- зевота;
- диарея;
- рвота;
- кожная сыпь;
- кожный зуд;
- повышение мышечного тонуса (гипертонус);
- нарушение мочеиспускания (преимущественно затрудненное начало мочеиспускания);
- задержка мочи;
- частое мочеиспускание в течение дня (поллакиурия);
- обильные менструации (меноррагия);
- маточное кровотечение (метроррагия);
- нарушения семяизвержения (эякуляции);
- нарушения эрекции;
- утомляемость;

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

- необъяснимая слабость и усталость (астения);
- озноб;
- снижение массы тела;
- увеличение массы тела;
- повышение концентрации холестерина в сыворотке крови.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- повышенное настроение, психическое возбуждение в виде ускорения мышления и речи и двигательное возбуждение (мания);
- легкая форма мании (гипомания);
- галлюцинации;
- расстройство с нарушением восприятия внешнего мира (дереализация);
- нарушение оргазма;
- непроизвольное скрежетание зубами (бруксизм);
- состояние вялости и безразличия (апатия);
- обморок (синкопальное состояние);
- непроизвольные кратковременные мышечные сокращения (миоклонусы);
- нарушение координации;
- нарушение равновесия;
- внезапно возникающие непроизвольные движения в различных группах мышц (дискинезия);
- снижение артериального давления при резком изменении положения тела (ортостатическая гипотензия);
- понижение артериального давления (артериальная гипотензия);
- безболезненные кровоизлияния под кожу (экхимозы);
- повышенная чувствительность кожи к солнечному свету (реакции фоточувствительности);
- выпадение волос (алопеция);
- недержание мочи;
- изменение активности печеночных ферментов;

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- значительное снижение уровня вплоть до отсутствия определенных белых клеток крови (агранулоцитоз);
- угнетение кроветворной функции костного мозга с низким образованием всех клеток крови (апластическая анемия);
- значимое снижение числа эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (панцитопения);
- снижение количества одного вида белых клеток (нейтрофилов) в крови (нейтропения);
- состояние, сопровождающееся уменьшением выделения мочи, увеличением массы тела, головокружением, головной болью, тошнотой и рвотой (синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона);
- снижение количества натрия в крови (гипонатриемия);

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

- острое психическое расстройство, характеризующееся нарушениями внимания, восприятия, мышления и памяти (делирий);
- судороги;
  стойкие непроизвольные сокращения мышц, приводящие к появлению аномального положения тела или резким скручивающим спазмам (дистония);
- повышенное внутриглазное давление, проявляющее сильной болью в глазу, покраснением, резким снижением зрения, появлением радужных кругов вокруг источников света, головной болью, тошнотой, рвотой (закрытоугольная глаукома);
- удлинение интервала QT на ЭКГ; хроническое воспаление легких с прогрессирующим рубцеванием легочной ткани (интерстициальная болезнь легких);
- скопление определенного типа белых клеток крови (эозинофилов) в ткани легких (легочная эозинофилия);

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- снижение количества кровяных пластинок, участвующих в образовании сгустка крови (тромбоцитопения);
- повышение содержание в крови гормона гипофиза, называемого пролактином;
- состояние, характеризующееся непроизвольными, часто повторяющимися движениями рта, щек и языка, (поздняя дискинезия);
- кровоизлияние в слизистые оболочки;
- увеличение продолжительности кровотечения.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- послеродовое кровотечение (эта нежелательная реакция была зарегистрирована для препаратов, относящихся к группе селективных ингибиторов обратного захвата серотонина/селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина);
- агрессия;
- ощущение вращения (вертиго);
- боль в груди, одышка, головокружение, обморок, нерегулярное сердцебиение (возможные признаки стрессовой кардиомиопатии – кардиомиопатии такоцубо)

Некоторые из перечисленных нежелательных реакций можно выявить только по результатам лабораторных анализов, поэтому лечащий врач может рекомендовать Вам регулярно сдавать кровь для анализов во время лечения препаратом Велаксин.

Синдром «отмены»

При прекращении применения препарата, резкой отмене или при снижении дозы могут наблюдаться симптомы, которые относятся к так называемому синдрому «отмены»: чаще всего наблюдались следующие реакции: утомляемость, сонливость, головная боль, тошнота, рвота, анорексия, сухость слизистой оболочки полости рта, головокружение, диарея, бессонница, беспокойство, тревога, дезориентация, гипомания, нарушение чувствительности, потливость. При возникновении подобных симптомов обратитесь к лечащему врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля, Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Иманова, 13
Телефон: +7 (7172) 235–135
Электронная почта: farm@dari.kz
Сайт: http://www.ndda.k

Республика Беларусь
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а
Телефон: +375 (17) 242-00–29
Сайт: https://www.rceth.by

Республика Армения
ГНКО «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий»
Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса 49/5
Телефон: (+374 10) 20-05-05, (+374 96) 22-05-05
Электронная почта: vigilance@pharm.am
Сайт: http://www.pharm.am

5. Хранение препарата Велаксин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Велаксин содержит
Действующим веществом является венлафаксин.

Велаксин, 75 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Каждая капсула содержит 75 мг венлафаксина (в виде гидрохлорида).

Велаксин, 150 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Каждая капсула содержит 150 мг венлафаксина (в виде гидрохлорида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: целлюлоза микрокристаллическая, натрия хлорид, диметикон (Е-1049 39 %), камедь ксантановая, калия хлорид, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк, этилцеллюлоза, коповидон, краситель железа оксид желтый (Е172), титана диоксид (Е171), краситель железа оксид красный (Е172), желатин.

Препарат Велаксин содержит натрий (см. раздел 2)

Внешний вид препарата Велаксин и содержимое упаковки
Капсулы с пролонгированным высвобождением.

Велаксин, 75 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Твердые желатиновые капсулы размера «2», с бесцветным, прозрачным корпусом и крышечкой оранжево-коричневого цвета, содержащие смесь пеллет белого и желтого цвета, без или почти без запаха.

Велаксин, 150 мг, капсулы с пролонгированным высвобождением

Твердые желатиновые капсулы «0EL», с бесцветным, прозрачным корпусом и крышечкой оранжево-коричневого цвета, содержащие смесь пеллет белого и желтого цвета, без или почти без запаха.

По 10 или 14 капсул в блистере из поливинилхлорид/поливинилиденхлорид // алюминиевой фольги. 2 или 6 блистеров по 14 капсул или 3 блистера по 10 капсул вместе с листком-вкладышем в картонной пачке.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации. 6 блистеров по 14 капсул доступны только в Российской Федерации

Категория отпуска лекарственного препарата
Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
Венгрия
ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 11.06.2026 № 11677
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0019)

1106 Будапешт, ул. Керестури, 30-38
Телефон: (+36-1) 803-5555
Адрес электронной почты: mailbox@egis.hu

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «ЭГИС-РУС»
121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 19, этаж 13, блок В.
Телефон: +7 (495) 363-39-66.
Электронная почта: pharmacovigilance@egis.ru

Республика Казахстан
Представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» в Республике Казахстан
050060, г. Алматы, ул. Жарокова 286 Г
Телефон: + 7 (727) 247 63 34, + 7 (727) 247 63 33, +7(771) 929 25 25
Электронная почта: egis@egis.kz

Республика Беларусь
Представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия) в Республике Беларусь
220053, г. Минск, пер. Ермака, д. 6А
Телефон: (017) 380-00-80, (017) 227-35-51, (017) 227-35-52
Факс: (017) 227-35-53
Электронная почта: info@egis.by

Республика Армения
Представительство ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» в Республике Армения
0010, г. Ереван, ул. Анрапетутян, дом 67, 4 этаж.
Телефон: +374–10574509
Электронная почта: info@egis.am

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза и на официальном сайте уполномоченного органа (экспертной организации) https://www.grls.rosminzdrav.ru (https://lk.regmed.ru/Register/EAEU_SmPC).

V_0019