

# Variable compleja

## Los números complejos

**Definición 1.1** Un número complejo es una expresión  $a + bi$  donde  $a, b \in \mathbb{R}$  y  $i$  es la unidad imaginaria, fruto de resolver la ecuación  $x^2 + 1 = 0$  en  $\mathbb{R}$ . Así, definimos  $i = \sqrt{-1}$ . Si  $z \in \mathbb{C} = a + bi$ ,  $a = \operatorname{Re} z$  y  $b = \operatorname{Im} z$  son la parte **real** e **imaginaria** de  $z$ .

**Definición 1.2** La **suma** y **multiplicación** están definidas en los complejos así:

$$(x_1 + y_1 i) + (x_2 + y_2 i) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i$$

$$(x_1 + y_1 i) (x_2 + y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1) i$$

Y con estas operaciones  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  es un cuerpo, con  $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$  y  $1_{\mathbb{C}} = 1 + 0i$ .

**Definición 1.3** Dado un complejo  $z = x + yi$ , llamamos **conjugado** de  $z$ ,  $\bar{z}$  a  $x - yi$ .

**Proposición 1.3.1** Se verifica que  $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$  y  $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ .


**Definición 1.4.1** Se denomina **módulo** de un complejo  $z = x + yi$ ,  $|z|$  a  $\sqrt{x^2 + y^2}$ . Se cumple que  $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$ . El módulo cumple que (1)  $|z| \geq 0$ , (2)  $|z| = 0 \iff z = 0$ , (3)  $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$  y (4)  $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

Demostración. (4)  $|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = z_1 \bar{z}_1 + z_1 \bar{z}_2 + z_2 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) \leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2 |z_1| |z_2| = (|z_1| + |z_2|)^2$

**Definición 1.5** Dado un  $z = a + bi$ , aplicando  $u = p + iq = z/|z|$ , entonces  $|u| = 1 = p^2 + q^2$ . El ángulo tal que  $p = \cos \alpha$ ,  $q = \sin \alpha$  se denomina **argumento**,  $\arg z$ . Así,  $z$  puede representarse como  $z = |z|(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ .

El argumento cumple que (1)  $\arg \bar{z} = -\arg z$  y (2)  $\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2$ .

**Definición 1.7 / 1.8** El espacio topológico  $(\mathbb{C}, \delta_E)$  con distancia euclídea no es compacto. Sin embargo, si tomamos  $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  entonces sí es compacto, y lo denominamos **plano complejo ampliado**. La **esfera de Riemann** es la representación del conjunto  $\hat{\mathbb{C}}$  en  $\mathbb{R}_{(\xi, \eta, \zeta)}^3$  en una esfera con centro  $(0, 0, 1/2)$  con ecuación  $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - \zeta = 0$ .



La relación entre la esfera y el plano es

$$\xi = \frac{x}{1 + x^2 + y^2}, \eta = \frac{y}{1 + x^2 + y^2}, \zeta = \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2}$$

La **distancia cordal** entre dos puntos  $z_1, z_2$  es la distancia euclídea entre los puntos  $P_1, P_2$  de la esfera de la esfera de Riemann.

$$\delta(z_1, z_2) = \sqrt{(\xi_1 - \xi_2)^2 + (\eta_1 - \eta_2)^2 + (\zeta_1 - \zeta_2)^2} = \frac{\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}}{\sqrt{(1 + x_1^2 + y_1^2)(1 + x_2^2 + y_2^2)}}$$

Para un punto en el infinito, la distancia es  $\delta(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}}$