

Topología

1 Espacios topológicos

Se dice que p es el límite de una sucesión de reales a_1, \dots, a_n cuando, para todo abierto $p - \epsilon, p + \epsilon$, existe un m tal que para todo $n \geq m$ se cumple que $a_n \in (p - \epsilon, p + \epsilon)$.

Esta noción de intervalo se unifica en el concepto **bola**, y se define la familia de intervalos de un punto p , $B(p)$. Sea X no vacío, para cada $p \in X$ existe una familia $B(p)$. Se dice que $B(p)$ es una **base de entornos abiertos** de p si todas las familias $B(p)$ verifican:

- B1: si $U \subset B(p)$, entonces $p \in U$.
- B2: si $U \in B(p)$ y $V \in B(p)$, existe $W \in B(p)$ tal que $W \subset U \cap V$.
- B3: si $U \in B(p)$, para todo $q \in U$ existe $V \in B(q)$ tal que $V \subset U$.

Esta generalización de conjuntos $(p - \epsilon, p + \epsilon)$ nos simplifica y permite expandir la definición de topología, independientemente de una métrica o distancia.

Se llama un **espacio métrico** (X, d) a un conjunto X con una distancia d definida en él. En un espacio métrico se llama **bola abierta** de centro p y radio r al conjunto $E(p, r) = \{t \in X \mid d(p, t) < r\}$. Las familias $B(p)$ de todas las bolas con radios reales cumplen los puntos B1, B2 y B3, por lo que constituyen base de entornos abiertos en (X, d) .

Si X es un conjunto en el que se ha definido un sistema de bases de entornos abiertos $B(p)$, un subconjunto $A \subset X$ es un **conjunto abierto** cuando es \emptyset o cuando para cada $t \in A$ existe un subconjunto $U \in B(t)$ tal que $U \subset A$.

En \mathbb{R} la topología usual (T_u) viene dada por $B(p) = (p - \epsilon, p + \epsilon)$. En esta topología, (\mathbb{R}, T_u) , cada intervalo abierto (a, b) viene dado como $B(t)$, $t = \frac{a+b}{2}$. El intervalo $[a, b)$ no es abierto, pues para a no existe ningún conjunto $U \in B(a)$ tal que $U \subset [a, b)$.

Dos sistemas de bases de entornos abiertos, $B(p), B'(p)$ son **equivalentes** cuando determinan la misma topología T en X ; es decir, que para cada $U \in B(p)$ existe un $U' \in B'(p)$ tal que $U \subset U'$ y que para cada $V' \in B'(p)$ exista un $V \in B(p)$ tal que $V' \subset V$.

1.1 Propiedades de una topología

Sea un conjunto X . La topología T determinada en X cumple:

- P1: $\emptyset \in T$ y $X \in T$.
- P2: Dada una familia de abiertos $U_\lambda, \lambda \in L$ de T , la unión de los elementos, $\bigcup_\lambda U_\lambda$ es un elemento de T .
- P3: Dada una familia **finita** $U_i, i = 1, \dots, n$ de elementos de T , la intersección de los elementos, $\bigcap_{i=1}^n U_i$ es un elemento de T .

Un **espacio topológico** (X, T) es un conjunto no vacío con una topología definida en él. Una familia de subconjuntos de X , $H(p)$ para cada $p \in X$ [SEAN DISCRETOS O CONTINUOS], si cumple P1, P2, P3 entonces, las familias H forman una topología T en X . Si para esa topología existe una métrica d , entonces decimos que es una **topología metrizable**.

Si T, T' son dos topologías de X , y $T \subset T'$, entonces se dice que T es menos **fina** que T' . La topología más fina de todas es la **topología trivial**, dada por $\{\emptyset, X\}$, y la menos fina, o **discreta**, está dada por $\mathcal{P}(X)$, es decir, el conjunto partición de X .

En (X, T) se llama **conjunto cerrado** a un conjunto $M \subset X$ tal que $X - M$ es abierto. Una familia de conjuntos cerrados es (X, T) verifica:

- C1: $\emptyset \in T$ y $X \in T$ son cerrados.
- C2: Dada una familia **finita** de cerrados $M_\lambda, \lambda \in L$ de T , la unión de los elementos, $\bigcup_\lambda M_\lambda$ es un cerrado.
- C3: Dada una familia $M_\lambda, \lambda \in L$ de elementos de T , la intersección de los elementos, $\bigcap_L U_\lambda$ es un elemento de T .

Si (X, T) es un espacio topológico y $M \subset X$, la topología $T_M = \{M \cap U\}$ de las intersecciones de M con abiertos U de (X, T) se llama **topología inducida o subordinada** de T . Así, el espacio M, T_M es un subespacio de (X, T) .

2 Base de una topología

Dada una topología T en X , la **base de la topología**, B , es una familia de conjuntos tal que cualquier abierto no vacío $U \subset T$ es una unión de elementos de B . $\forall U \subset T, U = \bigcup_i B_i$

Sea X un conjunto y $F = \{A_\lambda\}_{\lambda \in L}$ una familia de subconjuntos de X . Una condición necesaria y suficiente para que F sea base de X es:

- I: $\bigcup_\lambda \{A_\lambda\} = X$
- II: Si A_λ, A_μ son dos elementos de F , y $A_\lambda \cap A_\mu \neq \emptyset$, para cualquier punto $t \in A_\lambda \cap A_\mu$ existe $A_\nu \in F$ tal que $t \in A_\nu$

2.1 1er y 2º axioma de numerabilidad

Un espacio (X, T) verifica el 1er axioma de numerabilidad si para todo $x \in X$ existe una base de entornos de x que sea numerable. Un espacio (X, T) verifica el 2º axioma de numerabilidad cuando su topología tiene una base numerable.

2.2 Topología engendrada for una familia de subconjuntos

Cualquier familia $\{A_\lambda\}$ de X que cumpla I es una subbase de una topología de X . Si $H = \{A_\lambda\}$ cumple I y II, la familia B formada por las intersecciones (y uniones) finitas de H es base para alguna topología de X y se llama **topología engendrada**.

3 Entornos en un espacio topológico

Sea (X, T) un espacio topológico, y $p \in X$. $A \subset X$ es entorno de p si existe un abierto U de la topología T tal que $p \in U \subset A$. No todo entorno ha de ser abierto. Por ejemplo, $[0, 1)$ es entorno de $1/2$ (existe $U = (1/2 - 1/4, 1/2 + 1/4) \subset [0, 1)$), pero no de 0 (ningún abierto en T cumple $U \subset [0, 1)$).

Los sistemas de entornos $E(p)$ para X cumplen:

- E1: Si $A \in E(p)$, entonces $p \in A$.
- E2: Si $A \in E(p)$, todo subconjunto $A' \subset X$ tal que $A' \supset A$ pertenece a $E(p)$ [porque $p \in A'$].
- E3: Si $A, A' \in E(p)$, entonces $A \cap A' \in E(p)$. Esto es aplicable a un número finito de intersecciones.
- E4: Si $A \in E(p)$, A , existe $U \in E(p)$ tal que para todo $q \in U$, $A \in E(q)$.

Sea $p \in (X, T)$, y $E(p)$ su sistema de entornos. Una subfamilia $A(p)$ de $E(p)$ es un sistema fundamental de entornos (abiertos o no) de p [base de entornos] si todo entorno de p contiene un elemento de $A(p)$.

Los sistemas de bases de entornos $B(p)$ resultan ser sistemas fundamentales de entornos. P. ej. en (\mathbb{R}, T_u) cada punto x tiene una base de entornos numerable, los intervalos abiertos de radio racional: $\{(x - r, x + r)\}_{0 < r \in \mathbb{Q}}$.

Un espacio topológico métrico verifica el primer axioma de numerabilidad, pues $\{(x - r, x + r)\}_{0 < r \in \mathbb{Q}}$ es un sistema de entornos numerable.

4 Subconjuntos en un espacio topológico

Todo punto en un espacio topológico puede ser de 3 tipos distintos. Si consideramos el espacio (X, T) y $M \subset X$, entonces

- $t \in X$ es un punto **interior** a M ($t \in \text{int}(M)$) si existe algún entorno $V \subset M$.
- $t \in X$ es un punto **exterior** a M ($t \in \text{ext}(M)$) si existe un entorno V de t que no corta a M [$V \cap M = \emptyset$].
- $t \in X$ es un punto **frontera** ($t \in \text{front}(M)$) si para todo entorno V , $V \cap M \neq \emptyset$ y $V \cap (X - M) \neq \emptyset$.

El interior de M , $\text{int}(M)$ es el mayor abierto contenido en M . $\text{ext}(M)$ también es un conjunto abierto, y $\text{front}(M)$ es siempre cerrado.

De esta clasificación pueden crearse más definiciones.

- $t \in X$ es **adherente** a M si para todo entorno $V(t)$ es $V \cap M \neq \emptyset$. $\text{adh}(M) = \overline{M} = \text{int}(M) \cup \text{front}(M)$.
 - $t \in X$ es un punto de **acumulación** de M si todo entorno $V(t)$ corta a M en algún punto distinto de t ; es decir, $(V - \{t\}) \cap M \neq \emptyset$. El conjunto de puntos de acumulación se denomina **derivado** de M , o $\text{der}(M)$.
 - $t \in X$ es **aislado** cuando existe algún entorno $V(t)$ tal que $(V - \{t\}) \cap M = \emptyset$.

En (X, T) , un conjunto M es cerrado sii contiene todos sus puntos de acumulación.

En un espacio (X, T) un subconjunto M es denso en X si $\text{adh}(M) = X$. Por ejemplo, \mathbb{Q} es denso en

\mathbb{R} , porque para todo entorno de \mathbb{R} siempre hay un racional. Un subconjunto es denso sii para todo abierto no vacío $U \subset X$ se tiene que $U \cap M \neq \emptyset$.

Un espacio topológico es **separable** si tiene un subconjunto numerable y denso.

5 Sucesiones, límites de sucesiones

Una **sucesión** en un conjunto X es una aplicación $s : \mathbb{N} \rightarrow X ; s(i) \mapsto a_i$. Cuando se tiene una aplicación $f : X \rightarrow Y$ y una sucesión $s : \mathbb{N} \rightarrow X$, definimos la sucesión $s' : \mathbb{N} \rightarrow Y$ a la composición $s' = f \circ s$ de modo que $s'(i) = f \circ s(i) = f(a_i) \in Y$. La sucesión $s(i) = a_i$ se representa por $\{a_i\}$.

Dada una sucesión $\{a_i\}$ en X , se define $A_m = \{a_i \in s \mid i \geq m\}$. Se tiene que $A_m \neq \emptyset$ y $A_k \subset A_m \cap A'_m \iff k = \max(m, m')$.

Si X es un conjunto, una **base de filtro** \mathcal{B} es una familia $\mathcal{B} = \{A_\lambda\} \subset X$ que verifica que (1) $A_\lambda \neq \emptyset$ y (2) dados A_λ, A_μ existe $A_\nu \in \mathcal{B}$ tal que $A_\nu \subset A_\lambda \cap A_\mu$. En un espacio (X, T) , una base de entornos $E(p)$ es una base \mathcal{B} .

Dadas dos bases de filtro $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$, se dice que \mathcal{B}' es **más fina** que \mathcal{B} cuando para todo $A \in \mathcal{B}$, existe $A' \in \mathcal{B}'$ tal que $A' \subset A$.

Si $\mathcal{B} = \{A_\lambda\}$, las imágenes $\{f(A_\lambda)\}$ forman una base de filtro en Y , y se representa por $f(\mathcal{B})$. Si $\mathcal{B}' = \{A'_\lambda\}$ es una base de filtro en Y y $\forall \lambda A'_\lambda \cap f(X) \neq \emptyset$, entonces $\{f^{-1}(A'_\lambda)\}$ forman una base de filtro en X y se representa por $f^{-1}(\mathcal{B}')$.

Si consideramos la sucesión $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, los conjuntos $\mathbb{N}_m = \{i \in \mathbb{N} \mid i \geq m\}$ forman una base de filtro \mathcal{F} en \mathbb{N} , llamada **base de filtro de Fréchet**.

p es el **punto límite** de $\{a_i\}$ si dado un entorno U de p , existe m tal que $A_m \subset U$. Asimismo, p es un punto límite de \mathcal{B} en un espacio topológico (X, T) si dado un entorno U de p , existe un $A_\lambda \in \mathcal{B}$ tal que $A_\lambda \subset U$.

Un espacio topológico (X, T) verifica el **axioma de separación** T_2 cuando, dados $p, q \in X$ existen dos entornos $U(p), V(q)$ tales que $U \cap V = \emptyset$. Este espacio se denomina también **espacio de Hausdorff**. Por ejemplo, (\mathbb{R}, T_u) es de Hausdorff, porque si se toman $p, q \in \mathbb{R}$, y $d = |p - q|$, entonces $U = (p - \frac{d}{2}, p + \frac{d}{2})$ y $V = (q - \frac{d}{2}, q + \frac{d}{2})$ son disjuntos.

Sea $\mathcal{B} = \{A_\lambda\}$ una base en un espacio de Hausdorff. Si \mathcal{B} es convergente a p , éste es el único punto límite de \mathcal{B} .

Sea $s = \{a_i\}$. $p \in X$ es un **punto de aglomeración** de s si se verifica que para todo entorno U de p y para todo A_m de la base de filtro de Fréchet de la sucesión, es $A_m \cap U \neq \emptyset$.

Si $s = \{a_i\}$ es una sucesión en (X, T) , el conjunto de puntos de aglomeración de s es $\bigcap_{m \in \mathbb{N}} \{adh(A_m)\}$.

Si \mathcal{B} es una base de filtro en (X, T) , p es de aglomeración cuando para todo entorno U de p y para todo $A_\lambda \in \mathcal{B}$, $U \cap A_\lambda \neq \emptyset$. El conjunto $\bigcap_\lambda \{adh(A_\lambda)\}$ es el conjunto de puntos de aglomeración de \mathcal{B} .

6 Aplicaciones continuas. Homeomorfismos

Sea $f : (X, T) \rightarrow (Y, S)$, y $p \in X$. Entonces f es continua en p cuando para todo entorno $V \in (Y, S)$ existe un entorno $U \in (X, T)$ tal que $f(U) \subset V$. Si consideramos una base de \mathcal{B} , entonces f es continua en p si para toda base de filtro \mathcal{B} convergente a p , $f(\mathcal{B})$ converge a $f(p)$.

Una aplicación f es continua en (X, T) si lo es para todo $p \in X$. Una condición necesaria y suficiente para que f sea continua es que para todo abierto V de (Y, S) [o de la base del espacio], $f^{-1}(V)$ sea abierto en (X, T) . Análogamente, f es continua si para todo cerrado V , $f^{-1}(V)$ es cerrado en (X, T) .

Sea $f : (X, T) \rightarrow (Y, S)$ y $g : (Y, S) \rightarrow (Z, T')$, si f y g son continuas, $g \circ f$ también lo es.

Una aplicación $f : (X, T) \rightarrow (Y, S)$ es un homeomorfismo si f es biyectiva, y tanto f como f^{-1} son continuas. Dos espacios topológicos son homeomorfos si existe un homeomorfismo entre ellos.

Se llama propiedad topológica o invariante topológico a aquella que si la tiene un espacio topológico, la tienen todos los que son homeomorfos a este. Ejemplos de invariantes son los axiomas de numerabilidad, poseer un denso numerable (separabilidad) o ser espacio T_2 . Por ejemplo, espacios con topologías T_u y D no son homeomorfos.