

beschreibung	offset	info	erledigt
Rotavirus (RV) #1 (Alex)	2	1. Impfung in der 7. Lebenswoche	
Rotavirus (RV) #2 (Alex)	3	fruehestens 4 Wochen nach der 1. Impfung	
Rotavirus (RV) #3 (Alex)	4	abhaengig vom verwendeten Impfstoff fruehestens 4 Wochen nach der 1. Impfung	
6-fach #1 (Alex)	3	6-fach (Diphtherie (DIP), Tetanus (TET), Pertussis (PEA), Poliomylitis)	
6-fach #2 (Alex)	5	2 Monate nach der 1. Impfung	
6-fach #3 (Alex)	12	fruehestens 6 Monate nach der 2. Impfung	
Pneumokokken (PNC) #1 (Alex)	10		
Pneumokokken (PNC) #2 (Alex)	15	2 Monate nach der 1. Impfung	
Pneumokokken (PNC) #3 (Alex)	13	fruehestens 6 Monate nach der 2. Impfung	
MMR #1 (Alex)	11	Bei 1. Impfung im 10. bis 12. Monat: 2. Impfung nach 3 Monaten	
MMR #2 (Alex)	14	2. Impfung nach 3 Monaten	
Meningokokken B #1 (Alex)	3		
Meningokokken B #2 (Alex)	4		
Meningokokken B #3 (Alex)	5		
Meningokokken B #4 (Alex)	13	Auffrischungs- beziehungsweise Nachhol-Impfung	
Meningokokken C #1 (Alex)	13	1 Impfung ab dem 13. Monat	
FSME #1 (Alex)	13		
FSME #2 (Alex)	14		
FSME #3 (Alex)	20		
FSME #5 (Alex)	60	Auffrischungs-Impfung	
Varizellen (VZV) #1 (Alex)	30	Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mind. 12 Wochen	
Varizellen (VZV) #2 (Alex)	32	Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mind. 12 Wochen	
Hepatitis A (HAV) #1 (Alex)	30	Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mind. 12 Wochen	
Hepatitis A (HAV) #2 (Alex)	31	Vor Eintritt in Gemeinschaftseinrichtungen, 2 Impfungen, Abstand mind. 12 Wochen	