


## TEMA 3

1.

```
clc;
clear all;
close all;
pkg load signal;
```


```
figure(1);
t= 0: 0.01: 1;
x=t;
subplot (3,1,1);
plot(t,x,'linewidth',2);
title('x(t)');
grid;
h=(t).^2;
subplot(3,1,2);
plot(t,h,'linewidth',2);
plot(t,h,'linewidth',2);
```



```
title('y(t)');
grid;

t2= 0: 0.01: 2;
y=conv(x,h)*0.01;

subplot(3,1,3);
plot(t2,y,'r','linewidth',2);
title('x(t)*y(t)')
```



Peşu Mihai Alexandru

```
axis(); grid;
```

```
figure(2);
```

```
n=0:10;
```

```
x=n;
```

```
y=n.*n;
```

```
[z, intarziere]=xcorr(x,y);
```

```
subplot(3,1,1);
```

```
stem(n,x);
```

```
axis(); grid;
```

```
title(['x']);
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
stem(n,y);
```

```
axis(); grid;
```

```
title(['y']);
```

```
subplot(3,1,3);
```

```
stem(intarziere,z);
```

```
axis(); grid;
```

```
title(['z=x*y']);
```

## 2.

```
clc;
```

```
clear all;
```

```
close all;
```

```
pkg load signal;
```

Peșu Mihai Alexandru

```
figure(1);

t=0.001: 0.001: 2;

x=t.*(t<=1) + t.*t.*(1<t);


y=(t.^(-3)).*(t>1);

subplot(3,1,1);

plot(t,x,'linewidth',2);

title('x(t)');

grid;
```



```
subplot(3,1,2);

plot(t,y,'linewidth',2);

title('y(t)');

axis([1 2 0 1]);grid;

t2= 0.002: 0.001: 4;


h=conv(x, y)*0.001;

subplot(3,1,3);

plot(t2,h,'r','linewidth',2);

title('x(t)*y(t)');

axis([1 4 0 1.2]);grid;
```



```
figure(2);

n=0.2: 0.2: 2;

x=n.*(n<=1)+(n.*n).*(n>1);

y=((n.^(-3)).*(n>=1));

[z, intarziere]=xcorr(x,y);
```

Peșu Mihai Alexandru

```
subplot(3,1,1);
```

```
stem(n,x);
```

```
axis();grid; title(['x']);
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
stem(n,y);
```

```
axis([1 2 0 1]);grid; title(['y']);
```

```
subplot(3,1,3);
```

```
stem(intarziere,z);
```

```
axis(); grid;
```

```
title(['z=x*y']);
```

3.

```
clc;
```

```
clear all;
```

```
close all;
```

```
pkg load signal;
```

```
figure(1);
```

```
t= 0: 0.0001: 2;
```

```
x=t.*(t>=1);
```

```
y=t.^2;
```


```
subplot (3,1,1);
```

```
plot(t,x,'linewidth',2);
```

```
title('x(t)');
```

```
axis([1 2 1 2]);
```

```
grid;
```



Peșu Mihai Alexandru

```
subplot(3,1,2);  
plot(t,y,'linewidth',2);  
title('y(t)');  
grid;
```

```
t2= 0: 0.0001: 4;  
h=conv(x, y)*0.0001;
```

```
subplot(3,1,3);  
plot(t2,h,'r','linewidth',2);  
title('x(t)*y(t)')  
axis(); grid;
```

```
figure(2);  
n=1: 0.1: 2;  
x=n.*(1<=n).*(n<=2);  
n_h=0: 0.2: 2;  
y=n_h.*n_h;  
[z, intarziere]=xcorr(x,y);
```

```
subplot(3,1,1);  
stem(n,x);  
axis(); grid;  
title(['x']);
```

```
subplot(3,1,2);  
stem(n_h,y);  
axis(); grid;
```

Peșu Mihai Alexandru

```
title(['y']);
```

```
subplot(3,1,3);
```

```
stem(intarziere,z);
```

```
axis(); grid;
```

```
title(['z=x*y']);
```

5.

```
clc;
```

```
clear all;
```

```
close all;
```


```
pkg load signal;
```

```
figure(1);
```

```
t=0: 0.0001: 2;
```

```
x=4.*t.*(t<=1);
```

```
y=(-3.*t+6).*(t>=1);
```



```
subplot (3,1,1);
```

```
plot(t,x,'linewidth',2);
```

```
title('x(t)');
```


```
axis([0 1 0 4]);grid;
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
plot(t,y,'linewidth',2);
```

```
title('y(t)');
```

```
axis([1 2 0 3]);grid;
```



Peșu Mihai Alexandru

```
t2= 0: 0.0001: 4;
```

```
h=conv(x, y)*0.0001;
```

```
subplot(3,1,3);
```

```
plot(t2,h,'r','linewidth',2);
```

```
title('x(t)*y(t)');
```

```
axis();grid;
```

```
figure(2);
```

```
n=0: 0.1: 2;
```

```
x=4.*n.*(n<=1);
```

```
y=(-3.*n+6).*(n>=1);
```

```
[z, intarziere]=xcorr(x,y);
```

```
subplot(3,1,1);
```

```
stem(n,x);
```

```
axis([0 1 0 4]);grid;
```

```
title(['x']);
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
stem(n,y);
```

```
axis([1 2 0 3]);grid;
```

```
title(['y']);
```

```
subplot(3,1,3);
```

```
stem(intarziere,z);
```

```
axis(); grid;
```

```
title(['z=x*y']);
```

**Ex 1.**

```
clc;

clear all;

close all;

tstart = 0;

tstop = 0.1;

tpas = 0.0001;

t = tstart : tpas : tstop;

x = ones(1,1001);

subplot(3, 1, 1);

plot(t, x, 'linewidth', 3);

axis([-0.101 0.201 0 1.2]); grid;

tstop3 = 0.05;

t3 = tstart : tpas : tstop3;

h = ones(1,501);

subplot(3, 1, 2);

plot(t3, h, 'linewidth', 3);


axis([-0.101 0.201 0 1.2]); grid;

t2 = 2*tstart : tpas : tstop+tstop3;

y = conv(h, x)*tpas;

subplot(3, 1, 3);

plot(t2, y, 'r', 'linewidth', 3);
```





Peșu Mihai Alexandru

```
axis([-0.101 0.201 ]); grid;
```

%%reprezentarea grafica a convolutiei semnalelor dreptunghiulare

%%este un trapez intrucat bazele celor doua semnale nu sunt egale

## Ex 2.

```
clc;
```


```
clear all;
```

```
close all;
```

```
tstart = 0;
```

```
tstop = 0.1;
```

```
tpas = 0.0001;
```



f=50 %pentru o variatie exponentiala mai lina trebuie micșorata valoarea lui f

```
t = tstart : tpas : tstop;
```

```
x = 1+10*t; %am modificat semnul coeficientului lui t
```

```
%pt ca semnalul sa fie crescator
```

```
subplot(3, 1, 1);
```

```
plot(t, x, 'linewidth', 3);
```

```
axis([0 0.1001 1 2]); grid;
```

```
h = 1*exp(-f*t);
```

```
subplot(3, 1, 2);
```

```
plot(t, h, 'linewidth', 3);
```

```
axis([0 0.1001 0 1]); grid;
```

```
t2 = 2*tstart : tpas : tstop*2;
```

Peşu Mihai Alexandru

```
y = conv(h, x) *tpas;
```

```
subplot(3, 1, 3);
```

```
plot(t2, y, 'r', 'linewidth', 3);
```

```
axis(); grid;
```