

Intro till matriser

Matriser är väldigt viktiga objekt inom algebra och har tillämpningsområden inom i princip all modern ingenjörsvetenskap. Exempelvis inom ekonomi, medicin, datavetenskap & AI

Vad är en matris?

En matris är ett objekt rektangulärt objekt som har m rader och n kolumner. Varje element i en matris är generellt en reell siffra.

Exempel

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} n=2 \\ m=2 \end{array} \right.$$

Elementen för en matris A på rad nummer i och kolumn nummer j designeras vi med A_{ij} eller $A_{i,j}$

$$A_{11}=2, \quad A_{12}=3, \quad A_{21}=4, \quad A_{22}=5$$

$$A = \left(\begin{array}{cccc} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mn} \end{array} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} n \text{ kolumner} \\ m \text{ rader} \end{array} \right.$$

Observera att m inte nödvändigtvis behöver vara lika med n .

Dvs, antalet rader i en matris behöver generellt inte vara lika med antalet kolumner.

Matriser där $m = n$ kallas för *kvadratiska* matriser

Matrisoperationer

Vi säger att två matriser A & B har samma dimension om de har lika många rader och lika många kolumner.

Exempel

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\dim(A) = 2 \times 3$$

$$\dim(B) = 2 \times 3$$

Vi ser ovan att matriserna A och B har samma dimension (dvs lika många rader och kolumner) som varandra.

k-värde \neq $\dim(A) = \dim(B)$

$$A + B = \begin{pmatrix} (3+1) & (1+0) & (2+1) \\ (5-1) & (4+0) & (3-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Subtraktion av matriser av samma dimension definieras som elementvis subtraktion

$$A - B = \begin{pmatrix} (3-1) & (1-0) & (2-1) \\ (5+1) & (4-0) & (3+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Helt obeskrivne
av $\dim(k)$

Skalär multiplikation av en skalär k och en matris A definieras som elementvis multiplikation

$$kA = k \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot 3 & k \cdot 1 & k \cdot 2 \\ k \cdot 5 & k \cdot 4 & k \cdot 3 \end{pmatrix}$$

$$k = 3 \quad kA = 3 \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 15 & 12 & 9 \end{pmatrix}$$

Några speciella matriser
av dimensionerna 2x2 och 3x3

2x2 matris

$$O_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad O_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Identity matrix

$$I_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrismultiplikation

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \dim(A) = 2 \times 3$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \dim(B) = 3 \times 3$$

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (3 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4) & (3 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 3) & (3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 2) \\ (1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4) & (1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 3) & (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 3 & 11 \\ 8 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 3 & 11 \\ 8 & 3 & 7 \end{pmatrix} = C$$

$$2 \times 3 \quad 3 \times 3 \quad 2 \times 3$$

$$m \times n \quad n \times t \quad m \times t$$

$$n = 3$$

För matrismultiplikation kräver vi att antalet kolumner n i A är samma som antalet rader s i B!

Givet att kravet ovan är uppfyllt kommer AB där $\dim(A) = m \times n$ och $\dim(B) = s \times t$, resultera i en matris C med $\dim(C) = m \times t$.

Rektangeln akt
 $\dim(C) = m \times t$
 $n \neq s$ vi gör uppiför!

$$B\bar{v} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2) \\ (1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 2) \\ (4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$3 \times 2 \quad 2 \times 1$$

$$m \times n \quad n \times t$$

$$3 \times 1$$

$$m \times t$$

$$\bar{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \bar{u} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2 \times 1 \quad 1 \times 2$$

$$m \times n \quad n \times t$$

$$3 \times 1$$

$$m \times t$$