

PROBLEMAS DE QUÍMICA DE 2.º DE BACHARELATO

Exemplo de uso da folla de cálculo: «[QuimicaBachGal.ods](#)»

● Comezo

Ao abrir a folla de cálculo, mostrarase unha alerta de seguridade. Premer sobre o botón **Activar macros**.

Para ir ao índice, elixir unha destas opcións:

- Premer sobre a pestana **Índice** situada na parte inferior.
- Pulsar a tecla [Ctrl] mentres se preme sobre a cela **Índice** situada na parte superior dereita.

Para ver a axuda, unha destas opcións:

- Premer sobre a pestana **Axuda** situada na parte inferior.
- Pulsar a tecla [Ctrl] mentres se preme sobre a cela **Axuda** situada na parte superior dereita.

● Teclado e rato

Teclas

		Abreviatura
Aceptar	[↵] ([Intro] ou [Enter] ou [Entrar])	[↵]
Borrar á dereita	[Supr] (ou [Del] ou [Delete])	[Supr]
Borrar á esquerda	[⌫] [←] ou [Backspace])	[⌫]
Espazador	[Esp]	[Esp]
Frecha abaixo	[↓]	[↓]
Maiúscula	[⇧] ou ([Shift] ou [Mayús])	[⇧]
Tabulador	[⇥] (ou [Tab] ou [tabulador])	[⇥]

Teclas simples

Aceptar	[↵]	[↵]
Cela seguinte	[⇥]	[⇥]

Combinación de teclas

	Premar ao mesmo tempo as teclas:	Abreviatura
Ir ao principio da páxina	[Ctrl] e [Inicio]	
Cela anterior	[⇧] e [⇥]	
Desfacer acción anterior	[Ctrl] e [Z]	([Ctrl]+[Z])
Copiar	[Ctrl] e [C]	([Ctrl]+[C])
Pegar (<i>Desaconsellado</i>)	[Ctrl] e [V]	([Ctrl]+[V])
Pegar sen formato (menú)	[Ctrl], [⇧] e [V]	([Ctrl]+[Alt]+[V])
Pegar sen formato (rápido)	[Ctrl], [Alt], [⇧] e [V]	([Ctrl]+[Alt]+[⇧]+[V])
Punto multiplicación	[⇧] e [3]	([⇧]+[3])
Subíndice	[⇧] e [_, {número ou signo} e {, [⇥] ou [↵]}	([_, +n.º+[↵])
Superíndice	[⇧] e [^, {número ou signo} e {[Esp], [⇥] ou [↵]}	([⇧]+[^+n.º+[↵])
Ver opcións	[Alt] e [↓]	([Alt]+[↓])
Limpar formato	[Ctrl] e [M]	([Ctrl]+[M])

Rato

Seleccionar Premar dúas veces (dobre clic)

Teclado e rato

Seguir ligazón (na folla cálculo)[Ctrl] e premer na ligazón, ou facer dobre clic na ligazón.


● Datos

Para borrar os datos, elixir unha destas opcións:

- **Datos, instrucións e enunciado:**
 1. Premer sobre o menú: Editar → Seleccionar → Seleccionar células desprotexidas
 2. Pulsar a tecla Supr.
- **Tódolos datos:**
 1. Premer sobre calquera cela de datos:
 2. Premer sobre o botón **Borrar datos**

3. No diálogo «Borrar os datos desta folla?», premer sobre o botón **Aceptar**.
- **Só algúns dos datos:**
 1. Seleccionar co rato unha área na que se atopen os datos que se desexan borrar.
 2. Premer sobre o botón **Borrar datos**.
 3. No diálogo «Borrar os datos no intervalo seleccionado?», premer sobre o botón **Aceptar**.

Para elixir unha opción seguir estes pasos:

1. Premer sobre a cela: .
2. Premer sobre a frecha  para ver a lista despregable.
3. Desprazarse pola lista e elixir unha opción.

Para anotar unha cantidade:

Premer sobre unha cela: , e escribir nela a cantidade.

Se o formato no que se mostra un valor non é o axeitado (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao mesmo tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

Para poñer un valor en notación científica, elixir unha destas opcións:

- Escribir o número en formato científico 0,0E-0 da folla de cálculo.
- Escribir o número en formato habitual 0,0·10⁻⁰.
- Seleccionar o valor noutro documento, copialo ([Ctrl]+[C]) e pegalo ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]).

Exemplos de escritura en formato científico:

	Escriba:	Na cela aparecerá:
Folla de cálculo:	3E-9	3,00E-09
Formato habitual:	3,00[↕][3]10[↕]^-[Esp][↕][↕]^9[←]	3,00·10⁻⁹

(Despois do signo – pulsar o espazador [Esp]. Pulsar a tecla [↕] para borrar o espazo).

Se ese número xa estaba nun documento, pódese copiar e pegar seguindo estes pasos:

1. Seleccionar: premer sobre o comezo do número e arrastrar o rato ata o final ou dobre clic
2. Copialo: menú Editar → Copiar ou [Ctrl]+[C]
3. Premer sobre a cela: .
4. Pegalo: menú Editar → Pegado especial → Pegar texto sen formato ou [Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]

● Cifras significativas e formato numérico

No botón **Cifras significativas** pódese axustar o formato numérico dos resultados:

Número (1 a 6) de cifras significativas.

Número limiar (1 a 6) de díxitos para notación decimal.

decimal

Se |Número|<1 e a 1.ª posición decimal é menor ou igual que limiar
ou se |Número|>1 e o núm. de cifras da parte enteira é menor ou igual que limiar.

científica

No resto dos casos.

Símbolo de multiplicar (· ou ×) antes de 10ⁿ na notación científica.

Esta elección afecta a tódalas pestanas.

Os resultados que aparecen neste documento corresponden, na súa maioría, a unha elección de 3 cifras significativas.

● Fórmulas químicas

Cando haxa que escribir unha fórmula química, pode facerse sen subíndices nin superíndices.


Pero pódense escribir fórmulas químicas nas celas de cor branca e bordo verde, indicando os subíndices con «_» e os superíndices con «^». Tense que escribir o símbolo [] ou [^] antes de cada carácter.

Se se ten instalada a fonte Linux Libertine G ou Linux Biolinum G, os superíndices dispóñense sobre os subíndices como en SO₄²⁻. Noutras fontes o aspecto non é tan bo: SO₄²⁻.

Desde a versión 5 de LibreOffice os subíndices e superíndices substitúense mentres se escribe.

Para escribir a fórmula do ión sulfato SO₄²⁻:

1. Escribir: SO_4
2. Pulsar o espazador. (e a fórmula cambia a SO₄).
3. Borrar o espazo.
4. Seguir escribindo: ^2
5. Pulsar o espazador. (e a fórmula cambia a SO₄²).
6. Seguir escribindo: ^-
7. Pulsar a tecla [←] (ou [↵]).



● Como pegar o enunciado na folla de cálculo

Se o enunciado foi copiado da pestana de exemplos da mesma folla, só necesita pegalo, premendo ao tempo nas teclas [Ctrl] e [V]. Para pegar doutra orixe:

1. Premer sobre a cela situada baixo a etiqueta «Problema» da folla de cálculo.
2. Pulsar a tecla [Esp] (espazador).
3. Pegala, pulsando ao mesmo tempo as teclas [Ctrl], [Alt], [⇧] e [V].

No caso que desaparecese o formato da cela onde vai o enunciado, copiar calquera outro enunciado da folla de cálculo e pegalo nela.

● Outros cálculos

En tódalas pestanas aparecen unhas celas baixo o epígrafe: **OUTROS CÁLCULOS**.

Nelas pódense escribir fórmulas para facer cálculos.

Para poñer unha fórmula nunha cela, hai que empezar escribindo «=» e logo poñer símbolos de operacións («+», «-», «*» ou «/») e premer sobre as celas coas que operar.

Por exemplo, para que na cela A3 se faga a suma entre os números que hai nas celas A1 e B1:

1. **Premar sobre a cela** na que quere escribir a fórmula.
2. **Escriba o signo igual [=]** na cela. Isto lle indica a LibreOffice que escribe unha fórmula.
3. Agora pode seguir de calquera destas maneiras:
 - Premar sobre a cela A1. Pulsar a tecla [+]. Premar sobre a cela B1.
 - Ou escriba a fórmula: $=A1+B1$ onde A1 e B1 son as coordenadas das celas que quere sumar.
4. **Pulsar a tecla [↵]** para completar a entrada.

A cela mostrará agora o resultado da fórmula.

Pódense usar unha variedade de funcións matemáticas para as fórmulas, como SUM para sumar ou RAÍZC para calcular a raíz cadrada. Consultar a axuda de LibreOffice para obter unha lista completa das funcións dispoñíbles.

Cando a cela que contén o dato está en formato científico, como $6,67 \cdot 10^{-11}$, tense que empregar a función AVALOR, para que o transforme nun número. Por exemplo, a fórmula para calcular a velocidade na órbita

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}, \text{ se os datos se atopan nas celas do cadro (e tendo en conta que } r \text{ é a suma: } R + h), \text{ sería:}$$

$$= \text{RAÍZC}(\text{AVALOR}(J8) * J2 / (J3 + J6))$$

	H	I	I	K
2	Masa	$M =$	$5,97\text{E}+24$	kg
3	Raio	$R =$	$6,37\text{E}+06$	m
4				
5	Masa	$m =$		kg
6	Altura	$h =$	693 000	m
7				
8	Constante da gravitación	$G =$	$6,67 \cdot 10^{-11}$	$\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$

A cela onde escribiuse a fórmula, por exemplo H22, presentaría o resultado: 7508,53966 609 457. Para obter un aspecto máis lexible podería empregarse a función NUMFORMA. Se noutra cela, por exemplo J22, escribíse a función $=\text{NUMFORMA}(H22)$ o que se vería en J22 sería: $7,51 \cdot 10^3$.

Na pestana «Introd» hai máis información das funcións exclusivas que pode empregar. Para velas, fagcer dobre clic na ligazón [funcións](#) da folla de cálculo.

● Outros consellos

Facer unha copia de seguridade da folla de cálculo.

Non pegar ([Ctrl]+[V]) **nunca** nunha cela de cor laranxa.

En vez diso, pegar sen formato:

menú Editar → Pegado especial → Pegar texto sen formato ou [Ctrl], [Alt] e [V].


Se se acaba de pegar, probar a desfacelo pulsando ao mesmo tempo as teclas [Ctrl] e [Z].

Se iso non vai, recuperar desde a copia de seguridade ou descargala de novo.

Se se cambiou o aspecto dunha cela que era de cor branca e bordo azul , probar a pulsar ao mesmo tempo as teclas [Ctrl] e [M].

Si iso non funciona, premer sobre outra cela que estea ben, e copiala pulsando ao mesmo tempo as teclas [Ctrl] e [C]. Premer sobre a cela que cambiou de aspecto e pulsar ao mesmo tempo as teclas [Ctrl], [Alt] e [V], e, en Preconfiguracións, premer sobre «Formatos só»

● Tipos de problemas

Na páxina  Índice, aparecen as ligazóns ás follas cos tipos de problemas que pode resolver.


Para ir a algún deles, manteña pulsada a tecla [Ctrl] mentres fai clic co rato no Tema que contén o tipo de problemas desexado, ou faga clic co rato na pestana inferior correspondente.



O nome da pestana de cada tipo de problemas está na columna de **Pestana** na páxina  Índice.

Pódense resolver exercicios dos seguintes temas:

Bloque	Tema	Pestana
Cálculos elementais	Fórmula empírica e molecular	Formula
	Disolucións	Disoluc
	Estequiometría: cálculos en reaccións químicas	Esteq
Termoquímica	Lei de Hess	Hess
	Calorimetría	Calorim
Equilibrio químico	Equilibrio en fase gas	Equilibrio
	Equilibrio ácido-base	AcidoBase
	Equilibrio de solubilidadade	Solub
Oxidación redución	Reaccións redox	Redox
	Electrólise	Electrolise

● Exemplos

Na columna da dereita da páxina  Índice, aparecen as ligazóns ás follas que conteñen copias dos datos dos problemas dos tipos que pode resolver. Se se queren consultar, manter pulsada a tecla [Ctrl] mentres se preme sobre a ligazón Tema que contén o tipo de problemas desexado, ou premer sobre a pestana inferior correspondente.

As follas con exemplos comezan todas pola letra D, dende  D_Formula ata  D_Electrol.

♦ Fórmula empírica e molecular

Na pestana «Formula» pódense resolver exercicios da determinación da fórmula empírica e molecular dunha substancia. Débense indicar os elementos que a forman e proporcionarlle os datos para a análise elemental, tales como masa, porcentaxe ou cantidade. Estes datos poden ser dos elementos ou dos compostos que forman na combustión, tipicamente CO_2 e H_2O . Para o cálculo da masa molar, pódense dar datos do gas (volume, densidade absoluta ou relativa), ou propiedades coligativas das disolucións (presión osmótica, descenso crioscópico ou aumento ebulloscópico).

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

En RESULTADOS, móstranse a masa na mostra, a masa e a cantidade nun mol de composto e a relación entre as cantidades de cada un dos elementos, as fórmulas empírica e molecular e os valores da masa molar o deducido da fórmula e o calculado a partir dos datos.

1. Determina:

- A fórmula empírica.
- A fórmula molecular dun composto orgánico que contén carbono, hidróxeno e osíxeno, sabendo que, en estado de vapor, 2 g de composto, recollidos sobre auga a 715 mm de Hg e 40 °C ocupan un volume de 800 mL. Ao queimar completamente 5 g de composto obtéñense 11,9 g de dióxido de carbono e 6,1 g de auga.

Dato: Presión de vapor de auga a 40 °C = 55 mm Hg. $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

(P.A.U. xuño 99)

Rta.: a) e b) $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

[Borrar os datos.](#)

Análise elemental		Composto	Cálculo da masa molar	
Elem.				
			↓ clic	

Para ver o enunciado na mesma folla, selecciónalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premer sobre a cela da folla de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↵]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

En DATOS, elixir a opción «Masa», na cela situada debaixo de «Análise elemental».

Pulsar a tecla [↵] para ir á cela situada debaixo da etiqueta «Elem.». Escribir os símbolos dos elementos C [↓] H [←] O [←]. Na columna seguinte escribir os valores das masas dos compostos. Na terceira columna, [escribir as fórmulas químicas](#) dos compostos obtidos na combustión. Na última cela da columna «Masa», escribir o valor (5) da masa da mostra.

Premer na cela de color laranxa debaixo da etiqueta «↓ clic» e elixir a opción «Volume». Nas celas de cor branca debaixo de «Gas», escribir os valores das magnitudes, e elixir as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Análise elemental		Composto	Cálculo da masa molar	
Elem.	Masa			
C	11,9 g	CO_2	Gas	
H	6,1 g	H_2O		
O				
Mostra	5 g		Volume	800 mL
			Temperatura	40 °C
			Presión	660 mmHg
			Masa	2 g

En RESULTADOS móstranse as fórmulas empírica e molecular, que coinciden neste exercicio, e os valores da masa molar calculados a partir da fórmula e dos datos, neste caso o volume do gas.

Elementos	g	g/mol	mol/mol	relación
C	3,25	48,1	4,00	4,04
H	0,683	10,1	10,0	10,1
O	1,07	15,8	0,989	1,00
Mostra	5,00			
		empírica	molecular	
Fórmula		C ₄ H ₁₀ O	C ₄ H ₁₀ O	
		Masa molar	74,1 g/mol	
		a partir dos datos ^a :	74,0 g/mol	
		^a Volume gas		

2. A nicotina é un líquido completamente miscible en auga a temperaturas inferiores a 60 °C.C. Unha disolución de 1,921 g de nicotina en 48,92 g de auga conxela -0,450 °C. A nicotina contén 74,03 % de C; 8,70 % de H e o resto é N. Cal é a fórmula molecular da nicotina?¹

Rta.: C₁₀H₁₄N₂

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e **pegalo** na cela situada debaixo de «Problema».

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e **elixir** as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

En DATOS, elixir a opción «Porcentaxe», na cela situada debaixo de «Análise elemental».

Na columna coa etiqueta «Elem.», escribir os símbolos dos elementos. Na columna seguinte escribir os valores das porcentaxes dos elementos.

Premar na cela de color laranxa debaixo da etiqueta «↓ clic» e elixir a opción «Δt». Escribir os valores das magnitudes nas celas de cor branca debaixo de «Disolución», e elixir as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Suponse que o valor da constante crioscópica é unha dato. Na folla de cálculo, en REFERENCIAS, móstranse os valores de algúns disolventes habituais.

Análise elemental				
Elem.	Porcentaxe	Composto		Cálculo da masa molar
C	74,03 %			Disolución
H	8,7 %		Δt	0,45 °C
N			Constante	1,86 K·kg/mol
			m disolvente	48,92 g
			m soluto	1,92 g

En RESULTADOS, móstranse a masa e a cantidade nun mol de composto e a relación entre as cantidades dos elementos, as fórmulas empírica e molecular, e os valores da masa molar calculados a partir da fórmula e a partir dos datos, neste caso o descenso da temperatura de conxelación.

Elementos	%	g/mol	mol/mol	relación
C	74,0	120	10,0	5,00
H	8,70	14,1	14,0	7,00
N	17,3	28,0	2,00	1,00
Mostra	100			
		empírica	molecular	
Fórmula		C ₅ H ₇ N	C ₁₀ H ₁₄ N ₂	
		Masa molar	162 g/mol	
		a partir dos datos ^a :	162 g/mol	
		^a Δt disolución		

♦ Disolucións

Na pestana «Disoluc» pódense resolver exercicios para o cálculo de:

- A masa de soluto necesaria para preparar unha disolución dunha concentración dada.
- O volume necesario dunha disolución concentrada para prepara unha disolución máis diluída.
- A concentración dunha disolución a partir da masa, volume e densidade.

Débese [escribir a fórmula química](#) do soluto, pero non é necesario para o disolvente no caso da auga.

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

En RESULTADOS móstranse as masas de soluto, disolvente e disolución e as concentracións (porcentaxe, concentración en masa (g/dm^3), concentración (mol/dm^3), molalidade (mol/kg) e fracción molar) das disolucións orixinal, e diluída se é o caso. Cando se teñen os datos axeitados, determina o volume necesario de disolución concentrada para preparar un volume determinado da disolución diluída.

1. Indique o material, procedemento detallado e cálculos correspondentes necesarios para preparar no laboratorio 250 cm^3 dunha disolución de cloruro de sodio de concentración $0,50 \text{ mol}/\text{dm}^3$ a partir do produto sólido puro.

(P.A.U. xuño 09)

Rta.: $m = 7,3 \text{ g NaCl}$

[Borrar os datos.](#)

			Volume	Concentración	Densidade
Soluto (s)					
Fórmula?					
Disolvente (d)					
H ₂ O					
		Disolución			
		orixinal (D ₁)			
		diluída (D ₂)			

Para ver o enunciado na mesma folia, selecciónalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premer sobre a cela da folia de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

Escribir a fórmula do cloruro de sodio na cela de cor branca e bordo verde debaixo de «Soluto (s)».

Para a disolución orixinal, escribir na cela de cor branca o valor do volume (250) e [elixir](#) a unide (cm^3) na cela de cor laranxa debaixo de «Volume». Escribir na cela de cor branca debaixo de «Concentración» o valor da mesma (0,5) e a etiqueta cambiará a « mol/dm^3 ». Se non se elixen as unidades de concentración, a folia supón que son mol/dm^3 . Pero pódense elixir se se desexa.

			Volume	mol/dm^3	Densidade
Soluto (s)			cm^3		
NaCl			250	0,5	
		Disolución			
		orixinal (D ₁)			

En RESULTADOS mostrarase o valor da masa.

	Masa	Porcentaxe	Conc. masa	Concentración	Molalidade	Fracc. molar
	g	g/100 g (D)	$\text{g}/\text{dm}^3(\text{D})$	$\text{mol}/\text{dm}^3(\text{D})$	$\text{mol}/\text{kg}(\text{d})$	$\text{mol}/\text{mol}(\text{D})$
D ₁ s: NaCl	7,31		29,2	0,500		

2. Nunha botella de ácido clorhídrico concentrado figuran os seguintes datos: 36% en masa de HCl e densidade $1,18 \text{ g}/\text{mL}$. Calcula:

- a) A concentración e o volume deste ácido concentrado que se necesita para preparar un litro da disolución de concentración $2 \text{ mol}/\text{dm}^3$.

(P.A.U. xuño 16)

Rta.: a) $[\text{HCl}] = 12 \text{ mol}/\text{dm}^3$; $V = 0,17 \text{ dm}^3$.

[Borrar os datos.](#) Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir a fórmula do ácido clorhídrico na cela de cor branca e bordo verde debaixo de «Soluto (s)».

Para a disolución orixinal, [elixir](#) a opción «% masa soluto» debaixo de «Concentración», e escribir na cela de abaixo o seu valor (36).

Debaixo de «Densidade» elixir a opción « g/mL », e escribir na cela de abaixo o seu valor (1,18).

Para a disolución diluída, elixir a unidade (mol/dm^3) debaixo de «Concentración», e escribir na cela de abaixo o seu valor (2). Nas celas da esquerda elixir a unidade (L) e escribir debaixo o seu valor (1).

Solutos (s)	Disolución	Volume	Concentración	Densidade
		L	% masa soluto	g/mL
HCl	orixinal (D ₁)		36	1,18
Disolvente (d)		L	mol/dm ³	
H ₂ O	diluída (D ₂)	1	2	

En RESULTADOS móstranse: a concentración (11,7), debaixo de «Concentración mol/dm³(D)», e o volume que se necesita (172 cm³), debaixo de «D₁ necesario para preparar D₂»

	Masa g	Porcentaxe g/100 g (D)	Conc. masa g/dm ³ (D)	Concentración mol/dm ³ (D)	Molalidade mol/kg(d)	Fracc. molar mol/mol(D)
D ₁ s: HCl		36,0 %	425	11,7	15,4	0,217
d: H ₂ O						0,783
D ₂ s: HCl	72,9		72,9	2,00		
d: H ₂ O						
Disolución (D ₂)						
			Disolución (D ₂)	D ₁ necesario para preparar D ₂		
Volume			1,00·10 ³ cm ³		172 cm ³	

3. Tense un litro dunha disolución de ácido sulfúrico do 98 % de riqueza e densidade 1,84 g/cm³. Calcula:
- A concentración molar.
 - A molalidade.
 - O volume desa disolución de ácido sulfúrico necesario para preparar 100 cm³ doutra disolución do 20 % e densidade 1,14 g/cm³.

(P.A.U. xuño 01)

Rta.: a) [H₂SO₄] = 18,4 mol/dm³; b) $m = 5 \cdot 10^2$ mol/kg d; c) $V = 12,6$ cm³

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir a fórmula do ácido sulfúrico na cela de cor branca e bordo verde situada debaixo de «Solutos (s)».

[Elixir](#) as unidades (L, «% masa s» e g/cm³) nas celas de cor laranxa situada á dereita de «Disolución» e escribir os valores (1, 98 e 1,84) das magnitudes nas celas debaixo delas. Non é necesario elixir as unidades da disolución diluída se son as mesmas que as da orixinal. Elixir a unidade (cm³) de volume da disolución diluída e escribir os valores (100, 20 e 1,14) das magnitudes nas celas correspondentes.

Solutos (s)	Disolución	Volume	Concentración	Densidade
		L	% masa soluto	g/cm ³
H ₂ SO ₄	orixinal (D ₁)	1	98	1,84
Disolvente (d)		cm ³		
H ₂ O	diluída (D ₂)	100	20	1,14

A concentración (18,4) móstrase debaixo de «Concentración mol/dm³(D)» en RESULTADOS, e a molalidade (500) a súa dereita, e o volume que se necesita (12,6 cm³) debaixo de «D₁ necesario para preparar D₂»

	Masa g	Porcentaxe g/100 g (D)	Conc. masa g/dm ³ (D)	Concentración mol/dm ³ (D)	Molalidade mol/kg(d)	Fracc. molar
D ₁ s: H ₂ SO ₄	1,80·10 ³	98,0 %	1,80·10 ³	18,4	500	0,900
d: H ₂ O	36,8					0,1000
Disolución (D ₁)	1,84·10 ³					
D ₂ s: H ₂ SO ₄	22,8	20,0 %	228	2,32	2,55	0,0439
d: H ₂ O	91,2					0,956
Disolución (D ₂)	114					
			Disolución (D ₂)	D ₁ necesario para preparar D ₂		
Volume	1,00·10 ³ cm ³		100 cm ³		12,6 cm ³	

4. Mestúranse 6,27 gramos de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ con 85 gramos de auga. Determine a concentración da disolución resultante en:
- % en masa de FeSO_4 anhidro.
 - Fracción molar do FeSO_4 anhidro e fracción molar da auga.

(P.A.U. Set. 05)

Rta.: a) $\%(\text{FeSO}_4) = 3,75\%$; b) $x(\text{FeSO}_4) = 0,0046$; $x(\text{H}_2\text{O}) = 0,995$

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e **pegalo** na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir a fórmula do hidrato na cela de cor branca e bordo verde situada debaixo de «Solute (s)». **Elixir** a unidade (g) na cela de cor laranxa situada á dereita de «Solute (s)» e escribir os valores (6,27 e 85) das masas nas celas debaixo dela. Non é necesario elixir a unidade do disolvente se é a mesma que a do soluto.

Masa		Disolución	Volume	Concentración	Densidade
Solute (s)	g				
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	6,27	orixinal (D_1)			
Disolvente (d)		diluída (D_2)			
H_2O	85				

En RESULTADOS móstranse: o tanto por cento en masa (3,75 %), debaixo de «Porcentaxe», e as fraccións molares (0,00460 e 0,995), debaixo de «Fracc. molar».

		Masa	Porcentaxe	Conc. masa	Concentración	Molalidade	Fracc. molar
		g	g/100 g (D)	g/dm ³ (D)	mol/dm ³ (D)	mol/kg(d)	mol/mol(D)
D_1	s: FeSO_4	3,43	3,75 %			0,265	0,00460
	d: H_2O	87,8					0,995

5. Disólvense 22,5 g de hidróxido de sodio en 50,0 cm³ de auga destilada a 4 °C.C. A densidade da disolución é de 1 340 kg/m³. Calcula a composición da solución en:
- g/dm³ (concentración en masa).
 - Tanto por cento en masa.
 - mol/dm³ (concentración).
 - Molalidade.

Rta.: a) 416 g/L; b) 31,0 %; c) 10,4 mol/L; d) 11,2 mol/kg

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e **pegalo** na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir a fórmula do hidróxido de sodio na cela de cor branca e bordo verde situada debaixo de «Solute (s)». **Elixir** a unidade (g) na cela de cor laranxa situada á dereita de «Solute (s)» e escribir o valor (22,5) da masa na cela debaixo dela. Debaixo, elixir a unidade (cm³) e escribir debaixo o seu valor (50). Á súa dereita elixir a unidade (g/cm³) de densidade e escribir debaixo o seu valor (1). Aínda que o dato é a temperatura, dáse por suposto que é para empregar o valor da densidade máxima da auga a 4 °C.

Á dereita da «Disolución orixinal (D_1)» escribir o valor da densidade (1340) e elixir a súa unidade (kg/m³) na cela de color laranxa encima dela.

Masa		Densidade	Disolución	Volume	Concentración	Densidade
Solute (s)	g					kg/m ³
NaOH	22,5		orixinal (D_1)			1340
Disolvente (d)	cm ³	g/cm ³	diluída (D_2)			
H_2O	50	1				
Volume						

En RESULTADOS móstranse as respostas ás cuestións.

		Masa	Porcentaxe	Conc. masa	Concentración	Molalidade	Fracc. molar
		g	g/100 g (D)	g/dm ³ (D)	mol/dm ³ (D)	mol/kg(d)	mol/mol(D)
D_1	s: NaOH	22,5	31,0 %	416	10,4	11,3	0,169
	d: H_2O	50,0					0,831

♦ Estequiometría: cálculos en reacciones químicas

Na pestana «Esteq» pódense resolver exercicios de reaccións químicas para calcular:

- Cantidade, masa, volume de gas ou disolución, concentración ou pH de reactivos ou produtos.
- Riqueza dun reactivo.
- Rendemento da reacción.
- Intensidade de corrente, tempo, masa depositada ou volume de gas desprendido en electrólises.

Tamén no caso de reactivo limitante.


As reaccións deben escribirse axustadas. Non é necesario escribir os coeficientes cando son 1.

Mentres a reacción non estea completa nin axustada ou, no caso de que algún dos compostos non estean ben formulados, verase unha mensaxe «**Incorrecta!**» á dereita da reacción, e outra mensaxe «**A reacción non está axustada**» na zona de RESULTADOS. Os resultados numéricos non serán correctos ata que a reacción non estea escrita correctamente e ben axustada.

Escribir a ecuación da reacción química axustada debaixo de «Reactivos» deixando as celas máis estreitas para os coeficientes, e [escribindo as fórmulas](#) dos produtos debaixo de «Produtos».

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

1. Para determinar a concentración dunha disolución de FeSO_4 realízase unha valoración redox na que $18,0 \text{ cm}^3$ de disolución de KMnO_4 de concentración $0,020 \text{ mol/dm}^3$ reaccionan con $20,0 \text{ cm}^3$ da disolución de FeSO_4 . A reacción que ten lugar é:



- a) Calcula a concentración da disolución de FeSO_4 .
- b) Nomea o material necesario e describe o procedemento experimental para realizar a valoración.

(A.B.A.U. extr. 18)

Rta.: $[\text{FeSO}_4] = 0,090 \text{ mol/dm}^3$.

[Borrar os datos.](#)

Reactivos				Produtos			
Calcular:	a)						
	b)						
	c)						
que se precisa	para reaccionar con						

Para ver o enunciado na mesma folia, seleccionalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premer sobre a cela da folia de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

Escribir os ións e os coeficientes nas celas de cor branca debaixo de «Reactivos» ou «Produtos».

Na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular: a)», [elixir](#) a opción «concentración», pulsar a tecla $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix} \right]$ e elixir «disolución», volver a pulsar a tecla $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix} \right]$ e elixir « Fe^{2+} ». Na cela á dereita de «V=» escribir o valor do volume (20), pulsar a tecla $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix} \right]$, e elixir a unidade « cm^3 ».

Escribir o valor do volume (18) da disolución de KMnO_4 na cela de cor branca situada debaixo de «que se precisa», pulsar o tabulador e elixir a unidade (cm^3), pulsar outra vez e elixir «disolución», volver a pulsar a tecla $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix} \right]$ e elixir « Fe^{2+} ». Pulsar outra vez para chegar á cela situada á dereita de « $[\text{MnO}_4^-] =$ », e escribir nela o valor da súa concentración (0,02). Pulsar a tecla $\left[\begin{smallmatrix} \leftarrow \\ \rightarrow \end{smallmatrix} \right]$ e elixir a unidade « mol/dm^3 ».

Reactivos						Productos							
5	Fe2+		MnO4-	8	H+	5	Fe3+		Mn2+	4	H2O		

Calcular:	a)	concentración	disolución	Fe ²⁺	V =	20	cm ³			
	b)									
	c)									
que se precisa		para reaccionar con								
	18	cm ³	disolución	MnO ₄ ⁻	[MnO ₄ ⁻] =	0,02	mol/dm ³			

En RESULTADOS móstrase o valor da concentración do ión ferro(II), (é a mesma que a de FeSO₄):

a) $[Fe^{2+}] = 0,0900 \text{ mol/dm}^3 \text{ (D)}$

Se se preme sobre a cela de cor laranxa situada encima, e elíxese a opción «10ⁿ», o resultado exprésase nas unidades nas que o número estea comprendido entre 1 e 999,99:

a) $[Fe^{2+}] = 90,0 \text{ mmol/dm}^3 \text{ (D)}$

2. Calcula:

- O pH dunha disolución de hidróxido de sodio de concentración 0,010 mol/dm³.
- O pH dunha disolución de ácido clorhídrico de concentración 0,020 mol/dm³.
- O pH da disolución obtida ao mesturar 100 mL da disolución de hidróxido de sodio de concentración 0,010 mol/dm³ con 25 mL da disolución de ácido clorhídrico de concentración 0,020 mol/dm³.

(A.B.A.U. ord. 18)

Rta.: a) pH = 12; b) pH = 1,7; c) pH = 11,6

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e pegalo na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir as fórmulas das substancias nas celas máis anchas de bordo verde e os coeficientes nas celas máis estreitas de bordo azul debaixo de «Reactivos» ou «Productos».

Elixir a opción pH nos tres apartados, a opción «disolución» nos apartados a) e b) pero «mestura» no c) e as fórmulas dos reactivos nos apartados a) e b), pero deixe en branco a substancia do apartado c).

Na cela de cor branca debaixo de «que se precisa», escribir os volumes (100 e 25) de ambos reactivos, elixir as súas unidades (cm³), elixir a opción «disolución» en ambas e elixir as fórmulas dos reactivos. Escribir as concentracións das disolucións (0,001 e 0,002) nas celas correspondentes e elixir as unidades (mol/dm³).

Reactivos				Productos			
	HCl		NaOH		NaCl		H ₂ O
Calcular:	a)	pH	disolución	NaOH			
	b)	pH	disolución	HCl			
	c)	pH	mestura				
que se precisa		para reaccionar con					
	100	cm ³	disolución	NaOH	[NaOH] =	0,01	mol/dm ³
	25	cm ³	disolución	HCl	[HCl] =	0,02	mol/dm ³

En RESULTADOS móstranse as cantidades que reaccionan e os pH de cada caso.

	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
mol	5,00·10 ⁻⁴		5,00·10 ⁻⁴		5,00·10 ⁻⁴		5,00·10 ⁻⁴
			a)	pH(NaOH) =	12,0 (D)		
			b)	pH(HCl) =	1,70 (D)		
			c)	pH(mestura) =	11,6		

3. Unha mostra comercial e impura de 0,712 g de carburo de calcio (CaC_2) reacciona con exceso de auga producindo etino e hidróxido de calcio. Se o volume de etino (C_2H_2) recollido a 25 °C e 0,98 atm (99,3 kPa) foi de 0,25 L:
- Determina a masa en gramos de hidróxido de calcio formado.
 - Calcula a porcentaxe de pureza da mostra comercial.
- Dato: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{dm}^3\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ (P.A.U. Set. 12)
- Rta.:** a) $m = 0,74 \text{ g Ca(OH)}_2$; b) $r = 90 \%$

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas máis anchas de bordo verde e os coeficientes nas celas máis estreitas de bordo azul debaixo de «Reactivos» ou «Produtos».

Para o apartado a), [elixir](#) a opción «masa» na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular a)» e « Ca(OH)_2 » para a substancia.

Escribir o dato (0,25) na cela de cor branca situada debaixo de «que se obtén». Pulsar o tabulador [↹], elixir a opción « dm^3 » (ou escribir dm^3), pulsar [↹], e escribir (ou elixir) «gas», pulsar [↹], e elixir « C_2H_2 », pulsar [↹] e escribir valor da presión (99,3), pulsar [↹], escribir (ou elixir) kPa, pulsar [↹], e escribir 25, pulsar [↹], e escribir (ou elixir) °C [↹].

Para a apartado b), elixir a opción «riqueza» na cela de cor laranxa situada á dereita de «b)», pulsar a tecla [↹] (tabulador), e elixir a opción «mestura», pulsar [↹] e elixir a substancia (CaC_2), pulsar [↹] e escribir 0,712, pulsar [↹] e escribir (ou elixir) a unidade (g).

Reactivos				Produtos			
CaC ₂	2	H ₂ O		C ₂ H ₂	Ca(OH) ₂		
Calcular: a) masa				Ca(OH) ₂			
b) riqueza				CaC ₂			
c)							
que se obtén							
0,25		dm ³	gas	C ₂ H ₂	p = 99,3 kPa	T = 25 °C	

En RESULTADOS móstranse as cantidades que reaccionan, a masa de hidróxido de calcio e a riqueza.

CaC ₂	+	2 H ₂ O	→	C ₂ H ₂	+	Ca(OH) ₂
mol 0,0100		0,0200		0,0100		0,0100
a)				m =	0,742 g Ca(OH) ₂	
b)				r =	90,2 % CaC ₂	

Se se preme sobre a cela de cor laranxa, e se elixe a opción «10^a», a masa exprésase en mg.

				10 ^a		
a)				m =	742 mg Ca(OH) ₂	

4. Fanse reaccionar 5 mol de aluminio metal con cloruro de hidróxeno en exceso para dar tricloruro de aluminio e hidróxeno(g).
- Que volume de hidróxeno medido en condicións normais obtérase?
 - Se todo o hidróxeno faise pasar sobre unha cantidade en exceso de monóxido de cobre, producíndose cobre metal e auga, que cantidade de cobre metal obtense se o rendemento da reacción é do 60 %?

(P.A.U. Set. 97)

Rta.: a) $V = 168 \text{ dm}^3$ de H_2 c.n. b) $n = 4,5 \text{ mol Cu}$

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas máis anchas de bordo verde e os coeficientes nas celas máis estreitas de bordo azul debaixo de «Reactivos» ou «Produtos».

Para o apartado a), [elixir](#) a opción «volume» na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular a)», pulsar a tecla [↵] (tabulador), escribir (ou elixir) «gas», pulsar [↵] e elixir H₂, pulsar [↵] e escribir 1, pulsar [↵] e escribir (ou elixir) atm, pulsar [↵] e escribir 0, pulsar [↵] e escribir (ou elixir) °C[↵]. Escribir o dato (5) na cela de cor branca situada debaixo de «que se obtén». Pulsar o tabulador [↵], e elixir (ou escribir) mol, pulsar [↵] dúas veces, e escribir (ou elixir) Al[↵].

Reactivos				Produtos			
2	Al	6	HCl	2	AlCl ₃	3	H ₂

Calcular: a) volume gas H₂ p = 1 atm T = 0 °C

b)

c)

que se obtén 5 mol Al

con

Anotar o resultado (168):

a) $V = 168 \text{ dm}^3 \text{ (g) H}_2$

b) Para o apartado b), premer sobre o botón **Borrar datos** e clic en **Aceptar**.

Escribir a reacción axustada.

Premer sobre a cela de cor laranxa situada á dereita de a), elixir a opción «cantidade», pulsar a tecla [↵] (tabulador) dúas veces, escribir Cu, e pulsar a tecla [↵].

Premer sobre a cela de cor branca situada debaixo de «que se obtén», escribir 168, pulsar a tecla [↵] e escribir (ou elixir) «gas», pulsar [↵] e escribir H₂ (ou elixir H₂). Pulsar [↵] e escribir 1, pulsar de novo [↵] e escribir (ou elixir) atm. Volver a pulsar [↵] e escribir 0, pulsar de novo pulsar [↵] e escribir °C.

Premer sobre a cela de cor branca situada á dereita de «Rendemento» e escribir 60.

	H ₂		CuO		Cu		H ₂ O				
--	----------------	--	-----	--	----	--	------------------	--	--	--	--

Calcular: a) cantidade Cu

b)

c)

que se obtén 168 dm³ gas H₂ p = 1 atm T = 0 °C

con

Rendemento 60 %

RESULTADOS:

Rendemento 60 % a) $n = 4,50 \text{ mol Cu}$

5. Disólvense 3,0 g de SrCl₂ en 25 cm³ de auga e 4,0 g de Li₂CO₃ noutros 25 cm³ de auga. A continuación, mestúranse as dúas disolucións, levándose a cabo a formación dun precipitado do que se obteñen 1,55 g.


- Escribe a reacción que ten lugar, identificando o precipitado, e calcula o rendemento da mesma.
- Describe o procedemento que empregaría no laboratorio para separar o precipitado obtido, debuxando a montaxe e o material que precisa empregar.

(A.B.A.U. ord. 22)

Rta.: Rendemento do 56 %.

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e **pegalo** na cela situada debaixo de «Problema».

Escrever as fórmulas das substâncias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Produtos», e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de cor branca e bordo azul

Para o apartado a), [elixir](#) a opción «rendemento» na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular a»), pulsar a tecla [↵] (tabulador) dúas veces e premer na frecha  para elixir «SrCO₃», que é a fórmula do precipitado que se forma. Pulsar [↵] e escribir 1,55, pulsar [↵] e escribir (ou elixir) g.

Premer sobre a cela de cor branca situada debaixo de «que se obtén» e escribir o valor da masa (3) dun dos reactivos, pulsar $[\rightarrow]$ e escribir (ou elixir) a unidade (g), pulsar $[\rightarrow]$ outras dúas veces e elixir a fórmula do composto (SrCl_2). Seguir o mesmo proceso para o outro reactivo na fila seguinte.

Complete el siguiente diagrama de flujo para el cálculo reactivo en la siguiente reacción:

	SrCl ₂		Li ₂ CO ₃		2 LiCl		SrCO ₃			
--	-------------------	--	---------------------------------	--	--------	--	-------------------	--	--	--

Calcular:

a) rendemento		SrCO ₃					
b)							
c)							

que se obtén ao reaccionar

	3		SrCl ₂				
con	4		Li ₂ CO ₃				

m = 1,55 g

En RESULTADOS móstrase o valor do rendemento e tamén da masa teórica.

	SrCl_2	+	Li_2CO_3	\rightarrow	2LiCl	+	SrCO_3	
mol	0,0189		0,0189		0,0378		0,0189	
				a)	$Rto. =$		55,5 %	$m (m\acute{a}x.) = 2,79 \text{ g}$

6. Realízase a electrólise dunha disolución de cloruro de ferro(III) facendo pasar unha corrente de 10 amperios durante 3 horas. Calcula:
- Os gramos de ferro depositados no cátodo.
 - O tempo que tería que pasar a corrente para que no ánodo se desprendan 20,5 L de Cl_2 gas medidos a 25 °C de temperatura e 1 atm de presión.

(A.B.A.U. ord. 18)

Rta.: a) $m = 20,8 \text{ g Fe}$; b) $t = 4,5 \text{ h}$.

Este problema pódese resolver tamén na pestana «Electrolise».

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e **pegalo** na cela situada debaixo de «Problema».

Escrever as fórmulas das substâncias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Produtos», e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de cor branca e bordo azul

Non se poden poñer varias incógnitas eo mesmo exercicio porque os datos cambian.

Para a apartado a), [elixir](#) a opción «masa» na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular a)» e «Fe» para a substancia. Escribir (10) na cela de cor branca situada debaixo de «que se obtén», pulsar a tecla [↵] (tabulador) e escribir (ou [elixir](#)) a unidade (A). Premer sobre a cela de cor branca situada á dereita de «durante» e escribir (3), pulsar [↵] e escribir (ou [elixir](#)) a unidade (h).

Reactivos					Productos																															
2	FeCl ₃				3	Cl ₂	2	Fe																												
<p>Calcular:</p> <table border="1"> <tr> <td>a)</td> <td>masa</td> <td></td> <td>Fe</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>que se obtén ao pasar</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>durante</td> <td>3 h</td> <td></td> </tr> </table>												a)	masa		Fe			b)						c)						10	A			durante	3 h	
a)	masa		Fe																																	
b)																																				
c)																																				
10	A			durante	3 h																															

En RESULTADOS móstranse as cantidades que reaccionan e a masa.

♦ Lei de Hess

Na pestana «Hess» pódense resolver exercicios de termoquímica. Pódese calcular:

- A entalpía dunha reacción química, habitualmente de substancias orgánicas, a partir dos datos de formación ou de combustión.
- A calor a presión constante e a volume constante para unha cantidade, masa ou volume, dunha das substancias que se mostran na reacción.
- Cantidades, masas ou volumes de gases que reaccionan ou se producen.

Escribir as fórmulas das substancias nas celas máis anchas de cor branca e bordo verde, empezando pola esquerda **sen deixar ocos nas celas anchas**. Escribir os coeficientes para axustar a reacción nas celas máis estreitas de cor branca e bordo azul. Elixir a frecha «→», para separar reactivos de produtos, nunha das celas de cor laranxa situadas encima.

Elixir, na cela de cor laranxa situada máis abaixo, se as entalpías dos datos son de formación ou de combustión (opción predeterminada).

Elixir o estado (s, l, g) das sustancias nas celas de cor laranxa situadas á dereita de cada fórmula química.

Aparecerán, nas celas das entalpías, valores atopados nunha táboa interna (copiados de [CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th Edition, 2016](#)) e identificados cunha ^a na cela da dereita. Escribir o dato se algún se algún valor proposto non se corresponde con el. Se unha cela queda baleira o valor será 0.

Se se quere calcular a calor que corresponde a unha cantidade de sustancia, elixir a sustancia na cela de cor laranxa situada debaixo de «Substancia», elixir a unidade na cela de cor laranxa situada á súa esquerda e escribir o valor da magnitude na cela de cor branca e bordo azul situada á súa esquerda.

Se hai cálculos de volume de gases, escribir os valores da presión e a temperatura nas celas de cor branca situadas á dereita das etiquetas « $p =$ » e « $T =$ » e elixir as unidades nas celas de cor laranxa situadas á súa dereita. Os valores predeterminados son as condicións normais.

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

Se hai cálculos estequiométricos, elixir, en RESULTADOS, a unidade a magnitude incógnita na cela de cor laranxa da dereita e mostraranse os valores debaixo das fórmulas químicas das sustancias. O volume dunha sustancia só aparecerá se etiquetouse como gas. Comprobe que os datos da presión e a temperatura son os correctos.

Tamén pode elixir as unidades de enerxía, se son distintas ás dos datos, e pedir que se mostre o valor da variación de enerxía interna (ΔU).

1. A partir das entalpías de combustión e aplicando a Ley de Hess, calcula:

a) A entalpía da seguinte reacción: $3 \text{C}(\text{grafito})(s) + 4 \text{H}_2(g) \rightarrow \text{C}_3\text{H}_8(g)$.

b) A enerxía liberada cando se queima 1 L de propano medido en condicións normais.

Calores de combustión: $\Delta H_c^\circ \text{C}(\text{grafito})(s) = -393,5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta H_c^\circ \text{C}_3\text{H}_8(g) = -2219,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;

$\Delta H_c^\circ \text{H}_2(g) = -285,8 \text{ kJ/mol}$

(P.A.U. Set. 16)

Rta.: a) $\Delta H = -104 \text{ kJ}$; $Q = -99,1 \text{ kJ}$.

Borrar os datos.

Sitúe a frecha		reactivos		→	produtos	

Escribir a ecuación química

Entalpías de		combustión		kJ/mol
			+	
ΔH_c°				

Calcular a entalpía de

reacción		
----------	--	--

Substancia

--	--	--

$p =$

1	atm
---	-----

$T =$

0	°C
---	----

↑ Elixir

Para ver o enunciado na mesma folla, selecciónalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premar sobre a cela da folla de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas máis anchas de cor branca e bordo verde, empezando pola esquerda e **sen deixar ocos nas celas anchas**. Escribir os coeficientes para axustar a reacción nas celas máis estreitas de cor branca e bordo azul. [Elixir](#) a frecha «→», para separar reactivos de produtos, na cela de cor laranxa situadas encima da cela do coeficiente do C₃H₈.

Comprobar, na cela de cor laranxa máis abaixo, que as entalpías son as de combustión.

Elixir o estado (s, l, g) das substancias nas celas de cor laranxa situadas debaixo.

Para o apartado b), elixir a fórmula química (C₃H₈) da substancia na última fila, elixir a unidade (dm³) na cela de cor laranxa situada á súa esquerda, e escribir o valor do volume (1) debaixo da etiqueta «Volume».

			→		
3 C		4 H ₂		C ₃ H ₈	
Entalpías de		combustión	kJ/mol		
ΔH _c	3 C (s)	+ 4 H ₂ (g)	→	C ₃ H ₈ (g)	
	-393,5	-285,8		-2219,9	
Calcular a entalpía de		reacción			kJ
Volume	Substancia		p =	1 atm	
1 dm ³	C ₃ H ₈		T =	0 °C	

En RESULTADOS móstranse: a entalpía da reacción cando se forma 1 mol de propano, a calor cando se forma 1 dm³ (porque ese é o dato) e a enerxía liberada cando se queima 1 L de propano. Se se elixe «dm³», na cela de cor laranxa da dereita, veranse os volumes de hidróxeno e de propano. (O de carbono non, porque non é un gas).

	3 C(s)	+	4 H ₂ (g)	→	C ₃ H ₈ (g)	
Vol.			4,000		1,000	dm ³
Entalpía	Calor de reacción		de combustión			
kJ/mol C ₃ H ₈			kJ/dm ³ C ₃ H ₈			kJ/dm ³ C ₃ H ₈
ΔH _r = -104,6	q _r =		-4,668	q _c =		-99,01 A presión constante

Pódese pedir que se mostren os RESULTADOS para o proceso a volume constante elixindo a opción «ΔU =>» debaixo de «ΔH =>». Pódense cambiar tamén as unidades a calorías ou kcal.

2. Considere que a gasolina está composta por octano (C₈H₁₈) e que no bioetanol o composto principal é o etanol (CH₃CH₂OH).

- Escribir a ecuación da reacción de combustión do etanol e calcule a entalpía estándar de formación do etanol a 25 °C.
- Cantos litros de bioetanol necesítanse para producir a mesma enerxía que produce 1 L de gasolina?

Datos: (ΔH en kJ/mol) ΔH_f°(CO₂(g)) = -393,5; ΔH_f°(H₂O(l)) = -285,8; ΔH_c°(C₈H₁₈(l)) = -5445,3; ΔH_c°(CH₃CH₂OH(l)) = -1369,0; densidade a 298 K do etanol ρ_e = 0,79 g/mL e do octano ρ_o = 0,70 g/mL. (P.A.U. Set. 14)

Rta.: a) ΔH_f° = -275,4 kJ/mol; b) V = 1,43 dm³ bioetanol.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos». e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de de cor branca e bordo azul

[Elixir](#) a frecha «→» na cela de cor laranxa situadas encima da cela do coeficiente do CO₂.

Cambiar, na cela de cor laranxa máis abaixo, a opción «combustión» por «formación».

[Elixir](#) o estado (s, l, g) das substancias nas celas de cor laranxa situadas debaixo.

Na cela situada á dereita de «Calcular a entalpía de» elixir a opción «formación», e, na da súa dereita, elixir a fórmula do etanol. Desaparecerá a súa entalpía de formación. Escribir o valor da entalpía de combustión (-1369) na cela de cor branca situada debaixo de «ΔH reacción».

			→		
	C ₂ H ₅ OH	3 O ₂	3 H ₂ O	2 CO ₂	
	Entalpías de formación				
	C ₂ H ₅ OH (l)	+ 3 O ₂ (g)	→ 3 H ₂ O (l)	+ 2 CO ₂ (g)	
ΔH _f			-285,8 ^a	-393,5 ^a	
				ΔH reacción	
	Calcular a entalpía de formación	de C ₂ H ₅ OH			-1369 kJ

En RESULTADOS móstrase a entalpía de formación do etanol.

Entalpía	Calor de formación
kJ /mol C ₂ H ₅ OH	
ΔH _f = -275,5	

Para o apartado b), ten que escribir as fórmulas seguintes nas celas de OUTROS CÁLCULOS.

Etiqu.:	Moles gasolina	Calor gasolina	Moles bioetanol	V(cm ³) bioetanol
Fórm.:	=1000*0,7/MASA-MOL("C8H18")	=G26*5445,3	=I26/1369	=K26*MASA-MOL(G3)/0,79

Fórmula:

=1000*0,7/MASAMOL("C8H18")

O que fai:

Calcula os moles de gasolina que hai en 1 L de gasolina.

Multiplica os cm³ (1000) que hai en 1 L pola densidade, (0,7) en g/cm³, da gasolina e o divide entre a masa molar da gasolina (MASAMOL("C8H18")), empregando a función MASAMOL que calcula a masa molar dunha fórmula química.

$$n(\text{C}_8\text{H}_{18}) = \frac{m}{M_{\text{mol}}} = \frac{V(\text{C}_8\text{H}_{18}) \cdot \rho(\text{C}_8\text{H}_{18})}{M_{\text{mol}}(\text{C}_8\text{H}_{18})}$$

=G26*5445,3

Calcula a calor desprendida ao queimar 1 L de gasolina.

Multiplica os moles de gasolina calculados na cela de coordenadas G26, pola calor de combustión (5445,3) en kJ/mol da gasolina.

$$Q = n(\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l})) \cdot \Delta H_c^\circ(\text{C}_8\text{H}_{18}(\text{l}))$$

=I26/1369

ou

=I26/ABS(M9) Calcula os moles de etanol que producen a mesma calor.

Divide a calor desprendida ao queimar 1 L de gasolina, calculada na cela de coordenadas I26, entre a calor de combustión (1369 ou o valor absoluto do contido da cela de coordenadas M9) do etanol.

$$n(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{l})) = \frac{Q}{\Delta H_c^\circ(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(\text{l}))}$$

=K26*MASAMOL(G3)/0,79

Calcula o volume en cm³ de etanol que ocupan eses moles.

Multiplica os moles de etanol calculados na cela de coordenadas K26, pola masa molar do etanol (MASAMOL(G3)) empregando a función MASAMOL referida á fórmula química situada na cela de coordenadas G3, e dividindo pola densidade, (0,79) en g/cm³, do etanol.

$$V(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) = \frac{m}{\rho} = \frac{n(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}) \cdot M_{\text{mol}}(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH})}{\rho(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH})}$$

♦ Calorimetría

Na pestana «Calorim» pódense facer cálculos de enerxía de reacción coas medidas do laboratorio.

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↵]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

1. Calcula o valor da entalpía de neutralización de 100 cm³ de disolución de HCl de concentración 2,0 mol/dm³ con 100 cm³ de disolución de NaOH de concentración 2,0 mol/dm³, expresado en kJ/mol, se o incremento de temperatura que se produce é de 12 °C.
 Datos: $c_e(\text{mestura}) = c_e(\text{auga}) = 4,18 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$; densidades das disolucións do ácido e da base = 1,0 g·mL⁻¹.
 Considera desprezable a capacidade calorífica do calorímetro. (P.A.U. xuño 15)
Rta.: $\Delta H_n^\circ = -50 \text{ kJ/mol}$.

[Borrar os datos.](#)

	Soluto			
	Masa	$m =$		
H ₂ O	Volume	$V =$		
	Equivalente en auga	$m_e =$		g
	Incremento de temperatura	$\Delta t =$		°C
	Densidade	$\rho =$		
	Calor específica	$c_e =$		

En DATOS, escribir os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Deberase escribir a cantidade de NaCl, polo que haberá que calculala:

$$n(\text{NaCl}) = n(\text{HCl}) = 2,0 \text{ mol/dm}^3 \cdot 100 \text{ cm}^3 \cdot 1 \text{ dm}^3 / 10^3 \text{ cm}^3 = 0,2 \text{ mol NaCl}$$

Nesta pestana, hai que [elixir](#) as unidades, en vez das magnitudes.

[Elixir](#) as dúas primeiras unidades nas celas de cor laranxa situadas á dereita: (mol e cm³).

Premer a tecla [\leftrightarrow] (tabulador), para ir cara adiante, ou «[↶]» e [\leftrightarrow] á vez para ir cara atrás.

Escribir os valores nas celas de cor branca e/ou [elixir](#) (ou escribir) as unidades nas celas de cor laranxa.

Escribir (200) á dereita de «V=». (Suponse que os volumes son aditivos).

Na cela de cor laranxa situada á esquerda de «Densidade», [elixir](#) «Disolución», para a densidade.

	Soluto			
	Cantidade	$n =$	0,2	mol
H ₂ O	Volume	$V =$	200	cm ³
	Equivalente en auga	$m_e =$		g
	Incremento de temperatura	$\Delta t =$	12	°C
Disolución	Densidade	$\rho =$	1	g/cm ³
	Calor específica	$c_e =$	4,18	J·g ⁻¹ ·°C ⁻¹

En RESULTADOS móstrase o valor da entalpía de neutralización:

	Calor ganada		
	pola disolución	$q_1 =$	10,0 kJ
	polo calorímetro	$q_2 =$	0 kJ
	Calor cedida	$Q =$	-10,0 kJ
	Cantidade	$n =$	0,200 mol
		$\Delta H =$	-50,2 kJ/mol

♦ Equilibrio en fase gas

Na pestana «Equilibrio» pódense resolver exercicios de equilibrio químico en fase gasosa. Pódese calcular:

- As constantes de equilibrio en función das concentracións ou das presións a partir dos datos (presión parcial, concentración, cantidade ou masa) no equilibrio ou dos seus valores iniciais e o grao de disociación ou dalgún valor no equilibrio.
- Presión parcial, concentración, cantidade ou masa de cada unha das substancias que se mostran na reacción, a partir da constante de equilibrio.

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos». e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de de cor branca e bordo azul

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

[Elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa da dereita.

- Para a reacción $\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$, o valor de $K_c = 5$ a 530 °C. Se reaccionan 2,0 moles de CO(g) con 2,0 moles de H₂O(g) nun reactor de 2 L:

- Calcula a concentración molar de cada especie no equilibrio á devandita temperatura.
- Determina o valor de K_p e razoa como se verá afectado o equilibrio se introducimos no reactor máis cantidade de CO(g) sen variar a temperatura nin o volume.

(A.B.A.U. extr. 23)

Rta.: a) [CO] = 0,309; [H₂O] = 0,309; [CO₂] = 0,691; [H₂] = 0,691 mol/dm³; b) $K_p = 5,00$.

[Borrar os datos.](#)

	Reactivo A +	Reactivo B	⇌	Producto C	+	Producto D	
Reacción axustada							
Cantidade inicial							
Cantidade en equilibrio							
Temperatura $T =$							← αK
Volume $V =$							
Presión total $p =$							
Calcular:							

Para ver o enunciado na mesma folla, selecciónalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premer sobre a cela da folla de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos». e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de de cor branca e bordo azul

Escribir a cantidade inicial (2) de CO e H₂O, nas celas de cor branca e bordo azul debaixo das fórmulas químicas, e [elixir](#) a unidade (mol) na cela de cor laranxa da dereita.

Escribir os valores da temperatura (530) e volume (2) nas celas de cor branca á dereita de « $T =$ » e « $V =$ », e elixir as unidades (°C e L). Elixir «Constante de concentracións» na cela de cor laranxa situada máis abaixo de «Producto C», e escribir debaixo o seu valor (5).

	Reactivo A +	Reactivo B	⇌	Producto C	+	Producto D	
Reacción axustada							
Cantidade inicial							
Cantidade en equilibrio							
Temperatura $T =$							Constante de concentracións
Volume $V =$							$K_c =$
Presión total $p =$							
Calcular:							

En RESULTADOS, elixir a opción «Concentración» na cela de cor laranxa situada encima de «inicial» e mostraranse a concentración molar de cada especie no equilibrio e o valor de K_p .

Concentración	CO(g) +	H ₂ O(g)	⇌	CO ₂ (g) +	H ₂ (g)	
inicial	1,00	1,00		0	0	mol/dm ³
reacciona	0,691	0,691	→	0,691	0,691	mol/dm ³
equilibrio	0,309	0,309		0,691	0,691	mol/dm ³
Constantes	$K_c = 5,00$ (Conc. en mol/L) $K_p = 5,00$ (p en atm.)					

2. Nun recipiente pechado introdúcese 2,0 moles de CH₄ e 1,0 mol de H₂S á temperatura de 727 °C, establecéndose o seguinte equilibrio: CH₄(g) + 2 H₂S(g) ⇌ CS₂(g) + 4 H₂(g). Una vez alcanzado o equilibrio, a presión parcial do H₂ é 0,20 atm e a presión total é de 0,85 atm. Calcula:

- a) Os moles de cada substancia no equilibrio e o volume do recipiente.
 b) O valor de K_c e K_p.

(A.B.A.U. ord. 20)

Rta.: a) n_e(CH₄) = 1,80 mol; n_e(H₂S) = 0,60 mol; n_e(CS₂) = 0,200 mol; n_e(H₂) = 0,800 mol; V = 328 dm³;
 b) K_p = 0,0079; K_c = 1,2·10⁻⁶.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos», e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de de cor branca e bordo azul

[Elixir](#) a unidade (mol) na cela de cor laranxa a dereita de «Cantidad inicial», e a unidade (atm) debaixo dela. Escribir os valores das cantidades iniciais (2 e 1) do CH₄ e o H₂S, e o da presión en equilibrio (0,2) do H₂. Escribir os valores da temperatura (727) e da presión total (0,85) nas celas de cor branca á dereita de «T =» e «p =», e escribir (ou elixir) as unidades (°C e atm).

Elixir tamén, nas celas de cor laranxa a dereita de «Calcular», as opcións «Volume» e «total».

Reacción axustada		CH ₄	2	H ₂ S		CS ₂	4	H ₂	
Cantidad inicial		2		1					mol
Cantidad en equilibrio								0,2	atm
Temperatura	T =	727	°C						
Volume	V =								
Presión total	p =	0,85	atm						
Calcular:									
									Volume total

En RESULTADOS, elixir a opción «Cantidad» e mostraranse os moles de cada substancia no equilibrio, o volume do recipiente e os valores de K_p e K_c.

Cantidad	CH ₄ (g) +	2	H ₂ S(g)	⇌	CS ₂ (g) +	4	H ₂ (g)	
inicial	2,00		1,00		0		0	mol
reacciona	0,200		0,400	→	0,200		0,800	mol
equilibrio	1,80		0,600		0,200		0,800	mol
Constantes	$K_c = 1,17 \cdot 10^{-6}$ (Conc. en mol/L) $K_p = 0,00790$ (p en atm.)							
Volume(total) =	328 dm ³ en equilibrio							

3. Nun recipiente de 250 mL introdúcese 0,45 gramos de N₂O₄(g) e quéntase ata 40 °C, disociándose o N₂O₄(g) nun 42 %. Calcula:

- a) A constante K_c do equilibrio: N₂O₄(g) ⇌ 2 NO₂(g)
 b) Se se reduce o volume do recipiente á metade, sen variar a temperatura. Cal será a composición da mestura no novo equilibrio?

(P.A.U. Set. 02)

Rta.: K_c = 2,4·10⁻²; b) n(N₂O₄) = 3,3·10⁻³ mol; n'(NO₂) = 3,1·10⁻³ mol.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos», e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de de cor branca e bordo azul

[Elixir](#) a unidade (g) na cela de cor laranxa a dereita de «Cantidad inicial». Escribir o valor da masa inicial (0,45) do N_2O_4 .

Escribir os valores da temperatura (40) e do volume (250) nas celas de cor branca á dereita de «T=» e «V=», e escribir (ou elixir) as unidades ($^{\circ}\text{C}$ e mL). Elixir «Grao de disociación» na cela de cor laranxa situada debaixo de «Producto C», e escribir debaixo o seu valor (0,42 mellor que 42%. Pódese escribir 42%, pero é aconsellable pulsar xuntas as teclas [Ctrl] e [M] para que a cela non quede con formato porcentual).

		Reactivo A +	Reactivo B	\rightleftharpoons	Producto C	+	Producto D	
Reacción axustada		N_2O_4			2		NO_2	
Masa inicial		0,45						g
Masa en equilibrio								
Temperatura	T =	40	$^{\circ}\text{C}$				Grao de disociación	
Volume	V =	250	mL		$\alpha =$	0,42		
Presión total	p =							
								Calcular:

Se a opción era menor de 6 cifras significativas, facer clic no botón [Cifras significativas](#) e elixir 6 á dereita de «Cifras significativas».

En RESULTADOS mostraranse (con 6 cifras significativas) os valores das constantes e das cantidades no equilibrio.

Cantidad	$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$	\rightleftharpoons 2	$\text{NO}_2(\text{g})$	
inicial	0,00489 077		0	mol
reacciona	0,00205 412	\rightarrow	0,00410 825	mol
equilibrio	0,00283 665		0,00410 825	mol
Constantes	$K_c = 0,0237995$ (Conc. en mol/L)			
	$K_p = 0,611558$ (p en atm.)			

Para o apartado b), copiar o valor da constante K_c (0,0237995) premendo sobre o número e despois pulsando ao tempo as teclas [Ctrl] e [C]. En DATOS premer sobre a cela de cor branca situada á dereita de « $\alpha =$ », e pegar o resultado da constante ([Ctrl]+[Alt]+[\uparrow]+[V]). Elixir «Constante de concentración» na cela de encima, e, na cela de cor branca situada á dereita de «Volume», escribir (125) que é a metade do volume do apartado a.

Se na cela á dereita de « $K_c =$ », móstrase 2,38%, premer sobre a cela e despois pulsar á vez as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato.

Constante de concentración
$K_c =$ 0,0237995

Se se queren ver os resultados con 3 cifras significativas, facer clic no botón [Cifras significativas](#) e elixir 3 á dereita de «Cifras significativas».

En RESULTADOS mostraranse os valores das constantes de equilibrio, o grao de disociación e a composición da mestura no novo equilibrio.

Cantidad	$\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$	\rightleftharpoons 2	$\text{NO}_2(\text{g})$	
inicial	0,00489		0	mol
reacciona	0,00157	\rightarrow	0,00314	mol
equilibrio	0,00332		0,00314	mol
Constantes	$K_c = 0,0238$ (Conc. en mol/L)			
	$K_p = 0,612$ (p en atm.)			
				Grao de disociación $\alpha =$ 32,1 %

Agora vese que o grao de disociación é menor, porque o equilibrio desprazouse á esquerda, de acordo co principio de Le Chatelier.

4. Ao quentar HgO(s) nun recipiente pechado no que se fixo o baleiro, disóciase segundo a reacción: $2 \text{HgO(s)} \rightleftharpoons 2 \text{Hg(g)} + \text{O}_2\text{(g)}$. Cando se alcanza o equilibrio a 380°C , a presión total no recipiente é de $0,185 \text{ atm}$. Calcula:

a) As presións parciais das especies presentes no equilibrio.

b) O valor das constantes K_c e K_p da reacción.

Datos: $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{dm}^3\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$; $1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa}$.

(A.B.A.U. extr. 18)

Rta.: a) $p(\text{Hg}) = 0,123 \text{ atm}$; $p(\text{O}_2) = 0,0617 \text{ atm}$; b) $K_c = 6,1\cdot 10^{-9}$; $K_p = 9,4\cdot 10^{-4}$.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos», e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de de cor branca e bordo azul

Como o HgO non é un gas, non se debe escribir a súa fórmula, ignorando a mensaxe: «Non axustada» que se mostra á dereita. (Se se escribe, teríase que escribir tamén unha cantidade inicial arbitraria e a folla dará un resultado da presión parcial do HgO que non debería ter en conta. As presións parciais dos produtos serían as correctas, pero os valores das constantes de equilibrio serían erróneas, porque a folla de cálculo considera que o HgO é un gas e usa a súa presión ficticia no cálculo das constantes).

Escribir os valores da temperatura (380) e da presión total (0,19) nas celas de cor branca á dereita de «T=» e «p=», e escribir (ou elixir) as unidades ($^\circ\text{C}$ e atm).

	Reactivo A +	Reactivo B	\rightleftharpoons	Producto C	+ Producto D	
Reacción axustada			2	Hg	O2	Non axustada
Cantidade inicial						
Cantidade en equilibrio						
Temperatura	T =	380 $^\circ\text{C}$				
Volume	V =					
Presión total	p =	0,19 atm				

En RESULTADOS, elixir a opción «Presión» na cela de cor laranxa situada encima de «inicial», para que mostre as presións parciais dos produtos no equilibrio. Pódese elixir «atm» na cela de cor laranxa da dereita, aínda que non é necesario. Móstranse tamén os valores das constantes de equilibrio:

Presión		\rightleftharpoons	2	Hg(g) +	O ₂ (g)	
inicial						atm
reacciona						atm
equilibrio			0,123		0,0617	atm
Constantes	$K_c = 6,09\cdot 10^{-9}$ (Conc. en mol/L)					
	$K_p = 9,38\cdot 10^{-4}$ (p en atm.)					

5. Considera o seguinte proceso en equilibrio a 686 °C: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$. As concentracións en equilibrio das especies son:

$[\text{CO}_2] = 0,086 \text{ mol/dm}^3$; $[\text{H}_2] = 0,045 \text{ mol/dm}^3$; $[\text{CO}] = 0,050 \text{ mol/dm}^3$ e $[\text{H}_2\text{O}] = 0,040 \text{ mol/dm}^3$.

a) Calcula K_c para a reacción a 686 °C.

b) Se se engadise CO_2 para aumentar a súa concentración a $0,50 \text{ mol/dm}^3$, cales serían as concentracións de todos os gases unha vez restablecido o equilibrio?

(P.A.U. set. 14)

Rta.: a) $K_c = 0,517$; b) $[\text{CO}_2] = 0,47$; $[\text{H}_2] = 0,020$; $[\text{CO}] = 0,075$ e $[\text{H}_2\text{O}] = 0,065 \text{ mol/dm}^3$.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos», e os coeficientes para o axuste, nas celas máis estreitas de de cor branca e bordo azul

En DATOS, elixir a unidade (mol/dm^3) na cela de cor laranxa na parte dereita da liña coa etiqueta «en equilibrio», e escribir nas celas de cor branca os valores das concentracións.

Escribir o valor da temperatura na cela de cor branca situada á dereita de «T=» e escribir (ou elixir) a unidade (°C).

	Reactivo A +	Reactivo B	\rightleftharpoons	Producto C +	Producto D	
Reacción axustada	<input type="text" value="CO2"/>	<input type="text" value="H2"/>		<input type="text" value="CO"/>	<input type="text" value="H2O"/>	
Cantidad inicial	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Concentración en equilibrio	<input type="text" value="0,086"/>	<input type="text" value="0,045"/>		<input type="text" value="0,05"/>	<input type="text" value="0,04"/>	<input type="text" value="mol/dm³"/>
Temperatura T =	<input type="text" value="686"/>		<input type="text" value="°C"/>			

b) Se a opción era menor de 6 cifras significativas, facer clic no botón [Cifras significativas](#) e elixir 6 á dereita de «Cifras significativas».

En RESULTADOS mostrarase (con 6 cifras significativas) o valor da constante K_c .

Constantes $K_c = 0,516796$ (Conc. en mol/L)

Copiar o resultado da constante, premendo sobre a cela situada á dereita de « K_c » (0,516796) e premendo ao tempo as teclas [Ctrl] e [C]. En DATOS, pegar ([Ctrl]+[Alt]+[⌘]+[V]) o valor da constante na cela de cor branca e bordo azul encima de «Calcular», e elixir na cela de cor salmón encima dela a opción «Constante de concentracións». Borrar as concentracións do equilibrio e escribir as novas concentracións iniciais.

	Reactivo A +	Reactivo B	\rightleftharpoons	Producto C +	Producto D	
Ecuación axustada	<input type="text" value="CO2"/>	<input type="text" value="H2"/>		<input type="text" value="CO"/>	<input type="text" value="H2O"/>	
Concentración inicial	<input type="text" value="0,500"/>	<input type="text" value="0,045"/>		<input type="text" value="0,05"/>	<input type="text" value="0,040"/>	<input type="text" value="mol/dm³"/>
en equilibrio	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Temperatura T =	<input type="text" value="686"/>		<input type="text" value="°C"/>			
Volume V =	<input type="text"/>					
Presión total p =	<input type="text"/>					
			Constante de concentracións			
			$K_c =$ <input type="text" value="0,516796"/>			
			Calcular:		<input type="text"/>	

Se se queren ver os resultados con 3 cifras significativas, facer clic no botón [Cifras significativas](#) e elixir 3 á dereita de «Cifras significativas».

En RESULTADOS mostraranse as concentracións no novo equilibrio.

equilibrio	0,475	0,0199	0,0751	0,0651	mol/dm³
------------	-------	--------	--------	--------	---------

♦ Equilibrio ácido-base

Na pestana «AcidoBase» pódense resolver exercicios de equilibrio ácido-base. Pódese calcular:

- As constantes de acidez, basicidade ou hidrólise a partir dos datos (concentración, grao de disociación ou pH) no equilibrio ou dos seus valores iniciais e o grao de disociación ou de algún valor no equilibrio.
- Concentracións iniciais e no equilibrio, grao de disociación ou pH a partir da constante de equilibrio.

[Escribir as fórmulas](#) da substancia e os ións nas celas de cor branca e bordo verde á dereita de «Fórmula:». En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

1. Unha disolución de amoníaco de concentración $0,03 \text{ mol/dm}^3$ está disociada nun 2,42 %. Calcula:

- O valor da constante K_b do amoníaco.
- O pH da disolución e o valor da constante K_a do ácido conxugado.

Dato: $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14}$.

(A.B.A.U. ord. 23)

Rta.: a) $K_b = 1,80 \cdot 10^{-5}$; b) $\text{pH} = 10,86$; $K_a = 5,55 \cdot 10^{-10}$.

[Borrar os datos.](#)

		Base	Ácido conxugado
Solutos Disolución	Fórmula:		
	pH =		
	V =		
Constante	$K_w =$	$1,00 \cdot 10^{-14}$	de ionización da auga

Para ver o enunciado na mesma folia, selecciónalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premar sobre a cela da folia de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

[Escribir a fórmula](#) do amoníaco na cela de cor branca e bordo verde á dereita de «Fórmula:». Na cela seguinte móstranse a fórmula do seu ácido conxugado se na cela encima dela móstrase a opción «Base».

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Debaixo de «Fórmula:», elixir a opción « $\alpha =$ » na cela de cor laranxa, e escribir o seu valor (2,42) na cela de cor branca situada a súa dereita.

Na cela de cor laranxa, á dereita de «Solutos», elixir a unidade (mol/dm^3). A etiqueta cambia a «Concentración [s] =». Escribir o valor da concentración (0,03) na cela de cor branca situada á esquerda de « mol/dm^3 ».

		Base	Ácido conxugado
Grao de disociación	Fórmula:	NH_3	NH_4^+
	$\alpha =$	2,42 %	
Concentración	pH =		
	[s] =	0,03	mol/dm^3
Constante	$K_w =$	$1,00 \cdot 10^{-14}$	de ionización da auga

En RESULTADOS móstrase o valor da constante K_b do amoníaco, o pH da disolución e o valor da constante K_a do ácido conxugado.

Concentración	$\text{NH}_3 +$	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$	$\text{NH}_4^+ +$	OH^-	
inicial:	0,0300				mol/dm^3
en equilibrio:	0,0293		$7,26 \cdot 10^{-4}$	$7,26 \cdot 10^{-4}$	mol/dm^3

		$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,38 \cdot 10^{-11}$	mol/dm^3
pH = 10,86			
pOH = 3,14	Constante de basicidade:	$K_b = 1,80 \cdot 10^{-5}$	
	Constante de acidez do conxugado:	$K_a = 5,55 \cdot 10^{-10}$	

2. Disólvense 46 g de ácido metanoico, HCOOH , en 10 dm^3 de auga, obtendo unha disolución de pH igual a 2,52.

a) Calcula o grao de disociación do ácido.

b) Determina a constante K_a do ácido e a constante K_b da súa base conxugada.

Datos: $K_w = 1,0 \cdot 10^{-14}$.

(A.B.A.U. ord. 22)

Rta.: a) $\alpha = 3,02 \%$; b) $K_a = 9,41 \cdot 10^{-5}$; $K_b = 1,06 \cdot 10^{-10}$.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir a fórmula](#) do ácido metanoico na cela de cor branca e bordo verde á dereita de «Fórmula:». Na cela situada encima dela onde se mostra «Base», cambiar á opción «Ácido». Preséntanse a fórmula da súa base conxugada á dereita, pero pode escribirse se se quere.

En DATOS, escribir os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita. (Asumindo o erro mínimo de que o volume de disolución é o mesmo que o volume de auga).

		Ácido	Base conxugada
Fórmula:		HCOOH	HCOO ⁻
pH =		2,52	
Masa (s)	m =	46	g
Volume (D)	V =	10	dm ³

En RESULTADOS móstrase o grao de disociación do ácido e as constantes K_a do ácido e K_b da súa base conxugada.

Concentración	HCOOH +	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$	HCOO ⁻ +	H_3O^+	
inicial:	0,0999				mol/dm^3
en equilibrio:	0,0969		0,00302	0,00302	mol/dm^3
				$[\text{OH}^-] = 3,31 \cdot 10^{-12}$	mol/dm^3
pH = 2,52	Grao de disociación:		$\alpha = 3,02 \%$		
pOH = 11,48	Constante de acidez:		$K_a = 9,41 \cdot 10^{-5}$		
	Constante de basicidade do conxugado:		$K_b = 1,06 \cdot 10^{-10}$		

3. 1,12 dm³ de HCN gas, medidos a 0 °C e 1 atm, disólvense en auga obténdose 2 dm³ de disolución. Calcula:

a) A concentración de todas as especies presentes na disolución.

b) O valor do pH da disolución e o grao de ionización do ácido.

Datos: $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{dm}^3\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$; 1 atm = 101,3 kPa; $K_a(\text{HCN}) = 5,8\cdot 10^{-10}$.

(A.B.A.U.)

Rta.: a) $[\text{HCN}] = 0,025 \text{ mol/dm}^3$; $[\text{OH}^-] = 2,6\cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3$; $[\text{CN}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 3,8\cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$;

b) pH = 5,43; $\alpha = 0,015 \%$.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir a fórmula](#) do ácido cianhídrico na cela de cor branca e bordo verde á dereita de «Fórmula:».

Na cela situada encima dela, onde se mostra «Base», cambiar á opción «Ácido». Preséntanse a fórmula da súa base conxugada á dereita.

Elixir a opción « K_a =» na cela de cor laranxa situada debaixo de «Fórmula:».

En DATOS, escribir os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Pódese seleccionar e copiar o valor da constante ($5,8\cdot 10^{-10}$) no enunciado e pegalo na cela de cor branca situada á dereita de « K_a =».

		Ácido	Base conxugada
	Fórmula:	HCN	CN ⁻
Constante	K_a =	5,80E-10	de acidez
	pH =		
Volume (s)	V =	1,12	dm ³ gas
Volume (D)	V =	2	dm ³
Presión	P =	101,3	kPa
Temperatura	T =	0	°C
Constante	K_w =	1,00·10 ⁻¹⁴	de ionización da auga

En RESULTADOS móstranse a concentración de todas as especies na disolución, o valor do pH da disolución e o grao de ionización do ácido.

Concentración	HCN +	H ₂ O ⇌	CN ⁻ +	H ₃ O ⁺	
inicial:	0,0250				mol/dm ³
en equilibrio:	0,0250		3,81·10 ⁻⁶	3,81·10 ⁻⁶	mol/dm ³
			[OH ⁻] = 2,63·10 ⁻⁹		mol/dm ³
pH = 5,42		Grao de disociación:	$\alpha = 0,0152 \%$		
pOH = 8,58					
	Constante de basicidade do conxugado:		$K_b = 1,72\cdot 10^{-5}$		

4. Para unha disolución acuosa de concentración $0,200 \text{ mol/dm}^3$ de ácido láctico (ácido 2-hidroxipropáico), calcula:
- O grao de ionización do ácido en disolución e o pH da mesma.
 - Que concentración debe ter unha disolución de ácido benzoico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) para dar un pH igual ao da disolución de ácido láctico de concentración $0,200 \text{ mol/dm}^3$?
- Datos: $K_a(\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}) = 3,2 \cdot 10^{-4}$; $K_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}) = 6,42 \cdot 10^{-5}$. (A.B.A.U. ord. 17)
- Rta.:** a) $\alpha = 3,92 \%$; pH = 2,11; b) $[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]_0 = 0,965 \text{ mol/dm}^3$.

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e **pegalo** na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir a fórmula abreviada ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$) do ácido láctico na cela de cor branca e bordo verde á dereita de «Fórmula:». Na cela encima dela, onde se mostra «Base», cambiar á opción «Ácido». Preséntanse o símbolo «A⁻» dun anión xenérico á dereita porque a folla non é quen de construír a fórmula da súa base conxugada. Se se prefire, escribir ($\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2^-$).

Elixir a opción «K_a =» na cela de cor laranxa situada debaixo de «Fórmula:».

En DATOS, escribir os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e **elixir** as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Pódese seleccionar e copiar o valor da constante ($3,2 \cdot 10^{-4}$) no enunciado e pegalo na cela de cor branca situada á dereita de «K_a =».

	Ácido	Base conxugada
Fórmula:	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$	A ⁻
Constante	K _a = $3,2 \cdot 10^{-4}$	de acidez
	pH =	
Concentración	[s] = 0,2	mol/dm ³

Se a opción era menor de 6 cifras significativas, facer clic no botón **Cifras significativas** e elixir 6 á dereita de «Cifras significativas».

En RESULTADOS mostraranse o grao de ionización e o pH. Anotar ou copiar o valor do pH.

pH = 2,10560	Grao de disociación:	$\alpha = 3,92080 \%$
--------------	----------------------	-----------------------

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]), os novos valores e borrar o dato da concentración:

Fórmula:	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$	A ⁻
Constante	K _a = $6,42 \cdot 10^{-5}$	de acidez
	pH = 2,10560	
Soluto		

Se se queren ver os resultados con 3 cifras significativas, facer clic no botón **Cifras significativas** e elixir 3 á dereita de «Cifras significativas».

En RESULTADOS mostraranse as concentracións do ácido benzoico (inicial e en equilibrio). A que pide o exercicio é a inicial.

Concentración	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$ +	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$	A ⁻ +	H_3O^+	
inicial:	0,966				mol/dm ³
en equilibrio:	0,958		0,00784	0,00784	mol/dm ³
			[OH ⁻] = $1,28 \cdot 10^{-12}$		mol/dm ³
pH = 2,11		Grao de disociación:	$\alpha = 0,812 \%$		

♦ Equilibrio de solubilidad

Na pestana «Solub» pódense resolver exercicios de equilibrio de solubilidad. Pódese calcular:

- O produto de solubilidad a partir dos datos (concentración ou pH).
- A solubilidad en auga ou en presenza dun ión común.
- Se precipitará unha mestura de dúas disolucións.
- As concentracións nunha precipitación fraccionada.

[Escribir as fórmulas](#) das substancias ou dos ións nas celas de cor branca e bordo verde da primeira columna.

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

1. A solubilidad do hidróxido de manganeso(II) en auga é de 1,96 mg/L. Calcula:
 - a) O produto de solubilidad desta substancia e o pH da disolución saturada.
 - b) A solubilidad do hidróxido de manganeso(II) nunha disolución de concentración 0,10 mol/dm³ de hidróxido de sodio, considerando que este sal está totalmente disociado.

(A.B.A.U. extr. 23)

Rta.: a) $K_s = 4,28 \cdot 10^{-14}$; pH = 9,64; b) $s_2 = 4,28 \cdot 10^{-12}$ mol/dm³.

[Borrar os datos.](#)

Composto pouco soluble:		solubilidad		← Elixir
2.º composto pouco soluble:		solubilidad		
Ión/composto soluble:		Volume	Concentración	
2.º ión/composto soluble:				
Soluto na disolución que se engade:				

Para ver o enunciado na mesma folla, seleccionalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premer sobre a cela da folla de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde da primeira columna: Mn(OH)₂ á dereita de «Composto pouco soluble:» e NaOH á dereita de «Ión/composto soluble:».

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Elixir a unidade na cela de cor laranxa, á dereita de «solubilidad». Escribir o seu valor adaptado as unidades elixidas na cela de cor branca situada a súa esquerda.

Se o formato no que se mostra o valor é estraño (1,96E-03), pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato.

Escribir o valor (0,1) da concentración de NaOH na cela de cor branca situada debaixo de «Concentración».

Elixir a unidade (mol/dm³) na cela de cor laranxa situada a súa dereita.

Composto pouco soluble:	Mn(OH) ₂	solubilidad	1,96	mg/dm ³
2.º composto pouco soluble:		solubilidad		
Ión/composto soluble:	NaOH	Volume	Concentración	
2.º ión/composto soluble:			0,1	mol/dm ³
Soluto na disolución que se engade:				

En RESULTADOS móstranse o produto de solubilidad desta substancia, o pH da disolución saturada e a solubilidad do hidróxido de manganeso(II) na disolución de hidróxido de sodio.

	$\text{Mn(OH)}_2(\text{s})$	\rightleftharpoons	$\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$	+	$2 (\text{OH})^{-}(\text{aq})$	
	$K_s = 4,28 \cdot 10^{-14}$	=	s	.	$(2 \text{ s})^2$	= 4 s^3
Solubidade	mol/dm ³				g/dm ³	pH
En auga	$2,20 \cdot 10^{-5}$		0,00196			9,64
En 1 L D(NaOH)	$4,28 \cdot 10^{-12}$		$3,81 \cdot 10^{-10}$			

Pódense cambiar as unidades dos RESULTADOS, por exemplo, (mg) en vez de (g).

Solubidade	mol		mg	en	pH
En auga	$2,20 \cdot 10^{-5}$		1,96	1 dm ³	9,64
En D(NaOH)	$4,28 \cdot 10^{-12}$		$3,81 \cdot 10^{-7}$	1 dm ³	

2. O produto de solubilidade, a 20 °C, do sulfato de bario é $8,7 \cdot 10^{-11}$. Calcula:

- Os gramos de sulfato de bario que se poden disolver en 0,25 L de auga.
- Os gramos de sulfato de bario que se poden disolver en 0,25 L dunha disolución de concentración 1 mol/dm³ de sulfato de sodio, considerando que este sal está totalmente dissociado.

(A.B.A.U. ord. 21)

Rta.: a) $m(\text{BaSO}_4) = 5,44 \cdot 10^{-4}$ g en 0,25 L de H₂O; b) $m'(\text{BaSO}_4) = 5,08 \cdot 10^{-9}$ g en 0,25 L de D Na₂SO₄.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde da primeira columna: BaSO_4 á dereita de «Composto pouco soluble:», [←], [←], e Na_2[Esp][⊗]SO4[←] á dereita de «Ión/composto soluble:».

Seleccionar co rato, no enunciado, o valor do produto de solubilidade ($8,7 \cdot 10^{-11}$) e copialo ([Ctrl]+[C]).

Na folla de cálculo, en DATOS, premer sobre a cela de cor branca á dereita de «solubilidade» e pulsar á vez as teclas ([Ctrl], [Alt], [↕] e [V]) para pegar o valor.

Na cela de cor laranxa, situada a súa dereita [elixir](#) «K_s».

É necesario escribir o dato do volume (0,25 L) do apartado a), nalgunha das celas debaixo de «Volume», para que apareza como unha opción en RESULTADOS.

Nas celas de cor branca e bordo azul á dereita de «Ión/composto soluble:», escribir os valores do volume (0,25) e a concentración (1) e elixir as unidades (L e mol/dm³) nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Composto pouco soluble:	BaSO ₄	Produto de solubilidade	$8,7 \cdot 10^{-11}$	K _s
2.º composto pouco soluble:		solubilidade		
		Volume		Concentración
Ión/composto soluble:	Na ₂ SO ₄	0,25 L	1	mol/dm ³

En RESULTADOS móstranse as concentracións en g/dm³:

	$\text{BaSO}_4(\text{s})$	\rightleftharpoons	$\text{Ba}^{2+}(\text{aq})$	+	$(\text{SO}_4)^{-}(\text{aq})$	
	$K_s = 8,70 \cdot 10^{-11}$	=	s	.	s	= s ²
Solubidade	mol/dm ³				g/dm ³	
En auga	$9,33 \cdot 10^{-6}$		0,00218			
En 1 L D(Na ₂ SO ₄)	$8,70 \cdot 10^{-11}$		$2,03 \cdot 10^{-8}$			

¿V? ↑

Deberán escollerse as opcións «g» e «0,250 L» nas celas de cor laranxa.

Solubidade	mol		g	en
En auga	$2,33 \cdot 10^{-6}$		$5,44 \cdot 10^{-4}$	0,250 L
En D(Na ₂ SO ₄)	$2,17 \cdot 10^{-11}$		$5,08 \cdot 10^{-9}$	0,250 L

3. Dispónse dunha disolución que contén unha concentración de Cd^{2+} de $1,1 \text{ mg/dm}^3$. Quérese eliminar parte do Cd^{2+} precipitándoo cun hidróxido, en forma de $\text{Cd}(\text{OH})_2$. Calcula:

- a) O pH necesario para iniciar a precipitación.
b) A concentración de Cd^{2+} , en mg/dm^3 , cando o pH é igual a 12.

Datos: $K_s(\text{Cd}(\text{OH})_2) = 1,2 \cdot 10^{-14}$.

(P.A.U. xuño 16)

Rta.: a) pH = 9,5; b) $[\text{Cd}^{2+}]_b = 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ mg/dm}^3$.

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e pegalo na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir as fórmulas das substancias nas celas de cor branca e bordo verde da primeira columna:

$\text{Cd}(\text{OH})_2$ á dereita de «Composto pouco soluble:», Cd^{2+} á dereita de «Ión/composto soluble:» e OH^- á dereita de «2.º ión/composto soluble:».

Seleccionar co rato, no enunciado, o valor do produto de solubilidade ($1,2 \cdot 10^{-14}$) e copialo ([Ctrl]+[C]).

Na folla de cálculo, en DATOS, premer sobre a cela de cor branca á dereita de «solubilidade» e pulsar á vez as teclas ([Ctrl], [Alt], [Enter] e [V]) para pegar o valor.

Premer sobre a cela de cor laranxa, situada a súa dereita, e elixir « K_s ».

Elixir a unidade na cela de cor laranxa, á dereita de todo de «Ión/composto soluble:». Escribir o seu valor adaptado as unidades elixidas na cela de cor branca situada a súa esquerda.

Se o formato é extraño (1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato.

Composto pouco soluble:	$\text{Cd}(\text{OH})_2$	Produto de solubilidade	$1,2 \cdot 10^{-14}$	K_s
2.º composto pouco soluble:		solubilidade		
Ión/composto soluble:	Cd^{2+}	Volumen		
2.º ión/composto soluble:	OH^-	Concentración	$1,1 \text{ mg/dm}^3$	
Soluto na disolución que se engade:				

- a) En RESULTADOS elixir pH, debaixo de «Para que precipite $\text{Cd}(\text{OH})_2$ ». Preséntase o pH necesario para iniciar a precipitación.

	$\text{Cd}(\text{OH})_2(\text{s})$	\rightleftharpoons	$\text{Cd}^{2+}(\text{aq})$	+	$2 (\text{OH})^-(\text{aq})$	
	$K_s = 1,20 \cdot 10^{-14}$	=	s	.	$(2 \text{ s})^2$	= 4 s^3
Solubilidade	mol/dm ³		g/dm ³			pH
En agua	$1,44 \cdot 10^{-5}$		0,00211			9,46
En 1 L D(Cd^{2+})	$1,18 \cdot 10^{-5}$		0,00173			
Precipitación						
Para que precipite $\text{Cd}(\text{OH})_2$						
	pH		pH =			9,54

- b) En DATOS, elixir a opción «pH» na cela de cor laranxa á dereita de todo de «2.º ión/composto soluble:», e escribir 12 na cela de cor branca situada a súa esquerda.

2.º ión/composto soluble:	OH^-			12	pH
---------------------------	---------------	--	--	----	----

En RESULTADOS elixir «Concentración final de Cd^{2+} ». Preséntanse o valor da concentración de ión Cd^{2+} na disolución cando estea en equilibrio co precipitado. As unidades de concentración serán mg/dm^3 , como as do dato.

Precipitación	Sí				
$[\text{Cd}^{2+}] \cdot [(\text{OH})^-]^2$	= $9,79 \cdot 10^{-6} \cdot (0,0100)^2$		$> K_s =$	$1,20 \cdot 10^{-14}$	
Concentración final de Cd^{2+}	$[\text{Cd}^{2+}]_e =$	$1,20 \cdot 10^{-10} \text{ mol/L} =$		$1,35 \cdot 10^{-5} \text{ mg/dm}^3$	

4. A cantidade máxima de sulfato de estroncio que se pode disolver en 250 mL de auga a 25 °C é de 26,0 mg.

- a) Calcula o valor da constante do produto de solubilidade do sal a 25 °C.
 b) Indica se se formará un precipitado de sulfato de estroncio ao mesturar volumes iguais de disolucións de Na_2SO_4 de concentración 0,02 mol/dm³ e de SrCl_2 de concentración 0,01 mol/dm³, considerando que ambos os sales están totalmente dissociados. Supón os volumes aditivos.

(P.A.U. xuño 12)

Rta.: a) $K_s = 3,21 \cdot 10^{-7}$; b) Si. $[(\text{SO}_4)^{2-}] \cdot [\text{Sr}^{2+}] = 0,0100 \cdot 5,00 \cdot 10^{-3} > K_s$.

Borrar os datos. Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e **pegalo** na cela situada debaixo de «Problema».

Escribir as fórmulas das substancias nas celas de cor branca e bordo verde da primeira columna:

SrSO_4 á dereita de «Composto pouco soluble:», Na_2 á dereita de «Ión/composto soluble:» e SrCl_2 á dereita de «2.º ión/composto soluble:»

Elixir a unidade na cela de cor laranxa, á dereita de todo de «Ión/composto soluble:».

Calcular a concentración e escribirla na cela situada a súa esquerda.

Pódese tamén escribir unha fórmula matemática para que a folla faga o cálculo. Premer sobre a cela e pulsar nas teclas [Enter] e [9] para que apareza o signo =. Siga a escribir: 0,026/0,25.

A fórmula que estará na «Liña de entrada» será: =0,026/0,25 pero na cela verase o resultado: 0,104.

Se o formato é estraño (1,04E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,104).

Elixir a unidade (mol/dm³) na cela de cor laranxa, á dereita de todo de «Ión/composto soluble:». Escribir a súa esquerda o valor (0,02) da concentración. Facer o mesmo para o «2.º ión/composto soluble:».

Hai que escribir un valor do volume, non importa cal, pero o mesmo valor, nos dous compostos solubles, para que a folla asuma que é unha mestura (porque a concentración na mestura pasa a ser a metade). Se non se escriben, a folla interpreta que ambos os solutos están na mesma disolución inicial e a súa concentración non varía.

Composto pouco soluble:	SrSO_4	solubilidade	0,104	g/dm ³
2.º composto pouco soluble:		solubilidade		
Ión/composto soluble:	Na_2SO_4	Volume	1 L	Concentración
2.º ión/composto soluble:	SrCl_2		1 L	
Soluto na disolución que se engade:				
			0,02	mol/dm ³
			0,01	mol/dm ³

b) En RESULTADOS móstranse o valor da constante do produto de solubilidade e tamén por que se forma o precipitado.

$\text{SrSO}_4(\text{s})$	\rightleftharpoons	$\text{Sr}^{2+}(\text{aq})$	+	$(\text{SO}_4)^{2-}(\text{aq})$	
$K_s = 3,21 \cdot 10^{-7}$	=	s	·	s	= s ²
Solubilidade	mol/dm ³			g/dm ³	
En auga	$5,66 \cdot 10^{-4}$		0,104		
En 1 L D(Na_2SO_4)	$1,60 \cdot 10^{-5}$		0,00294		
				¿V? ↑	
Precipitación	Sí				
$[\text{Sr}^{2+}] \cdot [(\text{SO}_4)^{2-}]$	= 0,0100 · 0,00500		> $K_s =$	$3,21 \cdot 10^{-7}$	

5. Tense unha disolución acuosa de cromato de potasio e de cloruro de sodio, a unhas concentracións de $0,1 \text{ mol/dm}^3$ e $0,05 \text{ mol/dm}^3$, respectivamente. Engádese unha disolución de nitrato de prata. Su-
poñendo que o volume non varía:

- Determina, mediante os cálculos pertinentes, cal dos dous sales de prata precipitará en primeiro lugar.
- Calcula a concentración do aniión do sal máis insoluble ao comezar a precipitar o sal que precipita en segundo lugar.

Datos: Constantes do produto de solubilidade a 25°C do cromato de prata e do cloruro de prata, respectivamente: $2,0 \cdot 10^{-12}$ e $1,70 \cdot 10^{-10}$

(P.A.U. xuño 00)

Rta.: a) AgCl ; b) $[\text{Cl}^-] = 3,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$.

Escribir as fórmulas das substancias nas celas de cor branca e bordo verde da primeira columna.

Seleccionar co rato, no enunciado, o valor do produto de solubilidade ($2,0 \cdot 10^{-12}$) e copialo ([Ctrl]+[C]).

Na folla de cálculo, en DATOS, premer sobre a cela de cor branca á dereita de «solubilidade» e pulsar á vez as teclas ([Ctrl], [Alt], [↵] e [V]) para pegar o valor.

Na cela de cor laranxa, situada a súa dereita elixir « K_s ».

Facer o mesmo para o outro valor. Ou escribir os valores en formato científico «folla de cálculo».

Elixir a unidade (mol/dm^3) na cela de cor laranxa, á dereita de todo de «Ión/composto soluble:». Escribir a súa esquerda o valor (0,1) da concentración. Facer o mesmo para o 2.º composto soluble.

Composto pouco soluble:	Ag_2CrO_4	Produto de solubilidade	2,00E-12	K_s
2.º composto pouco soluble:	AgCl	Produto de solubilidade	1,70E-010	K_s
		Volume	Concentración	
Ión/composto soluble:	K_2CrO_4		0,1	mol/dm^3
2.º ión/composto soluble:	NaCl		0,05	mol/dm^3
Soluto na disolución que se engade:	AgNO_3			

En RESULTADOS móstranse cal precipitará primeiro e a concentración do aniión (Cl^-) do sal máis insoluble ao comezar a precipitar o sal que precipita en segundo lugar (Ag_2CrO_4).

Precipitación fraccionada	Para que precipite	Ag_2CrO_4	AgCl	
Precipita 1º AgCl	$[\text{AgNO}_3]_{\min}$	$4,47 \cdot 10^{-6}$	$3,40 \cdot 10^{-9}$	mol/dm^3
Ao empezar a precipitar Ag_2CrO_4	$[\text{Cl}^-] =$	$3,80 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$		

♦ Reaccións redox

Na pestana «Redox» pódense resolver exercicios de axuste de reaccións de oxidación redución e cálculos estequiométricos (cantidade, masa, volume de gas ou disolución, concentración ou pH) de reactivos ou produtos.

[Escribir as fórmulas](#) das substancias ou ións nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Produtos». **Escribir nas dúas primeiras celas** tanto de reactivos como de produtos **os que conteñen os elementos que cambian ou cambiaron de estado de oxidación**. No caso de que se forme auga, debe escribirse en último lugar.

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

- Pola acción do ácido HCl de riqueza 36 % en masa e densidade 1,19 g/cm³, o óxido de manganeso(IV) transfórmase en cloruro de manganeso(II), obténdose ademais cloro gasoso e auga.
 - Axusta as ecuacións iónica e molecular polo método do ión-electrón.
 - Calcula o volume de HCl que será necesario para obter 3 litros de cloro gasoso a 25 °C e 1 atm de presión.

(A.B.A.U. extr. 23)

Rta.: a) $2 \text{Cl}^- + \text{MnO}_2 + 4 \text{H}^+ \rightarrow \text{Cl}_2 + \text{Mn}^{2+} + 2 \text{H}_2\text{O}$; $4 \text{HCl} + \text{MnO}_2 \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$;
 b) $V(\text{HCl}) = 41,7 \text{ cm}^3$ (D).

[Borrar os datos.](#)

Reactivos				Produtos			
Calcular:							
necesarios							
para reaccionar con							
Rendemento		%					

Para ver o enunciado na mesma folia, selecciónalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premer sobre a cela da folia de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivo» ou «Producto», deixando a auga para o último lugar.

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Premer na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular», e elixir a opción «volume».

Ir pulsando a tecla [↵] (tabulador), para ir cara adiante, e premendo sobre as celas de cor laranxa para elixir as opcións deste exercicio, e escribindo os datos nas celas de cor branca.

Escribir 3 debaixo de «necesarios» e facer o mesmo cos datos do gas cloro.

Reactivos				Produtos			
HCl	MnO ₂			MnCl ₂	Cl ₂	H ₂ O	
Calcular:	volume	disolución	HCl	[HCl] =	36	% masa	
				Densidade	1,19	g/cm ³	
necesarios							
para obter							
	3	dm ³	gas	Cl ₂	P =	1	atm
Rendemento		%			T =	25	°C

En RESULTADOS móstranse as ecuacións iónica e global axustadas polo método do ión-electrón, e o volume de HCl necesario.

Axuste ión-electrón

Oxidación	2 Cl ⁻		- 2 e ⁻ →	Cl ₂		×1
Redución	MnO ₂	+ 4 H ⁺	+ 2 e ⁻ →	Mn ²⁺	+ 2 H ₂ O	×1
	2 Cl ⁻	+ MnO ₂	+ 4 H ⁺ →	Cl ₂	+ Mn ²⁺	+ 2 H ₂ O

Ecuación axustada:



$$n(\text{Cl}_2) = 0,123 \text{ mol}$$

$$n(\text{HCl}) = 0,490 \text{ mol}$$

$$V(\text{HCl}) = 41,7 \text{ cm}^3 (\text{D})$$

2. Dada a seguinte reacción: $\text{H}_2\text{S} + \text{NaMnO}_4 + \text{HBr} \rightarrow \text{S} + \text{NaBr} + \text{MnBr}_3 + \text{H}_2\text{O}$

a) Axusta a ecuación iónica polo método ión-electrón e escribir a ecuación molecular completa.

b) Calcula os gramos de NaMnO₄ que reaccionarán con 32 g de H₂S. Se se obtiveron 61,5 g de MnBr₃ calcule o rendemento da reacción.

(A.B.A.U. Xun. 21)

Rta.: a) $2 \text{S}^{2-} + (\text{MnO}_4)^- + 8 \text{H}^+ \rightarrow 2 \text{S} + \text{Mn}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$; $2 \text{H}_2\text{S} + \text{NaMnO}_4(\text{aq}) + 4 \text{HBr}(\text{aq}) \rightarrow 2 \text{S}(\text{s}) + \text{MnBr}_3(\text{aq}) + \text{NaBr}(\text{aq}) + 4 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$; b) $m(\text{NaMnO}_4) = 66,6 \text{ g}$. Rto. = 44,5 %.

[Borrar os datos](#). Copiar ([Ctrl]+[C]) o enunciado e [pegalo](#) na cela situada debaixo de «Problema».

[Escribir as fórmulas](#) das substancias nas celas de cor branca e bordo verde debaixo de «Reactivos» ou «Productos», deixando a auga para o último lugar.

Premar na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular», e elixir a opción «masa».

Pulsar a tecla [\leftarrow] (tabulador) dúas veces, premer para elixir a substancia «NaMnO₄».


Escribir 32 debaixo de «necesarios», pulsar a tecla [\leftarrow], escribir (ou elixir) a unidade (g), pulsar a tecla [\rightarrow] dúas veces, e premer para elixir a substancia (H₂S).

Reactivos			Productos			
H ₂ S	NaMnO ₄	HBr	S	MnBr ₃	NaBr	H ₂ O
Calcular:	masa	NaMnO ₄				
necesarios	para reaccionar con					
32 g		H ₂ S				
Rendemento	%					

En RESULTADOS móstranse as ecuacións iónica e global axustadas polo método do ión-electrón, e a masa de NaMnO₄ que reaccionará con 32 g de H₂S.

Oxidación	S ²⁻		- 2 e ⁻ →	S		×2
Redución	(MnO ₄) ⁻	+ 8 H ⁺	+ 4 e ⁻ →	Mn ³⁺	+ 4 H ₂ O	×1
	2 S ²⁻	+ (MnO ₄) ⁻	+ 8 H ⁺ →	2 S	+ Mn ³⁺	+ 4 H ₂ O

Ecuación axustada:



$$n(\text{H}_2\text{S}) = 0,939 \text{ mol}$$

$$n(\text{NaMnO}_4) = 0,469 \text{ mol}$$

$$m(\text{NaMnO}_4) = 66,6 \text{ g}$$

b) En DATOS, cambiar «masa» por «rendemento» r NaMnO₄ por MnBr₃, e escribir o valor (61,5) da masa obtida á súa dereita.

Calcular:	rendemento	MnBr ₃	m =	61,5 g
-----------	------------	-------------------	-----	--------

En RESULTADOS móstrase o rendemento da reacción

			Rendemento 44,6%	
n(H ₂ S) =	0,939 mol	n(MnBr ₃) =	0,469 mol	
		m(MnBr ₃) máx. =	138 g	

♦ Electrólise

Na pestana «Electrolise» pódense resolver exercicios de cálculos en procesos de electrólise:

- Cantidade, masa, volume de gas ou de disolución de reactivos ou produtos.
- Intensidade de corrente, carga ou tempo do proceso.

Alguns dos problemas de electrólise poden resolverse na pestana «Esteq».

[Escribir a fórmula](#), do ión ou da substancia, na primeira cela de cor branca e bordo verde debaixo da magnitude a calcular. No caso dos elementos, ten que indicar a carga do ión na seguinte cela.

En DATOS, escribir ou pegar ([Ctrl]+[Alt]+[↕]+[V]) os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e [elixir](#) as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Se o formato dun valor nunha cela de cor branca e bordo azul é estraño (por exemplo 1,00E-01), premer sobre a cela e pulsar ao tempo as teclas [Ctrl] e [M] para limpar o formato (verase 0,1).

- Realízase a electrólise dunha disolución de cloruro de ferro(III) facendo pasar unha corrente de 10 amperios durante 3 horas. Calcula:
 - Os gramos de ferro depositados no cátodo.
 - O tempo que tería que pasar a corrente para que no ánodo se desprendan 20,5 L de Cl_2 gas medidos a 25 °C de temperatura e 1 atm de presión.

(A.B.A.U. ord. 18)

Rta.: a) $m = 20,8 \text{ g Fe}$; b) $t = 4,5 \text{ h}$

[Borrar os datos.](#)

Calcular:	Masa	
Elemento, ión ou sal:		
Carga do ión:	$z =$	
Carga		C

Para ver o enunciado na mesma folla, selecciónalo na páxina de orixe e copialo ([Ctrl]+[C]).

Premer sobre a cela da folla de cálculo situada debaixo da etiqueta «Problema», e [pegar o enunciado](#).

[Escribir a fórmula](#) do ión (Fe^{3+}) ou da substancia (FeCl_3) na primeira cela de cor branca e bordo verde debaixo de «Masa».

En DATOS, [elixir](#) «Intensidade» en vez de «Carga», escribir o su valor (10) e elixir a unidade (A) na cela de cor laranxa situada a súa dereita.

Premer na cela de cor laranxa situada á dereita de «Calcular», e elixir a opción «Masa».

Ir pulsando a tecla [\rightarrow] (tabulador), para ir cara adiante, e premendo sobre as celas de cor laranxa, para elixir a unidade de tempo (h) e escribindo o seu valor (3) nas celas de cor branca.

Calcular:	Masa	
Íón:	Fe^{3+}	
Intensidade	$I =$	10 A
Tempo	$t =$	3 h

En RESULTADOS móstranse a reacción no cátodo e a masa de ferro depositada.

Cátodo:	$\text{Fe}^{3+} + 3 \text{e}^- \rightarrow$	Fe	
Cantidade:	1,12	0,373	mol
Masa	$m =$	20,8 g Fe	

Para o apartado b) premer sobre a cela de cor laranxa que contén «Masa» e cambiar pola opción «Tempo». Escribir debaixo a fórmula (Cl_2) do cloro e escribir a carga (-1) do ión de cloro na disolución (Cl^-).

Premer sobre a cela que contén «Intensidade» e cambiar pola opción «Volume de gas». Escribir os valores das magnitudes nas celas de cor branca correspondentes a elas, e elixir as unidades nas celas de cor laranxa situadas a súa dereita.

Calcular:		Tempo	
Elemento:		Cl ₂	
Carga do ión:	$z =$	-1	
Volume de gas	$V =$	20,5 L	
Presión	$p =$	1 atm	
Temperatura	$T =$	25 °C	
Intensidade	$I =$	10 A	

En RESULTADOS móstranse a reacción no ánodo e o tempo en segundos e en formato horas:minutos:segundos.

Ánodo:	$2 \text{ Cl}^- - 2 \text{ e}^- \rightarrow$	Cl ₂	
Cantidade:	1,68	0,838	mol
Tempo	$t =$	$1,62 \cdot 10^4 \text{ s}$	04:29:29

Actualizado: 03/11/24

Sumario

PROBLEMAS DE QUÍMICA DE 2.º DE BACHARELATO

Comezo.....	1
Teclado e rato.....	1
Datos.....	1
Cifras significativas e formato numérico.....	2
Fórmulas químicas.....	2
Como pegar o enunciado na folla de cálculo.....	3
Outros cálculos.....	3
Outros consellos.....	3
Tipos de problemas.....	4
Exemplos.....	4
Fórmula empírica e molecular.....	5
1. Determina:.....	5
2. A nicotina é un líquido completamente miscible en auga a temperaturas inferiores a 60 °C. Unha disolución de 1,921 g de nicotina en 48,92 g de auga conxela -0,450 °C. A nicotina contén 74,03 % de C; 8,70 % de H e o resto é N. Cal é a fórmula molecular da nicotina?.....	6
Disolucións.....	7
1. Indique o material, procedemento detallado e cálculos correspondentes necesarios para preparar no laboratorio 250 cm ³ dunha disolución de cloruro de sodio de concentración 0,50 mol/dm ³ a partir do produto sólido puro.....	7
2. Nunha botella de ácido clorhídrico concentrado figuran os seguintes datos: 36% en masa de HCl e densidade 1,18 g/mL. Calcula:.....	7
3. Tense un litro dunha disolución de ácido sulfúrico do 98 % de riqueza e densidade 1,84 g/cm ³ . Calcula:.....	8
4. Mestúranse 6,27 gramos de FeSO ₄ ·7H ₂ O con 85 gramos de auga. Determine a concentración da disolución resultante en:.....	9
5. Disólvense 22,5 g de hidróxido de sodio en 50,0 cm ³ de auga destilada a 4 °C. A densidade da disolución é de 1 340 kg/m ³ . Calcula a composición da solución en:.....	9
Estequiometría: cálculos en reaccións químicas.....	10
1. Para determinar a concentración dunha disolución de FeSO ₄ realízase unha valoración redox na que 18,0 cm ³ de disolución de KMnO ₄ de concentración 0,020 mol/dm ³ reaccionan con 20,0 cm ³ da disolución de FeSO ₄ . A reacción que ten lugar é:.....	10
2. Calcula:.....	11
3. Unha mostra comercial e impura de 0,712 g de carburo de calcio (CaC ₂) reacciona con exceso de auga producindo etino e hidróxido de calcio. Se o volume de etino (C ₂ H ₂) recollido a 25 °C e 0,98 atm (99,3 kPa) foi de 0,25 L:.....	12
4. Fanse reaccionar 5 mol de aluminio metal con cloruro de hidróxeno en exceso para dar tricloruro de aluminio e hidróxeno(g).....	12
5. Disólvense 3,0 g de SrCl ₂ en 25 cm ³ de auga e 4,0 g de Li ₂ CO ₃ noutros 25 cm ³ de auga. A continuación, mestúranse as dúas disolucións, levándose a cabo a formación dun precipitado do que se obteñen 1,55 g.....	13
6. Realízase a electrólise dunha disolución de cloruro de ferro(III) facendo pasar unha corrente de 10 amperios durante 3 horas. Calcula:.....	14
Lei de Hess.....	16
1. A partir das entalpías de combustión e aplicando a Ley de Hess, calcula:.....	16
2. Considere que a gasolina está composta por octano (C ₈ H ₁₈) e que no bioetanol o composto principal é o etanol (CH ₃ CH ₂ OH).....	17
Calorimetria.....	19
1. Calcula o valor da entalpía de neutralización de 100 cm ³ de disolución de HCl de concentración 2,0 mol/dm ³ con 100 cm ³ de disolución de NaOH de concentración 2,0 mol/dm ³ , expresado en kJ/mol, se o incremento de temperatura que se produce é de 12 °C.....	19
Equilibrio en fase gas.....	20
1. Para a reacción CO(g) + H ₂ O(g) ⇌ CO ₂ (g) + H ₂ (g), o valor de K _c = 5 a 530 °C. Se reaccionan 2,0 moles de CO(g) con 2,0 moles de H ₂ O(g) nun reactor de 2 L:.....	20

2. Nun recipiente pechado introdúcense 2,0 moles de CH_4 e 1,0 mol de H_2S á temperatura de 727°C , establecéndose o seguinte equilibrio: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CS}_2(\text{g}) + 4 \text{H}_2(\text{g})$. Una vez alcanzado o equilibrio, a presión parcial do H_2 é 0,20 atm e a presión total é de 0,85 atm. Calcula:.....	21
3. Nun recipiente de 250 mL introdúcense 0,45 gramos de $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ e quéntase ata 40°C , dissociándose o $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ nun 42 %. Calcula:.....	21
4. Ao quentar $\text{HgO}(\text{s})$ nun recipiente pechado no que se fixo o baleiro, disóciase segundo a reacción: $2 \text{HgO}(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{Hg}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$. Cando se alcanza o equilibrio a 380°C , a presión total no recipiente é de 0,185 atm. Calcula:.....	23
5. Considera o seguinte proceso en equilibrio a 686°C : $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$. As concentracións en equilibrio das especies son: $[\text{CO}_2] = 0,086 \text{ mol/dm}^3$; $[\text{H}_2] = 0,045 \text{ mol/dm}^3$; $[\text{CO}] = 0,050 \text{ mol/dm}^3$ e $[\text{H}_2\text{O}] = 0,040 \text{ mol/dm}^3$	24
Equilibrio ácido-base.....	25
1. Unha disolución de amoníaco de concentración $0,03 \text{ mol/dm}^3$ está dissociada nun 2,42 %. Calcula:....	25
2. Disólvense 46 g de ácido metanoico, HCOOH , en 10 dm^3 de auga, obtendo unha disolución de pH igual a 2,52.....	26
3. $1,12 \text{ dm}^3$ de HCN gas, medidos a 0°C e 1 atm, disólvense en auga obténdose 2 dm^3 de disolución. Calcula:.....	27
4. Para unha disolución acuosa de concentración $0,200 \text{ mol/dm}^3$ de ácido láctico (ácido 2-hidroxipropánoico), calcula:.....	28
Equilibrio de solubilidade.....	29
1. A solubilidade do hidróxido de manganeso(II) en auga é de $1,96 \text{ mg/L}$. Calcula:.....	29
2. O produto de solubilidade, a 20°C , do sulfato de bario é $8,7 \cdot 10^{-11}$. Calcula:.....	30
3. Dispónse dunha disolución que contén unha concentración de Cd^{2+} de $1,1 \text{ mg/dm}^3$. Quérese eliminar parte do Cd^{2+} precipitándoo cun hidróxido, en forma de $\text{Cd}(\text{OH})_2$. Calcula:.....	31
4. A cantidade máxima de sulfato de estroncio que se pode disolver en 250 mL de auga a 25°C é de 26,0 mg.....	32
5. Tense unha disolución acuosa de cromato de potasio e de cloruro de sodio, a unhas concentracións de $0,1 \text{ mol/dm}^3$ e $0,05 \text{ mol/dm}^3$, respectivamente. Engádesse unha disolución de nitrato de prata. Supoñendo que o volume non varía:.....	33
Reaccións redox.....	34
1. Pola acción do ácido HCl de riqueza 36 % en masa e densidade $1,19 \text{ g/cm}^3$, o óxido de manganeso(IV) transfórmase en cloruro de manganeso(II), obténdose ademais cloro gasoso e auga.....	34
2. Dada a seguinte reacción: $\text{H}_2\text{S} + \text{NaMnO}_4 + \text{HBr} \rightarrow \text{S} + \text{NaBr} + \text{MnBr}_3 + \text{H}_2\text{O}$	35
Electrólise.....	36
1. Realízase a electrólise dunha disolución de cloruro de ferro(III) facendo pasar unha corrente de 10 amperios durante 3 horas. Calcula:.....	36