

Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.


Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Centro, Boyacá

- Provincia ☐
- Centro
 - La Libertad
 - Lengupá
 - Marquez
 - Neira
 - Norte y Gutier...
 - Occidente
 - Oriente
 - Ricaurte Alto
 - Ricaurte Bajo
 - Sugamuxi
 - Tundama
 - Valderrama



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.



Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia La Libertad, Boyacá

- Provincia ▼
- ☐ Centro
 - ☒ La Libertad
 - ☐ Lengupá
 - ☐ Marquez
 - ☐ Neira
 - ☐ Norte y Gutier...
 - ☐ Occidente
 - ☐ Oriente
 - ☐ Ricaurte Alto
 - ☐ Ricaurte Bajo
 - ☐ Sugamuxi
 - ☐ Tundama
 - ☐ Valderrama



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.


Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.


Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Lengupá, Boyacá

- Provincia ▾
- Centro
 - La Libertad
 - Lengupá
 - Marquez
 - Neira
 - Norte y Gutier...
 - Occidente
 - Oriente
 - Ricaurte Alto
 - Ricaurte Bajo
 - Sugamuxi
 - Tundama
 - Valderrama



Temperatura mediana y máxima municipios en provincia



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.



Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Márquez, Boyacá

- Provincia ▾
- ☐ Centro
 - ☐ La Libertad
 - ☐ Lengupá
 - ☒ Marquez
 - ☐ Neira
 - ☐ Norte y Gutier...
 - ☐ Occidente
 - ☐ Oriente
 - ☐ Ricaurte Alto
 - ☐ Ricaurte Bajo
 - ☐ Sugamuxi
 - ☐ Tundama
 - ☐ Valderrama



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.


Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.


Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Neira, Boyacá

- Provincia
- Centro
 - La Libertad
 - Lengupá
 - Marquez
 - Neira
 - Norte y Gutier...
 - Occidente
 - Oriente
 - Ricaurte Alto
 - Ricaurte Bajo
 - Sugamuxi
 - Tundama
 - Valderrama



Temperatura mediana y máxima municipios en provincia



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.


Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera


Provincia

- ☐ Centro
- ☐ La Libertad
- ☐ Lengupá
- ☐ Marquez
- ☐ Neira
- ☒ Norte y Gutiérrez
- ☐ Occidente
- ☐ Oriente
- ☐ Ricaurte Alto
- ☐ Ricaurte Bajo
- ☐ Sugamuxi
- ☐ Tundama
- ☐ Valderrama

Provincia Norte y Gutiérrez, Boyacá



Temperatura mediana y máxima municipios en provincia



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.


Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.


Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Occidente, Boyacá

- Provincia
- Centro
 - La Libertad
 - Lengupá
 - Marquez
 - Neira
 - Norte y Gutier...
 - Occidente
 - Oriente
 - Ricaurte Alto
 - Ricaurte Bajo
 - Sugamuxi
 - Tundama
 - Valderrama



Temperatura mediana y máxima municipios en provincia



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.



Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Oriente, Boyacá

Provincia

- ☐ Centro
- ☐ La Libertad
- ☐ Lengupá
- ☐ Marquez
- ☐ Neira
- ☐ Norte y Gutier...
- ☐ Occidente
- ☒ Oriente
- ☐ Ricaurte Alto
- ☐ Ricaurte Bajo
- ☐ Sugamuxi
- ☐ Tundama
- ☐ Valderrama



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.


Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera


Provincia Ricaurte Alto, Boyacá

- Provincia ▼
- ☐ Centro
 - ☐ La Libertad
 - ☐ Lengupá
 - ☐ Marquez
 - ☐ Neira
 - ☐ Norte y Gutier...
 - ☐ Occidente
 - ☐ Oriente
 - ☒ Ricaurte Alto
 - ☐ Ricaurte Bajo
 - ☐ Sugamuxi
 - ☐ Tundama
 - ☐ Valderrama

Temperatura superficial mediana °C



Temperatura mediana y máxima municipios en provincia



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.



Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Ricaurte Alto, Boyacá

- Provincia
- Centro
 - La Libertad
 - Lengupá
 - Marquez
 - Neira
 - Norte y Gutier...
 - Occidente
 - Oriente
 - Ricaurte Alto
 - Ricaurte Bajo
 - Sugamuxi
 - Tundama
 - Valderrama



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.



Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Sugamuxi, Boyacá

- Provincia
- Centro
 - La Libertad
 - Lengupá
 - Marquez
 - Neira
 - Norte y Gutier...
 - Occidente
 - Oriente
 - Ricaurte Alto
 - Ricaurte Bajo
 - Sugamuxi
 - Tundama
 - Valderrama



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.



Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Tundama, Boyacá

- Provincia
- Centro
 - La Libertad
 - Lengupá
 - Marquez
 - Neira
 - Norte y Gutier...
 - Occidente
 - Oriente
 - Ricaurte Alto
 - Ricaurte Bajo
 - Sugamuxi
 - Tundama
 - Valderrama



Citación:

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis:
Alfonso rincón barrera

Provincia Valderrama, Boyacá

- Provincia
- ☐ Centro
 - ☐ La Libertad
 - ☐ Lengupá
 - ☐ Marquez
 - ☐ Neira
 - ☐ Norte y Gutier...
 - ☐ Occidente
 - ☐ Oriente
 - ☐ Ricaurte Alto
 - ☐ Ricaurte Bajo
 - ☐ Sugamuxi
 - ☐ Tundama
 - ☒ Valderrama