

Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Centro, Boyacá

Pr	ovincia $$
	Centro
	La Libertad
	Lengupá
	Marquez
	Neira
	Norte y Gutier.
	Occidente
	Oriente
	Ricaurte Alto
	Ricaurte Bajo
	Sugamuxi
	Tundama
	Valderrama

Dispersión temperatura superficial mediana y máxima (2001-2021abr) 42 40 **TempMax**°C Paya Pisba 36 34 32 ⁻ 26 27 28 29 30 31

TempMed °C

Citación:


Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia La Libertad, Boyacá



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.


El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Lengupá, Boyacá

Provincia	~
Centro	
La Libertad	
Lengupá	
Marquez	
Neira	
Norte y Gutie	r.
Occidente	
Oriente	
Ricaurte Alto	
Ricaurte Bajo	
Sugamuxi	
Tundama	
Valderrama	



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.


El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Márquez, Boyacá

Provincia 🗸
Centro
La Libertad
Lengupá
Marquez
Neira
☐ Norte y Gutier
Occidente
Oriente
Ricaurte Alto
Ricaurte Bajo
Sugamuxi
Tundama
Valderrama



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.


El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Neira, Boyacá

Provincia
Centro
La Libertad
Lengupá
Marquez
Neira
☐ Norte y Gutie
Occidente
Oriente
Ricaurte Alto
Ricaurte Bajo
Sugamuxi
Tundama
Valderrama




Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Norte y Gutiérrez, Boyacá



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.


El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Occidente, Boyacá

Provincia
Centro
La Libertad
Lengupá
Marquez
Neira
☐ Norte y Gutie
Occidente
Oriente
Ricaurte Alto
Ricaurte Bajo
Sugamuxi
Tundama
Valderrama



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.


El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Oriente, Boyacá

Provincia \vee
Centro
La Libertad
Lengupá
Marquez
Neira
Norte y Gutier
Occidente
Oriente
Ricaurte Alto
Ricaurte Bajo
Sugamuxi
Tundama
Valderrama




Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Ricaurte Alto, Boyacá




Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Ricaurte Alto, Boyacá



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.


El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Sugamuxi, Boyacá

Provincia
Centro
La Libertad
Lengupá
Marquez
Neira
Norte y Gutier
Occidente
Oriente
Ricaurte Alto
Ricaurte Bajo
Sugamuxi
Tundama
Valderrama



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.


El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Tundama, Boyacá

Provincia ~
Centro
La Libertad
Lengupá
Marquez
Neira
Norte y Gutier.
Occidente
Oriente
Ricaurte Alto
Ricaurte Bajo
Sugamuxi
Tundama
Valderrama



Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC) de la NASA.

El producto MOD11A2 V6 proporciona una temperatura de la superficie terrestre (LST) promedio de 8 días en una cuadrícula de 1200x1200.

Cada valor de pixel en MOD11A2 es un promedio simple de todos los pixeles LST de MOD11A1 correspondientes recopilados dentro de ese período de 8 días.

Se eligió el período de composición de 8 días porque el doble de ese período es el período exacto de repetición de la trayectoria terrestre de las plataformas Terra y Aqua.

Composición y análisis: Alfonso rincón barrera Provincia Valderrama, Boyacá

ovincia 💉
Centro
La Libertad
Lengupá
Marquez
Neira
Norte y Gutier
Occidente
Oriente
Ricaurte Alto
Ricaurte Bajo
Sugamuxi
Tundama
Valderrama