




میتودهای کلینیکی علی

متن کامل معاینات کلینیکی

داکتر الله یار فروتن



میتودهای کلینیکی علی

میتوذهای کلینیکی علی

متن کامل معاینات کلینیکی

تألیف

داکتر الله یار فروتن

۱۴۰۵ هجری شمسی

نام کتاب:

مؤلف: داکتر الله یار فروتن

نوبت چاپ: اول (۱۴۰۵)

سال نشر: ۱۴۰۵ هجری شمسی

شابک (ISBN): هنوز اخذ نگردیده است

© ۲۰۲۶ داکتر الله یار فروتن. تمام حقوق محفوظ است.

تمام شکل‌ها، شیمایا و نقشه‌های ذهنی این کتاب به صورت شیماتیک برای همین نسخه ترسیم شده‌اند؛ ECGها مصنوعی بوده و از مریض واقعی گرفته نشده‌اند. اندازه‌های نارمل مطابق رهنمودهای معتبر بین‌المللی (تا سال ۲۰۲۶) بازبینی گردیده‌اند.

این کتاب صرف برای مقاصد آموزشی تهیه گردیده است و جانشین قضاوت کلینیکی داکتر معالج نمی‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: اخذ تاریخچه ۱

تاریخچه مریض ۲

شکایات فعلی (Present Complaints) ۳

تاریخچه مرض فعلی (History of Present Illness) ۴

تاریخچه گذشته (Past History) ۹

تاریخچه شخصی (Personal History) ۱۰

تاریخچه خانواده‌گی (Family History) ۱۳

تاریخچه اجتماعی (Social History) ۱۳

یادداشت ۱۴

فصل دوم: عرض‌شناسی و استجواب ۱۵

تب (Fever) ۱۶

درد (Pain) ۱۷

عسرت تنفس (Dyspnea) ۲۰

سرفه (Cough) ۲۱

بلغم (Sputum) ۲۱

Hemoptysis ۲۲

استفراغ (Vomiting) ۲۲

اسهال (Diarrhea) ۲۲

اختلاج (Fits) ۲۳

ضعف (Weakness) ۲۴

سردردی (Headache) ۲۴

کتله (Mass) ۲۵

فصل سوم: معاینه مریض ۲۷

۲۸ معاینه فیزیکی عمومی

۵۱ معاینه سیستمیک (Systemic Examination)

فصل چهارم: معاینه سیستم تنفسی ۵۳

۵۳ فص‌ها و سگمنت‌های ریوی

۵۶ معاینه کلینیکی صدر

فصل پنجم: معاینه اکسری صدر ۸۵

فصل ششم: معاینه سیستم قلبی و وعایی ۹۷

۹۷ آناتومی سطحی قلب

۹۸ اعراض امراض قلبی و وعایی

۱۰۰ معاینه نبض شریانی

۱۰۸ فشار خون (Blood pressure)

۱۱۰ معاینه وریدهای عنق

۱۱۳ معاینه Precordium

۱۲۹ انواع مرمرها

۱۳۱ آفات دسامات

۱۳۵ تست‌ها برای تشخیص اروای ناکافی اطراف سفلی

۱۳۷ ارتباط علایم فیزیکی و امراض قلبی و وعایی

۱۳۹ امراض دسامی قلب چپ

۱۴۲ CARDIOMYOPATHY

۱۴۳ امراض ولادی قلب بدون سیانوز

۱۴۴ امراض ولادی قلب توأم با سیانوز

فصل هفتم: معاینه سیستم هضمی ۱۴۵

۱۴۵ اعراض امراض سیستم هضمی

۱۴۶ معاینه سیستم هضمی

فصل هشتم: معاینه سیستم حرکی ۱۸۳

۱۸۳ اخذ تاریخچه

۱۸۵ معاینه مفاصل

۱۸۷ سیستم ارزیابی سیستماتیک GALS

فصل نهم: معاینه سیستم عصبی ۱۸۹

۱۸۹ آناتومی سیستم عصبی

۱۹۴ اعراض امراض سیستم عصبی مرکزی

۱۹۴ معاینه فیزیکی سیستم عصبی مرکزی

فصل دهم: معاینه ولادی ۲۶۵

۲۶۵ تاریخچه

۲۶۶ فکتورهای ریسک

۲۶۷ تاریخچه دوائی

۲۶۷ تاریخچه گذشته

۲۶۷ تاریخچه خانواده‌گی

۲۶۷ تاریخچه ولادی

۲۶۸ معاینه کلینیکی

فصل یازدهم: معاینه نسایی ۲۸۱

۲۸۱ تاریخچه

۲۸۵ معاینه نسایی

فصل دوازدهم: معاینه اطفال ۲۸۹

۲۸۹ اخذ تاریخچه

۲۹۱ معاینه طفل

فصل سیزدهم: معاینه گوش، بینی و گلو ۲۹۷

۲۹۷ گوش

۳۰۹ بینى

۳۱۶ گلو

فصل چهاردهم: الکتروکاردیوگرافی (ECG) ۳۱۹

۳۱۹ الکتروفزیولوژی عضله قلبی

۳۲۰ انتقال سیاله قلبی

۳۲۰ محور قلبی (Cardiac axis)

۳۲۲ لیدها (Leads)

۳۲۴ ECG نارمل

۳۲۶ مطالعه سیستماتیک ECG

۳۲۸ اریتمی (Arrhythmia)

۳۴۱ انحراف محور (Axis deviation)

۳۴۳ هایپرتروفی بطنی (Ventricular hypertrophy)

۳۴۶ موج P

۳۴۸ انتروال PR

۳۴۸ موج Q

۳۴۸ کمپلکس QRS

۳۴۹ سگمنت ST

۳۵۰ موج T

۳۵۰ اروای دموی قلب

۳۶۱ حالات متفرقه

ضمیمه: اندازه‌های نارمل لابراتواری ۳۶۸

۳۶۸ Blood

۳۷۰ Hematology

۳۷۱ Absolute values

۳۷۱ CSF

፳፻፲ Urine
፳፻፲ Stool
፳፻፲ Semen



فصل اول

اخذ تاریخچه

تشخیص درست مستلزم سه چیز اساسی است:

۱. تاریخچه جامع مریض
۲. معاینه درست و مکمل مریض
۳. معاینات لابراتواری

تاریخچه مریض

تاریخچه مریض

معلومات شخصی: اسم، سن، جنس، شغل، آدرس	شکایات فعلی (به ترتیب زمان)
تاریخچه مرض فعلی (۳ پاراگراف)	تاریخچه گذشته
تاریخچه شخصی: شغل، غذا، تنباکو، خواب...	تاریخچه خانواده‌گی
تاریخچه اجتماعی	تاریخچه تداوی/دوایی

نقشه ذهنی ۱.۱: اجزای تاریخچه مریض

هنگام اخذ تاریخچه، معلومات ابتدایی ذیل باید ثبت گردد:

◆ اسم

اسم مریض جهت معرفت و برقراری ارتباط با وی پرسیده می‌شود.

◆ سن

تفصیل اهمیت سن در فصل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد.

◆ جنس

تفصیل اهمیت جنس در فصل سوم مورد بحث قرار می‌گیرد.

◆ دین

چانس ابتلاء به سرطان قضیب در نزد مسلمان‌ها و یهودی‌ها، به سبب انجام ختنه در مراحل مقدم طفولیت، بسیار نادر است.

◆ شغل

شغل مریض در تاریخچه شخصی به صورت مفصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

◆ آدرس

بعضی امراض در مناطق خاص اندیمیک می‌باشند؛ بنابراین آدرس مریض باید همیشه به صورت مفصل ذکر گردد.



شکایات فعلی (Present Complaints)

شکایاتی که مریض را واداشته است تا نزد داکتر مراجعه نماید، تحت این عنوان ذکر می‌گردند.

شکایات باید به ترتیب زمان وقوع آن‌ها نوشته شوند؛ یعنی در نخست شکایت با دوام بیشتر و سپس شکایت با دوام کمتر ذکر گردد. هر شکایت باید در یک سطر نوشته شود.

مثال:

- تب - ۷ روز
 - سرفه - ۵ روز
 - بلغم - ۲ روز
 - موجودیت خون در بلغم - ۱ روز
- بهتر است حالات مترافقه هر شکایت نیز با آن یکجا ذکر گردد. به گونه مثال، به عوض نوشتن «تب برای ۵ روز»، اگر «تب با لرزه برای ۵ روز» نوشته شود، در تشخیص کمک‌کننده است و می‌تواند در مورد تشخیص یک مفکوره ایجاد نماید. بعضاً اعراض به صورت متقطع سیر می‌نمایند. به طور مثال، در استما عسرت تنفس به صورت متقطع موجود می‌باشد. در این صورت باید به گونه ذیل نوشته شود:

- تاریخچه عسرت تنفس متقطع - ۱ سال
- تاریخچه سرفه با بلغم - ۶ ماه



تاریخچه مرض فعلی (History of Present Illness)

تاریخچه مرض فعلی باید در سه پاراگراف نوشته شود.

♦ پاراگراف اول

در این بخش تفصیل هر شکایت به ترتیب زمان وقوع آن پرسیده می‌شود. چون مریضان فاقد دانش مسلکی هستند و نمی‌توانند وضعیت خود را به صورت کامل تشریح نمایند، بناءً وظیفه معاینه‌کننده است تا سوالات را طوری مطرح نماید که تفصیل مکمل هر عرض حاصل گردد.

هنگام نوشتن تاریخچه، دو مورد ذیل باید به خاطر داشته شوند:

۱. از سوال‌های تلقینی و رهنمایی‌کننده استفاده نکنید.
۲. از اصطلاحات مسلکی استفاده نکنید؛ بلکه همیشه تاریخچه را به زبان خود مریض بنویسید.

ارزیابی شدت اعراض

سوال‌های ذیل در دانستن شدت اعراض کمک‌کننده می‌باشند:

- شما چقدر مسافه را قدم زده می‌توانید؟ آیا می‌توانید در زمینه‌ها بدون توقف بالا بروید؟ آیا کارهای روزمره خانه‌تان را به درستی انجام داده می‌توانید؟
- آیا وظیفه‌تان را انجام می‌دهید؟ اگر جواب نخب باشد، چرا؟
- آیا این اعراض غذا خوردن‌تان را متأثر می‌سازد؟ آیا در زمان صرف طعام با کدام مشکل مواجه می‌شوید؟
- آیا فعالیت‌های نارمل اجتماعی و جنسی‌تان برهم خورده‌اند؟
- خواب‌تان چگونه است؟

توضیح اعراض خاص

هنگام تشریح یک عرض، نکات عمومی ذیل باید در نظر گرفته شوند:

۱. مدت عرض

باید با سوال‌های مناسب در مورد مدت عرض معلومات حاصل گردد.

از مریض پرسیده شود:

«آیا شما قبل از این زمان سالم بودید؟»

۲. طرز شروع

طرز شروع مرض باید از مریض پرسیده شود.

آیا عرض به صورت آئی آغاز شده یا به صورت تدریجی؟

۳. دوام عرض

باید پرسیده شود که آیا عرض از زمان آغاز آن تا حالا متداوم بوده یا دارای وقفه‌های بدون عرض بوده است.

طول زمانی این وقفه‌ها نیز باید پرسیده شود.

اگر مرض دارای سلسله‌ای از «حملات» باشد، در آن صورت لازم است طرز شروع، سیر، مدت، طرز تخفیف و اثرات بعدی هر حمله پرسیده شود.

۴. عوامل تغییردهنده عرض

از مریض باید در مورد عواملی که سبب تشدید یا تخفیف اعراض می‌شوند پرسیده شود.

به طور مثال، موجودیت درد در صدر که با جهد تشدید شود و با استراحت تخفیف شود، دلالت به مرض اسکیمیک قلب می‌کند.

موجودیت درد در ناحیه اپی‌گستریک که با نوشیدن شیر بهبود یابد، دلالت به قرحه پپتیک می‌نماید؛ در حالی که اگر همین درد با گرفتن شیر تشدید شود، دلالت به التهاب کیسه صفراء می‌کند.

۵. پدیده‌های مترافقه

از مریض پرسیده شود که آیا کدام عرض دیگر را که مترافق با اعراض عمده وی باشد تجربه نموده است؟

به گونه مثال، اگر به تعقیب حملات درد در قسمت علوی راست بطن، چشمان مریض زردرنگ شوند، دلالت به تشوش کبد یا طرق صفراوی می‌نماید.

موجودیت درد در ناحیه قطنی که توسط hematuria، یعنی موجودیت خون در ادرار، تعقیب گردد، دلالت به مرض کلیوی می‌نماید.

۶. پیشرفت عرض

یکی از بخش‌های مهم تاریخچه، پرسیدن در مورد پیشرفت عرض است؛ یعنی آیا عرض شدیدتر شده یا به عین ماهیت ابتدایی خود باقی مانده است. تشدید عرض نشان‌دهنده پیشرفت مرض است که سبب آسیب عضو مأووفه شده است.

به طور مثال، اگر شخص در آغاز مرض با جهد متوسط نفس‌تنگ می‌گردید، اما در حال حاضر نفس‌تنگی وی به حدی شدت کسب نموده که حتی در حال استراحت نیز به وی عاید می‌گردد، واضحاً دلالت به تخریب بیشتر انساج ریوی و قلبی می‌نماید.

به همین صورت، اگر زردی چشم‌ها بیشتر شده باشد، دلالت به تشدید تخریب کبد یا انسداد طرق صفراوی می‌نماید.

اشارات و حرکات مریض هنگام صحبت

اشارات و حرکات مریض را در موقع تشریح شکایات زیر نظر داشته باشید؛ زیرا در مورد مرض معلومات مهم کلینیکی فراهم می‌نماید.

- هنگام تشریح درد صدری، اگر مریض دست خود را مشت نموده بالای قدام صدر فشار دهد، نشان‌دهنده درد قلبی، یعنی خناق (angina) یا احتشای مایوکارد (myocardial infarction)، است.
- قرار دادن دست‌ها در ناحیه قطنی و فشردن آن، نشان‌دهنده کولیک کلیوی است.

- مالیدن sternum نشان‌دهنده دلجوشی (GERD) است.

- مالیدن سرین و ران‌ها نشان‌دهنده sciatica است.

- به هم فشردن بازوها در اطراف بطن نشان‌دهنده کولیک معایی است.

♦ پاراگراف دوم

در این پاراگراف سوالات وابسته با اعراض به تفصیل پرسیده می‌شوند تا در مورد امراض احتمالی که داکتر در مورد آن مفکوره گرفته است، معلومات واضح حاصل شود.

این سوالات پرسیده می‌شوند تا نکاتی که از مریض در مورد مرض‌اش فراموش گردیده است، حاصل شوند. به این صورت بعضی از امراض رد شده و برای داکتر آسان می‌شود تا به یک تشخیص احتمالی برسد.

به گونه مثال، مریض از پولی‌یوریا (polyuria) شکایت می‌کند. پرسیدن سوالات ذیل برای رسیدن به تشخیص کمک‌کننده‌اند:

- تأخیر التیام زخم‌ها
- تکرر انتانات جلدی
- ضیاع وزن
- اختلال دید
- خارش ناحیه عجان اگر خانم باشد

با در نظر داشت تفصیلات فوق، معاینه‌کننده به این نتیجه می‌رسد که ممکن شخص معاینه‌شونده مصاب diabetes mellitus باشد. در این صورت، امراض دیگری که سبب پولی‌یوریا می‌شوند، رد شده می‌توانند.

معلومات خاص

مریض ممکن از گفتن برخی از علایم مرض ابا ورزد و آن را بی‌ارزش تلقی کند. در این صورت داکتر باید سوالات مربوط به علایم عمده امراض سیستمیک را مطرح نماید؛ یعنی سوالاتی در مورد امراض سیستم‌های قلبی و وعایی، هضمی، تنفسی، بولی یا عصبی مرکزی پرسیده شوند.

شکایات عمده سیستم تنفسی:

- سرفه
- بلغم
- موجودیت خون در بلغم (hemoptysis)
- عسرت تنفس
- ناراحتی یا درد صدري
- Wheezing

شکایات عمده سیستم قلبی و وعایی:

- ناراحتی یا درد صدري
- عسرت تنفس (dyspnea)
- تپش قلبی (palpitation)
- اذیمای اطراف سفلی
- سنکوپ / گیچی

شکایات عمده سیستم هضمی:

- دلجوشی / سوء هضم / توسع بطنی
- درد بطنی
- دلبدی، استفراغ
- موجودیت خون در استفراغ (hematemesis)
- melena: مواد غایطه سیاه‌رنگ از سبب خونریزی طرق معدی معایی علوی
- اسهال / قبضیت
- زردی (jaundice)
- عسرت بلع (dysphagia)

شکایات عمده سیستم حرکی:

- درد یا شخی مفاصل
- درد یا شخی کمر
- تورم مفاصل
- مشکلات در حرکات؛ یعنی اشکال در قدم زدن، نشستن، ایستادن، تدور رأس، خم شدن و غیره

شکایات عمده سیستم بولی:

- سوزش هنگام تبول (dysuria)
- درد فلانک
- Hematuria

- مشکلات در تبول؛ مانند توقف ادرار، قطره‌قطره آمدن ادرار و غیره
- دفع ادرار کم (Oliguria)
- دفع ادرار بیش از اندازه (Polyuria)
- افزایش فرکانس؛ یعنی افزایش تعداد دفعات رفتن به تشناب برای تبول
- دفع سنگ در ادرار

شکایات عمده سیستم عصبی مرکزی:

- سردردی
- سنکوپ / گیچی / سرچرخی
- شخی
- ضعف یک قسمت از بدن
- ضیاع شعور
- کرختی و خارش یک قسمت از بدن

♦ پاراگراف سوم: تاریخچه تداوی (Treatment History)

تاریخچه تداوی تفصیل تداوی‌های قبلی را در بر می‌گیرد و همچنان به داکتر کمک می‌نماید تا به تشخیص احتمالی برسد.

به گونه مثال، مریض از تب شکایت دارد و قبلاً chloroquine اخذ نموده، اما بهبود نیافته است؛ این وانمود می‌نماید که شخص مذکور به احتمال زیاد مصاب ملاریا نیست.

تاریخچه فرط حساسیت دوايي، خصوصاً با penicillin و ادویه sulpha، باید پرسیده شود.



تاریخچه گذشته (Past History)

تاریخچه گذشته نباید با اعراض مقدم مرض فعلی مغالطه شود. نکات ذیل باید هنگام اخذ تاریخچه گذشته مریض در نظر باشند:

- هر تاریخچه مرض وابسته در گذشته؛ مثلاً در تضیق پیلورس، در مورد تاریخچه قرحه پیپتیک بپرسید.
- امراض دوران طفولیت از قبیل تب روماتیک (rheumatic fever)، کله‌چرک (mumps)، سیاه سرفه (whooping cough)، سرخکان (measles) و توبرکلوز ابتدایی ریوی نیز باید پرسیده شوند.
- در مورد ترضیض، تصادم، جراحی، سفرها و تسمم باید پرسیده شود.
- تاریخچه طبی سابقه خاص، مثلاً diabetes mellitus، یرقان، استمء، توبرکلوز، فرط فشار خون، امراض قلبی و صرع (epilepsy)، باید اخذ گردد.
- تاریخچه بستری شدن مریض در شفاخانه.
- تاریخچه عملیات جراحی و تصادم.



تاریخچه شخصی (Personal History)

در این رابطه باید موضوعات ذیل پرسیده شوند:

◆ شغل مریض

در مورد شغل فعلی و همچنان شغل قبلی مریض پرسیده شود. مهم است تا شرایط کاری وی نیز ملاحظه گردد؛ زیرا امراض خاص از قبیل توبرکلوز، انترکس، استما و امراض جلدی با مشاغل خاص ارتباط دارند.

مثال‌ها:

- سیاه زخم (anthrax) در نزد اشخاصی که با پوست حیوانات سروکار دارند.
- Asthma در نزد اشخاصی که در کارخانه‌های تولید ظروف سفالی کار می‌کنند.
- فیصدی واقعات استما در میان آشپزان و بافنده‌گان نسبتاً بلند است.
- امراض جلدی در نزد کارگرانی که در معرض تشعشعات، مواد کیمیای و مخرشات دیگر قرار دارند، شایع‌اند.

- Silicosis ریه‌ها در نزد اشخاصی که در کارخانه‌ها و معادن کار می‌کنند، معمول است.
- مرض ریه دهقان (farmer's lung) به سبب معروضیت به گرد و خاک به میان می‌آید. این مرض در نزد اشخاصی که در دهات زنده‌گی می‌کنند، بیشتر دیده می‌شود.
- کرسینومای مثانه در نزد اشخاصی دیده می‌شود که در کارخانه‌های تولید رابر، مواد کیمیاوی و کیبل‌ها کار می‌کنند و معروض به امین‌های اروماتیک هستند.

♦ زمان و ترتیب صرف طعام

مقدار غذا، تنوع غذاها و شیوه صرف طعام باید پرسیده شود؛ یعنی آیا درست پخته شده یا خیر؟ آیا به اندازه کافی جویده می‌شود یا با عجله بدون جویدن کافی بلع می‌شود؟

تمام این یافته‌ها معلومات مهمی را در مورد امراض هضمی می‌دهد.

♦ اخذ تنباکو، الکول یا دخانیات دیگر

سگرت کشیدن در بروز امراض ذیل نقش بارز دارد:

- کارسینومای قصبات
 - اختلالات وعایی (مرض Buerger)
 - امراض اسکیمیک قلب
- از مریضان معتاد باید در مورد نحوه استفاده از تنباکو، سگرت، سیگار یا پایپ پرسیده شود. کیفیت و مدت هر کدام باید پرسیده شود.
- در مورد سگرت از اصطلاح «تعداد قوطی‌ها در سال» یا pack years استفاده می‌شود که توسط فورمول ذیل محاسبه می‌شود:
- ۲۰ سگرت = یک قوطی (pack)
- تعداد قوطی‌ها در سال = (تعداد سگرت‌ها در روز ÷ ۲۰) × تعداد سال‌ها
- اشخاص معتاد به تریاک مصاب به نوع شدید قبضیت می‌باشند.

الکول

الکول در بروز امراض ذیل نقش دارد:

- liver cirrhosis
- neuropathies
- pancreatitis
- psychoneurosis

وابستگی به الکول توسط سوالات CAGE ارزیابی می‌شود:

- آیا کدام وقتی در مورد قطع (cut) الکول فکر کرده‌اید؟
 - آیا بالای شخصی که به خاطر اخذ الکول به شما انتقاد می‌کند، قهر می‌شوید؟ (angry)
 - آیا در اخذ الکول احساس گناه (guilt) می‌کنید؟
 - آیا از طرف صبح می‌نوشید؟ (بازکننده چشم‌ها یا eye opener)
- دو یا بیشتر از دو جواب مثبت نشان‌دهنده مشکل‌ساز بودن نوشیدن الکول است.

♦ خواب

در مورد کیفیت خواب مریض باید پرسیده شود.

- آیا خواب آرام‌بخش و نشاط‌آور است یا خیر؟
 - آیا مریض کابوس‌ها و رؤیاهای وحشتناک را در خواب می‌بیند یا خیر؟
 - از مریض باید در مورد اخذ ادویه خواب‌آور پرسیده شود.
- تشوشت خواب در حالت اضطراب و psychosis معمول است.

♦ تاریخچه جنسی

- آیا مریض متأهل است یا مجرد؟
- تاریخچه جنسی در ارزیابی psychoneurosis اهمیت ویژه دارد. تاریخچه روابط جنسی باید اخذ گردد تا امراض تناسلی رد شوند.
- از خانم باید همیشه تاریخچه عادت ماهوار اخذ شود.

♦ تاریخچه سفرهای خارجی

در ارزیابی امراضی که در مناطق خاص شیوع دارند، اهمیت دارد. مثلاً Leishmaniasis (بنگلادیش)، AIDS، Bilhariasia (مصر) و تب زرد (ممالک افریقایی).



تاریخچه خانواده‌گی (Family History)

در مورد تعداد اعضای خانواده، شامل اناث و ذکور، و صحت‌شان باید پرسیده شود. در واقعات مشکوک به امراض ارثی یا خانواده‌گی از قبیل hemophilia، تأخر عقلی و myopathy، نیاز به گرفتن تاریخچه خانواده‌گی کامل است. امراض دیگری چون دیابت، فرط فشار خون، صرع، امراض کلیوی و قلبی-وعایی و تب روماتیک نیز زمینه خانواده‌گی دارند که باید در نظر باشند. توبرکلوز در کشور ما بسیار شایع است؛ لذا هر واقعه آن باید در هر خانواده جستجو شود.



تاریخچه اجتماعی (Social History)

معلومات مفصل در مورد محیط اجتماعی مریض باید اخذ گردد. سلوک وی با رفقا، خویشاوندان و سایر اشخاصی که وی به تماس‌شان است باید پرسیده شود؛ زیرا تاریخچه اجتماعی در تشخیص اختلالات روانی اهمیت زیاد دارد.



یادداشت

قبل از معاینه، داکتر باید به صورت مختصر تاریخچه و شکایات را با مریض مرور نماید تا:

۱. هر چیزی که نادرست است تصحیح شود.
 ۲. هر چیزی که فراموش شده به خاطر آورده شود.
- سپس به مریض در مورد اجراءات بعدی، که معاینه فیزیکی است، معلومات داده شود.





فصل دوم

عرض‌شناسی و استجواب

اکثر مریضان که به وارد داخله مراجعه می‌نمایند، دارای اعراض ذیل می‌باشند:

- تب
- درد
- عسرت تنفس
- سرفه
- استفراغ
- اسهال
- اختلاج
- ضعف
- سردردی
- کتله

جهت تشریح کامل یک عرض، داکتر باید پرسش‌های وابسته به شکایات مریض را مطرح نماید.

این عمل در دانستن تفصیلات اعراض مهم پنداشته می‌شود و بدین وسیله گذاشتن یک تشخیص مناسب امکان‌پذیر می‌شود.

یادداشت: مدت هر عرض باید قبل از پرسیدن تفصیلات سایر اعراض پرسیده شود.



تب (Fever)

- طرز شروع تب چگونه است؛ آنی است یا تدریجی؟
- آیا تب مترافق با لرزه و تعرق است؟
- درجه تب چگونه است؛ بلند است یا پایین؟
- دوام تب چگونه است؛ آیا متداوم، متقطع یا remittent است؟
- آیا تب با کدام شکایت دیگر از قبیل استفراغ، اسهال، درد بطنی، درد صدري، hematuria، سردردی، زردی یا hemoptysis مترافق است؟



درد (Pain)



در ارزیابی درد، نکات ذیل باید پرسیده شوند:

♦ محل درد

محل درد در کجا قرار دارد؟

♦ مدت

مدت دوام آن چقدر است؟

♦ دوام

متداوم است یا متقطع؟

مثلاً درد متداوم ناحیه اپی‌گستریک یک تظاهر التهاب معده (gastritis) است؛ در حالی که اگر درد همین ناحیه به شکل متقطع باشد، دلالت به قرحه اثناعشر می‌کند.

♦ موضعی یا منتشر

آیا درد موضعی است یا منتشر؟

♦ انتشار درد

آیا درد انتشار دارد؟ اگر چنین است، به کدام سمت؟

- درد طرف چپ صدر که به شانه چپ انتشار نماید، نشان‌دهنده مرض اسکیمیک قلب است.
- درد فلانک‌ها که به طرف خصایص (تستیکول‌ها) انتشار نماید، تظاهر درد حالبی (سنگ حالب) است.

♦ درد راجعه (Referred Pain)

درد ناحیه هایپوکاندیریم راست که به نوک شانه راست رجعت نماید، دلالت به درد کیسه صفرا (cholecystitis) می‌کند.

♦ وصف درد

دردها می‌توانند دارای اوصاف ذیل باشند:

- سوزنده
- مانند خنجر زدن یا فشردن
- سنگین
- پاره‌کننده
- گنگ
- کولیکی
- تپشی

♦ تغییر مکان درد (Shifting of Pain)

درد التهاب اپندکس (appendicitis) ابتداء در اطراف سره احساس می‌شود، سپس به حفره حرقی راست (RIF) تغییر موقعیت داده و در آنجا توضع می‌نماید.

♦ شدت درد

شدت درد چگونه است؛ شدید، متوسط یا خفیف؟

♦ عوامل تشدیدکننده

کدام عوامل سبب تشدید درد می‌شوند؟

- درد صدري که با جهد تشدید شود، نشان‌دهنده درد اسکیمیک قلب است.
- درد قسمت علوی بطن که با اخذ شیر تشدید شود، نشان‌دهنده التهاب کیسه صفرا (cholecystitis) است.
- درد صدري که با تنفس و سرفه تشدید شود، نشان‌دهنده pleurisy است.

♦ عوامل تخفیف‌دهنده

کدام عوامل سبب برطرف شدن درد می‌شوند؟

- درد صدري که با استراحت برطرف شود، نشان‌دهنده مرض اسکیمیک قلب است.
- درد اپی‌گستریک که با گرفتن انتی‌اسید برطرف شود، نشان‌دهنده قرحه معدی است.

♦ اعراض مترافقه

آیا درد با کدام عرض دیگر مترافق است؟

- درد در اپی‌گستریک که با hematemesis مترافق باشد، دلالت به قرحه پپتیک و اگر با زردی همراه باشد، دلالت به امراض کبدی می‌نماید.
- درد ناحیه قطنی که توأم با hematuria باشد، دلالت به مرض کلیوی (سنگ کلیه) می‌نماید.

♦ ارزیابی درد

شدت درد توسط مقیاس عددی یا مقیاس دیداری ارزیابی شده می‌تواند.

مقیاس عددی

از مریض خواسته می‌شود تا به درد خود یک شماره را از صفر الی ۱۰ انتخاب نماید. صفر عدم موجودیت درد را نشان می‌دهد، در حالی که عدد ۱۰ بدترین درد، مانند درد ولادت یا احتشای مایوکار، را نشان می‌دهد.

مقیاس دیداری

به مریض یک خط که ۱۰ سانتی‌متر طول دارد ترسیم می‌شود که سمت چپ آن حالت بدون درد و سمت راست آن درد شدید را نشان می‌دهد. از مریض خواسته می‌شود تا اندازه شدت درد خود را در آن نشان دهد.

ارزیابی شفاهی

به صورت شفاهی نیز از مریض خواسته می‌توانیم تا درد خود را به صورت نبودن درد، خفیف بودن، متوسط بودن، شدید بودن یا بسیار شدید بودن توصیف کند.



عسرت تنفس (Dyspnea)

- محیط‌هایی که در آن عسرت تنفس به وجود می‌آید کدام‌ها اند؛ یعنی بعد از تمرینات، در هنگام جهد یا در حالت استراحت (orthopnea)؟
- اگر بعد از جهد به وجود می‌آید، درجه جهد به کدام اندازه است؛ شدید، متوسط یا خفیف؟
- آیا عسرت تنفس به صورت آنی تظاهر می‌نماید (اذیمای ریوی، استما) یا به صورت تدریجی (امراض پیشرفته صدری یا قلبی)؟
- وصف تنفس چگونه است؟ آیا سریع است، توأم با wheeze است یا با سایر مشکلات همراه است؟
- درجه distress چقدر است؟ آیا مریض در زمان حمله عسرت تنفس به زمین می‌افتد؟ (dyspnea syncope)
- آیا عسرت تنفس با سرفه، تعرق یا palpitation مترافق است (استمای قلبی)؟

- آیا مریض در بین حملات بدون اعراض است (asthma)؟



سرفه (Cough)

- تکرر سرفه؟
- شدت سرفه‌ها چقدر است؛ شدید، متوسط یا خفیف؟
- آیا سرفه در یک وقت خاص روز یا شب به میان می‌آید؟ آیا فصلی است؟
- آیا سرفه تحت کدام شرایط خاص تشدید می‌شود؟ سرفه‌ای که با خاک، گرد یا حتی دیدن بعضی اشیای خاص ارتباط داشته باشد، نوع الرژیک سرفه است.
- آیا سرفه با wheeze همراه است؟ در asthma و chronic bronchitis همراه با wheeze موجود می‌باشد.
- سرفه گاوی (bovine cough) سرفه‌ای است که با خشن شدن آواز مترافق می‌باشد. در فلج حبول صوتی به میان می‌آید.
- آیا سرفه خشک است یا همراه با بلغم؟ سرفه خشک اکثراً به سبب انتانات طرق تنفسی علوی، acute bronchitis و asthma به میان می‌آید.



بلغم (Sputum)

- اگر بلغم موجود باشد، باید مقدار، وصف، بو و رنگ آن ارزیابی شود.
۱. مقدار ممکن زیاد، به اندازه یک گیللاس چای‌خوری، یا کم، به اندازه یک قاشق چای‌خوری، باشد.
 ۲. وصف تقشع می‌تواند سیروزی، مخاطی، قیچی یا مخاطی-قیچی باشد. ممکن رنگ‌شده با خون یا به رنگ زنگ باشد.
 ۳. بو تقشع می‌تواند متعفن باشد؛ مثلاً در آبسه ریوی یا bronchiectasis.

۴. **رنگ** رنگ تقشع می‌تواند سفید، زرد، سبز یا خون‌آلود باشد.
تقشع زرد و سبز در آبسه ریوی و bronchiectasis دیده می‌شود.



Hemoptysis

موجودیت خون در بلغم به نام hemoptysis یاد می‌شود.
تمام سوالاتی که تحت عنوان تقشع تذکر یافت، در این بخش نیز پرسیده شوند.



استفراغ (Vomiting)

- تکرر آن چگونه است؟
- آیا با جهد خارج می‌شود یا به شکل فورانی است (meningitis)؟
- ارتباط بین غذا و استفراغ چگونه است؟
- آیا با کدام مقطع زمانی خاص ارتباط دارد؟ (از طرف صبح در حاملگی)
- مقدار، بو، رنگ و محتوای استفراغ پرسیده شود.
- آیا خون در استفراغ موجود است؟ اگر چنین است، رنگ و مقدار آن پرسیده شود.
- آیا کدام عرض مترافقه، مثلاً درد اپی‌گستریک، موجود است؟



اسهال (Diarrhea)

- آیا اسهال متداوم است یا متناوب؟ اگر متناوب است، مدتی که مریض در آن بدون اعراض است چقدر است؟
- تکرر تغوط روزانه به کدام اندازه است؟

- رنگ، مقدار و محتویات مواد غایطه پرسیده شود.
- آیا اسهال با مخاط یا خون یکجا است؟ اگر خون موجود است، رنگ آن چگونه است؛ سرخ یا سیاه؟ آیا خون با مواد غایطه مخلوط است یا جدا؟
- آیا اسهال با اعراض دیگری از قبیل استفراغ، درد بطنی، تب و ضیاع وزن مترافق است؟
- آیا تاریخچه اخذ کدام غذا قبل از اسهال موجود است؟ (تسمم غذایی)
- آیا تاریخچه اسهال در اشخاصی که در مجاورت مریض زنده‌گی می‌کنند وجود دارد؟ (تسمم غذایی اپیدیمیک)
- آیا تاریخچه tenesmus (تغوط کاذب) موجود است؟



اختلاج (Fits)

- ماهیت اختلاج چگونه است؛ موضعی یا عمومی؟
- تکرر و مدت هر اختلاج چقدر است؟
- آیا ضیاع شعور نیز با آن مترافق است؟
- آیا تاریخچه سقوط یا صدمه در اثنای حمله موجود است؟
- آیا تاریخچه ضیاع کنترل معصرات، یعنی تغوط و تبول بدون اختیار در اثنای حمله، موجود است؟
- آیا کدام عرض مترافقه دیگری از قبیل گزیدن زبان، جمع شدن کف در دهن، انحراف کره‌های چشم نیز موجود است؟
- تمام این اعراض دلالت به epilepsy می‌نماید.
- آیا aura موجود است؟



ضعف (Weakness)

- طرز آغاز ضعف چگونه است؛ آتی است یا تدریجی؟ اگر تدریجی است، مدت آن پرسیده شود.
- وسعت ضعف پرسیده شود؛ موضعی یا عمومی؟
- اگر موضعی است، کدام قسمت بدن مصاب است؛ یک دست، یک پا (monoplegia)، هر دو پا (paraplegia)، یک نصف بدن (hemiplegia) یا نصف وجه (facial palsy)؟
- درجه ضعف چگونه است؟ تفصیل در فصل معاینه سیستم عصبی مرکزی.
- آیا اعراض مترافقه دیگری از قبیل ضیاع شعور، تب، سردردی، شخی گردن، ضیاع حسیت یا رعشه (tremor) نیز موجود است؟
- آیا تاریخچه صدمه رأس یا تب در گذشته موجود است؟
- در کدام مقطع زمانی مریض احساس ضعف می‌کند؛ در حال استراحت یا بعد از فعالیت‌های عضلی درازمدت؟



سردردی (Headache)

- وصف درد چگونه است؛ گنگ، پرتابی یا تپشی؟
- درد چقدر دوام می‌کند؟ آیا متداوم است یا متناوب؟ اگر متناوب است، مدت و تکرر هر حمله پرسیده شود.
- آیا با کدام وقت خاص روز ارتباط دارد؟
- آیا aura نیز موجود است؟
- عوامل تشدیدکننده و تخفیف‌دهنده آن کدام‌ها اند؟
- کدام قسمت رأس مأوف است؛ یک نصف رأس (migraine)، یا ناحیه جبهی یا قفوی؟

- آیا اعراض مترافقه از قبیل استفراغ، دل‌بدی، افسرده‌گی، بی‌خوابی، تیره‌گی دید یا ضیاع شعور نیز موجود است؟
- آیا تاریخچه صدمه رأس، فرط فشار خون، شخی گردن یا ضیاع شعور در گذشته موجود است؟



کتنه (Mass)

موارد ذیل ملاحظه شوند:

- موقعیت
- اندازه
- تعداد
- سطح
- قوام
- تحرکیت
- حساسیت
- نبضان
- تموج

همچنان موارد ذیل نیز ارزیابی شوند:

- آیا جلد بالای کتنه متحرک است یا ساکن؟ آیا جلد بالای آن علایم التهاب حاد را نشان می‌دهد؟ آیا کدام sinus روی آن تشکل نموده است؟ (توبرکلوز)
- در واقعاتی که عقدات لمفاوی متورم شده باشند، دریابید که آیا از هم جدا اند یا به هم چسپیده؟ (توبرکلوز)





فصل سوم

معاینه مریض

قبل از معاینه مریض، محصل طب باید وسایل ذیل را با خود داشته باشد:

- ستاتسکوپ
 - چکش وتری
 - چراغ دستی
 - فپته اندازه‌گیری
 - در صورت امکان یک آله فشار
- معاینه مریض شامل دو بخش است:

۱. معاینه فیزیکی عمومی

۲. معاینه سیستمیک



معاینه فیزیکی عمومی

معاینه فیزیکی مریض

معاینه عمومی

منظره عمومی، وضعیت، رفتار

خسافت، پرقان، سیانوز، کلبینگ، اذیما

عقدات لمفاوی، تایراید، جلد

علایم حیاتی: نبض، BP، تنفس، حرارت

معاینه سیستمیک

تفتیش (Inspection)

جس (Palpation)

قرع (Percussion)

اصغا (Auscultation)

نقشه ذهنی ۳.۱: ترتیب معاینه فیزیکی

یادداشت: معاینه‌کننده باید در سمت راست مریض قرار بگیرد.

معاینه فیزیکی عمومی با اولین مشاهده مریض آغاز می‌شود. داکتر باید یک مشاهد خوب باشد؛ در غیر آن، برخی از علایم کلینیکی که برای رسیدن به تشخیص مهم‌اند ممکن است از نظر دور بمانند. بعد از اخذ تاریخچه، یک مفکوره درباره تشخیص در ذهن داکتر ایجاد می‌شود؛ بعداً علایم فیزیکی مورد توقع جستجو شوند؛ زیرا گفته‌اند: «جوینده یابنده است.»

دست دادن، یعنی مصافحه دوستانه، با مریض نه تنها اعتماد مریض را جلب نموده و اطمینان وی را حاصل می‌نماید، بلکه در مورد تشخیص یک تعداد امراض نیز کمک‌کننده است:

- Acromegaly: دست‌های بزرگ و عرق‌آلود
- Thyrotoxicosis: دست‌های گرم و عرق‌آلود
- اضطراب: دست‌های سرد و عرق‌آلود

- Hypothyroidism: دست‌های خشک و درشت
- Dystrophia myotonica: استرخای مؤخر دست‌ها
- CVA: فلج اطراف

♦ رفتار (Gait)

رفتار مریض باید هنگام ورود وی به اتاق معاینه تحت نظر باشد. توضیحات بیشتر در فصل معاینه سیستم عصبی مرکزی ارائه شده است.

♦ وضعیت مریض در بستر

- چگونگی وضعیت مریض در بستر در تشخیص بعضی از امراض کمک‌کننده است.
- اگر مریض به وضعیت اضطجاع ظهري، خاموش و آرام بالای بستر قرار داشته و تنفس سطحی داشته باشد، ممکن مصاب peritonitis باشد.
- مریض مصاب عدم کفایه قلب و احتقان ریوی به شکل افقی بالای بستر قرار نمی‌گیرد؛ بلکه یک وضعیت نیمه‌نشسته را به کمک بالش‌ت اختیار می‌نماید.
- مریض مصاب COPD معمولاً در بستر به حالت نشسته و خمیده به قدام قرار می‌گیرد.
- مریضی که از کولیک کلیوی رنج می‌برد، بالای بستر ناآرام می‌باشد، وضعیت خود را از یک حالت به حالت دیگر تغییر می‌دهد و در جستجوی وضعیت بدون درد می‌باشد.
- مریض مصاب meningitis یک وضعیت وصفی می‌داشته باشد. عنق وی به طرف خلف خمیده بوده و رأس وی طوری معلوم می‌شود گویا در درون بالش‌ت باشد.

♦ اجزای معاینه فیزیکی عمومی

موارد ذیل باید به صورت منظم ملاحظه شوند:

- منظره عمومی
- سن
- جنس

- منظره وجه
- حالت تغذی
- خسافت (anemia)
- سیانوز (cyanosis)
- یرقان (jaundice)
- اذیما (edema)
- دیهایدریشن (dehydration)
- Clubbing
- Koilonychia
- خونریزی تراشه‌ای (splinter hemorrhage)
- عقدات لمفاوی
- معاینه عنق / غده تایراید
- نبض، فشار خون، تنفس
- درجه حرارت / تب
- معاینه جلد
- معاینه دست‌ها
- معاینه پاها
- معاینه ثدیة

◆ منظره عمومی (General Appearance)

- مریض را نگاه کنید و سیمای وی را مطالعه نمایید.
- آیا مریض معلوم می‌شود یا ناراحت یا صحتمند؟
 - قیافه مریض، وضعیت، حرکات غیرارادی اگر موجود باشند و طرز رفتار وی را مشاهده نمایید.
 - موجودیت هر گونه سوء شکل را ملاحظه نمایید:
 - Kyphosis: زمانی که ستون فقرات محدبیت خلفی داشته باشد.

- Scoliosis: زمانی که ستون فقرات سوء شکل جنبی داشته باشد.
- Lordosis: زمانی که ستون فقرات محدبیت قدامی داشته باشد.
- Cubitus varus / Cubitus valgus
- Genu varus / Genu valgus
- Coxa vara / Coxa valga
- Talipes equinovarus
- Hallux valgus

◆ سن

سن مریض مهم است؛ زیرا خباثت‌ها و تشوشات وعایی، مانند atherosclerosis و thrombosis، در نزد مریضان سالخورده به وجود می‌آید؛ در حالی که تومور Wilm در نزد اطفال معمول است.

◆ جنس

- جنس مریض نیز در تشخیص بعضی امراض اهمیت دارد:
- طبقه اناث هرگز به hemophilia مصاب نمی‌شوند.
 - مرض Raynaud عمدتاً در نزد خانم‌ها به وجود می‌آید.
 - Ankylosing spondylitis در نزد مردها بیشتر شایع است (۱۰:۱).
 - کرسینومای قصبی در نزد مردان بیشتر معمول است (۸:۱).
 - نقرس (gout) در ۹۵٪ واقعات در نزد مردها به وجود می‌آید.

◆ منظره وجه (Facial Appearance)

یک تعداد منظره‌های وجه به بعضی از امراض اختصاصی هستند:

- وجه مهتابی (Moon face): Cushing's syndrome
- وجه نقاب‌مانند: Parkinsonism
- وجه ابلهانه: تأخر ذهنی
- چشمان برجسته (Exophthalmos): Hyperthyroidism
- وجه در فلج عصب وجهی: توضیحات در معاینه سیستم عصبی مرکزی

- وجه موی‌دار در خانم‌ها: Hirsutism
- وجه پهن و بزرگ (acromegalic face): در hyperpituitarism دیده می‌شود.
- وجه خاسف: ۱. Shock ۳. Hypothyroidism ۲. Anemia و syncope
- وجه سرخ‌رنگ: ۱. Polycythemia ۲. گرم‌زده‌گی ۳. تب بلند
- وجه متورم: ۱. Cushing's syndrome ۲. Glomerulonephritis ۳. Nephrotic syndrome
- وجه زردرنگ: زردی (Jaundice)
- وجه آبی‌رنگ: Cyanosis
- تصبغات: مرض Addison، حاملگی
- اندفاعات پروانه‌ای بالای گونه‌ها: SLE
- اندفاعات سفیدرنگ (Leukoderma / Vitiligo): عکس‌العمل اوتومایمیون

♦ حالت تغذی

قد، وزن و BMI مریض را اندازه‌گیری نمایید.

شاخص کتله بدن (Body Mass Index – BMI)

نسبت بین وزن بدن و قد به نام شاخص کتله بدن (BMI) یاد می‌شود و توسط فورمول ذیل محاسبه می‌شود:

$$\text{BMI} = \text{وزن (کیلوگرام)} \div \text{مربع قد (متر}^2\text{)}$$

حدود نارمل آن بین ۱۸/۵ و ۲۵ است؛ یعنی کمتر از ۱۸/۵ کم‌وزن (underweight) و اضافه‌تر از ۲۵ اضافه‌وزن (overweight) محسوب می‌شود.

قد

قد مریض را اندازه نمایید.

آیا با سن مریض مطابقت دارد یا خیر؟

اگر مریض تأخر رشد داشته باشد، ممکن سبب آن یکی از این‌ها باشد:

- hypothyroidism (cretinism)

- hypopituitarism
 - achondroplasia؛ اطراف کوچک بوده، اما اندازه بدن نارمل است.
 - ارثی
 - rickets
- اگر مریض به صورت غیرطبیعی قدبلند و پهن باشد، ممکن مصاب hyperpituitarism (gigantism) باشد.

وزن

وزن مریض را اندازه‌گیری نمایید.
 ببینید که آیا مریض چاق است، لاغر است یا نارمل.
 ضیاع وزن و لاغری در حالات ذیل به وجود می‌آید:

- خباثت‌ها (malignancies)
- توپرکلوز ریوی
- thyrotoxicosis
- diabetes mellitus

چاقی

چاقی توسط محاسبه نسبت کمر و ران ارزیابی می‌شود.
 در حالت نارمل در نزد خانم‌ها این نسبت کمتر از ۰/۸ و در نزد مردها کمتر از ۰/۹ است.

موجودیت شحم فوق‌العاده زیاد ممکن از سبب حالات ذیل باشد:

- Cushing's syndrome
- چاقی (تغذیه)
- خانوادگی

◆ خسافت یا Pallor (Anemia)

کاهش مقدار هموگلوبین خون به نام کم‌خونی (anemia) یاد می‌شود.

از لحاظ کلینیکی کم‌خونی را می‌توان توسط معاینه ناخن‌ها، ملتحمه پلک‌های سفلی، سطح سفلی زبان، غشای مخاطی رخسارها، حنک سخت و خطوط کف دست‌ها ارزیابی نمود.

ناخن‌ها

ناخن‌های مریض را معاینه نموده و با ناخن‌های خود مقایسه نمایید.
در کم‌خونی ناخن‌ها خاسف می‌شوند.

پلک‌های سفلی

از مریض بخواهید تا به علوی نگاه کند؛ بعداً پلک‌های سفلی وی را به طرف پایین کش نموده و قسمت داخلی آن را مشاهده کنید.
در حالت عادی گلابی‌رنگ است.

جوف دهن

از مریض بخواهید که دهن خود را باز نماید.
رنگ زبان، غشای مخاطی رخسارها و حنک سخت را معاینه نمایید.
این‌ها در کم‌خونی خاسف می‌شوند.

خطوط کف دست

خطوط کف دست را نیز معاینه نمایید؛ خسافت آن نشان‌دهنده کم‌خونی است.

♦ Cyanosis (سیانوز)

سیانوز زمانی تظاهر می‌نماید که مقدار هموگلوبین ارجاع‌شده (reduced) به ۵ گرم فیصد یا بیشتر از آن برسد.
در این حالت، ناخن‌ها، لب‌ها، زبان، نوک بینی و غشای مخاطی جوف دهن آبی‌رنگ می‌شوند.

سیانوز می‌تواند نظر به اسباب آن مرکزی یا محیطی باشد.

الف) سیانوز محیطی

از سبب تقبض اوعیه و حالات دیگری که سبب رکودت خون در اوعیه می‌گردد، تظاهر می‌نماید.

اسباب سیانوز محیطی:

- معروض شدن به سردی
- احتقان وریدی از سبب وارد شدن فشارهای موضعی مانند گره‌های جراحی یا ترومبوز وریدهای عمیق
- تحریک بیش از حد vasomotor (مرض Raynaud)

ب) سیانوز مرکزی

زمانی تظاهر می‌نماید که خون شریانی و وریدی باهم مخلوط گردند یا این که انتشار ناقص آکسیجن از سبب امراض ریوی موجود باشد.

اسباب قلبی:

تترالوژی فالوت که شامل ۴ پتالوژی ذیل است:

- نقیصه حجاب بین‌البطینی (VSD)
 - بی‌جا بودن شریان ابهر
 - تضیق دسام ریوی
 - هایپرتروفی بطین راست
- امراضی که در مراحل اخیر سبب سیانوز می‌شوند:

- نقیصه حجاب بین‌البطینی (VSD)
- نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD)
- قنات شریانی باز (Patent Ductus Arteriosus)

اسباب ریوی:

- تکاثف کتلولی (Pneumonia)
- Cor-pulmonale
- COPD
- انسداد طرق تنفسی

اسباب دموی:

- Methemoglobinemia
- Sulphhemoglobinemia

تفاوت سیانوز محیطی و مرکزی:

سیانوز مرکزی	سیانوز محیطی
از سبب امراض ریوی و قلبی به وجود می‌آید.	از سبب مواجه شدن به سردی به وجود می‌آید.
نواحی سیانوتیک گرم می‌باشند.	نواحی سیانوتیک سرد می‌باشند.
گرم کردن بالای آن اثر ندارد.	با گرم کردن، سیانوز برطرف می‌شود.
دست‌ها گرم می‌باشند.	دست‌ها سرد می‌باشند.

♦ یرقان (Jaundice)

از لحاظ کلینیکی یرقان، یعنی زردی جلد، زمانی تظاهر می‌کند که سویه بلیروبین سیروم از $\frac{2}{5}$ ملی‌گرام فیصد بیشتر شود. رنگ زرد لیمویی در یرقان هیمولایتیک دیده می‌شود؛ در حالی که در یرقان انسدادی رنگ زرد تیره یا حتی نارنجی می‌باشد.

یادداشت: اگر خارش توأم با یرقان باشد، نشان‌دهنده یرقان انسدادی است.

طرز معاینه:

- پلک علوی مریض را با انگشت شست خود به علوی کش نمایید.
- سپس از مریض بخواهید تا به پایین، به طرف پاها، بدون حرکت دادن رأس خود نگاه کند.
- رنگ sclera را مشاهده نمایید؛ در صورت موجودیت یرقان رنگ آن زرد می‌باشد.
- همزمان با آن وجه سفلی زبان و غشای مخاطی جوف دهن را نیز مشاهده نمایید.

- زرد شدن جلد مریض را نیز مشاهده نمایید.

یادداشت: رنگ sclera و غشای مخاطی جوف دهن باید در روشنی آفتاب معاینه شوند، نه در پرتو چراغ‌های مصنوعی.

◆ اذیما (Edema)

تجمع مایع اضافی در انساج بین‌الخلالی به نام اذیما یاد می‌شود. از لحاظ کلینیکی، به منظور دریافت اذیما، ناحیه متورم را برای ۱۵-۲۰ ثانیه تحت فشار قرار می‌دهیم؛ ممکن یک فرورفتگی (pit) در این ناحیه به وجود آید. این pit باید برای مدت تقریباً نیم دقیقه باقی بماند.

یادداشت: اگر اذیما از سبب انسداد اوعیه لمفاوی و hypothyroidism به وجود آمده باشد، از نوع non-pitting می‌باشد.

اذیما در نواحی dependent، یعنی ناحیه سکروم و قسمت‌های سفلی پاها، تعیین می‌گردد.

اسباب اذیمای عمومی:

- عدم کفایه احتقانی قلب (dependent)
- اذیمای کلیوی (nephrotic syndrome): معمولاً در ابتداء بالای وجه، در تحت چشم‌ها، به ویژه زمانی که مریض در وقت صبح از خواب بیدار می‌شود، تظاهر می‌نماید.
- hypoproteinemia
- cor-pulmonale
- الرژیک (angioneurotic edema)
- اذیمای لمفاتیک (non-pitting)
- filariasis (non-pitting)

یادداشت: تورم جلد که با وارد کردن فشار خفیف به شکل جرجز (crackling) احساس شود، ناشی از امفزیمای تحت‌الجلدی می‌باشد. در عنق و جدار علوی صدر در آسیب ریه دیده می‌شود.

♦ دیهایدریشن (Dehydration)

دیهایدریشن در حالات ذیل به وجود می‌آید:

- اسهالات و استفراغات
- Ketoacidosis
- آفتاب‌زده‌گی
- سوء تغذی شدید
- تعرق بیش از حد

علائم دیهایدریشن:

- زبان خشک
- جلد غیرایلاستیک
- تفریط فشار خون با نبض سریع
- چشم‌های نرم و فرورفته
- کاهش بیرون‌ده ادرار (Urine output)

♦ Clubbing

در این حالت انساج نرم قاعده ناخن‌ها ضخامه نموده و زاویه بین قاعده ناخن و جلد مجاور آن از بین می‌رود.

مراحل Clubbing:

مرحله ۱

انگشت مریض را به شکل افقی در نزدیک چشم‌های خود قرار دهید و معدومیت زاویه بین ناخن و جلد مجاور آن را با گذاشتن یک پارچه کاغذ به صورت عمودی و مستقیم بالای آن مشاهده نمایید.

مرحله ۲

در این مرحله تموج قاعده ناخن را می‌توان با گذاشتن هر دو انگشت شهادت بالای هر دو کنار قاعده ناخن مریض و فشردن یکی آن دریافت نمود. احساس بالا آمدن نسج در تحت انگشت دوم دلالت بر تموج (fluctuation) می‌نماید.

مرحله ۳

در این مرحله سگمنت‌های نهایی انگشتان منظره چوب طبل (drum stick) را به خود اختیار می‌کند.

تست دریچه شمروت (Schamroth's Window Test)

در حالت نارمل، زمانی که ناخن‌های هر دو انگشت شست بر روی هم قرار داده شوند، بین‌شان یک خالیگاه لوزی‌شکل مشاهده می‌شود؛ در حالی که در clubbing این خلا کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود.

اسباب Clubbing:

ریوی:

- Bronchogenic carcinoma
- Bronchiectasis
- Pulmonary abscess
- Fibrosing alveolitis
- Empyema

قلبی:

- امراض سیانوتیک قلب (Fallot's tetralogy)
- Subacute bacterial endocarditis

هضمی:

- Crohn's disease
- Ulcerative colitis

- سندروم سوء جذب

کبدی:

- Biliary cirrhosis

◆ Koilonychia

در این حالت ناخن‌ها نرم، شکننده و قاشق‌مانند می‌شوند.

اسباب Koilonychia:

- کم‌خونی کمبود آهن
- سندروم Plummer-Vinson
- استعمال زیاد صابون و سایر پاک‌کننده‌ها
- Idiopathic

◆ خونریزی‌های تراشه‌ای (Splinter Hemorrhages)

عبارت از خطوط کوچک سرخ‌رنگ / قهوه‌ای تاریک و عمودی‌اند که در تحت ناخن‌ها به مشاهده می‌رسند.

اسباب:

- اندوکاردیت باکتریایی تحت الحاد
- ترضیض
- تشوشات نزفی
- trichuris trichura هجوم
- sickle cell anemia
- atrial myxoma

◆ عقدات لمفاوی (Lymph Nodes)

گروه‌های متعدد عقدات لمفاوی را جس نمایید، مثلاً:

- رقبی خلفی (posterior cervical)
- تحت الفکی (submandibular)
- فوق الترقوی (supraclavicular)

● ابطی (axillary)

● مغبنی (inguinal)

عقدات تحت الذقنی (submental)، تحت الفكی (submandibular)، اطراف اذن (periauricular)، فوق الترقوی (supraclavicular) و رقبی عمیق (deep cervical) از پشت جس می‌شوند؛ در حالی که عقدات قفوی (occipital) و اذنی خلفی (posterior auricular) از طرف پیشروی مریض جس می‌شوند. نواحی تخلیوی عقدات بزرگ نیز باید معاینه شوند.

تشخیص تفریقی لمف ادینوپتی‌ها:

- در syphilis عقدات لمفاوی بدون درد و منتشر می‌باشند.
- در توبرکلوز عقدات با هم ملتصق بوده و ممکن sinus بالای آن تشکل نموده باشد.
- در واقعات رشد ثانوی (متاستاز)، عقدات سخت، غیرمنظم و با انساج مجاور ملتصق می‌باشند.
- در مرض Hodgkin و Reticulosis های دیگر، عقدات بزرگ، منتشر، رابری و ایلاستیکی می‌باشند.
- عقداتی که نواحی التهابی را تخلیه می‌نمایند، متورم و دردناک می‌باشند. مثلاً در واقعات tonsillitis عقدات لمفاوی زاویه فکی بزرگ و دردناک می‌باشند. جلد روی آن نیز گرم می‌باشد.
- در leukemia عقدات در هر دو طرف بدن بسیار بزرگ می‌شوند. طحال نیز بزرگ می‌باشد.
- عقده لمفاوی فوق الترقوی چپ (Virchow's gland) در کنسر معده بزرگ می‌شود.

◆ معاینه عنق / غده تایراید

عنق مریض را جهت دریافت تورم موضعی یا عمومی غده تایراید، عقدات لمفاوی، نبضان‌ها و JVP تفتیش نمایید.

معاینه غده تایراید:

- از مریض بخواهید تا عمل بلع را انجام دهد.
- در این صورت غده تایراید به علوی حرکت می‌کند.
- سپس در خلف مریض ایستاد شده و هر دو دست خود را در قدام عنق بگذارید و غده را جس نمایید.

اگر غده بزرگ شده باشد، موارد ذیل را تعیین نمایید:

- اندازه
- شکل
- سطح
- حساسیت
- قوام
- تحرکیت جلد روی آن
- نبضان

یادداشت: با استفاده از یک ستاتسکوپ می‌توانیم یک systolic bruit را بالای toxic goiter بشنویم.

علامه Van Graefe

این علامه در thyrotoxicosis موجود می‌باشد.

میتود:

از مریض بخواهید که به انگشت شهادت‌تان که در وضعیت افقی و به فاصله ۱-۲ فوت قرار دارد، نگاه کند و با دست دیگران رأس مریض را استناد دهید. در این صورت انگشت را به طرف پایین حرکت داده و از مریض بخواهید تا بدون حرکت رأس آن را تعقیب نماید. در صورت مثبت بودن تست، سفیدی sclera بالاتر از قرنیه مشاهده می‌شود.

♦ معاینه نبض (Pulse)، فشار خون (BP) و تنفس (Respiration)

در فصل‌های معاینه سیستم‌های قلبی-وعایی و تنفسی به تفصیل توضیح شده‌اند.

♦ درجه حرارت (Temperature)

یک ترمومتر را بعد از تکان دادن آن تا ستون سیما به تحت ۹۶ درجه فارنهایت بیاید، در زیر زبان مریض برای ۱-۳ دقیقه می‌گذاریم. سپس آن را بیرون نموده و مطالعه می‌نماییم. درجه حرارت نارمل ۹۸-۹۹ درجه فارنهایت، با اوسط ۹۸/۴ درجه فارنهایت، یا ۳۷ درجه سانتی‌گراد است. درجه حرارت رکتیم یک درجه بالاتر است؛ در حالی که درجه حرارت ابط یک درجه پایین‌تر از درجه حرارت نارمل بدن است.

یادداشت: زمانی که ترمومتر در دهن مریض قرار داشته باشد، وی باید با بینی خود تنفس نماید.

انواع تب (Fever):

تب متداوم (Continuous)

اگر تب در ۲۴ ساعت از ۱/۵ درجه فارنهایت یا یک درجه سانتی‌گراد بیشتر نوسان ننماید و به درجه نارمل برنگردد، تب متداوم گفته می‌شود.

تب Remittent

در صورتی که نوسان روزانه تب بیشتر از ۲ درجه سانتی‌گراد یا ۳ درجه فارنهایت باشد و به درجه نارمل برنگردد، به نام تب remittent یاد می‌شود.

تب متقطع (Intermittent)

در صورتی که تب صرف برای چند ساعت در روز موجود باشد، به نام تب متقطع یاد می‌شود؛ یعنی تب در ۲۴ ساعت به درجه نارمل برمی‌گردد. مثلاً در ملاریا و توبرکلوز تب اکثراً در شام به وجود می‌آید.

Quotidian

در صورتی که حملات تب روزانه واقع شوند.

Tertian

در صورتی که حملات تب هر دو روز بعد واقع شوند.

Quartan

در صورتی که حملات تب هر ۳ روز بعد واقع شوند.

Pel-Ebstein Fever (Relapsing Fever)

در مرض Hodgkin به مشاهده می‌رسد.

در این صورت تب برای چندین روز، معمولاً ۷-۱۰ روز، تا ۱۰۲-۱۰۳ درجه فارنهایت بالا می‌رود؛ سپس در ۷-۱۰ روز بعدی موجود نمی‌باشد و بدین منوال تکرار می‌شود.

Hypothermia (هایپوترمیا)

وقتی که درجه حرارت کمتر از ۹۵ درجه فارنهایت یا ۳۵ درجه سانتی‌گراد باشد، به نام هایپوترمیا یاد می‌شود.

جهت مطالعه آن باید از ترمامترهای با درجه پایین استفاده نمود.

اسباب Hypothermia:

- hypothyroidism
- غرق شدن در آب
- تسمم با الکول
- معروضیت دوامدار به سردی
- مریضان غیرمتحرک مسن که تنها زنده‌گی می‌کنند در زمستان

◆ معاینه جلد

جلد را به صورت دقیق معاینه کنید.

تغییر رنگ، منظره و موجودیت اندفاعات نشان‌دهنده مرض سیستمیک یا امراض خود جلد می‌باشد.

رنگ جلد می‌تواند:

- خاسف (anemia)
- زرد (jaundice)
- آبی‌رنگ (cyanosis)

باشد.

اصطلاحات مستعمله در امراض جلدی:

Macule

عبارت از تغییر رنگ جلد است.

ممکن سفید، سرخ، آبی یا زرد باشد؛ مثلاً leucoderma.

Papule

برجستگی نیم‌دایروی اپیدرم است.

قطر آن به چند ملی‌متر می‌رسد.

ممکن ناشی از ارتشاحات التهابی درم یا رشد حشرات جدید باشد؛ مثلاً nevus.

Vesicle & Bulla

از سبب تجمع مایع سیروزی در اپیدرم به وجود می‌آید؛ مثلاً بعد از سوختگی‌ها.

Pustule

از سبب تجمع قیح در اپیدرم به وجود می‌آید؛ مثلاً پوستول واکسین.

Nodule

ماؤوفیت تمام ضخامت جلد توسط ارتشاحات التهابی یا رشد حشرات جدید به

نام nodule یاد می‌شود.

نظر به papule سخت‌تر است.

Wheal

اگر تشکل اذیما در درم از سبب الرژی بوده و توأم با خارش شدید باشد، به نام

wheal یاد می‌شود.

رنگ، اندازه و شکل آن به سرعت تغییر می‌کند؛ مثلاً urticaria.

نقیصه‌های نسجی:

Maceration

عبارت از نرم شدن طبقات بیرونی اپیدرم توسط افرازات مختلف است.

Erosion

نقیصه نسجی داخل اپیدرم است.

Ulcer (قرحه)

یک نقیصه جلدی است که تقریباً تمام طبقات جلد را در بر می‌گیرد.

تجمعات بالای جلد:

Scale

تشکل scale عبارت از تجمع زاید طبقات قرنی اپیدرم است؛ مثلاً در psoriasis.

Crust / Scab

زمانی که scale با exudate یکجا باشد، به نام crust یاد می‌شود.

اندفاعات جلدی که در سیر امراض سیستمیک به وجود می‌آیند:

Heberden's Nodes

نودول‌های کوچک‌اند که در مفاصل interphalangeal نهایی در osteoarthritis به میان می‌آیند.

Erythema Marginatum

این‌ها به شکل حلقاتی که مرکز آن خاسف و کناره‌های آن گلابی‌رنگ است دیده می‌شوند.

بیشتر در جذع و سطوح قابضه مفاصل به وجود می‌آیند.

این اندفاعات در سیر تب روماتیک دیده می‌شود.

Erythema Nodosum

این‌ها نودول‌های غیرحساس مدور-مخروطی بوده که در تحت جلد قرار می‌داشته باشند.

اندازه آن از نوک سوزن الی ۲ سانتی‌متر فرق می‌کند.

اکثراً در سطوح باسطه آرنج و ساق پا دیده می‌شود.

ممکن در وجه ظهري پاهای و دست‌ها نیز دیده شوند.

این اندفاعات در سیر امراضی چون TB، sarcoidosis، leprosy و انتانات -Beta hemolytic streptococcus دیده می‌شوند.

لکه‌های نزفی (Hemorrhagic Spots):

Petechiae & Purpura

این‌ها لکه‌های نزفی بسیار کوچک هستند.

در هموفیلیا دیده می‌شوند.

اگر توسط سلاید شیشه‌ای بالای آن فشار وارد شود، ناپدید نمی‌شوند؛ تشخیص تفریقی با telangiectasia.

Ecchymosis

این‌ها لکه‌های نزفی بوده و نسبت به petechiae بزرگتر می‌باشند.

Spider Naevi

در فصل معاینه سیستم هضمی توضیح گردیده است.

Erythema Ab Igne

این‌ها خطوط سرخ‌رنگ مارمانند هستند که در سطح ساق پا به وجود می‌آیند.

این‌ها از سبب معروضیت درازمدت به آتش به میان می‌آیند (myxoedema).

Janeway's Lesions

لکه‌های کوچک سرخ-قهوه‌ای بوده و بالای کف دست‌ها در اندوکاردیت انتانی تحت‌الحاد به میان می‌آیند.

Campbell de Morgan Spots

این‌ها لکه‌های کوچک سرخ‌رنگ‌اند.
در قسمت‌های مختلف بدن به وجود آمده می‌توانند؛ در بعضی اشخاص به صورت
نارمل نیز دیده می‌شوند.

Hyperpigmentation

هایپرپیگمنتیشن جلدی در امراضی چون مرض Addison، تسمم با arsenic،
malignancy و cachexia دیده می‌شود.

رنگ جلد:

- خاسف: کم‌خونی (anemia)
- زرد: یرقان (jaundice)
- آبی: سیانوز (cyanosis)

♦ معاینه دست‌ها

۱. شکل

در آغاز شکل دست‌ها مطالعه شود.
هر تغییری که در جلد دریافت گردید، چه به سبب تصادمات باشد یا به سبب
امراض، باید ملاحظه شود.
انگشتان طویل و نازک علامه arachnodactyly است.
کوتاه بودن metacarpal چهارم در حالت مشتم بودن دست بهتر مشاهده
می‌شود؛ در سندروم Turner و در دختران دچار amenorrhea ابتدائی دیده
می‌شود.
کوتاه بودن metacarpal چهارم و پنجم در pseudohypoparathyroidism دیده
می‌شود.

۲. اندازه

دست‌های پهن و بزرگ علامه acromegaly است.
افزایش کتله انساج نرم دست در myxoedema دیده می‌شود.

۳. رنگ

رنگ دست‌ها مانند رنگ جلد ارزیابی می‌شود.
تفصیل آن در معاینه فیزیکی عمومی گذشت.
سرخی کف دست (palmar erythema) در سیروز کبدی دیده می‌شود.

۴. ناخن‌ها

مشاهدات ذیل در تشخیص بعضی امراض کمک می‌نمایند:

- ناخن‌های گزیده‌شده با دندان‌ها: اضطراب
 - Clubbing: تفصیل در معاینه فیزیکی عمومی
 - Splinter haemorrhages: Subacute bacterial endocarditis و ترضیض
 - Koilonychia: کمبود مزمن آهن
 - Pitting: Psoriasis
 - Leukonychia: Hypoalbuminemia
 - خطوط عرضانی (Beau's lines): مرض حاد
- علاوه بر یافته‌های فوق، ممکن انتانات فنگسی یا بکتریایی ناخن‌ها یا بستر ناخن (paronychia) نیز به مشاهده برسند.

۵. انساج تحت‌الجلدی

ضخیم شدن و کوتاه شدن صفاق کف دست منجر به سوء اشکال قابضه انگشتان چهارم و پنجم می‌شود که به نام Dupuytren's contracture یاد می‌شود.
نودول‌های تحت‌الجلدی سخت و بدون درد در نوک انگشتان در rheumatoid arthritis دیده می‌شود.
مفاصل انگشتان متورم و دوک‌مانند در rheumatoid arthritis دیده می‌شود.
انحراف ulnar نیز در rheumatoid arthritis دیده می‌شود.

۶. عضلات

اتروفی عضلات دست در امراض نیورون حرکی، آفت جذر عصب اول صدی و نیوروپتی‌های محیطی دیده می‌شود.

۷. حرکات

رعشه (tremor) در اضطرابات، thyrotoxicosis و استفاده از beta-agonists دیده می‌شود.

Asterixis در hepatic encephalopathy دیده می‌شود.

Tetany در hypocalcemia دیده می‌شود.

وضعیت دست‌ها و بازوهای قبض شده در hemiplegia دیده می‌شود.

سقوط بند دست (wrist drop) نشان‌دهنده فلج عصب radial است.

◆ معاینه پاها

پاها جهت دریافت موارد ذیل معاینه می‌شوند:

● pitting edema

● امراض وعایی محیطی

● قرحات

Pitting قبلاً توضیح شده است.

جهت دریافت امراض وعایی محیطی، نبضان را در اوعیه dorsalis pedis و posterior tibial معاینه نمایید؛ تفصیل در فصل معاینه سیستم قلبی-وعایی ارائه می‌شود.

موجودیت قرحات در کف پا (diabetic foot) در نزد مریضان دیابتیک دیده می‌شود.

◆ معاینه ثدیه‌ها

در نزد مریضان مذکر ممکن تورم جزئی به صورت دو طرفه در ثدیه‌ها موجود باشد. در بلوغ این حالت نارمل است.

تورم ثدیه‌ها (gynecomastia) در سیروز کبدی یا التهابات موضعی نیز به مشاهده رسیده می‌تواند.

تمام این سه حالت را باید در نظر داشت.

در نزد خانم‌ها، خصوصاً در سنین بالاتر از ۳۰ سال، ثدیه‌ها را جهت دریافت تورم‌ها، مطالعه شکل حلیمه ثدیه و افرازات حلیمه معاینه کنید.

برای تفصیل بیشتر به میتودهای جراحی مراجعه نمایید.



معاینه سیستمیک (Systemic Examination)

تمام سیستم‌های بدن باید به صورت جداگانه مورد معاینه قرار بگیرند:

- سیستم تنفسی
- سیستم قلبی و وعایی
- سیستم هضمی
- سیستم حرکتی
- سیستم عصبی





فصل چهارم

معاینه سیستم تنفسی

فص‌ها و سگمنت‌های ریوی

♦ آناتومی

ریه راست دارای سه فص (lobe) و متشکل از ۱۰ سگمنت است؛ در حالی که ریه چپ دارای دو فص و متشکل از ۹ سگمنت است.

ریه راست:

- فص علوی: شامل سگمنت‌های apical، خلفی و قدامی
- فص متوسط: شامل سگمنت‌های وحشی و انسی
- فص سفلی: شامل سگمنت‌های قاعدوی apical، قاعدوی انسی، قاعدوی قدامی، قاعدوی وحشی و قاعدوی خلفی

ریه چپ:

- فص علوی: شامل سگمنت‌های apical، خلفی و قدامی
- Lingula: شامل سگمنت‌های علوی و سفلی

- **فص سفلی:** شامل سگمنت‌های قاعدوی apical، قاعدوی قدامی، قاعدوی وحشی و قاعدوی خلفی

یادداشت: فضای سگمنت قاعدوی انسی ریه چپ توسط قلب اشغال شده است.

باید به خاطر داشت که هیچ‌گونه سرحد میکروسکوپیکی میان این سگمنت‌ها در سطح ریه‌ها وجود ندارد، بلکه این سگمنت‌ها بر اساس تشعب شجر قصبی نامگذاری شده‌اند.

به هر حال هر سگمنت یک «واحد جراحی» است یعنی از لحاظ جراحی جداشدنی بوده و اوعیه و قصبه آن به صورت مصون بدون این که به سگمنت‌های مجاور آن از لحاظ آناتومی و فزیولوژی صدمه وارد شود، قطع شده می‌تواند.

♦ **آناتومی سطحی قاعده و شیارهای ریوی**

قاعده ریه راست بالای سطح صدر توسط خطی که ضلع ششم در خط ثدیوی، ضلع هشتم در خط ابطی متوسط، ضلع دهم در خط scapular و spine فقره یازدهم صدی را با هم وصل می‌نماید نشان داده می‌شود.

شیار بزرگ (major fissure) ریه راست توسط خطی که از spine فقره دوم صدی آغاز شده و در امتداد کنار انسی scapula طوری که مریض دست راست خود را بالای رأس قرار دهد به طرف پایین سیر نموده و بالاخره قداماً با ضلع ششم در خط ثدیوی وصل می‌شود نشان داده می‌شود.

شیار کوچک (minor fissure) ریه راست توسط یک خط افقی نشان داده می‌شود که از غضروف ضلعی چهارم آغاز شده و به ظهر مریض در طرف راست تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که شیار بزرگ را قطع نماید.

ریه راست	ریه چپ
دارای ۳ فص است	دارای ۲ فص است
دارای ۱۰ سگمنت است	دارای ۹ سگمنت است (سگمنت قاعدوی انسی در آن موجود نمی‌باشد)
فاقد lingula است	حاوی lingula است

◆ اعراض امراض سیستم تنفسی

اعراض عمده امراض تنفسی قرار ذیل اند:

۱. سرفه (cough)
 ۲. بلغم (sputum)
 ۳. خون در بلغم (hemoptysis)
 ۴. درد صدري (chest pain)
 ۵. عسرت تنفس (dyspnea)
 ۶. Wheeze
- تفصیل آن در فصل دوم ذکر گردیده است.



معاینه کلینیکی صدر

معاینه صدر – ترتیب

تفتیش	جس
شکل و تناظر صدر، حرکات، ریت و نوع تنفس، شزن، ندبات	موقعیت شزن و apex، اتساع صدر، اهتزازات صوتی (TVF)
قرع	اصغا
resonant / dull / stony dull / hyper-resonant	آوازه‌های تنفسی، آوازه‌های اضافی، وضاحت صوتی

همیشه دو طرف را در نقاط مشابه مقایسه کنید

نقشه ذهنی ۴.۱: ترتیب معاینه صدر

♦ تفتیش (Inspection)

یادداشت: هر علامه که در یک طرف صدر وجود داشته باشد باید با طرف مقابل آن مقایسه گردد.

نکات ذیل باید در زمان تفتیش مدنظر گرفته شوند:

۱. شکل صدر
۲. تناظر صدر
۳. حرکات صدر
۴. کتله یا تورم
۵. تنفس
۶. شزن
۷. حفره‌های فوق الترقوی (supraclavicular fossae)

۸. مسافات بین الضلعی

۹. تصبغات (pigmentations)، سکارها و اندفاعات جلدی جدار صدر

۱۰. Apex beat و هرگونه نبضان که در جدار صدر موجود باشد

(۱) شکل صدر

صدر از لحاظ شکل دو نوع است:

(الف) صدر نارمل:

صدر نارمل در مقطع عرضانی به شکل بیضوی است، یعنی قطر قدامی خلفی آن نسبت به قطر مستعرض آن کوتاهتر است. به صورت نارمل نسبت بین این اقطار ۵/۳ است.

صدر نارمل یعنی صدر بیضوی شکل دو نوع است:

- نوع asthenic: طویل و باریک بوده و در اشخاص قدبلند و لاغر دیده می‌شود. این شکل صدر در مریضان مصاب سندروم Marfan یک علامه مهم تلقی می‌شود (مريض ectomorphic).
- نوع sthenic: عریض بوده و قطر عمودی آن کوتاهتر است. این نوع صدر در اشخاص قد کوتاه دیده می‌شود (مريض mesomorphic).

(ب) اشکال غیر نارمل صدر:

اشکال غیر نارمل صدر قرار ذیل اند:

صدر بیرل مانند (barrel shape): در این نوع صدر اضلاع به صورت مایل قرار داشته و قطر قدامی خلفی صدر طویل می‌باشد. زاویه Louis برجسته‌تر است. این نوع صدر در امفزیما دیده می‌شود. در واقعات شدید طوری دیده می‌شود مثلی که صدر به وضعیت شهیق عمیق قرار داشته باشد.

شکل کبوتر مانند (pigeon shape/pectus carinatum): در این نوع صدر عظم sternum به قدام برجسته است. صدر در مقطع عرضانی به شکل مثلثی دیده می‌شود. این شکل صدر در واقعات ذیل دیده می‌شود:

- رکتس نوجوانان

● تکرر انتانات تنفسی در سن جوانی

صدر Ricketic: این نوع صدر دو علامه فزیک را نشان می‌دهد:

۱. Ricketic rosary: در این صورت، جنکشن‌های ضلعی غضروفی برجسته می‌باشند.

۲. Harrison's sulcus: این میزابه در اذای xiphesternum آغاز شده و به طرف خارج و خفیفاً به طرف سفلی ادامه دارد. این میزابه در امتداد خط اتصالی دیافراگم تشکیل می‌شود.

صدر قیف مانند (Funnel shape/ Pectus excavatum): در این نوع صدر فرورفتگی قسمت سفلی عظم قص وجود داشته که به شکل قیف مانند در خط متوسط دیده می‌شود. این نوع صدر در کفش‌دوزان دیده می‌شود زیرا در زمان دوختن کفش‌ها توسط خلف دست‌های شان بالای قسمت سفلی صدر فشار وارد می‌کنند. به صورت ولادی نیز دیده می‌شود.

صدر غیر متناظر یا کج: در این صورت یک طرف یا یک قسمت صدر فرورفتگی یا برجستگی را نشان می‌دهد. این حالت از سبب امراض اضلاع (osteomyelitis)، فقری (scoliosis و kyphosis)، یا کسر اضلاع یا امراض ریوی (collapse) به وجود می‌آید.

(۲) تناظر صدر

صدر نارمل به صورت دو طرفه متناظر می‌باشد. یک صدر غیرمتناظر ممکن یکی از این‌ها را داشته باشد:

● برآمدگی (bulging)

● فرورفتگی (retraction)

برآمدگی (bulging) صدر ممکن از سبب حالات ذیل باشد:

● انصباب پلورا (pleural effusion)

● pneumothorax

● kyphosis یا scoliosis ستون فقرات

- cardiomegaly کتلوی

- تومور داخل صدري

- کسر یا سوءشکل اضلاع

فرورفتگی (retraction) صدر ممکن از سبب حالات ذیل باشد:

- کولپس یا فایبروز ریوی

- ضخیم شدن پلورا

- عملیات thoracoplasty

(۳) کتله و تورم

بعضاً در جدار صدر کتله (mass) یا تورم (swelling) دیده می‌شود. شکل، رنگ، اندازه و محل آن باید ملاحظه گردد. این یافته باید بعداً توسط جس تأیید گردد.

(۴) حرکات صدر

حرکات صدر باید از قدام، خلف و از بالا دیده شوند. معاینه کننده باید در طرف پاهای مریض ایستاد شده و حرکات صدري و اتساع صدر را به قضاوت بگیرد. در حالت عادی هر دو طرف صدر به طور مساویانه در اثنای شهیق برجسته می‌شوند، اما در بعضی از امراض یک طرف یا یک قسمت صدر در حرکات کمتر سهم می‌گیرد.

(۵) تنفس (Respiration)

ریت، ریتم و نوع تنفس باید ارزیابی شود. ریت نارمل در کاهلان ۱۲-۲۰ تنفس فی دقیقه می‌باشد. تزايد ریت تنفس به نام tachypnea یاد می‌شود. dyspnea یک عرض نفس‌تنگی است که توسط مریض احساس می‌شود. توقف تنفس به نام apnea یاد می‌شود.

حالا ببینید که ریتم تنفس چگونه است آیا منظم است یا غیر منظم؟

ببینید که تنفس بطني صدري است یا صدري بطني. در تنفس بطني صدري قسمت علوی بطن در زمان شهیق برجسته می‌شود؛ اما در تنفس صدري بطني قسمت علوی جدار بطن در زمان شهیق فرو می‌رود. تنفس نارمل در نزد مردان بطني صدري است در حالی که در نزد خانم‌ها به شکل صدري بطني می‌باشد.

انواع دیگر تنفس‌ها عبارت اند از:

تنفس Cheyne Stokes: در این نوع تنفس عمق و سرعت تنفس تدریجاً افزایش می‌یابد تا این که به حد اعظمی خود می‌رسد؛ بعداً تنفس بطی‌تر و سطحی‌تر شده تا این که مرحله apnea فرا می‌رسد. این سایکل بار بار تکرار می‌شود. این نوع تنفس در حالات ذیل دیده می‌شود:

- عدم کفایه قلب
- امراضی که بصله را ماؤوف می‌سازد
- تسمم با ادویه نارکوتیک

بعضاً در اثنای خواب و در نزد کاهلان بدون موجودیت کدام سبب به وجود می‌آید. **مکانیزم تنفس Cheyne Stokes:** در ابتداء عمق و سرعت تنفس نسبت به حالت معمول بیشتر است. این حالت باعث سقوط PCO_2 در خون ریوی می‌گردد. چند ثانیه بعد این خون ریوی به دماغ رسیده باعث نهی تنفس می‌شود. در نتیجه نهی تنفس PCO_2 خون اسناخ ریوی به تدریج متزاید می‌شود. بعد از تأخیر کوتاه خون که حاوی CO_2 بیشتر است به دماغ رسیده باعث تنبیه مرکز تنفسی می‌شود و تنفس دوباره آغاز می‌شود؛ بدین وسیله یک سایکل جدید آغاز می‌گردد. **اپنیای مرکزی:** حملات apnea هنگام خواب در نزد بعضی از افراد از سبب توقف مکمل جهد تنفسی به وجود می‌آید.

اپنیای انسدادی: اپنیا در نزد بعضی از اشخاص در هنگام خواب به رغم تداوم جهد تنفسی به وجود می‌آید. این حالت از سبب موجودیت کدام انسداد در بلعوم به وجود می‌آید.

تنفس Acidotic (تنفس Kussmaul): یک نوع تنفس سریع و عمیق بوده و در اسیدوز (ketoacidosis، uremia) به وجود می‌آید.

(۶) شزن (Trachea)

مشکل است تا موقعیت دقیق شزن تعیین گردد مگر این که به اندازه کافی تغییر موقعیت نموده باشد.

(۷) حفرات فوق الترقوی (Supraclavicular fossae)

پر بودن حفره فوق الترقوی باید ملاحظه گردد، زیرا در امفیما و تومور ذروه کم عمق بوده اما در کولپس و فایبروز فصل‌های علوی ریه‌ها عمیق‌تر می‌شود.

(۸) مسافات بین الضلعی (Intercostal spaces)

برای دریافت حالات ذیل دیده شود:

- برجستگی (emphysema)
- حرکات معکوس در فلج عضلات بین الضلعی
- نبضان در coarctation ابهر که باعث ضخامه شرائین بین الضلعی گردیده باشد، دیده می‌شود.

(۹) تصبغات، سکار و اندفاعات جدار صدری

جلد جدار صدر ممکن چون مرض Addison یا malignancy ها صباغی شود. در صورتی که مریض تحت عمل جراحی قرار گرفته باشد یا در جدار صدر کدام ترضیض دیده باشد سکارها به مشاهده می‌رسند.

(۱۰) Apex beat

دیده شود که آیا این ضربان ذروه (apex beat) قابل دید است. نبضان‌ها (pulsations) ممکن در عنق یا در جدار صدر دیده شوند. تفصیل آن در فصل سیستم قلبی و وعایی ذکر گردیده است.



◆ جس (Palpation)

جس به منظور تأیید علایم تفتیش اجراء می‌شود.

۱. شزن
۲. اتساع (expansion) جدار قدامی و جدار خلفی صدر
۳. اهتزازات صوتی قابل جس
۴. جس ذروه‌ها
۵. Impulse قلب / Apex beat
۶. حساسیت (tenderness)، تموج (fluctuation) و crepitation ها

۷. تورم (swelling) و کتله (mass)

۱. شزن

شزن باید در ابتدا جس شود. در اثنای جس شزن مریض باید در بستر به وضعیت اضطجاع ظهري قرار داشته و رأس وی باید توسط دست چپ معاینه کننده تثبیت شود. می شود سه انگشت (انگشت شهادت، انگشت متوسط و انگشت حلقوی) را طوری قرار بدهید که انگشت شهادت و انگشت حلقوی بالترتیب بالای مفاصل sternoclavicular و انگشت متوسط غرض جس فضای بین عضله sternomastoid هر دو طرف و شزن آزاد باقی بماند.

یادداشت: انحراف جزئی شزن به طرف راست یک یافته نارمل است.

حالاتی که در آن شزن به طرف آفت کش می شود عبارت اند از:

- کولپس ریوی
- فایبروز ریوی

حالاتی که باعث راندن شزن به طرف مقابل می شود عبارت اند از:

- Pneumothorax
- انصباب پلورا
- تومورهای منصف علوی

Splinting شزن: در صورتی که شزن به طرف فایبروز یا کولپس ریوی بیجا نشود و یا از سبب انصباب پلورا به طرف مقابل رانده نشود به نام splinting شزن یاد می شود.

اتساع صدر (Expansion of chest) در حالات ذیل متناقص می شود:

- فایبروز ریوی
- انصباب پلورا
- کولپس ریوی
- تکاثف (consolidation)

● Emphysema

● Pneumothorax

میتود اتساع صدر توسط تثبیت نوک انگشتان هر دو دست بالای دو طرف صدر صورت می‌گیرد طوری که نوک‌های انگشتان شست در خط متوسط باهم متلاقی شوند اما با جدار صدر تماس ننمایند. این عملیه در قدام و خلف جدار صدر اجراء شده می‌تواند. حالا از مریض بخواهید که نفس‌های عمیق بکشد. فاصله حرکت هر انگشت شست را از خط متوسط مشاهده نموده و آن‌ها را با هم مقایسه کنید. اگر یک انگشت شست به خط متوسط نزدیک‌تر باقی بماند نشان‌دهنده کاهش اتساع صدر ناحیه مرضی در همان ناحیه است.

اگر اتساع صدر توسط یک فите که در اطراف صدر پایین‌تر از نوک پستان‌ها گذاشته می‌شود اندازه شود حد نارمل آن در زمان شهیق ۵-۸ سانتی‌متر می‌باشد.

جس ذروه‌ها

برای جس ذروه‌ها مریض باید به حالت نشسته قرار گرفته و رأس وی کمی به قدام متمایل باشد. بعداً معاینه کننده در عقب مریض قرار گرفته و هر دو دست خود را بالای شانه مریض طوری قرار می‌دهد که انگشتان وی به طرف قدام و انگشت شست وی به طرف ناحیه رقبی متوجه گردد. در این وقت از مریض تقاضا می‌گردد که نفس‌های عمیق بکشد. حرکات انگشتان باید به صورت مقایسوی ملاحظه گردد.

اهتزازات صوتی قابل لمس (Tactile vocal fremitus)

به این منظور کف دست و نوک انگشتان دست را به صورت هموار بالای نقاط مشابه در دو طرف صدر قرار داده و از مریض می‌خواهیم که کلمات چهار، چهل یا چهل و چهار را اداء نماید.

یادداشت: فعلاً توصیه می‌شود که vocal fremitus بعد از اصغا معاینه شود.

اهتزازات صوتی در حالات ذیل متزاید می‌شوند:

- تکاثف (consolidation)
- کعف (cavitation)
- کولپس ریوی که با یک قصبه باز در ارتباط باشد

اهتزازات صوتی در حالت ذیل متناقص می‌شوند:

- ضخیم شدن پلورا
- انصباب پلورا
- فایبروز
- کولپس ریوی که با یک قصبه بسته در ارتباط باشد
- Pneumothorax

اهتزاز اصطکاکی (friction fremitus): در صورت موجودیت التهاب پلورا، pleural rub توسط جس احساس می‌شود.

اهتزاز رانکایی (Rhonchial fremitus): rhonchi خشن ممکن توسط دست‌ها احساس شود.

۵. ضربان ذروه (Apex beat / Cardiac impulse)

تفصیل بیشتر آن در فصل معاینه سیستم قلبی و وعایی ذکر گردیده است. به هر صورت آفات ریوی که باعث بیجاشدن آن می‌شوند عبارت اند از:

- انصباب پلورا
- Pneumothorax
- فایبروز ریوی
- کولپس ریوی
- سوءشکل صدر (صدر قیف مانند)
- سوءشکل ستون فقرات (scoliosis)

۶. حساسیت (tenderness)، تموج (fluctuation) و crepitationها

صدر ممکن از سبب عوامل ذیل هنگام جس دردناک (tender) باشد:

- آفات التهابی عضلی اسکلتی
- Tietze (costochondritis)

● Herpes zoster

● تومورهای ثانوی اضلاع

در صورت تشکل آبسه جدار صدري (tuberculous empyema necessitans) یا osteitis که اضلاع را ماؤوف بسازد تموج احساس می‌شود.
در صورت موجودیت امفزیمای تحت الجلدی از سبب ترصیضات نافذهی صدر یا اختلاط تیوب تخلیه‌کننده نوموتورکس، crepitationهای جلدی احساس می‌شوند.

۷. تورم (swelling) یا کتله (mass)

در صورت موجودیت تورم یا کتله جس باید طوری اجراء گردد که مریض احساس درد ننماید. محل، اندازه و وسعت تورم باید ملاحظه شود. در صورت موجودیت کتله لازم است تا قوام، شکل و حساسیت آن جس گردد. آیا نبضانی است یا خیر؟



◆ قرع (Percussion)

قواعد قرع:

- قرع باید از ناحیه resonant به طرف ناحیه dull اجراء گردد.
- pleximeter (انگشت متوسط دست چپ) باید به صورت موازی با کنار عضوی که قرع می‌شود گذاشته شود.
- pleximeter باید بالای جلد بدن تماس صمیمی داشته باشد.
- باید توسط plexor (انگشت متوسط دست راست) بالای phalanx متوسط pleximeter عموداً ضربه وارد شود.
- حرکات باید در مفاصل بند دست و انگشتان باشند.
- توسط plexor دو بار ضربه وارد نمایید و بعداً آن را از pleximeter دور نمایید؛ یعنی plexor نباید به تماس pleximeter باقی بماند، زیرا باعث توقف overtone گردیده و بدین وسیله باعث تغییر وصف آواز مؤلده می‌گردد.
- خط قرع باید عمود بر کنار عضوی که قرع می‌شود، باشد.

- برای قرع صدر، دست چپ بالای صدر طوری گذاشته می‌شود که کف دست به طرف پایین باشد و انگشتان دست قسماً از هم جدا باشند.
ترتیب قرع:

یادداشت: همیشه نقاط مشابه هر دو طرف را مقایسه کنید.

عملیه قرع اولاً در قدام و جوانب و بعداً در خلف صدر اجراء می‌گردد.
قرع جدار قدامی صدر: اولاً ذروه‌های ریه، بعداً clavicleها، بعداً فضا‌های تحت ترقوی و بالآخره جدار قدامی صدر قرع می‌گردد. باید مواظب باشید که pleximeter از dullness قلب دورتر قرار بگیرد.
قبل از قرع صدر، لازم است تا کنار علوی کبد قرع شود. میتود آن در مبحث معاینه طرق معدی معایی ذکر گردیده است.

قرع ذروه‌ها: رأس مریض را به طرف مقابل تدویر داده و انگشت pleximeter تان را بالاتر از ثلث انسی clavicle در امتداد کنار قدامی عضله trapezius قرار دهید، بعداً قرع را اجراء کنید.

قرع clavicleها: یک انگشت تان را بالاتر از clavicle و انگشت دیگر تان را پایین‌تر از آن قرار دهید تا جلد بالای clavicle تثبیت شود.

حالا clavicle را مستقیماً قرع نمایید بدون این که از pleximeter استفاده نمایید. امروزه برای قرع clavicle از pleximeter نیز استفاده می‌شود.

قرع جدار خلفی صدر: مریض باید در بستر به وضعیت نشسته قرار گرفته و دست‌های خود را از قدام صدر عبور داده و بالای شانه‌های خود قرار دهد. حالا قرع به روش معمول اجرا می‌گردد.

قرع جوانب صدر: از مریض بخواهید تا دست‌های خود را بالای رأس خود قرار دهد. حالا قرع را در جوانب از بالا به پایین اجراء نمایید.

حرکات دیافراگم (Tidal percussion): برای معاینه آن، از مریض بخواهید تا بالای بستر به وضعیت نشسته قرار بگیرد. قرع در خلف از بالا به پایین تا زمانی

اجرا می‌گردد که آهنگ resonant به dull تبدیل شود. plexor را در همان نقطه نگهداشته و از مریض بخواهید که شهیق عمیق نموده و نفس خود را نگهدارد. دوباره قرع را اجرا نمایید. حالا آهنگ قرع دوباره resonant می‌شود. آهنگ resonant تا ۲ - ۳ سانتی‌متر پایین‌تر از نقطه اولی را در بر خواهد گرفت. این تغییر از سبب حرکت رو به پایین دیافراگم در نتیجه شهیق عمیق به وجود می‌آید. در آبه آمایی کبد حرکت گنبد راست دیافراگم از بین خواهد رفت. تخریب عصب phrenic ممکن منجر به از بین رفتن حرکات گنبدیهای دیافراگم شود.

معاینه دیگری که توسط آن فلج دیافراگم تشخیص شده می‌تواند این است که از مریض خواهش می‌نماییم تا نفس عمیق بگیرد، حالا اعداد را به آهستگی حساب می‌نماییم. شمارش اعداد در یک فرد نارمل تا ۲۰ می‌رسد، اما در موجودیت فلج دیافراگم تنفس قبل از حساب کردن تا ۲۰ به اتمام می‌رسد.

Myodemia: در نزد مریضان مصاب امراض ضعیف کننده، اگر بالای عظم قص قرع اجرا گردد باعث تقلص عضلات صدری می‌گردد. این از سبب تخرشیت زیاد عضلات به وجود می‌آید. این پدیده به نام myodemia (myotatic irritability) یاد می‌شود.

آهنگ‌های قرع:

آهنگ (note) نارمل قرع ریه‌ها resonant است. درجه resonance در بخش‌های مختلفه صدر متفاوت است. نواحی پایین‌تر از clavicle و scapula ها از سبب طبقات عضلی نازک resonant تر اند.

سایر انواع آن قرار ذیل اند:

- **طبلی (Tympanitic):** در کف ریوی حاوی هوا موجود است. این نوع آهنگ به صورت نارمل بالای معده خالی شنیده می‌شود.
- **Impaired:** این نوع آهنگ در محل اتصال اعضای جامد با ریه‌ها موجود می‌باشد. مثلاً در کنار علوی کبد و در کنارهای قلب.

- **dull:** اگر قرع بالای اعضای جامد از قبیل کبد، طحال و قلب اجراء شود اصمیت (dullness) موجود می‌باشد.
- **Stony dull:** اصمیت سنگ مانند بالای مایع شنیده می‌شود؛ مثلاً در انصباب پلورا و در ascites.

آهنگ قرع در حالات ذیل dull است:

- ضخامه پلورا
- کولپس ریوی
- تکاثف ریوی
- مایع در جوف پلورا (stony dullness)

آهنگ قرع در حالات ذیل hyperresonant است:

- Emphysema
- Pneumothorax
- بالاتر از سویه انصباب پلورا (skodiac resonance): این از سبب موجودیت مقدار قابل ملاحظه هوا در ریه که بالای مایع شناور باشد به وجود می‌آید.



◆ اصغا (Auscultation)

قبل از عملیه اصغا لازم است تا جدار صدر مریض کاملاً برهنه باشد و در بستر به وضعیت اضطجاع ظهري قرار داشته باشد.

تکنیک اصغا:

۱. دیافراگم ستاتسکوپ نسبت به bell آن ترجیح داده می‌شود، زیرا آوازه‌های صدی دارای فرکانس نسبتاً بلندتر اند. در نزد افرادی که صدر مشعر داشته باشند یا لاغر باشند، آوازه‌های اضافی که تفکیک آن با pleural rub و crackleها مشکل است شنیده می‌شود. در این صورت کاربرد بل نسبت به دیافراگم ترجیح داده می‌شود.

۲. قطعه صدری ستاتسکوپ باید بالای جدار صدر طوری قرار داده شود که با جلد تماس صمیمی پیدا کند اما نباید بالای آن فشار اضافی وارد شود. باید مواظب بود که قطعه صدری بالای جلد حرکت ننماید.
۳. نخست باید قدام و بعداً خلف جدار صدری اصفا شود.
۴. در زمان اصفا باید از مریض تقاضا شود تا از طریق دهن تنفس نماید.

میتود اصفا:

۱. ساحه ۲-۳ سانتی متر دورتر از خط متوسط را اصفا نکنید.
۲. دو طرف باید به صورت متناوب در نقاط مشابه اصفا شوند.
۳. عملیه اصغای قدام صدر باید از بالای clavicle شروع شده تا به ضلع ششم ادامه داده شود.
۴. در جوانب از ابط شروع شده تا به سویه ضلع یازدهم ادامه داده می شود.
۵. در خلف به طرف پایین تا سویه ضلع ۱۱ ادامه داده می شود.
۶. اگر لازم باشد عملیه اصفا را بعد از سرفه تکرار نمایید.
۷. غرض اصغای خلف مریض از وی تقاضا می شود تا به حالت نشسته قرار گرفته و دستهای خود را بالای شانه های مقابل خود قرار دهد؛ یعنی دست چپ باید بالای شانه راست و دست راست بالای شانه چپ گذاشته شود. بدین وسیله شانه ها دورتر واقع شده و نواحی بیشتر ریه در معرض دید معاینه کننده قرار می گیرند. به هر صورت اگر مریض ضعیف باشد در آن صورت باید اولاً به یک پهلوی و بعداً به پهلوی دیگر قرار داده شود.
۸. تنفس باید پرسروصدا نباشد.
۹. از تنفس عمیق و طولانی ممانعت شود.

هدف اصفا:

چهار مشاهده ذیل باید در هر نقطه اصفا در نظر گرفته شود:

۱. شدت آوازه های تنفسی
۲. وصف آوازه های تنفسی

۳. آوازهای اضافی

۴. وضاحت صوتی (vocal resonance)

(۱) شدت آوازهای تنفسی

شدت آوازهای تنفسی هر دو طرف صدر باید باهم مقایسه شوند.

(۲) وصف آوازهای تنفسی

سه نوع تنفس وجود دارد:

تنفس vesicular: زمانی تولید می‌شود که هوا از طرق هوائی کوچک عبور نماید. به صورت نارمل در صدر موجود می‌باشد یعنی این یک آواز ریه نارمل است.

اوصاف:

- زفیر نسبت به شهیق کوتاه‌تر است (تقریباً ۱:۲).
- شهیق نسبت به زفیر خشن‌تر است.
- در بین شهیق و زفیر وقفه وجود ندارد.
- وصف صدای برگ خشک (rustling) را دارد. آواز rustling زمانی ایجاد می‌شود که هوا از میان برگ‌های خشک درخت عبور نماید.

انواع:

- تنفس کودکانه (puerile) در اطفال موجود می‌باشد.
- تنفس از هم گسیخته (interrupted) در parkinsonism موجود می‌باشد.
- تنفس vesicular با زفیر طولانی در انسداد طرق هوائی (استما) به وجود می‌آید.

تنفس bronchovesicular: این آواز به صورت نارمل در نواحی که قصبات سطحی‌تر قرار دارند شنیده می‌شود. در قسمت‌های ذیل خوبتر شنیده می‌شود:

- ناحیه interscapular
- ذروه ریه راست

اوصاف:

- هر دو زفیر و شهیق خشن هستند.

- زفیر طولانی است.
 - در بین شهیق و زفیر وقفه کوتاه وجود دارد.
- تنفس bronchial:** یک تنفس پتالوژیک است.

اوصاف:

- از لحاظ وصف وزشی (blowing hollow) است.
- زفیر ممکن طولانی باشد.
- زفیر نسبت به شهیق خشن تر و شدیدتر است.
- در بین شهیق و زفیر وقفه وجود دارد.
- بالای manubrium sterni، فقره چهارم spine صدی و پشت گردن ممکن شنیده شود. به صورت نارمل از سبب عبور هوا از طریق شزن و قصبات بزرگ شنیده می شود.

اسباب:

- Consolidation
- Cavitation
- Collapse که با قصبه باز در ارتباط باشد

انواع:

- Tubular consolidation در موجود می باشد.
- Cavernous cavitation در موجود می باشد.
- Amphoric در pneumothorax موجود می باشد. شبیه صدایی است که از سبب دمیدن در داخل دهانه یک بوتل حاصل می شود.

آوازه های تنفسی ممکن در حالات ذیل معدوم بوده یا به صورت قابل ملاحظه

متناقض باشند:

- ضخیم شدن پلورا
- انصباب پلورا
- Pneumothorax

- انسداد قصبی
- جدار ضخیم صدر

(۳) آوازهای اضافی (Added sounds)

دو نوع اند:

(الف) آوازهای اضافی خارج ریوی:

۱. **pleural rub**: از لحاظ وصف شبیه مالش دو ورقه چرم بر روی همدیگر است. یعنی مانند غرغر کردن که به سبب اصطکاک دو ورقه ایجاد می‌شود. توسط نکات ذیل از course crepitation تشخیص تفریقی می‌شود:

- pleural rub با سرفه تغییر نمی‌کند.
- شدت آواز با گذاشتن ستاتسکوپ یا تنفس عمیق بیشتر می‌شود.
- pleural rub موضعی‌تر است.
- در اخیر شهیق و در شروع زفير شنیده می‌شود.

وصفی برای التهاب پلورا (pleurisy) می‌باشد و در مرحله‌ای که exudate به اندازه‌ای نباشد که دو سطح التهابی و درشت پلورا را از هم جدا سازد به وجود می‌آید. pleural rub در بعضی حالات قابل جس می‌گردد.

یادداشت:

- آوازهای اضافی کاذب که مشابه pleural rub هستند ممکن به اثر حرکت ستاتسکوپ بالای جلد یا لباس مریض به وجود آید.
- صدر موی‌دار ممکن آوازهای شبیه crackleهای ظریف را از سبب اصطکاک دیافراگم ستاتسکوپ تولید کند.
- pneumothorax click: یک آواز ریتمیک است که با ضربان قلب به صورت همزمان شنیده می‌شود. زمانی تولید می‌شود که در بین طبقات پلورای که بالای قلب قرار دارند هوا موجود باشد.

۲. **Succussion splash (Hippocratic succussion)**: در pneumo-

hydrothorax زمانی که مریض را به صورت سریع تکان داده و دست‌های خود را

بالای اضلاع پایین‌تر از یک سمت به سمت دیگر قرار دهیم یک آواز چلپ چلوپ (splash) که توسط حرکت مایع در جوف پلورا تولید می‌شود شنیده می‌شود.

۳. **علامه آواز سکه (coin sound):** در pneumothorax، زمانی که یک سکه بالای سکه دیگری در قدام صدر زده شود یک آواز خاص را در خلف صدر توسط عملیه اصغا شنیده می‌توانیم.

۴. **Forced expiratory time (FET):** از مریض بخواهید که شهیق عمیق نماید، بعداً زفیر سریع انجام دهد. زمان زفیر را ملاحظه کنید. در حالت نارمل کمتر از ۴ ثانیه است. در صورت موجودیت استمای قصبی، امفزیما و برانشیت مزمن زفیر طولانی‌تر می‌شود.

(ب) آوازهای اضافی ریوی:

۱. **wheeze (rhonchi):** عبارت از یک آواز متداوم است که توسط عبور هوا از بین قصبات تنگ شده تولید می‌شود. قصبات در حالات ذیل تنگ می‌شوند:

- اذیمای غشای مخاطی قصبات
- سپازم عضلات جدار قصبات
- پلگ‌های سخت مخاطی که در زمان تنفس اهتزاز می‌نمایند

انواع:

● **polyphonic wheezes:** این آوازاها از سبب انسداد منتشر جریان هوا در زمان زفیر شنیده می‌شوند. در حالات ذیل شنیده می‌شوند:

● Asthma

● COPD

● Bronchitis

در استما wheezeها دارای فرکانس بلند یا متوسط می‌باشند و در زمان زفیر شنیده می‌شوند.

در COPD، wheeze دارای فرکانس متوسط یا پایین می‌باشد و در زمان شهیق و زفیر شنیده می‌شوند.

● **monophonic wheezes**: آوازهای موضعی هستند. در صورت تنگ شدن قصبه واحد از سبب جسم اجنبی یا تومور به وجود می‌آید. در اثنای شهیق یا زفیر شنیده می‌شود. شدت آن ممکن با تغییر وضعیت تغییر نماید.

۲. **stridor**: یک آواز بلند است که بدون ستاتسکوپ هم شنیده می‌شود. می‌تواند شهیقی یا زفیری باشد. در حالاتی چون تنگ شدن موضعی شزن و التهاب حنجره شنیده می‌شود.

۳. **crepitation (crackles)**: عبارت از یک آواز متقطع است که به سبب موجودیت مخاط یا مایع در قصبات یا اسناخ تولید می‌شود. وصف آن مشابه جوش خوردن (bubbling)، ترکیدن‌های متکرر یا ترق و تروق (crackle) است. اگر طرق هوایی بزرگ مملو از مخاط باشد آواز crackleهای خشن حتی بدون ستاتسکوپ نیز شنیده می‌شود. در bronchiectasis آوازهای crackle موضعی هستند. با سرفه کردن وصف crackleها تغییر می‌نماید.

انواع:

- ملایم (fine)
- متوسط (medium)
- خشن (course)

Crackleها در حالات ذیل شنیده می‌شوند:

- COPD
- Bronchiectasis
- Pulmonary edema
- Diffuse interstitial alveolitis
- Resolving pneumonia

(۴) وضاحت صوتی (Vocal resonance)

از مریض بخواهید تا چهل چهل یا چهار را اداء نماید. بعداً عملیه اصغا را انجام دهید.

تزايد vocal resonance به نام bronchophony یاد می‌شود.

vocal resonance در حالات ذیل متزايد می‌شود:

● consolidation

● cavitation

● collapse که با یک قصبه باز در ارتباط باشد

آواز صدري نجوایی (whispering pectoriloquy): از مريض بخواهید تا اعداد ۱،

۲، ۳ را نجوا کند. با اصغا، کلمات اداء شده چنان واضح شنیده می‌شود مثلی که

در گوش به صورت مستقیم صحبت می‌شود. در consolidation شنیده می‌شود.

علامه E spine: تنفس bronchial بالای spine های فقرات چهارم، پنجم و ششم

در کاهلان و در spine های فقرات اول، دوم و سوم صدري در اطفال در صورت

موجودیت tuberculous mediastinal lymphadenitis شنیده می‌شود.

Aegophony: این آواز چنان شنیده می‌شود گویا مريض از طریق بینی خود

صحبت می‌کند. در سوبه علوی مایع پلورایی یا بعضاً بالای ناحیه consolidation

بهرتر شنیده می‌شود. در زاویه سفلی scapula شنیده می‌شود.



♦ تشخیص تفریقی hematemesis و hemoptysis

Hemoptysis	Hematemesis
اولاً سرفه و بعداً خونریزی واقع می‌شود.	اولاً دلبدی و استفراغ و بعداً خونریزی واقع می‌شود.
خون از سبب مخلوط شدن با هوا کف‌دار می‌باشد.	خون معمولاً با ذرات غذایی مخلوط می‌باشد.
رنگ آن سرخ روشن می‌باشد.	رنگ خون از سبب مخلوط شدن با محتویات معدی تغییر یافته می‌باشد.
قلیوی	اسیدی
موجودیت تاریخچه امراض تنفسی	موجودیت تاریخچه امراض هضمی



♦ بذل افیوژن پلورا (Aspiration of pleural effusion)

استطبابات: aspiration مایع از جوف پلورا در حالات ذیل صورت می‌گیرد:

۱. ماؤوفیت قلبی یا تنفسی
 ۲. انصباب کتلوی
 ۳. اذیمای حاد ریه
 ۴. انتانات ثانوی مایع پلورایی
 ۵. موجودیت تب
 ۶. عدم جذب مایع پلورایی توسط کیموترایی
- وضعیت مریض:** مریض باید به قدام خم شود و بازوهای خود را بالای قسمت فوقانی میز بستر قرار دهد.

محل: محل توسط قرع و معاینه اکسری تعیین می‌گردد. معمولاً مسافه بین الضلعی هشتم در خط ابطی متوسط غرض اجرای aspiration انتخاب می‌گردد.

اگر پایان‌تر از آن اجرا گردد خطر صدمه کبد در طرف راست و طحال در طرف چپ وجود دارد. اگر مایع در یک جوف موضعی باشد کنار سفلی جوف انتخاب می‌گردد. **تکنیک:** تقریباً تمام سمت انتخاب شده باید تعقیم شود. به منظور انستری موضعی از پروکابین ۲٪ استفاده می‌گردد و تا پلورای جداری زرق می‌گردد. بعداً سوزن aspiration را در جلد بین دو ضلع داخل می‌نماییم. سعی شود تا از اعصاب و اوعیه بین الضلعی دورتر باشد و تا زمانی پیش می‌بریم که پلورای جداری را نفوذ نماید. در این ساحه مقاومت دفعتهاً ناپدید می‌شود. حالا سوزن را به سرنج ۲۰ ملی‌لیتره با two way stopcock وصل می‌نماییم. حالا مایع را خارج می‌نماییم. منحیث یک قاعده عمومی نباید بیشتر از ۱/۵ لیتر مایع را در یک زمان خارج نماییم (BTS)؛ در صورت درد صدر، سرفه یا عسرت تنفس، بذل باید زودتر متوقف شود. سوزن را بعد از aspiration خارج نموده و ساحه را با گاز که در محلول آبیودین‌دار مغطوس شده می‌پوشانیم. بعداً نمونه‌های مایع خارج شده را غرض معاینه و کلچر به لابراتوار ارسال می‌نماییم.



◆ تشخیص تفریقی اگزودت و ترانسودت

مشاهدات	اگزودت (Exudate)
رنگ	گاهی خونین
پروتین‌ها	اضافه‌تر از ۳ گرام فیصد
نسبت پروتین مایع و پروتین سیروم	اضافه‌تر از ۰/۵
حجرات	حجرات التهابی موجود می‌باشد
وزن مخصوصه	اضافه‌تر از ۱۰۱۸
سویه LDH	۲۰۰ واحد یا اضافه‌تر
سویه کولسترول	اضافه‌تر از ۴۵ ملی‌گرام فیصد



♦ ارتباط علایم فیزیکی و امراض سیستم تنفسی

آواز تنفسی	قرع	TVF	اتساع	شزن	حالت
bronchial	dull	↑	↓	مرکزی	Consolidation
↓/معدوم	stony dull	↓/معدوم	↓	به طرف مقابل	Pleural effusion
↓/معدوم	hyper-resonant	↓	↓	به طرف مقابل	Pneumothorax
↓	dull	↓	↓	به طرف مصاب	Collapse
bronchial	dull	↑/تارمل	↓	به طرف مصاب	Fibrosis
vesicular ↓ + wheeze	hyper-resonant	↓	↓ دو طرفه	مرکزی	COPD / Emphysema

جدول خلاصه ۴.۲: علایم فیزیکی در امراض عمده ریوی

ارزیابی عمومی:

معاینه سیستم تنفسی توأم با معاینه عمومی معلومات خوبی را در مورد امراض و وضعیت مریض ارائه می‌نماید.

- **هیكل و تغذی عمومی:** هیكل بدن مریض باید مورد مشاهده قرار بگیرد. مریض مصاب TB یا carcinoma لاغر می‌باشد. چاقی یکی از رسك فکتورهای مهم فرط فشار و امراض اسکیمیک قلب محسوب می‌شود.
- **آواز:** آیا آواز خشن است (laryngitis)؟ آیا مریض به صورت درست صحبت کرده می‌تواند؟ در استمای قصبی پیشرفته مریض قادر نیست تا به صورت درست صحبت کند یا سرفه نماید. موجودیت wheezing قابل سمع دیده شود (استمای قصبی). موجودیت stridor (آواز شهیقی پرفرکانس) نشان‌دهنده انسداد طرق تنفسی است.
- **عسرت تنفس (dyspnea):** شدت عسرت تنفس باید ملاحظه گردد. شدت عسرت تنفس نشان‌دهنده شدت مرض است.
- **Clubbing:** دست‌ها باید به منظور دریافت clubbing انگشتان دیده شوند. امراض صدري که باعث clubbing می‌شوند در فصل معاینه فیزیکی عمومی ذکر گردیده‌اند.

- **سیانوز و خسافت:** سیانوز نشان‌دهنده کاهش اکسیژن‌رسانی خون از سبب امراض ریوی (lobar pneumonia، COPD، کولپس ریوی) است. خسافت یا anemia نیز نزد مریض پالیده شود.
- **فرورفتگی‌های بین الضلعی:** موجودیت آن نشان‌دهنده شدت امراض تنفسی است.
- **استفاده از عضلات تنفسی ضمیمی:** از سبب امراض تنفسی شدید مریض دست‌های خود را بالای زانوهای خود تثبیت می‌نماید و عضلات sternomastoid را در هنگام تنفس به کار می‌برد.
- **لب‌های غنچه (pursed lips):** در COPD پیشرفته مریض برای این که به سهولت تنفس نماید لب‌های خود را غنچه می‌کند.
- **نبض:** هنگام جهد شدید برای شهیق در استمای قصبی ریت نبض افزایش می‌یابد در حالی که فشار خون کاهش می‌یابد (pulsus paradoxus).
- **عقدات لمفاوی:** عقدات لمفاوی در توبرکلوز و کارسینومای ریوی بزرگ می‌شوند.



Pneumonia ◆

التهاب ریه‌ها به نام pneumonia یاد می‌شود و به lobar و lobular تصنیف می‌شود. lobular pneumonia دوطرفه به نام bronchopneumonia یاد می‌شود. علایم lobar pneumonia وصفی می‌باشند.

علایم:

- اتساع صدی در ناحیه ماؤوفه کاهش می‌یابد.
- Vocal fremitus در ناحیه ماؤوفه افزایش می‌یابد.
- قرع: dull اما نه stony dull.
- آوازه‌های تنفسی bronchial است اگر طرق هوائی باز باشد.
- آوازه‌های اضافی: در مرحله ابتدائی fine crepitation و در مرحله بعدی course crepitation شنیده می‌شود.

- Vocal resonance تراید می‌نماید.
- Pleural rub ممکن موجود باشد.



◆ کولپس ریوی

اگر یک قصبه توسط تومور یا چیز دیگری مسدود شود، هوای آن قسمت از ریه که توسط قصبه مذکور تهویه می‌شود جذب گردیده و قسمت ماؤوفه ریه کولپس می‌نماید.

علامیم:

- شزن به طرف ساحه ماؤوفه بیجا می‌شود.
- اتساع صدر در ساحه ماؤوفه کاهش می‌یابد و جدار صدر در همان ناحیه هموار می‌شود.
- قرع در ناحیه ماؤوفه dullness به وجود می‌آید.
- آوازهای تنفسی کاهش می‌یابد و ممکن تنفس bronchial موجود باشد. اگر لوب به صورت مکمل کولپس نماید آوازهای تنفسی ممکن معدوم شوند.



◆ Pleural effusion

تجمع مایع در جوف پلورا به نام pleural effusion یاد می‌شود.

- شزن به طرف مقابل رانده می‌شود.
- اتساع صدر در ناحیه ماؤوفه کاهش می‌یابد.
- قرع بالای ناحیه ماؤوفه: stony dullness.
- آوازهای تنفسی به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته یا معدوم می‌شوند.
- Vocal resonance کاهش می‌یابد.



◆ امراض انسدادی مزمن ریوی (COPD)

COPD عبارت از طیفی از امراض است که شامل chronic و emphysema و bronchitis می‌باشد.

علائم امفیزما:

- مریض معمولاً سیانوتیک نبوده، بلکه dyspneic می‌باشد. بعضاً به نام پف‌کننده‌های گلابی (pink puffers) یاد می‌شوند.
- صدر بیرل مانند می‌باشد یعنی قطر قدامی خلفی آن متزاید می‌شود.
- Pursed lip breathing یعنی زفیر توسط لب‌های قسماً بسته صورت می‌گیرد.
- مریضان هنگام تنفس عضلات ضمیمه‌ی شان را استفاده می‌کنند و عضلات بین‌الضلعی سفلی‌شان در اثنای شهیق فرو می‌روند.
- جس: کاهش اتساع صدري با صدر بسیار متوسع.
- قرع: hyperresonant با کاهش dullness کبد.
- Wheeze معمولاً موجود نمی‌باشد.
- علائم عدم کفایه قلب راست ممکن در مراحل اخیر به وجود آیند.

علائم Chronic bronchitis:

- از سبب فرط ترشح قصبی و انسداد طرق هوایی به وجود می‌آید.
- سرفه با تقشع مخاطی یا مخاطی قیحی.
 - Cyanosis (این مریضان بعضاً به نام دودزده آبی یا blue bloaters یاد می‌شوند).
 - جس: صدر وسیع بوده و اتساع صدري کاهش می‌یابد.
 - قرع: تزاید resonance.
 - آوازه‌های تنفسی: کاهش آوازه‌های تنفسی، موجودیت wheeze با فرکانس بلند یا متوسط در اخیر زفیر و همچنان موجودیت crackle‌ها در شروع شهیق.



◆ Pneumothorax

لیکاژ هوا از ریه یا از جدار سوراخ شده صدر به داخل جوف پلورا باعث نوموتورکس می‌شود.

علائم:

- شزن به طرف مقابل بیجا می‌شود.
- اتساع صدر در طرف ماؤوفه متناقص می‌شود.
- قرع: hyperresonant.
- آوازه‌ای تنفسی به صورت قابل ملاحظه کاهش می‌یابند یا حتی معدوم می‌شوند.



◆ Tension pneumothorax

زمانی واقع می‌شود که یک ارتباط بین ریه و جوف پلورا ایجاد شود. مریض معمولاً tachypneic و cyanotic می‌باشد و حتی ممکن به شک برود.

علائم:

- شزن و ذروه از ناحیه ماؤوفه دورتر بیجا می‌شود.
- اتساع صدر در ساحه ماؤوفه کاهش می‌یابد یا حتی معدوم می‌شود.
- قرع بالای ساحه ماؤوفه hyperresonant می‌باشد.
- آوازه‌ای تنفسی معدوم می‌شوند.
- Vocal resonance کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود.



◆ Bronchiectasis

عبارت از توسع پتالوژیک قصبات است که از سبب تشوش در پاک شدن مخاط یا انتان مزمن به وجود می‌آید.

علائم:

- علائم سیستمیک: تب، لاغری، sinusitis.

- اگر مرض شدید باشد: cyanosis و clubbing.
- بلغم: مقدار قابل ملاحظه مخصوصاً هنگام صبح، قیحی، بعضاً توأم با خون.

یادداشت: تاریخچه موجودیت سرفه و تقشع قیحی از هنگام طفولیت در تشخیص کمک می‌کند.



◆ استمای قصبی (Bronchial asthma)

عبارت از حملات اشتدادی و مکرر wheezing است که از سبب انسداد طرق هوائی به وجود می‌آید و شدت آن با گذشت زمان تغییر می‌نماید.

علائم:

- wheezing
- tachypnea
- tachycardia
- زفیر طولانی
- استفاده از عضلات تنفسی ضمیموی
- صدر بسیار متوسع (تزايد قطر قدامی خلفی) با شانه‌های بلند و در قرع، کاهش dullness کبد.
- wheezeهای شهبی و زفیری



◆ کارسینومای برانکوجنیک (Bronchogenic carcinoma)

اکثر مریضان فاقد علائم اند.

علائم تنفسی:

- hemoptysis
- pneumonia
- pulmonary collapse

- pleural effusion
 - اضلاع حساس (tender ribs)
 - mediastinal compression (در این صورت ممکن اعصاب نیز مأؤوف باشند)
 - lymphadenopathy فوق الترقوی یا ابطی
- این تومور بیشتر به دماغ، کبد و مخ عظم میتاستاز می‌دهد.





فصل پنجم

معاینه اکسری صدر

شیمای مطالعه اکسری صدر (PA)

۱. کیفیت فلم

۲. اسکلپیت صدر

۳. وضعیت مریض

۴. موقعیت شزن

۵. سایه قلب ($CTR < 0.5$)

۶. منصف

۷. دیافراگم (راست ۲/۵ cm بلندتر)

۸. ریه‌ها و پلورا

شیمای ۵.۱: ترتیب مطالعه اکسری صدر

معاینه اکسری صدر، یک بخش مهم معاینه کلینیکی مریض را تشکیل می‌دهد. فلم ستندرد اکسری صدر منظره خلفی قدامی (PA) است که در این صورت فلم اکسری در مقابل صدر مریض قرار داده می‌شود.

شیمای مطالعه اکسری صدر

در هنگام مطالعه اکسری صدر نکات ذیل را در نظر بگیرید:

۱. کیفیت فلم
۲. معاینه اسکلیت صدر
۳. وضعیت مریض
۴. موقعیت شزن
۵. معاینه سایه قلب
۶. معاینه منصف
۷. معاینه دیافراگم
۸. معاینه ریه‌ها

۱. کیفیت فلم

در یک منظره خوب PA، فقرات و اضلاع در خلف قلب دیده می‌شوند.

۲. معاینه اسکلیت صدر

نکات ذیل را مشاهده کنید:

- کسرهای اضلاع قبلی یا فعلی
- آیا اضلاع در هم آمیخته‌اند (malunited ribs) یا از هم دور شده‌اند (emphysema)؟
- موجودیت اضلاع رقبی
- ساییده‌گی (erosion) یا بریده‌گی (notching) اضلاع؛ بریده‌گی سطح سفلی اضلاع یک علامه coarctation ابهر است. این حالت از سبب هایپرتروفی شرایین بین الضلعی به وجود می‌آید.
- فقرات کولپس شده
- Scoliosis

۳. وضعیت مریض

جهت ارزیابی این که آیا مریض در یک وضعیت مستقیم و درست ایستاد شده یا به یک طرف متمایل شده است، به نهایت انسی عظام clavicle نگاه کنید که

از ستون فقرات به کدام مسافه قرار دارند. در صورتی که مریض به صورت درست ایستاد شده باشد، باهم مساوی می‌باشند.

۴. موقعیت شزن


شزن را از روی موجودیت هوا (سایه سیاه در بین آن) شناسایی نموده می‌توانیم. در حالت نارمل شزن یک کمی به طرف راست متمایل می‌باشد. در صورت موجودیت انحراف واضح شزن از خط متوسط، باید اسبابی که سبب کش شدن یا تپله شدن آن می‌شود را دریافت نمود.

۵. معاینه سایه قلب

شامل بخش‌های ذیل می‌شود:

- اندازه قلب
- شکل قلب
- سایه ابهر
- سایه ریوی
- تکلسات قلبی

الف) اندازه قلب:



$CTR = A \div B$
 نارمل: کمتر از ۵/۵ (در فلم PA)
 بیشتر از ۵/۵: کاردیومگالی

شما ۵.۲: اندازه‌گیری نسبت قلبی صدی (CTR)

به صورت نارمل اندازه قلب کمتر از نصف قطر داخلی صدر می‌باشد. نسبت اندازه قلب و قطر داخلی صدر به نام نسبت قلبی صدری (cardio-thoracic ratio یا CTR) یاد می‌شود. در حالت نارمل CTR کمتر از ۰/۵ می‌باشد. در کاهلان اگر این نسبت بیشتر از ۰/۵ باشد، دلالت به بزرگ بودن اندازه قلب (cardiomegaly) می‌نماید که علت آن ممکن است توسع اجواف قلبی یا pericardial effusion باشد.

ب) شکل قلب:

شکل قلب نظر به امراض مختلفه قلبی متفاوت است. در واقعات که انصباب پریکارد (pericardial effusion) موجود باشد، اندازه قلب بزرگ شده و شکل آن کروی می‌شود. همچنان حدود آن واضح‌تر بوده و زوایای قلبی حجاب حاجزی (cardiophrenic) در مقایسه با نارمل بیشتر حاد می‌شوند. اگر اجواف قلبی بزرگ باشند، به منظره‌های خاصی که بزرگ شدن یک جوف خاص را نشان دهد نیاز است.

مایترلایزیشن قلب: در تضیق مایترل علایم تشخیصیه ذیل موجود اند:

۱. مستقیم شدن کنار چپ قلب به سبب بزرگ شدن appendage اذین چپ.
۲. اوعیه ریوی برجسته خواهند بود و تزیاید نشانه‌های ریوی (vascular marking) در فص‌های علوی ریه از سبب توزیع مجدد خون به وجود خواهند آمد. این تظاهر به نام علامه سرسانت‌من (sergeant major sign) یاد می‌شود.
۳. علایم احتقان ریوی نیز موجود خواهند بود (نشانه‌های ریوی برجسته خواهند بود).
۴. قصبه چپ به سبب توسع اذین چپ به طرف بالا تیله شده می‌باشد.
۵. موجودیت Kerley's B lines در زون سفلی ریه‌ها؛ اینها عبارت از خطوط افقی با طول ۱-۲ سانتی‌متر می‌باشند که به سبب ضخیم شدن اوعیه دموی و لمفاوی ناشی از فرط فشار ریوی به وجود می‌آیند.

۶. بلع باریم در منظره جنبی، دندانۀ (indentation) را از سبب بزرگ شدن اذین چپ نشان می‌دهد.

ج) سایه ابهر:

در فلم صدري دیده می‌شود که ابهر از کنار راست سایه قلب منشأ گرفته است، بعداً به سفلی دور می‌خورد و یک ساختمان مشابه به بند انگشت (knuckle) را می‌سازد که به صورت یک سایه نیمه هلالی در بلندترین نقطه سرحد چپ قلب دیده می‌شود. در سنين پيشرفته و در فرط فشار خون اين knuckle بیشتر برجسته می‌شود.

د) سایه شريان ريوي:

Pulmonary knuckle بلافاصله پایین‌تر از aortic knuckle قرار دارد. برجسته شدن این knuckle در واقعات ذیل دیده می‌شود:

- توسع بعد از تضيق شريان ريوي (poststenotic dilatation of pulmonary artery)

- افزایش جریان خون شريان ريوي

- فرط فشار شريان ريوي

- انوريزم شريان ريوي

هـ) تكلس (calcification) قلبي:

در حالت نارمل هیچ‌گونه تكلس در قلب دیده نمی‌شود. تكلس دسام مایترل، دسام ابهر، pericardium و قوس ابهر در پتالوژی‌های مختلف دیده شده می‌توانند.

۶. معاینه منصف (mediastinum)

منصف فضایی است که توسط sternum در قدام، فقرات در خلف و ریه‌ها در جوانب احاطه شده است. در اثنای معاینه منصف، اندازه، شکل و موقعیت آن باید مشاهده شود. موجودیت کتله‌ها (lymphoma) سبب توسع آن می‌شود.

۷. معاینه دیاфраگم

به صورت نارمل سطح علوی دیافراگم از یک زاویه ضلعی حجاب حاجزی (costophrenic) تا به زاویه دیگر واضحاً دیده می‌شود. دیافراگم در سمت راست نسبت به چپ به اندازه ۲/۵ سانتی‌متر بالاتر قرار دارد. اگر این تفاوت بیشتر از ۲/۵ سانتی‌متر باشد، دلالت به موجودیت بعضی پتالوژی‌ها چه در تحت دیافراگم (مانند amebic hepatitis) یا در فوق آن (مانند collapse یا fibrosis فص سفلی ریه راست) می‌کند.

در سمت چپ دیافراگم یک سایه سیاه به سبب موجودیت هوا در معده دیده می‌شود. در سمت راست به سبب موجودیت کبد کدام سایه دیده نمی‌شود.

● **یادداشت:** موجودیت سایه هوا در طرف راست دلالت به تثنقب معده یا امعاء می‌کند.

● **بلند بودن گنبد راست دیافراگم:** این منظره در amebic hepatitis دیده می‌شود.

۸. معاینه ریه‌ها

شامل بخش‌های ذیل است:

- الف) معاینه ساحات ریوی
- ب) معاینه سایه‌های سره
- ج) معاینه پلورا

الف) معاینه ساحات ریوی (lung fields):

از نظر کلینیکی ساحه ریوی به سه زون تقسیم می‌شود؛ سرحدات آن قرار ذیل اند:

۱. زون علوی: از ذروه ریه‌ها الی خطی که کنار سفلی غضروف ضلعی دوم را با هم وصل می‌کند را شامل می‌شود.
۲. زون متوسط: از خط غضروف ضلعی دوم الی خطی که کنار سفلی غضروف ضلعی چهارم را با هم وصل می‌نماید را شامل می‌شود.
۳. زون سفلی: از خطی که کنار سفلی غضروف ضلعی چهارم را با هم وصل می‌نماید الی قاعده ریه‌ها را شامل می‌شود.

● **یادداشت:** این تصنیف زون‌ها با لوب‌های ریوی مطابقت ندارد.

اوعیه خون و فیشرهای بین الفصی یگانه ساختمان‌هایی اند که در ساحه ریوی نارمل قابل دید هستند.

سایه‌های غیر نارمل داخل ریوی قرار ذیل اند:

۱. **سایه‌های ارتشاحی:** شامل سایه‌های منتشر با حدود غیر واضح است که در تمام ساحه ریوی پراکنده می‌باشد. می‌توانند یک‌طرفه یا دوطرفه باشند. اسباب آن قرار ذیل اند:

● اذیمای ریوی: در این صورت هر دو طرف ریه‌ها مؤؤف می‌باشند. سایه‌ها در نزدیک سره نسبت به محیط بیشتر متبازز می‌باشند. نواحی محیطی نسبتاً صاف می‌باشند. این نوع مؤؤوفیت به نام منظره بال‌های خفاش (bat's wings) یاد می‌شود.

● تکاثف (consolidation): ممکن است یک فص مکمل را در بر گرفته باشد (lobar pneumonia) یا به صورت ارتشاح منتشر باشد (bronchopneumonia). ساحه ریوی در صورت تکاثف، مکرر (opaque) می‌باشد.

● **یادداشت:** سایه ثدیه خانم‌ها ممکن است به صورت کاذب، تکاثف را در قاعده ریه‌ها تقلید نماید.

۲. **علائم کولپس (collapse) ریوی:**

● Opacity لوب واحد یا لوب‌های متعدد.

● بی‌جا شدن منصف یا دیافراگم نظر به این که کدام قسمت ریه مؤؤوف است به طرف ناحیه مؤؤوفه؛ سبب معمول آن توبرکلوز است.

۳. **فایبروز (fibrosis):** یکجا با موجودیت سایه‌های collapse در فایبروز ممکن علائم reticulonodular متراکم در پارانشیم ریوی دیده شوند. اسباب معمول آن توبرکلوز، sarcoidosis و pneumoconiosis است.

۴. **سایه‌های کروی (Spherical shadows):** ممکن است یک یا چندین سایه مدور با حدود واضح در ساحه ریوی موجود باشد. اسباب:

- کنسرهای ابتدائی
- متاستازها (منظره مرمی توپ یا cannon ball appearance)
- آبسه ریوی
- Tuberculosis granuloma

۵. **سایه‌های خطی:** عبارت از خطوط متعدد و نازک اند که به شکل منتشر در ساحه ریوی موجود می‌باشند. اینها خطوط septal اند و زمانی قابل دید می‌شوند که ضخیم شده باشند. موجودیت این خطوط دلالت بر موجودیت اذیمای ریوی، فرط فشار ریوی یا chronic bronchitis می‌نماید. این خطوط با اوعیه خون مغالطه شده می‌توانند؛ اما باید به خاطر داشت که اوعیه خون در دو سانتی‌متری محیط ریه‌ها دیده نمی‌شوند در حالی که سایه‌های خطی غیر نارمل در قسمت‌های محیطی ریه‌ها نیز به مشاهده می‌رسند.

۶. **سایه‌های کوچک منتشر:** جهت توضیح این سایه‌ها اصطلاحات ذیل به کار می‌روند:

- لکه‌ها (mottling)
- لانه زنبور عسل (honeycomb)
- نودیولر نازک (fine nodular)
- شبکوی (reticular)
- شبکوی نودیولر (reticulonodular)
- در این حالت سایه‌های کوچک پراکنده و متعدد با اندازه کمتر از ۱-۲ ملی‌متر در فلم صدري دیده خواهند شد.

۷. **کَهِف (Cavitation):** عبارت از یک سایه محدود و مشخص است که در نسج ریوی به مشاهده می‌رسد. این کَهِف‌ها به سبب موجودیت هوا در بین‌شان قابل دید می‌شوند. بعضی اوقات مایع نیز با هوا یکجا موجود بوده که در

این صورت یک سویه مایع-هوا (air fluid level) قابل دید می‌باشد. کُهِف یک علامه امراضی چون توبرکلوز، آبسه ریوی و کنسر است.

۸. **تکلس (Calcification):** تکلسات متعدد و کوچک در محراقات توبرکلوزیک التیام‌یافته یا hamartoma دیده می‌شود.

● **یادداشت:** افزایش translucency ساحه ریوی، وسیع شدن مسافات بین‌الضلعی از همدیگر و سایه کوچک قلب از جمله علایم emphysema محسوب می‌شوند.

ب) معاینه سایه‌های سروی (Hilar shadows):

سایه سروی متشکل از اوعیه و عقدات لمفاوی سروی می‌باشد. متبارز شدن سایه سره به سبب توسع اوعیه ریوی یا موجودیت کتله/عقدات لمفاوی متورم ایجاد می‌شود.

اوعیه ریوی از سبب افزایش جریان خون یا فرط فشار ریوی متوسع می‌شوند. عقدات لمفاوی معمولاً در توبرکلوز، lymphoma، به صورت ثانوی بعد از کنسر قصبات و sarcoidosis برجسته می‌شوند.

ج) معاینه پلورا (Pleura):

جوف پلورا را جهت دریافت موجودیت مایع (hydrothorax)، هوا (pneumothorax) و مایع-هوا (hydropneumothorax) معاینه نمایید.

۱. **انصباب پلورا (Pleural effusion):** موجودیت مایع در جوف پلورا به نام انصباب پلورا یاد می‌شود. این مایع می‌تواند exudate، transudate، قیج یا خون باشد. در فلم صدري مشابه می‌باشند. مایعی که در بین جوف پلورا قرار دارد ممکن است آزاد یا جوف‌دار (loculated) باشد.

● مایع آزاد: مقدم‌ترین علامه آن از بین رفتن زاویه costophrenic است زیرا به سبب تأثیر قوه جاذبه زمین، مایع در پایین‌ترین قسمت پلورا تجمع می‌نماید. در صورتی که مایع به اندازه کافی زیاد باشد، ساحه ریه از پایین به بالا توسط

opacity متحدالشکل مغشوش می‌شود، البته کنار علوی آن به شکل مقعر تا به ابط از سبب تأثیر عروق شعریه ادامه پیدا می‌کند.

- انصباب تحت ریوی (subpulmonary effusion): اگر مقدار مایع به اندازه کم باشد که نتواند در جدار صدر بالا برود، به این نام یاد می‌شود. جهت مشاهده، فلم صدري مريض باید در وضعیت جنبی بالای بستر قرار داشته باشد (منظره lateral decubitus). در این صورت مایع در قسمت وابسته (dependant) وحشی صدر تجمع نموده و واضحاً دیده می‌شود.

- **یادداشت:** از این تخنیک در تشخیص تفریقی pleural effusion کوچک و پلواری ضخیم‌شده نیز استفاده می‌شود که در اخیرالذکر سویه مایع (fluid level) موجود نمی‌باشد.

- مایع جوفدار (loculated): در فلم PA مشکل است که با consolidation و تومور تشخیص تفریقی گردد. در این حالت باید یک فلم جنبی اخذ گردد که در این صورت یک opacity متراکم دیده خواهد شد.

- اسباب انصباب پلورا:

- توبرکلوز

- کنسرها

- عدم کفایه احتقانی قلب

- احتشای ریوی

- سندروم نفروتیک

- آبسه تحت دیافراگم که به جوف پلورا تمزق نموده باشد

۲. **Pneumothorax:** با در نظر داشت نکات ذیل قابل تشخیص است:

- کنار خارجی پلورا به صورت واضح از جدار صدر توسط یک ناحیه translucent هوا جدا شده است.

- نشانه‌های ریوی (lung markings) در خارج خط پلواری قابل دید نمی‌باشد.

- شزن به طرف مقابل تبیل شده می‌باشد.

- اسباب: توبرکلوز، emphysema، ترضیض.

۳. **Hydropneumothorax**: موجودیت سوپیه هوا-مایع (air-fluid level) برای hydropneumothorax تشخیصیه می‌باشد.

یادداشت: رادیوگرافی‌های واقعی این فصل (فهرست ذیل) در نسخه‌های بعدی علاوه خواهند شد؛ برای دیدن نمونه‌ها به اطلس‌های معتبر رادیولوژی مراجعه نمایید.

فهرست رادیوگرافی‌های پیشنهادی این فصل

- شکل ۵.۱: Cardiomegaly
- شکل ۵.۲: Pericardial effusion
- شکل ۵.۳: رادیوگرافی PA صدر
- شکل ۵.۴: اذیمای ریوی (Bat's wings / AP Sitting Mobile)
- شکل ۵.۵: Pneumonia
- شکل ۵.۶: فایبروز ریوی
- شکل ۵.۷: منظره مرمی توپ (Cannon ball appearance)
- شکل ۵.۸: آبسه ریوی
- شکل ۵.۱۰: کعف ریوی (Cavitation)
- شکل ۵.۱۱: تکلس ریوی
- شکل ۵.۱۲: Bronchiectasis
- شکل ۵.۱۳: سایه سروی برجسته
- شکل ۵.۱۴: Pleural effusion
- شکل ۵.۱۵: Emphysema
- شکل ۵.۱۶: Hydropneumothorax
- شکل ۵.۱۷: Pneumothorax





فصل ششم

معاینه سیستم قلبی و وعایی

اناتومی سطحی قلب

معاینه سیستم قلبی و وعایی

نبض

ریت، ریتم، حجم، وصف، جدار شریان،
radio-femoral delay

JVP و BP

BP در هر دو بازو؛ JVP در ۴۵°: نارمل >
۴ cm بالای زاویه قصی

Precordium

تفتیش، جس (apex beat، heave)،
قرع (thrill)

اصغا

مخراق‌های، mitral، tricuspid،
pulmonary، aortic: S1، S2، S3، S4
مرمرها

نقشه ذهنی ۶.۱: ترتیب معاینه سیستم قلبی و وعایی

قلب دارای دو کنار راست و چپ می‌باشد. کنار راست آن عمودی است و کمی وحشی‌تر از کنار راست sternum قرار دارد. کنار چپ قلب به طور مایل می‌باشد. کنار چپ از علوی به سفلی توسط ساختمان‌های ذیل ساخته شده است:

- قوس ابهر (aortic arch)
- شریان ریوی (pulmonary artery)
- اذین چپ Appendage
- کنار راست از علوی به سفلی توسط ساختمان‌های ذیل ساخته شده است:
- ابهر صاعده (ascending aorta)
- ورید اجوف علوی (SVC)
- اذین راست (right atrium)
- ورید اجوف سفلی (IVC)

اعراض امراض قلبی و وعایی

اعراض عمده امراض قلبی و وعایی قرار ذیل اند:

- درد / ناراحتی صدري (chest pain / discomfort)
- عسرت تنفس (dyspnea)
- تپش قلبی (palpitation)
- سرگنگسی و syncope
- اذیمای محیطی
- خستگی (fatigue)

هر کدام این‌ها را به‌صورت جداگانه مطالعه می‌کنیم:

۱. **درد / ناراحتی صدري:** درد صدري عمدتاً به سبب خناق (angina)، احتشای مایوکارد (MI) و pericarditis و نادراً توسط aneurysm انشقاقی به وجود می‌آید. اوصاف درد قبلاً در فصل اعراض و شکایات مریض تشریح گردیده‌اند.

- **درد قلبی (cardiac pain):** این درد در خلف عظم قص احساس می‌شود. وصف فشار دهنده داشته و به شانه چپ و بازوی چپ انتشار می‌نماید (حتی تا به فک سفلی و قسمت علوی بطن نیز انتشار نموده می‌تواند). دوام آن در خناق کوتاه‌تر است و در احتشای مایوکارد طولانی‌تر، اضافه‌تر از نیم ساعت می‌باشد. دردهای قلبی با فعالیت فیزیکی افزایش یافته و با استراحت و اخذ nitroglycerine تحت لسانی بهبود می‌یابد.
 - **Pericarditis:** این درد موقعیت مرکزی داشته، وصف آن تیز و مانند چاقوزدن می‌باشد. با شهیق، سرفه و تغییر وضعیت شدت کسب نموده و با اخذ NSAIDs رفع می‌شود.
 - **Aortic dissection:** انشقاق ابهر یک درد شدید با وصف پاره‌کننده است. در قدام یا خلف صدر احساس می‌شود. آغاز آن به صورت آتی و ناگهانی می‌باشد.
 - **Aortic aneurysm:** باعث دردهای شدید از سبب فشار موضعی می‌گردد.
۲. **عسرت تنفس (dyspnea):** تفصیل آن در فصل اعراض ذکر گردیده است.
۳. **تپش قلبی (Palpitation):** احساس کردن ضربان قلب به نام Palpitation یاد می‌شود. palpitation در حالات هیجانی و بعد از فعالیت‌های فیزیکی یک پدیده نارمل و فزیولوژیک پنداشته می‌شود. Palpitation ممکن از سبب extrasystole های مختلف قلبی از قبیل arrhythmia تا tachycardia ها به وجود آید. Fibrillation اذینی و SVT ها اسباب معمول آن را تشکیل می‌دهند. یک تعداد محدود مریضان ممکن از ضربان‌های از دست رفته (missed beats) نیز شکایت داشته باشند.
۴. **Syncope (dizziness):** ضیاع گذری شعور به نام سنکوپ یاد می‌شود که به سبب کاهش آتی وظایف دماغی در نتیجه hypotension گذری به وجود می‌آید. اسباب قلبی آن شامل arrhythmia ها، bradycardia ها و تضیق دسام ابهر می‌باشد. اسباب غیر قلبی آن عبارت اند از: stroke، epilepsy و vasovagal syncope.

۵. **اذیمای محیطی:** Pitting edema اطراف سفلی تظاهر عمده CCF است. در واقعات hypoproteinemia و امراض کلیوی نیز دیده شده می‌تواند.

۶. **خستگی (fatigue):** خستگی جهدی خصوصاً در اواخر روز از اعراض عمده اختلال وظایف قلبی (عدم کفایه مزمن قلب) است. این حالت در نتیجه اروای ناکافی عضلات به سبب مختل شدن بیرون‌ده قلبی به وجود می‌آید.

معاینه سیستم قلبی و وعایی مشتمل است بر:

- معاینه نبض شریانی
- فشار خون
- معاینه وریدهای عنق
- معاینه precordium که شامل بخش‌های ذیل است:
 - تفتیش (inspection)
 - جس (palpation)
 - قرع (percussion)
 - اصغا (auscultation)



معاینه نبض شریانی

نبض (pulse) یک موجه افزایش فشار است که با هر ضربان قلب در امتداد شریاین عبور می‌کند. نبض را به صورت دو طرفه در شریاین، carotid، brachial، radial، femoral، popliteal، posterior tibial و dorsalis pedis معاینه می‌نماییم.

۱. **نبض کعبری (radial pulse):** داکتر باید سه انگشت اشاره، متوسط و حلقوی خود را بالای شریان کعبری (که در وحشی وتر عضله flexor carpi radialis قرار دارد) در مچ دست مریض بگذارد. نبض با نرمی نوک انگشتان جس می‌شود.

۲. نبض عضدی (brachial pulse): این نبض با انگشت شست جس می‌شود. از انگشت شست راست برای بازوی راست و از چپ برای بازوی چپ مریض استفاده می‌شود. قسمت علوی بازوی راست مریض را با دست چپ خود محکم گرفته و انگشت شست خود را بالای شریان عضدی که بلافاصله در انسی وتر عضله biceps قرار دارد بگذارید.

۳. نبض کروتید (carotid pulse): شریان carotid باید زمانی جس شود که مریض در بستر قرار داشته باشد. از انگشت شست دست چپ برای جس شریان carotid راست و برعکس آن استفاده می‌شود. نوک انگشت شست در بین حنجره و کنار قدامی عضله sternocleidomastoid قرار داده می‌شود. انگشت شست باید به آهستگی به طرف خلف فشار داده شود تا نبض احساس گردد.

یادداشت: هیچگاه هر دو شریان carotid را به صورت همزمان جس نکنید.

شریان‌های کروتید برای bruitها توسط حرکت دادن دیافراگم ستاتسکوپ بالای شریان اصغا می‌گردد.

۴. شریان فخذی (femoral artery): این شریان بلافاصله در تحت لگمنت مغبنی بین iliac spine علوی قدامی و ارتفاع عانه (symphysis pubis) موقعیت دارد. وحشی‌تر از ورید فخذی قرار داشته و آن را با انگشت شهادت یا متوسط می‌توان جس نمود.

۵. شریان مابضی (popliteal artery): اولاً زانوی مریض را به اندازه ۳۰ درجه به حالت قبض درآورده و آن را با هر دو دست محکم بگیرید. انگشتان شست باید در هر دو طرف patella و سایر انگشتان در جوف مابضی (popliteal fossa) قرار داده شوند. این شریان را می‌توان در ۳-۴ سانتی‌متری خط متوسط توسط نوک انگشتان جس نمود. جس این شریان معمولاً مشکل بوده و اکثراً از معاینه باز می‌ماند.

۶. شریان مابضی خلفی (posterior tibial / posterior popliteal artery): این شریان ۲ سانتی‌متر سفلی‌تر و ۲ سانتی‌متر خلف‌تر از malleolus انسی موقعیت

دارد. این شریان توسط سه انگشت جس می‌گردد. مریض باید در بستر طوری قرار بگیرد که پاهایش در حالت بسط باشند.

۷. شریان Dorsalis pedis: این شریان در بین قسمت قریبه میزابه که در بین metatarsal های اول و دوم وجود دارد واقع گردیده است. در ۱۰٪ واقعات موجود نمی‌باشد.

در اثنای جس نبض نکات ذیل در نظر گرفته شوند:

- Rate
- Rhythm
- حجم (volume)
- وصف (character)
- جدار اوعیه خون
- مقایسه نبض‌ها

۱. ریت (rate): ریت نبض را برای ۱۵ ثانیه با گذاشتن نوک انگشتان بالای شریان radial حساب می‌کنیم. ساعد مریض باید به وضعیت prone و مچ دست کمی به حالت قبض باشد. نبض برای یک دقیقه محاسبه می‌شود. حدود نارمل آن در کاهلان ۵۰-۱۰۰ فی دقیقه است (رهنمود ۲۰۱۸ ACC/AHA/HRS). نبض در اثنای استراحت و خواب بطی و در جریان فعالیت‌های فیزیکی سریع می‌شود.

Tachycardia: اگر ریت قلب اضافه‌تر از ۱۰۰ فی دقیقه باشد به نام تکی‌کاردیا یاد می‌شود.

اسباب Tachycardia:

- فزیولوژیک:
- بعد از تمرینات
- بعد از صرف غذا
- در حالات هیجانی
- در جریان تحیض

- بعد از نوشیدن قهوه یا الکل
- پتالوژیک:
- Anemia
- امراض malignant
- عدم کفایه قلب
- تفریط فشار خون
- Thyrotoxicosis

یادداشت: تکی‌کاردیای فزیولوژیک در زمان استراحت ناپدید می‌شود، در حالی که تکی‌کاردیای پتالوژیک در زمان استراحت نیز ادامه پیدا می‌کند.

Bradycardia: اگر ریت قلب پایین‌تر از ۵۰ فی دقیقه باشد به نام برادی‌کاردیا یاد می‌گردد (رهنمود ۲۰۱۸ ACC/AHA/HRS؛ در بسیاری کتاب‌ها حد پایین‌تر از ۶۰ فی دقیقه ذکر شده است).

اسباب Bradycardia:

- فزیولوژیک:
- در نزد ورزشکاران
- به صورت خانوادگی
- پتالوژیک:
- بلاک تام قلب
- تزاید فشار داخل قحف
- Hypothyroidism
- اخذ ادویه مانند digitalis و B-blocker ها
- برادی‌کاردیای نسبی (relative bradycardia)، یعنی زمانی که نبض با افزایش درجه حرارت مطابقت نداشته باشد.

۲. Rhythm: ریتم نشان می‌دهد که آیا فواصل زمانی بین ضربان‌های قلبی با هم مساوی اند یا خیر. در حالت نارمل این فواصل مساوی می‌باشند در حالی که در بعضی مریضان ممکن تفاوت ناچیز در زمان شهیق و زفیر موجود باشد.

Sinus arrhythmia: در حالت طبیعی، نبض در اثنای شهیق سریع و در اثنای زفیر بطی می‌شود؛ این یک پدیده فزیولوژیک است. اگر این تشوش قابل ملاحظه باشد به نام sinus arrhythmia یاد می‌شود.

انواع دیگر اریتمیها عبارت اند از:

● **ریت غیر منظم منظم (Regularly irregular heart rate):** در این حالت

نبض غیر منظم بوده اما بی‌نظمی آن بعد از انتروال‌های منظم تظاهر می‌نماید. این شکل اریتمیا در واقعات ضربان‌های قبل از وقت (premature beats) دیده می‌شود که بعد از تعداد ثابت ضربان‌ها به وقوع می‌پیوندد.

● **ریت غیر منظم نامنظم (Irregularly irregular heart rate):** در این حالت

فواصل ضربان‌ها با هم مساوی نمی‌باشند. در حالات ذیل مشاهده می‌شود:

● Atrial fibrillation

● Multiple ectopic beats

● Atrial flutter with varying blocks

۳. حجم (volume): حجم نبض را باید در شریان carotid راست ارزیابی نمود.

حجم عبارت از امپلیتود موجه است که در جریان تقلص بطن از اوغیه خون عبور می‌نماید. یا گفته می‌توانیم که حجم نبض قوه‌ایست که انگشتان جس‌کننده را به طرف بالا بلند می‌کند. تمام حالات که سبب افزایش بیرون‌ده قلبی می‌شوند، سبب افزایش حجم نبض نیز شده می‌توانند.

۴. وصف (character): وصف نبض نظر به نوعیت مرض متفاوت می‌باشد. ذیلاً بیان می‌گردد:

● **نبض کولپس‌کننده (Collapsing / water hammer pulse):** یک نبض

سریع، پر حجم و ناپایدار (non-sustained) است. برای جس آن مچ دست

مریض را گرفته و نبض شریان radial را جس می‌نماییم. بعداً بازوی مریض را مستقیماً به طرف بالا حرکت می‌دهیم. اگر نبض کولپس کننده موجود باشد، حجم نبض تزايد می‌نماید. امپلیتود نبض دفعه‌تاً بلند رفته و بعداً سقوط می‌نماید. صعود آنی آن از سبب تزايد stroke volume به وجود می‌آید. کولپس آن از سبب لیکاژ رو به خلف در صورت عدم کفایه ابهر یا پایین بودن مقاومت محیطی که جریان خون را در اثنای دیاستول به طرف اوعیه محیطی تشدید می‌نماید است.

این نوع نبض در تمام واقعات که سبب افزایش pulse pressure می‌گردد دیده می‌شود. این واقعات عبارت اند از:

- عدم کفایه ابهر

- تب

- Thyrotoxicosis

- Arterio-venous fistulae

- Anemia

- **Anacrotic pulse (Pulsus plateau):** یک نبض با حجم کوچک بوده، به آهستگی بلند می‌شود و پایدار (sustained) است. این نوع نبض در تضیق دسام ابهر دیده می‌شود.

- **Pulsus bisferiens:** این نبض ترکیبی از نبض کولپس کننده و نبض anacrotic است. با یک ضربان دو بار احساس می‌شود. این نوع نبض در صورت یکجا بودن تضیق دسام ابهر با عدم کفایه دسام ابهر مشاهده می‌شود.

- **Pulsus paradoxus:** این یک تسمیه نادرست است. در حالت نارمل در اثنای شهیق حجم نبض به سبب تنقیص بیرون‌ده قلبی و تنقیص فشار خون (۳-۵ ملی‌متر ستون سیماب) کاهش می‌یابد. مکانیزم آن در تضاعف آوازهای قلبی تشریح شده است. این پدیده نارمل در حالات پتالوژیک، شدت کسب می‌کند یعنی حجم نبض به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته یا حتی غیر قابل جس

می‌گردد. در اصغا، آوازهای قلبی با وجود غیر قابل جس بودن نبض شنیده می‌شود. این نوع نبض در حالات ذیل به مشاهده می‌رسد:

- constrictive pericarditis

- pericardial effusion

- bronchial asthma

- **Pulsus alternans**: در این نوع نبض به صورت متناوب یک ضربان قوی و یک ضربان ضعیف وجود دارد اما ضربان‌ها هم‌فاصله‌اند. این نوع نبض اهمیت زیاد دارد و در صدمه شدید بطن چپ به مشاهده می‌رسد.

- **Pulsus deficit**: اگر ریت قلب با ریت نبض متفاوت باشد به نام pulsus deficit یاد می‌شود. علت آن اینست که یک تعداد ضربان‌های معین به حدی ضعیف هستند که قادر به پرتاب نمودن خون به اوعیه محیطی نمی‌باشند. در حالات ذیل دیده می‌شود:

- atrial fibrillation

- multiple ectopic beats

- **Pulsus bigeminus**: در این صورت یک جفت ضربان‌ها موجود می‌باشد؛ یعنی دو ضربان در یک وقت توسط انگشتان جس می‌شود. از جمله آن‌ها یکی آن نارمل و دومی آن ضربان قبل از وقت (premature beat) است. بعداً توسط یک مکث جبرانی (compensatory pause) تعقیب می‌گردد. این نوع نبض در حالات ذیل مشاهده می‌شود:

- تسمم digitalis

- premature beats

- **نبض مؤخر (delayed pulse)**: در حالت نارمل، نبض کعبی (radial) و فخذی (femoral) به صورت همزمان جس می‌شوند، اما در کوآرکتیشن ابهر، نبض فخذی مؤخرتر می‌باشد.

۵. **تناظر نبض‌ها:** نبض‌های کعبری (radial)، عضدی (brachial)، کروتید (carotid)، فخذی (femoral)، مابضی (popliteal) و قدمی (pedal) در هر دو طرف مقایسه شوند. تناظر نبض‌ها باید تایید گردد. تنقیص یا عدم موجودیت نبض دلالت به انسداد قسمت قریبه شرایین توسط atherosclerosis یا thromboembolism می‌کند.

۶. **نبضان عروق شعریه:** در تمام حالاتی که منجر به افزایش pulse pressure می‌گردند به مشاهده می‌رسد. مثلاً در عدم کفایه ابهر، thyrotoxicosis، تب و بعد از حمام گرم.

میتودهای ارزیابی نبضان عروق شعریه عبارت اند از:

- قسمت داخلی لب سفلی مریض را توسط سلاید شیشه‌یی با ملایمت فشار دهید. رنگ‌های سفید و گلابی به ترتیب به مشاهده می‌رسند که دلالت بر موجودیت نبضان عروق شعریه می‌کند.
- ناخن انگشت مریض (معمولاً شست) را با ملایمت فشار دهید. در این صورت اگر نبضان عروق شعریه موجود باشد یک تموج ستون خون در ناخن در محل اتصال ناحیه سرخ و سفید دیده می‌شود.
- نرمی نوک انگشتان خود را به ملایمت بالای نرمی نوک انگشتان مریض قرار دهید. در صورت که نبضان عروق شعریه موجود باشد، آن را جس کرده می‌توانیم.

Tracheal tug: در انوریزم ابهر نبضان انوریزم ممکن به شزن منتقل شده و سبب ایجاد یک tracheal tug گردد. برای دریافت آن داکتر در عقب مریض قرار گرفته نوک انگشتان خود را در تحت غضروف cricoid گذاشته و شزن و حنجره مریض را به طرف بالا می‌کشد. در صورت مثبت بودن آن یک tug واضح با هر ضربان قلب جس می‌شود.



فشار خون (Blood pressure)

فشار خون دو نوع است:

- **فشار سیستولیک:** توسط ایلاستیکیت اوعیه خون و stroke volume ایجاد می‌شود.

- **فشار دیاستولیک:** توسط مقاومت محیطی تنظیم می‌گردد.

اندازه‌های نارمل: فشار خون نارمل در کاهلان کمتر از ۱۲۰/۸۰ ملی‌متر ستون سیماپ است. فشار ۱۴۰/۹۰ ملی‌متر ستون سیماپ یا بیشتر (در اندازه‌گیری‌های مکرر) فرط فشار خون گفته می‌شود (WHO و ESC)؛ رهنمود ACC/AHA 2017 حد ۱۳۰/۸۰ را به کار می‌برد.

Pulse pressure: تفاوت بین فشار سیستولیک و دیاستولیک به نام pulse pressure یاد می‌شود. pulse pressure نارمل در حدود ۳۰-۶۰ ملی‌متر ستون سیماپ است.

میتود استفاده از Sphygmomanometer: مریض باید در وضعیت نشسته یا خوابیده قرار داشته باشد. آلّه فشار را در ساحه دید تان قرار دهید. بازوبند آلّه فشار که باید ۱۲/۵ سانتی‌متر عرض و ۳۰-۳۵ سانتی‌متر طول داشته باشد را ۲/۵ سانتی‌متر بالاتر از جوف cubitus بالای بازوی مریض بسته نمایید. بازوبند آلّه فشار باید در عین سویه قلب قرار داشته باشد.

میتود تعیین فشار خون: فشار خون به دو طریقه تعیین می‌شود:

- طریقه جس
- طریقه اصغا

فشار سیستولیک خون با هر دو میتود تعیین شده می‌تواند در حالی که فشار دیاستولیک صرف توسط میتود اصغا تعیین شده می‌تواند.

۱. **میتود جس:** شریان brachial را جس نمایید. بازوبند آلّه فشار را تا زمانی از هوا مملو نمایید که نبضان brachial ناپدید گردد. در این صورت درجه ستون

سیماب را یادداشت نمایید و سپس ۱۰ ملی‌متر ستون سیماب بیشتر هوا دهید. سپس بازوبند آلۀ فشار را به آهستگی تخلیه نموده و اولین نبض که جس گردید را یادداشت کنید. اوسط این خوانش‌ها عبارت از فشار سیستولیک خون است.

۲. میتود اصغاً: در این صورت بعد از بسته نمودن بازوبند آلۀ فشار دیافراگم ستاتسکوپ را بالای شریان brachial بگذارید و بازوبند را تا زمانی مملو از هوا نمایید که نبضان شریان مذکور ناپدید گردد. سپس ۱۰-۲۰ ملی‌متر ستون سیماب بیشتر هوا دهید و بعد از این به آهستگی هوا را تخلیه نمایید.

پنج مرحله آوازه‌های Korotkoff:

- **مرحله ۱:** اولین آوازی که شنیده می‌شود عبارت از فشار سیستولیک است.
- **مرحله ۲ و ۳:** بلند رفتن فزاینده آوازا.
- **مرحله ۴:** خفه شدن آوازا.
- **مرحله ۵:** ناپدید شدن آوازا.

زمانی که اولین آواز شنیده شد ستون سیماب را یادداشت کنید؛ این آواز فشار سیستولیک را نشان می‌دهد. به صورت تدریجی و به آهستگی هوا را تخلیه نمایید، آوازا بلند و بلندتر می‌شوند تا این که دفعه‌تاً وصف آن تغییر می‌کند یعنی ملایم شده و بالاخره ناپدید می‌شوند. این نقطه را یادداشت نمایید زیرا فشار دیاستولیک را نشان می‌دهد.

در واقعات عدم کفایه ابهر، فستول‌های شریانی وریدی و حاملگی، آوازه‌های Korotkoff تا به درجه صفر ادامه می‌یابند. در این صورت مرحله چهارم منحیث فشار دیاستولیک قبول می‌شود.

بعضاً در نزد مریضان مصاب فرط فشار خون آوازا بعد از ۱۶۰-۱۸۰ ملی‌متر ستون سیماب ناپدید گردیده و بعداً ظاهر می‌شوند. این حالت به نام خلاء خاموش (silent gap) یاد می‌شود. اهمیت آن تا به حال دانسته نشده است.

در یک تعداد واقعات مثلاً coarctation ابهر لازم است تا فشار خون در اطراف سفلی نیز تعیین گردد. در این صورت مریض باید بالای بستر به وضعیتی قرار

بگیرد که وجه به طرف پایین باشد. Cuff بالای قسمت سفلی ران مریض بسته می‌شود. ستاتسکوپ بالای شریان popliteal قرار داده می‌شود و به این صورت فشار آن تعیین می‌گردد.



معاینه وریدهای عنق

مریض باید بالای بستر طوری قرار گیرد که زاویه بین ظهر و بستر ۴۵ درجه باشد. رأس مریض را بالای بالشت قرار داده تا عضلات عنق وی استرخا نمایند. حالا برجستگی وریدهای internal jugular را مشاهده کنید. موجودیت وریدهای برجسته در این وضعیت نشان‌دهنده یک تعداد پتالوژی‌ها مثلاً عدم کفایه قلب است. اساس این تست اینست که در یک شخص صحتمند که به وضعیت ایستاده قرار داشته باشد، سویه علوی ستون وریدی با زاویه sternal در عین سویه قرار دارد. وقتی که همین شخص در زاویه ۴۵ درجه بالای بستر قرار بگیرد ستون وریدی در خلف یا کمی بالاتر از سویه عظم clavicle می‌رسد. به همین علت است که تبارز وریدها در اشخاص نارمل دیده نمی‌شود. برای مشاهده آن در وسط بطن برای ۱۰-۱۵ ثانیه فشار وارد نمایید. این طرزالعمل (hepatojugular reflux) برگشت وریدی را زیاد نموده و فشار وریدی را ۱-۳ سانتی‌متر افزایش می‌دهد و سبب تظاهر ورید jugular می‌شود. فشار نارمل آن ۹ سانتی‌متر است.

در عدم کفایه قلب ستون خون در وریدهای jugular صعود می‌نماید. لذا وقتی که مریض به وضعیت ۴۵ درجه بالای بستر قرار بگیرد وریدها متبارز شده و قابل دید می‌شود. ارتفاع عمودی بین زاویه قصی (sternal angle) و بلندترین نقطه نبضان ورید را به سانتی‌متر اندازه نمایید.

برای اندازه‌گیری آن یک پنسل را عموداً بالای زاویه sternal قرار داده و پنسل دیگر را به شکل افقی در سویه سرحد علوی نبضان ورید jugular قرار دهید. ارتفاع که در آن پنسل افقی توسط پنسل عمودی قطع می‌شود را به سانتی‌متر اندازه‌گیری

نموده و عدد ۵ را به آن جمع نمایید زیرا زاویه قصی ۵ سانتی‌متر بالاتر از اذین راست قرار دارد.

در حالت نارمل با شهیق JVP سقوط می‌کند. در یک تعداد واقعات مثلاً در pericardial effusion و constrictive pericarditis، cardiac tamponade اثنای شهیق نبضان ورید jugular ستون JVP صعود می‌کند. این یافته به نام علامه Kussmaul یاد می‌شود.

اسباب برجسته شدن وریدهای عنق:

● اسباب خارج قلبی در داخل صدر:

- جاغور خلف عظم قص
- عقدات لمفاوی متورم که بالای IVC فشار وارد کنند.
- انوریزم ابهر که بالای وریدهای عنق فشار وارد کند.

● اسباب پریکاردیال:

- constrictive pericarditis
- pericardial effusion

● اسباب مایوکاردیل:

- عدم کفایه احتقانی قلب
- عدم کفایه قلب راست

● اسباب اندوکاردیل:

- عدم کفایه تضییق ترای کسپید

● اسباب داخل بطنی:

- حاملگی
- ascites کتلوی

● اسباب عمومی:

- anemia
- overtransfusion مایعات

وریدهای عنق نه تنها برای برجستگی آن بل برای مطالعه نبضان وریدی نیز معاینه می‌شوند.

نبض وریدی (venous pulse) سه موج مثبت (a, c, v) و دو موج منفی (x, y) دارد.

- **موج a:** این موج به سبب تقلص اذین راست ایجاد می‌شود.
 - **موج c:** این موج در اثنای تفتیش وریدهای عنق قابل دید نیست. از سبب بسته شدن دسام tricuspid ایجاد می‌شود.
 - **موج v:** این موج از سبب پر شدن اذین راست در حالی که دسام ترایکسپید تا هنوز بسته است ایجاد می‌شود.
 - **موج x:** به زمان استرخای اذین توافق می‌کند و در اثر پایین آمدن دسام tricuspid ایجاد می‌شود.
 - **موج y:** سقوط فشار را در اذین راست به سبب باز شدن دسام tricuspid نشان می‌دهد.
- در اثنای معاینه عنق هر دو نبض شریانی و وریدی مشاهده شده می‌توانند. نکات ذیل باید در زمان تشخیص تفریقی آن‌ها در نظر گرفته شوند:

نبض وریدی (venous pulse)	نبض شریانی (arterial pulse)
با انگشتان جس شده نمی‌تواند	جس می‌شود
وارد شدن فشار در جذر عنق آن را متوقف ساخته و وریدها برجسته می‌شوند	نبض آن با وجود وارد شدن فشار بالای جذر عنق قابل مشاهده می‌باشد
دارای سویه علوی واضح بوده که با تنفس تغییر می‌نماید. یعنی با شهیق پایین می‌آید چون فشار صدر از سبب حرکت دیافراگم به طرف پایین منفی می‌شود و با زفیر بالا می‌رود	تنفس بالای آن تأثیر ندارد
با تغییر وضعیت تغییر می‌کند	وضعیت بالای آن اثر ندارد
با وارد نمودن فشار بالای کبد نبضان آن متبازتر می‌شود (HJR)	با وارد نمودن فشار بالای کبد کدام تغییری در آن به وجود نمی‌آید
نبضان آن دارای سه موجه مثبت و دو موجه منفی دارد.	نبضان آن ثابت بوده دو موجه دارد اولی آن مثبت و دومی آن منفی است.



معاینه Precordium

◆ تفتیش

در اثنای تفتیش ساحه قرب‌القلبی (precordium) مریض باید به زاویه ۴۵ درجه در بستر قرار داشته باشد. چهار نکته عمده باید در اثنای تفتیش ساحه قرب‌القلبی در نظر باشد:

- شکل precordium
- نبضان در precordium

- نبضان‌ها در خارج از precordium

- موجودیت وریدهای برجسته در جدار صدر

۱. **شکل Precordium:** در حالت نارمل کدام برجستگی در این ناحیه دیده نمی‌شود. در واقعات ضخامه بطین چپ و انصباب پریکارد در precordium برجستگی دیده می‌شود. بعضاً به سبب سوء اشکال صدری در این ناحیه برجستگی دیده می‌شود.

۲. **نبضان‌ها در Precordium:** نبضان‌های مهم در این ساحه قرار ذیل اند:

- **Apex beat:** عبارت از پایین‌ترین و خارجی‌ترین نقطه precordium است که در آن نبضان دیده شده می‌تواند. در حالت نارمل در نزد اشخاص لاغر apex beat قابل دید است. در صورت مشاهده آن نکات ذیل باید در نظر باشند:

- موقعیت

- وسعت نبضان

- **نبضان در محراق دسام ترای‌کسپید:** این نبضان در مسافات بین‌الضلعی ۴ و ۵ کنار چپ عظم قص مشاهده شده می‌تواند. موجودیت آن دلالت بر امراض دسام ترای‌کسپید (عدم کفایه ترای‌کسپید) یا ضخامه بطین راست می‌کند.

- **نبضان در محراق دسام ریوی:** این نبضان در مسافه بین‌الضلعی دوم کنار چپ عظم قص به مشاهده می‌رسد. موجودیت آن دلالت بر فرط فشار ریوی یا توسع شریان ریوی می‌کند.

- **نبضان در محراق ابهر:** در مسافه بین‌الضلعی دوم کنار راست عظم قص دیده شده می‌تواند. موجودیت آن دلالت بر امراض دسام ابهر (عدم کفایه ابهر یا aortic aneurysm) می‌کند.

۳. **نبضان‌ها در خارج از Precordium:** پنج محراق در خارج Precordium موجود است که در آن‌ها نبضان‌ها مشاهده شده می‌تواند که عبارت اند از:

- عنق

- حفره suprasternal

- مسافات بین‌الضلعی
- ناحیه epigastric
- ناحیه intrascapular

۱. نبضان در عنق:

- نبضان شریانی در شرایین carotid در واقعات ذیل به مشاهده می‌رسد:
 - عدم کفایه ابهر
 - thyrotoxicosis
 - حالات هیجانی
- در عدم کفایه دسام ابهر نبضان شریان carotid ممکن به حدی شدید باشد که سبب تکان خوردن رأس مریض با هر ضربان قلبی شود. این علامه را به نام علامه de-Musset یاد می‌کنند.
- نبضان وریدی قبلاً تشریح شده است.
- **نبضان در حفره suprasternal** در حالات ذیل به مشاهده می‌رسد:
 - unfolding of aorta
 - aneurysm قوس ابهر
- **نبضان در مسافات بین‌الضلعی:** این نبضان‌ها در coarctation ابهر دورتر از منشأ شریان subclavian چپ که سبب ضخامه شرایین بین‌الضلعی می‌شود دیده می‌شود.
- **نبضان‌های ناحیه epigastrium:** نبضان‌های این ناحیه به سبب حالات ذیل می‌باشد:
 - عصبانیت
 - hypertrophy بطین راست
 - انوریزم ابهر بطنی
 - کبد نبضانی (عدم کفایه ترای‌کسپید)
 - موجودیت تومور در قدام ابهر

- **نبضان در مسافه intrascapular:** ساحه intrascapular را در صورت که مریض به وضعیت خمیده قرار داشته باشد مشاهده نمایید. در coarctation ابهر در این ساحه نبضان به سبب برجسته بودن شرایین تضممی (suprascapular، infrascapular) و شرایین صدري جنبی دیده شده می‌تواند.

۴. موجودیت وریدهای برجسته در جدار صدر

اسباب:

- زمانی که جلد به صورت غیر طبیعی شفاف باشد.
- زمانی که تومور داخل صدري یا انوریزم ابهر سبب انسداد جریان وریدی شده باشد.



◆ جس

در اثباتی جس precordium نکات ذیل را در نظر بگیرید:

- Apex beat
- Heaving بطین راست
- Thrill
- آوازهای قلبی قابل جس
- شریان ریوی

۱. ضربان ذروه (Apex beat):

Apex beat وحشی‌ترین و سفلی‌ترین نقطه در precordium است که با هر ضربان قلب سبب بلند شدن انگشتان معاینه‌کننده می‌شود. برای دریافت آن تمام دست خود را بالای ساحه قلبی قرار می‌دهیم. اگر در این حالت دریافت نگردید مریض را کمی به طرف چپ وضعیت می‌دهیم و کوشش می‌نماییم تا apex beat را دریابیم.

در حالات ذیل جس آن ممکن نمی‌باشد:

- ضخیم بودن عضلات جدار صدر
- pneumothorax طرف چپ
- pleural effusion طرف چپ
- انصباب پریکارد (pericardial effusion)
- emphysema
- dextrocardia

اگر apex beat جس گردید انگشت شهادت خود را عموداً بالای آن قرار دهید. در حالت نارمل در مسافه بین الضلعی پنجم ۱ سانتی متر انسی تر از خط ترقوی متوسط چپ یا ۹ سانتی متر وحشی تر از خط متوسط قرار دارد. حالا دریابید که آیا این نقطه بیجا شده است یا خیر؛ ممکن به طرف خارج یا به طرف خارج و سفلی یا به طرف داخل بیجا شده باشد.

اسباب بیجا شدن ذروه به طرف سفلی و خارج:

- بزرگ شدن بطین چپ
- بزرگ شدن بطین راست (صرف به طرف خارج)
- انصباب پلورایی طرف راست
- سوء شکل جدار صدر (صدر قیف مانند)
- pneumothorax طرف راست

اسباب کش شدن ذروه به طرف داخل:

- collapse ریه راست
- fibrosis ریه راست
- Dextrocardia: ضربان ذروه در طرف راست می باشد.

وصف Apex beat دو نوع است:

- **heaving**: انگشت شهادت خود را بالای ضربان ذروه (apex beat) گذاشته و آن را با دقت معاینه نمایید. ضربان ذروه نارمل سبب بلند شدن انگشت معاینه کننده می شود. ضربان ذروه با بار فشاری (pressure loaded apex)

beat) قوی و پایدار بوده که در تضییق دسام ابهر و فرط فشار خون دیده می‌شود، در حالی که ضربان ذروه با بار حجمی (volume loaded apex beat) قوی بوده اما پایدار نمی‌باشد که در عدم کفایه ابهر و مایترل موجود می‌باشد. اگر نوک انگشت با ضربان ذروه حرکت کند یعنی در زمان سستول صعود نموده و در زمان دیاستول سقوط نماید به نام heaving ضربان ذروه یاد می‌شود. این حالت اخیرالذکر در ضخامه بطین چپ دیده می‌شود.

اسباب بزرگ شدن بطین چپ:

- عدم کفایه مایترل
- عدم کفایه ابهر
- تضییق دسام ابهر
- فرط فشار خون
- **ضربت زدن (tapping):** اگر آواز اول قلب قابل جس باشد به نام tapping یاد می‌شود. در این حالت ذروه قلب با انگشت معاینه‌کننده اصابت نموده و دوباره به عقب بر می‌گردد. این حالت در تضییق مایترل که منجر به ضخامه بطین راست نیز شده می‌تواند دیده می‌شود.
- **ضربه مضاعف در ذروه (double apical impulse):** عبارت از قابل جس بودن آوازه‌های سوم و چهارم قلب است و یک مشخصه hypertrophic cardiomyopathy می‌باشد.

۲. Heaving بطین راست:

در دو ناحیه احساس می‌گردد:

- قسمت سفلی کنار چپ عظم قص (parasternal heave)
- epigastrium

طریقه جس:

- کف دست خود را به صورت صمیمی بالای قسمت سفلی کنار چپ sternum بگذارید. در اثنای که مریض نفس خود را قید نموده باشد، حرکات دست خود را مشاهده نمایید.
- نوک سه انگشت اول خود را بالای epigastrium یک کمی به طرف چپ گذاشته و حرکات رو به داخل و رو به خارج انگشتان تان را مشاهده کنید.

اسباب بزرگ شدن بطین راست:

- به صورت ثانوی بعد از عدم کفایه بطین چپ
- تضیق مایترل
- Cor pulmonale
- عدم کفایه tricuspid
- تضیق ریوی
- فرط فشار ابتدائی ریوی
- عدم کفایه ریوی

۳. Thrill:

thrill مشابه احساسی است که در اثنای کشیدن دست بالای پشک خرخر کننده حس می‌گردد. thrill در صورت موجودیت مرمها جس می‌شود و به دو شکل ذیل می‌باشد:

- سستولیک
- دیاستولیک

این دو با موجودیت مرمهای سستولیک و دیاستولیک تطابق می‌نمایند. نوعیت thrill توسط منطق ساختن آن با apex beat یا نبض carotid تعیین شده می‌تواند. زمانی که ذروه با دست جس‌کننده اصابت نماید thrill احساس شده در این زمان سستولیک است و اگر ذروه دورتر از دست قرار داشته باشد و تریل در این زمان احساس شود دیاستولیک است. عین روش در نبض carotid نیز صورت می‌گیرد؛ یعنی اگر نبض را احساس کنید سستولیک و در غیر آن دیاستولیک است.

معمول‌ترین thrill سستولیک که احساس می‌شود از سبب تضیق دسام ابهر می‌باشد. این thrill در ذروه، کنارهای راست و چپ عظم sternum یا بالای شرایین carotid جس شده می‌تواند. تریل VSD در کنار چپ عظم قص بهتر جس می‌شود. thrill دیاستولیک تضیق مایترل زمانی بهتر جس می‌شود که مریض بالای بستر به وضعیت جنبی چپ قرار داشته باشد. thrill هایی که از قاعده قلب نشأت می‌کنند زمانی بهتر جس می‌شوند که مریض به وضعیت خمیده قرار داشته باشد.

۴. آوازهای قلبی قابل جس:

بعضاً آوازهای قلب نیز قابل جس می‌باشند. آوازهای سوم و چهارم بهتر احساس می‌شوند نظر به این که شنیده شوند. آواز اول قلب در تضیق مایترل قابل جس می‌شود، در حالی که آواز دوم در فرط فشارهای سیستمیک و ریوی قابل جس می‌باشد.

۵. شریان ریوی:

در مسافه بین‌الضلعی دوم طرف چپ در واقعات فرط فشار ریوی، توسع شریان ریوی و غیره قابل جس می‌شود.



◆ قرع

در معاینه قلب دارای ارزش محدود است.

قرع کنار راست قلب: قبل از قرع کنار راست قلب لازم است تا اولاً سرحد علوی کبد را قرع نموده و آن را تعیین کنیم. سپس از راست به طرف چپ در مسافه بین‌الضلعی چهارم قرع نموده و کنار راست قلب را دریافت می‌نماییم.


قرع کنار چپ قلب: چون سرحد چپ قلب به صورت مایل از علوی به سفلی و وحشی قرار دارد بنابراین قرع نیز باید به شکل مایل صورت گیرد. قرع از طرف چپ به طرف راست در مسافه بین‌الضلعی چهارم صورت می‌گیرد تا این که نقطه اصمیت دریافت گردد. بالاترین باید در مسافات بین‌الضلعی سوم و پنجم نیز قرع

صورت بگیرد. ساحه اصمیت قلب در emphysema و pneumothorax کاهش می‌یابد.

در pericardial effusion زمانی که مریض بالای بستر قرار گیرد ساحه اصمیت قلب ناک‌مانند شده و زمانی که در حالت نشسته قرار گیرد این ساحه مثلثی شکل می‌شود.



◆ اصغا



سایکل قلبی (Cardiac cycle): بعد از تکمیل یک ضربان، اذین‌ها و بطین‌ها استرخا می‌نمایند. به تعقیب آن اذین‌ها تقلص نموده و خون را از طریق دسامات اذینی بطینی (Atrioventricular valves) داخل بطین‌ها می‌نماید. سپس بطین‌ها تقلص نموده و خون را به اوعیه تخلیه می‌نماید. در همین اثنا

اذین‌ها استرخا نموده و با خون مملو می‌شوند. بالآخره بطین‌ها نیز استرخا نموده و سایکل قلبی تکمیل می‌شود.

دوران خون: خون از وریدهای اجوف علوی و سفلی (SVC & IVC) داخل اذین راست شده، از اذین راست به بطین راست و سپس به ریه‌ها داخل می‌شود. از ریه‌ها دوباره داخل اذین چپ و بطین چپ می‌شود. از بطین چپ به ابهر و سپس به تمام بدن خون می‌رسد.

در کلینیک اصطلاحات سستول و دیاستول برای نشان دادن عملکرد بطین‌ها به کار می‌روند. حوادث که در زمان تقلص اذین‌ها واقع می‌شوند به نام pre-systolic یاد می‌شوند. به صورت نارمل ما آوازهایی را می‌شنویم که به نام آواز اول و دوم قلب نام‌گذاری شده‌اند. از لحاظ کلینیکی آواز اول با مرحله سستول و آواز دوم با مرحله دیاستول مطابقت دارد.

محراقات اصغائی قلب:

۱. **محراق مایترل:** با apex beat مطابقت دارد. به صورت نارمل در مسافه

بین‌الضلعی پنجم ۱ سانتی‌متر انسی‌تر از خط clavicular متوسط قرار دارد.

۲. **محراق ترای‌کسپید:** در قسمت سفلی کنار چپ عظم قص در مسافات

بین‌الضلعی ۴ و ۵ قرار دارد.

۳. **محراق ریوی:** در مسافه بین‌الضلعی دوم کنار چپ عظم قص قرار دارد.

۴. **محراق ابهر:** دسام ابهر دو محراق اصغائی دارد؛ محراق اولی آن در مسافه

بین‌الضلعی دوم کنار راست عظم قص و دوم آن در مسافه بین‌الضلعی سوم

کنار چپ عظم قص قرار دارد.

ترتیب اصغای:

- ذروه قلب
- محراق ابهر (مسافه بین‌الضلعی دوم کنار راست عظم قص)
- محراق ریوی (مسافه بین‌الضلعی دوم کنار چپ عظم قص)
- محراق ترای‌کسپید (قسمت سفلی کنار چپ عظم قص)

- شراین کروتید (carotid arteries)
- ابط یا axilla اگر نیاز باشد.

وضعیت‌های مریض هنگام اصغا:

- مریض باید بالای بستر به وضعیت اضطجاع ظهري قرار بگیرد؛ محراقات دسامات مایترل، ترای‌کسپید، ریوی و ابهر باید اصغا شوند.
 - مریض باید به وضعیت جنبی چپ قرار بگیرد؛ ذروه قلب باید توسط bell ستاتسکوپ اصغا گردد. در این وضعیت مرمهرای محراق مایترل نیز واضح‌تر شنیده می‌شوند.
 - مریض باید در حالت نشسته و خمیده به قدام قرار گیرد؛ اصغای محراقات ابهر و ریوی در حالی که مریض نفس خود را قید نموده باید صورت گیرد. مرمهر early diastolic محراق ابهر در این وضعیت بهتر اصغا می‌شود.
- در اثنای اصغای قلب لازم است تا نکات ذیل را ملاحظه نماییم:

- آوازهای اول و دوم قلب
- آوازهای سوم و چهارم قلب
- آوازهای اضافی
- آوازهای خارج قلبی
- آوازهای داخل قلبی

۱. آوازهای اول و دوم قلب:

- در حالت نارمل دو آواز شنیده می‌شود: آواز اول (سس‌تولیک) و آواز دوم (دیاس‌تولیک).
- آواز اول قلب از سبب بسته شدن دسامات اذینی بطینی (مایترل و ترای‌کسپید) تولید می‌شود. در ذروه قلب بهتر شنیده می‌شود.
- آواز دوم قلب از سبب بسته شدن دسامات ریوی و ابهر تولید می‌شود.

این دو آواز با کلمات «lub» و «dub» مطابقت دارند. حالا lub یا dub را برای یک دقیقه محاسبه نمایید. بدین صورت ریت قلب دریافت می‌گردد. سپس دریابید که آیا ریتم منظم است یا غیر منظم. در حالات ذیل ریتم غیر منظم می‌باشد:

- extrasystoles
- atrial fibrillation
- atrial flutter
- multiple ectopic beats

شدت آوازهای قلبی:

● شدت آواز اول قلب:

- افزایش در: تضیق مایترل، فرط فشار سیستمیک، تکی‌کاردیا.
- کاهش در: تضیق و سخت شدن مایترل، rheumatic carditis، عدم کفایه مایترل، بلاک درجه یک قلب.
- شدت آواز دوم قلب: این آواز دو جزء دارد: ابهری و ریوی.

● شدت جزء ابهری:

- افزایش در: فرط فشار خون، atheroma، ابهر، aortic aneurysm.
- کاهش در: تضیق دسام ابهر، عدم کفایه ابهر.

● شدت جزء ریوی:

- افزایش در: تضیق مایترل، cor pulmonale، فرط فشار ریوی.
- کاهش در: تضیق ریوی، عدم کفایه ریوی، Fallot's tetralogy.

تضاعف (splitting) آوازهای قلب:

- تضاعف آواز اول قلب: طوری که قبلاً تذکر یافت آواز اول قلب از سبب بسته شدن دسامات اذینی بطینی تولید می‌شود. به صورت نارمل splitting این آواز موجود می‌باشد زیرا دسام مایترل مقدم‌تر از دسام ترای‌کسپید بسته می‌شود. تضاعف وسیع غیر نارمل آواز اول قلب در تضیق مایترل و نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD) دیده می‌شود.

● **تضاعف آواز دوم قلب:** چون آواز دوم قلب از سبب بسته شدن دسامات ابهر و ریوی ایجاد می‌شود، فلذا طوری که قبلاً تذکر یافت دو جزء دارد؛ ابهری (A2) و ریوی (P2). A2 در تمام ساحه قرب القلبی قابل اصغا می‌باشد، در حالی که P2 صرف در محراق ریوی شنیده شده می‌تواند. به صورت طبیعی دسام ابهر نسبت به ریوی مقدم‌تر بسته می‌شود.

میکانیزم: در اثنای شهیق برگشت وریدی به اذین راست افزایش یافته و stroke volume بطین راست نیز متزاید می‌شود و سبب بسته شدن مؤخر دسام ریوی می‌شود بنابراین P2 مؤخر است. از جانب دیگر با شهیق stroke volume بطین چپ کاهش می‌یابد زیرا ازدیاد فشار منفی داخل صدی در اثنای شهیق سبب افزایش ظرفیت اذین چپ و وریدهای ریوی می‌شود. این حالت بالآخره سبب کاهش فشار اذین چپ و بدین وسیله سبب کاهش فشار پرشدن (filling pressure) بطین چپ می‌گردد. از آنجایی که بطین چپ خون کمتر را در اثنای شهیق دریافت می‌کند بنابراین stroke volume آن نیز سقوط نموده و سبب بسته شدن مقدم دسام ابهر می‌شود، A2 مقدم واقع می‌گردد. وقوع مقدم A2 و وقوع مؤخر P2 در اثنای شهیق (به صورت فزیولوژیک) سبب تضاعف وسیع آواز دوم می‌شود.

در اثنای زفیر عکس عملیه فوق صورت می‌گیرد لذا تضاعف آواز دوم قلب باریک می‌شود. اسباب پتالوژیک تضاعف آواز دوم قلب قرار ذیل اند:

● فرط فشار ریوی

● RBBB

● VSD

● ASD (تضاعف ثابت آواز دوم قلب)

● امراض دسام ریوی

در تضیق دسام ابهر و LBBB تضاعف آواز دوم قلب برخلاف حالت طبیعی در اثنای شهیق کم می‌شود که در این صورت به نام «تضاعف معکوس آواز دوم قلب» گفته می‌شود.

۲. آوازهای سوم و چهارم قلب:

هر دو آواز سوم و چهارم دارای فرکانس پایین هستند. توسط bell ستاتسکوپ در ذروه قلب زمانی که مریض به وضعیت جنبی چپ قرار داشته باشد بهتر اصغا می‌شود.

آواز سوم قلب (S3):

این آواز از سبب پر شدن آبی بطین‌ها در زمان دیاستول ایجاد می‌شود. در حالات ذیل شنیده می‌شود:

- اسباب فزیولوژیک: اطفال و جوانان، حاملگی، anemia.
- اسباب پتالوژیک: احتشای مایوکارد (MI)، عدم کفایه قلب، تب، thyrotoxicosis.

آواز سوم قلب ۱۵٪ ثانیه بعد از آواز دوم قلب شنیده می‌شود (lub-dub-dum).

آواز چهارم قلب (S4):

این آواز از سبب تقلص اذین ایجاد شده سبب افزایش فشار بطین می‌شود، در نتیجه دسامات آن سخت گردیده و آواز تولید می‌شود. این آواز در اشخاص مسن به صورت نارمل شنیده شده می‌تواند. در واقعات ذیل نیز شنیده می‌شود:

- فرط فشار خون
- تضیق دسام ابهر
- hypertrophic cardiomyopathy

این آواز قبل از آواز اول شنیده می‌شود و یک آواز pre-systolic یا late diastolic است.

در tachycardia آوازهای سوم و چهارم ممکن باهم یکجا شود که به نام summation gallop یاد می‌شود.

Pericardial knock: در constrictive pericarditis از سبب قطع آبی امتلای بطینی در اثنای دیاستول یک آواز پرفرکانس ایجاد می‌شود. این آواز به نام

pericardial knock یاد می‌شود. این آواز در ذروه قلب توسط bell ستاتسکوپ در اثنای دیاستول بهتر اصفا می‌شود.

دسامات میکانیکی قلب: دسامات میکانیکی (مصنوعی) قلب سبب تولید آواز در اثنای بسته شدن آن و هم در اثنای باز شدن آن می‌شود. این آواها پرفرکانس و فلزی هستند. دسام میکانیکی مایترل یک آواز مشابه به opening snap را تولید می‌نماید و دسام میکانیکی ابهر آواز مشابه به ejection click را تولید می‌نماید.

۳. آوازهای اضافی (Additional sounds):

آوازهای اضافی دو نوع اند:

- خارج قلبی (exocardial)
- داخل قلبی (endocardial)

الف) آوازهای خارج قلبی: این آواها قرار ذیل اند:

- **Continuous machinery murmur:** در Patent ductus arteriosus در

این حالت یک مرمر سستولیک و دیاستولیک در مسافات بین‌الضلعی اول و دوم چپ شنیده می‌شود.

- **Venous hum:** اگر جریان خون ورید jugular به شکل hyperkinetic باشد یک مرمر متداوم (continuous) در ناحیه عنق و علوی صدر (اکثراً در اطفال) شنیده می‌شود. با قرار گرفتن مریض به وضعیت هموار این مرمر ناپدید می‌شود.

- **Pericardial rub:** در pericarditis یک آواز بالای قلب شنیده می‌شود که به نام pericardial friction یا pericardial rub یاد می‌شود. مانند اصطکاک دو سطح خشن آواز می‌دهد. وصف پس و پیش را دارد یعنی در هر دو مرحله هم در سستول و هم در دیاستول موجود می‌باشد. این آواز با وضعیت خمیده به قدام و قید کردن نفس شدت کسب می‌کند. انتشار نداشته و موقعیت آن روز به روز تغییر می‌کند. تشخیص تفریقی میان pericardial rub و pleural rub

را می‌توان به طور ساده با قید نمودن تنفس، انجام داد، طوری که pleural rub با قید نمودن نفس ناپدید می‌شود اما pericardial rub باقی می‌ماند.

ب) آوازهای داخل قلبی: آوازهای اضافی داخل قلبی قرار ذیل اند:

- **Clicks و Opening snap:** آوازی که از سبب باز شدن دسامات ریوی و ابهر تولید می‌گردد به نام ejection systolic click و آواز که از سبب باز شدن دسامات مایترل و ترای‌کسپید تولید می‌گردد به نام opening snap یاد می‌شود. Click یک آواز early systolic است در حالی که Opening snap یک آواز early diastolic است.
- **Aortic click:** در فرط فشار خون، تضیق دسام ابهر و bicuspid aortic valve موجود می‌باشد. در تمام ساحه قلب موجود بوده اما در ذروه بهتر شنیده می‌شود.
- **Pulmonary click:** در محراق ریوی شنیده می‌شود. در اثنای شهیق خفیف شده و در اثنای زفیر تشدید می‌شود. در فرط فشار ریوی شنیده می‌شود.
- **Opening snap:** در تضیق مایترل و ترای‌کسپید شنیده می‌شود. در ذروه قلب بهتر اصغا می‌شود. این آواز با تکلس دسامات اذینی بطینی ناپدید می‌شود.
- **Mid-systolic click:** این آواز در سوء اشکال ولادی دسام مایترل شنیده می‌شود. در این صورت در اثنای سیستول یک وریقه مایترل به داخل اذین چپ prolapse نموده سبب تولید این آواز می‌شود (mitral valve prolapse syndrome).
- **Murmurs:** این آوازا از سبب جریان متلاطم (turbulent) خون در داخل اوویه و قلب ایجاد می‌شود.



انواع مرمرها

۱. **مرمرهای وظیفوی:** این مرمرها از سبب دوران hyperkinetic تولید می‌شوند. در این حالت کدام آفت ساختمانی دسامات وجود ندارد. اسباب آن قرار ذیل است:

- thyrotoxicosis

- تب

- anemia

این‌ها مرمرهای mid systolic هستند.

۲. **مرمرهای عضوی:** این مرمرها از سبب امراض دسامی به وجود می‌آیند. این مرمرها عبارت اند از:

- انسداد جلو: تضیق دسامی (به نام مرمرهای انسدادی نیز یاد می‌شوند).
- لیکاز رو به عقب: عدم کفایه دسامی (به نام مرمرهای عدم کفایه نیز یاد می‌شوند).

مرمرهای وظیفوی	مرمرهای عضوی
بعد از تمرینات ناپدید می‌شود.	شدت آن بعد از تمرینات زیاد می‌شود.
انتشار ندارد.	به سایر نواحی انتشار می‌نماید.
هیچگاه thrill موجود نیست.	ممکن thrill موجود باشد.
شدت آن با تغییر وضعیت و تنفس تغییر می‌کند.	شدت آن با تغییر وضعیت و تنفس تغییر نمی‌کند.

در زمان معاینه مرمرها نکات ذیل را باید ملاحظه نمود:

- **زمان وقوع:** معاینه را به دقت انجام داده و دریابید که آیا مرمر سستولیک است یا دیاستولیک. این‌ها توسط منطبق ساختن مرمر با جس apex beat یا نبض carotid تشخیص شده می‌توانند. سپس دیده شود که مقدم (early) است یا متوسط (mid) یا مؤخر (late).

- مرمر systolic ممکن late systolic یا mid systolic، pan systolic باشد. در واقعات تضیق دسام ابهر، عدم کفایه مایترل، عدم کفایه ترایکسپید، تضیق ریوی و VSD ممکن موجود باشد.
- مرمر diastolic ممکن early، mid یا pre-systolic باشد. در واقعات عدم کفایه ابهر (early)، تضیق مایترل (mid یا pre-systolic)، عدم کفایه ریوی و تضیق ترایکسپید موجود می‌باشد.
- مرمرهای دیاستولیک به سه مرحله تقسیم شده‌اند:
 - early: قبل از باز شدن دسام مایترل
 - mid: در اثنای باز شدن دسام مایترل
 - late یا presystolic: در اثنای تقلص اذین‌ها
- **بلندی (loudness):** وابسته به درجه تلاطم (turbulence) است که به حجم و سرعت خونی که دسام را عبور می‌نماید ارتباط دارد.
- **درجه‌بندی مرمرها:**
 - درجه ۱: بسیار ضعیف
 - درجه ۲: شدت متوسط
 - درجه ۳: بلند بدون thrill
 - درجه ۴: بلند با thrill
 - درجه ۵: بسیار بلند
 - درجه ۶: مرمر بسیار بلند بوده و حتی با نزدیک کردن ستاتسکوپ به جدار صدر نیز شنیده می‌شود.
- **وصف مرمر:** عبارت از فرکانس مرمر است. وصف آن می‌تواند با فرکانس بلند، متوسط و پایین باشد. ممکن ملایم یا خشن باشد.
- **ارتباط مرمر با تنفس:** مرمرهای قلب راست در زمان شهیق به سبب تزاید برگشت وریدی شدیدتر می‌شود در حالی که مرمرهای قلب چپ در اثنای زفیر شدیدتر می‌شوند.



آفات دسامات

◆ آفات دسام مایترل

● تضیق مایترل (Mitral stenosis):

مرمر mid diastolic توسط bell ستاتسکوپ زمانی که مریض به وضعیت جنبی چپ قرار داشته باشد، بهتر شنیده می‌شود.

● **زمان مرمر:** قبلاً تذکر یافت

● **موقعیت مرمر:** ذروه قلب

● **کیفیت:** خشن، آواز کشیده و دنباله‌دار (rumbling)، با فرکانس پایین

● **انتشار:** موضعی است، انتشار ندارد

● **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت

● **سایر یافته‌های مهم تضیق مایترل:**

● افزایش شدت آواز اول

● Presystolic accentuation: مرمر از سبب تقلص auricle ها تولید

می‌شود.

● Opening snap: از سبب باز شدن شدید وریقات مایترل تولید

می‌شود؛ در زمان زفیر در محراق مایترل خوبتر اصغا می‌شود.

● احتقان ریوی

● بطین راست ممکن بزرگ باشد.

● Graham Steel murmur: در ساحه ریوی این یک مرمر دیاستولیک

است.

● **عدم کفایه مایترل (mitral incompetence):**

یک مرمر pan systolic است که توسط دیافراگم ستاتسکوپ در وضعیت

جنبی چپ بهتر اصغا می‌شود.

● **زمان مرمر:** قبلاً تذکر یافت

● **موقعیت مرمر:** ذروه قلب

- **کیفیت:** ملایم شبیه به وزش هوا با فرکانس بلند
- **انتشار:** به طرف ابط یا حتی نواحی ظهری انتشار می‌کند
- **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت
- **سایر یافته‌های مهم:** بزرگ شدن بطن چپ، کاهش شدت آواز اول قلب
- **پرولیپس دسام مایترل (mitral valve prolapse):**
سبب تولید مرمr mid systolic و late systolic و click می‌شود.

♦ آفات دسام ترایکسپید

- **تضیق ترایکسپید (tricuspid stenosis):**
 - **زمان مرمr:** mid diastolic
 - **موقعیت مرمr:** محراق tricuspid
 - **کیفیت:** خشن با فرکانس بلند
 - **انتشار:** ندارد
 - **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت
 - **سایر یافته‌های مهم:** بطن راست بزرگ نخواهد بود، برجسته بودن وریدهای عنق، برجسته بودن موج a در وریدهای عنق.
- **عدم کفایه ترایکسپید (tricuspid incompetence):**
 - **زمان مرمr:** Pan systolic
 - **موقعیت مرمr:** محراق tricuspid
 - **کیفیت:** ملایم با فرکانس پایین
 - **انتشار:** به طرف سفلی به epigastrium
 - **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت
 - **سایر یافته‌های مهم:** کبد نبضانی و بزرگ، وریدهای عنق نبضانی با موج ۷ برجسته، بزرگ شدن بطن راست.

♦ آفات دسام ابهر

- **تضیق دسام ابهر (aortic stenosis):**
 - **زمان مرمr:** Ejection systolic murmur

- **موقعیت مرمر: محراق ابهر**
- **کیفیت: خشن با فرکانس بلند**
- **انتشار: به شرایین carotid و به epigastrium**
- **ارتباط با تنفس: قبلاً تذکر یافت**
- **سایر یافته‌های مهم: Anacrotic pulse (یک نبض با حجم پایین است)، کاهش شدت آواز دوم.**
- **عدم کفایه ابهر (aortic incompetence):**
 - Early diastolic مرمر توسط دیافراگم زمانی که مریض به طرف قدام خم شود و نفس خود را هنگام زفير قيد نمايد بهتر شنیده می‌شود.
 - **زمان مرمر: Early diastolic**
 - **موقعیت مرمر: محراق ابهر**
 - **کیفیت: شبیه نجوا کردن حرف R با فرکانس بلند**
 - **انتشار: به کنار چپ عظم قص یا ممکن موضعی باشد.**
 - **ارتباط با تنفس: قبلاً تذکر یافت**
 - **سایر یافته‌های مهم: Water hammer pulse، نبضان عروق شعریه، آواز مشابه شلیک مرمی تفنگچه در شریان femoral، Austin Flint murmur در محراق مایترل، Duroziez's murmur در شریان femoral، Corrigan pulsation (یعنی رقص شریان carotid)، بزرگ شدن بطین چپ، افزایش pulse pressure، کاهش شدت آواز دوم.**

♦ آفات دسام ریوی

- **تضیق ریوی (pulmonary stenosis):**
 - **زمان مرمر: Ejection systolic murmur**
 - **موقعیت مرمر: محراق ریوی**
 - **کیفیت: خشن با فرکانس بلند**
 - **ارتباط با تنفس: قبلاً تذکر یافت**
 - **سایر یافته‌های مهم: کاهش شدت آواز دوم، توسع بطین راست.**

● **عدم کفایه دسام ریوی (pulmonary incompetence):**

- **زمان مرمر:** Early diastolic
- **موقعیت مرمر:** محراق ریوی
- **کیفیت:** ملایم با فرکانس پایین
- **انتشار:** موضعی
- **ارتباط با تنفس:** قبلاً تذکر یافت
- **سایر یافته‌های مهم:** کاهش شدت آواز دوم، توسع بطین راست.

نقیصه حجاب بین‌البطنی (VSD):

سبب تولید مرمر systolic شده در قسمت سفلی کنار چپ عظم قص اصغا می‌شود.

نقیصه حجاب بین‌الاذینی (ASD):

سبب ایجاد یک مرمر systolic ریوی به سبب بار حجمی بطین راست می‌شود.

مرمرهای مهم دیگر:

● **Graham-Steel murmur:** یک مرمر دیاستولیک است که در محراق ریوی

شنیده می‌شود و در تضیق مایترل موجود می‌باشد. علت تولید این مرمر فشار رو به خلف بوده که منجر به توسع شراییین ریوی و بدین وسیله سبب عدم کفایه دسام ریوی می‌شود.

● **Austin-Flint murmur:** یک مرمر mid/late diastolic است که در محراق

مایترل در عدم کفایه دسام ابهر شنیده می‌شود. در زمان دیاستول خون برگشته از ابهر سبب تیله شدن یکی از ورقات مایترل شده و یک تضیق وظیفوی را در فوهه مایترل ایجاد می‌نماید.

● **Duroziez's murmur:** دیافراگم ستاتسکوپ را بالای شریان femoral فشار

دهید. مرمهرهای سستولیک و دیاستولیک شنیده می‌شود. این مرمر در عدم کفایه دسام ابهر موجود می‌باشد.

- **Carey Coombs murmur**: مرمر mid diastolic است که در محراق مایترل در تب روماتیک شنیده می‌شود.
 - **Seagull murmur**: مرمر موزیکال دیاستولیک است که در عدم کفایه ابهر به سبب عوامل ذیل شنیده می‌شود: syphilis، تکلس (calcification)، sub-acute bacterial endocarditis.
 - **Gibson's murmur**: مرمری است که هم در سستول و هم در دیاستول شنیده می‌شود. وصف machinery داشته در PDA موجود می‌باشد.
- مرمرهای ناشی از آفات مختلف:**

آفت	مرمر
عدم کفایه مایترل، عدم کفایه VSD، tricuspid	مرمر pan systolic
تضیق دسام ابهر، تضیق دسام ریوی	مرمر mid systolic
Mitral valve prolapse	مرمر late systolic
عدم کفایه دسام ابهر، عدم کفایه دسام ریوی	مرمر early diastolic
تضیق مایترل، تضیق tricuspid	مرمر mid diastolic
تضیق مایترل، تضیق tricuspid	مرمر pre-systolic
PDA، فستول‌های شریانی وریدی	مرمر متداوم



تست‌ها برای تشخیص اروای ناکافی اطراف سفلی

- **Homan's test**: در این معاینه مریض از سبب dorsiflexion پا در عضلات ساق و ناحیه popliteal احساس درد می‌نماید. تست مثبت دلالت بر thrombophlebitis وریدهای عمیق می‌کند.
- **Lowenberg test**: کف آله فشار را بالای ناحیه ماؤوفه اطراف بسته نموده و به آهستگی هوا دهید. در اثنای هوا دادن شخص نارمل در فشارهای بالاتر از ۱۶۰ ملی‌متر ستون سیماپ احساس ناراحتی می‌نماید. مریضان با انسداد

وریدی در فشارهای پایین‌تر از ۱۶۰ (یعنی در بین ۶۰-۱۵۰ میلی‌متر ستون سیماب) احساس ناراحتی می‌نماید.

● **Buerger test:** مریض بالای بستر قرار گرفته اطراف سفلی وی را به زاویه ۴۵ درجه بلند نمایید. در حالت نارمل سطح plantar پاها گلابی رنگ باقی می‌ماند. خاسف شدن آن دلالت بر کاهش اروای ناحیه می‌نماید. حالا از مریض بخواهید تا به سرعت راست نشسته و اطراف سفلی خود را به وضعیت dependent درآورد. در این اثنا مدت زمان سرخ شدن و پر شدن وریدی اطراف سفلی مریض را ثبت نمایید. وریدها در زمان کمتر از ۱۰ ثانیه در حالت نارمل پر می‌شوند. در صورتی که بیشتر از ۱۰ ثانیه را در بر بگیرد دلالت به اختلال اروای ناحیه می‌نماید.

یادداشت: دردی که با صعود طرف بهبود یابد دلالت به انسداد وریدی می‌نماید، در حالی که اگر با نزول بهبود یابد دلالت به انسداد شریانی می‌نماید.

- فشار خون بجلک کمتر از ۵۰ میلی‌متر ستون سیماب است و تست مثبت Buerger نشان‌دهنده امراض شریاین محیطی است (شش P).
- امراض شریاین محیطی تظاهرات آن در شش P خلاصه می‌شود:
 - بدون نبض (Pulseless)
 - خسافت (Pallor)
 - سردی مهلك (Perishing cold)
 - اختلال حسیت (Paresthesia)
 - فلج (Paralysis)
 - درد (Pain)

هنگام معاینه یک واقعه قلبی باید ترتیب ذیل در نظر گرفته شود:

۱. تفتیش (inspection)
۲. نبض کعبری (radial pulse)

۳. ریت قلب (heart rate)
۴. فشار خون (blood pressure)
۵. معاینه عنق JVP
۶. جس قدام صدر
۷. اصغای قلب
۸. قرع و اصغای قاعده ریه‌ها
۹. نبضان محیطی
۱۰. اصغا جهت دریافت bruit های femoral و carotid



ارتباط علائم فیزیکی و امراض قلبی و وعایی

◆ عدم کفایه قلب (Heart failure)

عدم کفایه قلب چپ (LVF):

- **علائم عمومی:** Tachypnea
- **نبض شریانی:** pulsus alternans، tachycardia (تناوب ضربان‌های قوی و ضعیف ممکن موجود باشد).
- **Apex beat:** قابل جس، gallop rhythm
- **اصغا:** آواز سوم موجود می‌باشد. از سبب توسع بطین چپ عدم کفایه وظیفوی مایترل موجود می‌باشد که سبب تولید مرمر سستولیک می‌شود.
- **ساحات ریوی:** علائم احتقان ریوی یا اذیمای ریوی

عدم کفایه قلب راست (RVF):

- **علائم عمومی:** سیانوز محیطی ممکن موجود باشد.
- **نبض شریانی:** کم حجم
- **JVP:** بلند می‌باشد.
- **Apex beat:** به طرف خارج بیجا شده می‌باشد.

- **Heave:** بطین راست ممکن موجود باشد.
- **اصغا:** آواز سوم و مرمر pan systolic عدم کفایه وظیفوی tricuspid ممکن موجود باشد.
- **بطن:** tender hepatomegaly
- **اذیما:** pitting edema ناحیه بجلک و سکروم

◆ **امراض Pericardial**

- **Acute pericarditis:** تظاهرات: تب، pericardial friction rub.
- **Chronic constrictive pericarditis:**
 - **علائم عمومی:** لاغری شدید.
 - **نبض و فشار خون:** فشار خون پایین و pulsus paradoxus
 - **JVP:** بلند می‌باشد، موج a برجسته و نزول موج y.
 - **Apex beat:** غیر قابل جس.
 - **اصغا:** ازدیاد فاصله بین آوازهای قلبی، آواز سوم مقدم؛ early pericardial knock چون پر شدن سریع بطین آنّا متوقف می‌شود.
 - **بطن:** ascites، hepatomegaly، splenomegaly ممکن موجود باشد.
 - **اذیمای محیطی:** موجود می‌باشد.

◆ **Infective endocarditis**

- **علائم عمومی:** تب.
- **دستها:** splinter hemorrhage، clubbing، Osler nodes
- **چشم‌ها:** Roth spots (آفات vasculitic فندس است که مرکز آن زرد و توسط یک حلقه سرخ احاطه شده است).
- **قلب:** علائم مرض زمینه‌ای قلب:
- **کسبی:** عدم کفایه مایترل، تضیق مایترل، تضیق دسام ابهر و یا عدم کفایه دسام ابهر.
- **ولادی:** PDA، VSD، coarctation ابهر
- **دسامات مصنوعی**

- **بطن: splenomegaly**
- **معاینه ادرار:** ممکن hematuria موجود باشد.



امراض دسامی قلب چپ

تضيق مایترل (Mitral stenosis):

مساحت نارمل دسام مایترل ۴-۶ سانتی‌متر مربع است. کاهش مساحت دسام به نصف یا کمتر از آن سبب انسداد شدید در مقابل پر شدن بطن چپ می‌شود.

- **علائم عمومی:** tachypnea، وجه مایترل (سرخ‌ی تیره گونه‌ها)
- **نبض:** حجم نارمل یا کم، atrial fibrillation ممکن موجود باشد.
- **JVP:** در صورت موجودیت فرط فشار ریوی موجه a برجسته می‌باشد.
- **جس:** ضربان ذروه heave، tapping، بطن راست و P2 قابل جس، thrill دیاستولیک اتفاقاً موجود می‌باشد زمانی که مریض وضعیت جنبی چپ را اختیار کند.

- **اصفا:** S1 بلند، P2 بلند، diastolic murmur، opening snap دنباله‌دار با فرکانس پایین با bell زمانی که مریض به وضعیت جنبی چپ قرار بگیرد بهتر شنیده می‌شود. پری‌سستولیک (late diastolic accentuation) (mermur دیاستولیک ممکن واقع شود. تمرین مرم را تشدید می‌نماید.

- **علائم تضيق شدید:** زمانی که مساحت دسام ۱/۵ سانتی‌متر مربع یا کمتر باشد (رهنمود ۲۰۲۰ ACC/AHA): early opening snap، آواز اول ملایم، pulse pressure باریک، diastolic murmur طولانی، thrill دیاستولیک، موجودیت فرط فشار ریوی.

عدم کفایه مایترل (Mitral incompetence):

عدم کفایه دسام مایترل باعث می‌شود که یک قسمت از stroke volume بطین چپ به داخل اذین چپ برگشت نماید، سبب افزایش حجم اذین چپ و بطین چپ می‌شود.

- **علائم عمومی:** tachypnea
- **نبض:** نارمل یا صعود سریع، اریتمیا معمول است.
- **JVP:** نارمل بوده مگر این که عدم کفایه قلب راست به وجود آمده باشد. موجه a در فبریلیشن اذینی ناپدید می‌گردد.
- **Apex beat:** جس hyperdynamic به طرف سفلی و خارج بیجاشده بوده و Pansystolic thrill در ذروه و parasternal impulse از سبب توسع اذین چپ در خلف بطین راست موجود می‌باشد.
- **اصغا:** آواز اول ملایم یا معدوم می‌باشد. آواز سوم بطین چپ، مرمر pansystolic در ذروه که به طرف ابط انتشار دارد موجود می‌باشد.
- **علائم عدم کفایه شدید:** نبض با حجم کوچک، بزرگ شدن بطین چپ، آواز سوم، آواز اول ملایم، A2 مقدم، علایم فرط فشار ریوی ممکن موجود باشد. سایر علایم عدم کفایه بطین چپ ممکن موجود باشد.

پرولپس دسام مایترل (Mitral valve prolapse):

به نام‌های Barlow's syndrome و late systolic click murmur syndrome نیز یاد می‌گردد. این سندروم سبب یک click یا مرمر سستولیک یا هر دو در ذروه شده می‌تواند. موجودیت مرمر دلالت بر موجودیت عدم کفایه مایترل می‌کند.

- **اصغا:** کلیک‌های سستولیک یا کلیک‌های در اوقات متغیر (نوع midsystolic) ممکن یگانه علامه اصغائی باشد. مرمر سستولیک مؤخر با فرکانس بلند با click شروع شده و در زمان باقی سستول ادامه پیدا می‌کند.
- **Dynamic auscultation:** مرمر و کلیک هر دو مقدم‌تر واقع شده و ممکن با مانور Valsalva و حالت ایستاده بلندتر شود. در اثنای چمباتمه نشستن (squatting) و اجرای تمرینات آیزومتریک مانند مشت کردن دست، مؤخر و ملایم‌تر می‌شود.

تضیق دسام ابهر (Aortic stenosis):

مساحت نارمل دسام ابهر ۳-۴ سانتی‌متر مربع است. تنگ شدن قابل ملاحظه این دسام سبب محدودیت مسیر خروجی بطن چپ و اعمال بار فشاری بالای بطن چپ می‌شود.

- **علایم عمومی:** کدام علامه خاص موجود نمی‌باشد.
- **نبض:** ممکن نبض plateau یا anacrotic موجود باشد. حجم این نبض کوچک بوده و pulse pressure نیز باریک می‌باشد.
- **جس:** heaving ذروه موجود می‌باشد، ثابت بوده، به طرف خارج بیجا شده می‌باشد. یک thrill سستولیک ممکن قابل جس باشد.
- **اصغا:** تضاعف کوچک یا معکوس آواز دوم به علت ejection مؤخر بطن چپ، harsh midsystolic ejection murmur که اوج آن در محراق ابهر بوده به طرف شرایین carotid انتشار می‌کند، در ذروه نیز بهتر شنیده می‌شود. این مرمر زمانی بهتر شنیده می‌شود که مریض به وضعیت راست قرار داشته و زفیر عمیق اجرا نماید.
- **علایم تضیق شدید ابهر:** مساحت دسام ۱ سانتی‌متر مربع یا کمتر یا گرادینت اوسط فشار ۴۰ ملی‌متر ستون سیماپ یا بیشتر (رهنمود ۲۰۲۰ ACC/AHA)، نبض plateau، thrill، آواز چهارم، تضاعف معکوس آواز دوم، عدم کفایه بطن چپ.

عدم کفایه دسام ابهر (Aortic incompetence):

دسام ابهر مصاب عدم کفایه خون را در زمان دیاستول از ابهر به بطن چپ تا زمانی اجازه عبور می‌دهد که فشار دیاستولیک بطن چپ بلندتر از ابهر گردد.

- **علایم عمومی:** Marfan's syndrome، ankylosing spondylitis یا علایم یکی از ارتروپتی‌های seronegative ممکن مشهود باشد.
- **نبض و فشار خون:** water hammer pulse و pulse pressure وسیع.
- **عنق:** نبضان‌های واضح کروتید (علامه Corrigan).

- **apex beat:** جس به شکل hyperdynamic بوده و به طرف سفلی و خارج بیجا شده می‌باشد. یک thrill دیاستولیک ممکن در کنار چپ عظم قص زمانی بهتر جس گردد که مریض به حالت نشستۀ قرار داشته و نفس خود را در زفیر قید نموده باشد.
- **اصفا:** A2 ممکن ملایم و با فرکانس بلند باشد. یک مرمر دیاستولیک بلافاصله بعد از آواز دوم قلب آغاز شده و برای یک زمان متغیر تا دیاستول ادامه پیدا می‌کند. اوج آن در مسافات بین الضلعی سوم و چهارم می‌باشد. یک systolic ejection murmur ممکن از سبب موجودیت همزمان تضیق دسام ابهر یا افزایش جریان در دسام ابهر با قطر نارمل موجود باشد. Austin flint murmur نیز باید جستجو شود. این یک مرمر mid-diastolic دنباله‌دار و presystolic با فرکانس پایین می‌باشد که در ذروه خوبتر شنیده می‌شود. از تضیق دسام مایترل تفریق شده می‌تواند؛ زیرا آواز اول بلند نبوده و snap موجود نمی‌باشد.
- **علامیم عدم کفایه شدید دسام ابهر:** collapsing pulse، pulse pressure وسیع، decrescendo diastolic murmur طولانی، S3 بطین چپ، A2 ملایم، Austin flint murmur و علامیم عدم کفایه بطین چپ.



CARDIOMYOPATHY

:Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM)

در این حالت عضلات مسیر خروجی بطین چپ یا راست یا هر دو ضخاموی می‌باشند.

- **نبض:** به تندی صعود نموده و پرشی می‌باشد.
- **JVP:** موجۀ a معمولاً متباز می‌باشد.
- **جس:** impulse دوگانه یا سه گانه در ذروه.

- **اصفا:** مرمر late systolic در قسمت سفلی کنار چپ عظم قص و ذروه و یک مرمر pan systolic که با تمرین آیزومتريک و squatting کاهش می‌یابد.



امراض ولادی قلب بدون سیانوز

نقیصه حجاب بین‌البطينی (VSD):

- **جس:** ذروه hyperkinetic که به طرف سفلی و خارج بیجا شده است. اگر نقیصه بزرگ باشد یک تریل در کنار چپ عظم قص قابل جس می‌باشد.
- **اصفا:** مرمر pan systolic خشن در کنار چپ عظم قص، آواز سوم و چهارم. مرمر در زمان زفير بلندتر می‌شود. در صورت کوچک بودن نقیصه، مرمر خشن‌تر و بلندتر می‌باشد.

نقیصه حجاب بین‌الاذیني (ASD):

- دو نوع آن اکثراً دیده می‌شود: ostium secundum و ostium primum.
- **جس:** نارمل یا هایپرتروفی بطین راست.
 - **اصفا:** تضاعف ثابت آواز دوم، مرمر دیاستولیک دسام tricuspid با فرکانس پایین و مرمر سستولیک ریوی که هر دوی این‌ها با شهیق بلندتر می‌شوند.

Patent Ductus Arteriosus (PDA):

Ductus Arteriosus یک وعاء است که در حیات داخل رحمی ابهر و شریان ریوی را با هم مرتبط می‌سازد. در patent ductus arteriosus سمت شنت از ابهر به طرف شریان ریوی می‌باشد، اما در صورت تأسس فرط فشار ریوی سمت شنت از شریان ریوی به طرف ابهر می‌شود.

- **نبض و فشار خون:** فشار دیاستولیک پایین می‌باشد، collapsing pulse.
- **جس:** apex beat به شکل hyperdynamic می‌باشد.
- **اصفا:** در صورت متوسط بودن شنت آواز دوم تضاعف نداشته اما در صورت بزرگ بودن قابل ملاحظه شنت تضاعف معکوس آواز دوم قلب به وجود

می‌آید. مرمر دوامدار و machinery بلند در مسافه بین‌الضلعی اول چپ موجود می‌باشد.

Coarctation of aorta

عبارت از یک تضیق ولادی ابهر است که بعد از منشأ شریان subclavian چپ موجود می‌باشد.

- **علائم:** رشد اطراف علوی نسبت به سفلی بهتر است. نبضان در شریان femoral نسبت به شریان radial مؤخر بوده و همچنان نبض در شریان femoral ضعیف می‌باشد. فشار خون در بازو بلند می‌باشد. یک مرمر mid systolic در precordium و ناحیه ظهری به علت انکشاف collateralها موجود می‌باشد.



امراض ولادی قلب توأم با سیانوز

Tetralogy of Fallot

در این حالت چهار پتالوژی به علت یک اختلال تکاملی موجود می‌باشد:

۱. نقیصه حجاب بین‌البطینی (VSD)
 ۲. انسداد مسیر خروجی بطین راست که شدت آفت را مشخص می‌کند. تضیق می‌تواند در ادای دسام ریوی یا در ادای infundibular باشد.
 ۳. بیجا شدن ابهر به طرف راست که سبب سیانوز می‌شود.
 ۴. ضخامه بطین راست به علت انسداد مسیر خروجی آن.
- **علائم:** سیانوز مرکزی، clubbing و polycythemia معمولاً موجود می‌باشد.
 - **علائم توسع بطین راست:** parasternal impulse و thrill در کنار چپ عظم قص، cardiomegaly موجود نمی‌باشد. در اصغا آواز دوم تضاعف نداشته و یک مرمر سستولیک در محراق ریوی شنیده می‌شود.





فصل هفتم

معاینه سیستم هضمی

اعراض امراض سیستم هضمی

۱. عسرت بلع (dysphagia): عبارت از احساس بندش چیزی در گلو یا صدر در اثنای فعل بلع است. عسرت بلع از سبب امراض مختلف مری از قبیل تضیقات، تقرحات، التهابات یا تومورهای مری به وجود می‌آید.
۲. دلجوشی (heart burn)
۳. استفراغ / اسهال (vomiting / diarrhea)
۴. خون در استفراغ (hematemesis)
۵. مواد غایطه سیاه‌رنگ (Melena)
۶. دردهای بطنی (abdominal pains)
۷. نفخ (flatulence)
۸. سوء هضم (indigestion)
۹. قبضیت (constipation)

۱۰. یرقان (jaundice)

از مریض باید در مورد هر یکی از اعراض فوق استجواب صورت بگیرد.

معاینه سیستم هضمی

معاینه سیستم هضمی مشتمل است بر:

۱. معاینه جوف دهن

۲. معاینه بطن

۳. معاینه رکتوم

◆ ۱. معاینه جوف دهن

در این بخش قسمت‌های ذیل باید معاینه شوند:

۱. لب‌ها

۲. بیره‌ها

۳. دندان‌ها

۴. زبان

۵. حنک، بلعوم، ناحیه فمی‌بلعومی، غشای مخاطی جوف دهن

۶. تنفس

۱. معاینه لب‌ها

در قدم اول رنگ آن را ملاحظه کنید:

● آبی در cyanosis

● خاسف در anemia

● سوء اشکال ولادی مثلاً لب‌های خرگوشی

● لب‌های نارمل لشم می‌باشند.

کنج‌های لب‌ها را برای دریافت ترکیدگی‌ها مشاهده کنید (angular stomatitis).

التهاب و تقرح لب‌ها به نام cheilitis یاد می‌شود؛ این حالت در کم‌خونی کمبود

آهن و کمبود ویتامین B12 دیده می‌شود. انتان herpes simplex سبب ایجاد

ویزیکل‌های با قاعده سرخ بالای لب‌ها می‌شود. تقرحات لب‌ها در سفلیس (snail tract ulcer) و کنسرها دیده می‌شود.

۲. معاینه بیره‌ها

- رنگ آن را ارزیابی نمایید. در تسمم سرب یک خط آبی‌رنگ در کناره‌های بیره‌ها مشاهده می‌شود. این خط را می‌توان با طبقه سیاه tartar دندان‌ها، توسط داخل کردن یک پارچه کاغذ گوه‌شکل سفید در بین دندان و بیره تشخیص تفریقی نمود. خطی که از سبب تسمم سرب به وجود آمده باشد بیشتر متبازر می‌گردد در حالی که خط ناشی از tartar دندان‌ها ناپدید می‌شود.
- بیره‌های متورم در scurvy: در scurvy بیره‌ها متورم و اسفنجی می‌شوند. در حاملگی و epilepsy که تداوی طولانی با hydantoin صورت گرفته باشد نیز بیره‌ها متورم می‌باشد.
- خونریزی در بیره‌ها در acute leukemia و thrombocytopenic purpura به مشاهده می‌رسد.
- در gingivitis کناره‌های بیره‌ها سرخ بوده به آسانی خونریزی می‌دهند. در حالی که در pyorrhea (قیح دندان‌ها) بیره‌ها منقبض بوده و مکرراً خونریزی می‌دهند. قیح ممکن در بین بیره‌ها و دندان‌ها دیده شود.

۳. معاینه دندان‌ها

دندان‌های Hutchison در سفلیس ولادی دیده می‌شود. در این حالت دو دندان مرکزی ثنایای دایمی علوی در مقطع مدور می‌باشند؛ میخ‌مانند می‌باشند یعنی در نزدیک بیره‌ها نسبت به تاج وسیع‌تر بوده و کناره‌های آزاد آن نصف هلالی می‌باشند.

۴. معاینه زبان

از مریض بخواهید تا زبان خود را بیرون نماید.

- رنگ: رنگ زبان را مشاهده کنید:
- آبی در cyanosis
- سرخ در تسمم nicotinic و کمبود riboflavin (زبان گوشتی سرخ)

- خاسف در کم خونی
- سیاه در مریضان که ترکیبات آهن را اخذ می نمایند و همچنان در مرض Addison و بعضی از امراض فنگسی
- مرکز پوشیده با کناره های سرخ در تب محرقه
- **تناظر:** تناظر آن را مشاهده نمایید. در حالت نارمل زبان از خط متوسط کمی منحرف می باشد. در فلج عصب ۱۲ زبان به صورت واضح به یک طرف انحراف می داشته باشد.
- **رعشه (tremor):** رعشه زبان در عصبانیت، thyrotoxicosis و parkinsonism دیده می شود.
- **معاینه سطح زبان:** نکات ذیل باید در نظر گرفته شوند:
 - زبان خشک در حالات ذیل موجود می باشد:
 - اضطراب
 - Dehydration
 - زبان برهنه (bald tongue): پاپیلاهای زبان ممکن اترافی نموده و زبان لشم و صاف باقی بماند. در واقعات ذیل دیده می شود:
 - Pernicious anemia
 - کم خونی کمبود آهن
 - Pellagra
 - زبان پوشیده یا خردار (furred tongue): زبان در حالت نارمل توسط یک طبقه نازک حجرات غشای مخاطی پوشیده شده است. اگر این طبقه ضخیم گردد به نام زبان پوشیده یا خردار یاد می شود. اسباب آن قرار ذیل اند:
 - افراط در سگرت کشیدن
 - تب (در ملاریا زبان بصورت متحدالشکل پوشیده می باشد و در محرقه صرف مرکز آن پوشیده می باشد)
 - تنفس با دهن

- قبضیت
- آفات بطنی مانند gastritis
- در تب مخملک (scarlet fever) در نخست زبان توسط پوش ضخیم پوشیده می‌باشد و پاپیلاهای سرخ نیز در آن دیده می‌شود (زبان توتی سفید)؛ سپس زبان پوش خود را از دست داده و رنگ سرخ را به خود اختیار می‌کند (زبان توتی سرخ).
- **قرحات زبان:** قرحات می‌توانند بالای زبان تشکل نمایند. چهار نوع قرحات دیده شده می‌تواند:
 - قرحات ساده: این قرحات سطحی بوده با دندان‌های تیز و سیاه سرفه (whooping cough) همراه می‌باشد.
 - قرحات خبیث: اکثراً در کناره‌های زبان به وجود می‌آیند. این قرحات دارای کنارها و قاعده سخت می‌باشند. عقدات لمفاوی ناحیوی ممکن متورم باشند.
 - قرحات توبرکلوزیک: اکثراً در نوک زبان به وجود می‌آیند. این قرحات سطحی، زردرنگ و بدون درد می‌باشند. در توبرکلوز ریوی دیده می‌شود.
 - قرحات syphilitic: دو شکل آن دیده می‌شود:
 - سطحی: این قرحات یا به شکل قرحات در کناره‌های زبان یا به صورت ترکیدگی‌ها در سطح زبان تشکل می‌کند.
 - عمیق: در ظهر زبان دیده می‌شود و شکل سوراخ شده را دارد. قاعده آن سخت نمی‌باشد و عقدات لمفاوی ناحیوی نیز متورم نمی‌باشند. درد نیز ندارد.
- **پلک‌های زبان:** در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - پلک‌های سفید یا برفک فمی (oral thrush)
 - leukoplakia
 - geographic tongue: پلک‌های سفید نقشه‌مانند بالای زبان موجود می‌باشد که دلالت به حالت مرضی نمی‌نماید.

- **معاینه سطح سفلی زبان:** از مریض بخواهید تا نوک زبان خود را به حنک خود تماس دهد. نکات ذیل را ملاحظه نمایید:
- در زبان گره شده (tied tongue)، مریض قادر به بلند کردن زبان خود نمی‌باشد.
- در سیاه سرفه قرحات کوچک در نزدیک frenulum به مشاهده می‌رسد.
- در صورت التهاب غده‌های submaxillary، فوهای قنات‌ها دیده می‌شود.
- **اندازه زبان:** در صورتی که اندازه زبان بزرگ شود به نام macroglossia یاد می‌شود. در این صورت زبان از جوف دهن پیش برآمده می‌باشد. در cretins دیده می‌شود.

۵. معاینه حنک، بلعوم، ناحیه فمی‌بلعومی و غشای مخاطی جوف دهن

- از مریض بخواهید تا دهن خود را باز نماید. یک tongue depressor را داخل دهن کنید و داخل دهن را در روشنی کافی مشاهده نمایید.
- رنگ غشای مخاطی داخلی رخسارها را مشاهده نمایید: در سیانوز آبی‌رنگ، در کم‌خونی خاسف و در یرقان زردرنگ می‌باشد.
 - Koplik's spots: در مرحله نزوی سرخکان قبل از تظاهر اندفاعات، نقاط سفید آبی کوچک که توسط هاله سرخ احاطه شده در مقابل دندان‌های آسیاب به مشاهده می‌رسد.
 - تصبغ غشای مخاطی جوف دهن در مرض Addison دیده می‌شود.
 - در اثنای معاینه حنک رنگ آن را مشاهده نمایید: در سیانوز آبی، در یرقان زرد، در کم‌خونی خاسف و در کمبود ویتامین B12 سرخ‌رنگ می‌باشد.
 - نکته دوم که باید در نظر گرفته شود قرحات است. انواع مختلف قرحات که موجود بوده می‌توانند قرار ذیل اند:
 - قرحات aphthous: عبارت از قرحات کوچک سفید یا زردرنگ می‌باشد.
 - Snail track ulcers در syphilis دیده می‌شود.
 - قرحات عمیق معقم (Vincent's angina).

- قرحات بزرگ غیر منظم (leukemia / agranulocytosis).
- سپس تانسل‌ها را معاینه نمایید؛ ممکن متورم و ملتهب باشند. در tonsillitis نقاط کوچک زردرنگ قیچی بالای سطح آن موجود می‌باشد. در دیفتری ممکن توسط یک غشای خاکستری‌رنگ ستر شده باشد.
- ناحیه فمی‌بلعومی را برای دریافت التهاب (chronic pharyngitis)، adenoids، توسع وریدها و بالآخره قرحات و تورم‌ها مشاهده نمایید.

۶. تنفس

- از مریض بخواهید تا دهن خود را باز نموده و تنفس نماید. در این اثنا بوی آن را ملاحظه نمایید:
- بوی متعفن: آفات دندان‌ها، قرحات فمی، تجزیه بقایای غذایی توسط باکتری.
 - بوی ماهی: Uremia
 - بوی موش: سیروز کبدی (fetor hepaticus)
 - بوی میوه: ketoacidosis
 - بوی ایتزر: تسمم الکول
 - سایر بوها: بوی تریاک، تسمم با paraldehyde بوهای مختص به خود را دارند.



۲. معاینه بطن

مراق چپ	اپی‌گستر	مراق راست
قطنی چپ	سروی	قطنی راست
حرقفی چپ	خثلی (hypogastric)	حرقفی راست

نُه ناحیه بطن (نمای قدامی، راستِ مریض در سمت چپ تصویر)

شیمای ۷.۱: نواحی نه‌گانه بطن

معاینه بطن شامل تفتیش، اصغا، جس، قرع و معاینه تناسلی و مقعدی می‌باشد.

تفتیش

جهت اجرای معاینه درست فیزیکی شرایط ذیل باید مراعات گردند:

- مثنانه مریض باید تخلیه شده باشد.
- مریض باید به شکل هموار بالای بستر بدون بالشت قرار داشته باشد.
- مریض باید کاملاً راحت و آرام باشد. بازوهای وی باید در جوانب به صورت هموار قرار داشته باشد.
- بطن مریض را در روشنی کافی در معرض دید تان قرار دهید.
- معاینه‌کننده در طرف راست مریض قرار گیرد.

- لباس‌های وی باید تا به xiphisternum در علوی و تا به ارتفاع عانه (symphysis pubica) در سفلی برطرف گردد.
- در اثنای تفتیش نکات ذیل را باید ملاحظه نمود:

- نمای بطن
- حرکات بطن
- برجستگی‌های روی بطن
- تصبغات جدار بطن
- وریدهای متبارز
- امواج پرستالتیک
- موهای عانه
- سره
- فوهات فتقیه
- سکارها و خطوط
- اعضای تناسلی خارجی

تفصیل نکات تفتیش:

- **نمای بطن:** به صورت نارمل بطن در مرکز کمی فرورفته می‌باشد. فرورفتگی واضح قسمت مرکزی بطن (scaphoid abdomen) در فاقگی شدید و کنسر مری یا معده دیده می‌شود. بطن برجسته و متورم در حالات ذیل دیده می‌شود:

- مایع داخل جوف پریتون (ascites)
- شحم (چاقی)
- انتفاخ گازهای بطنی
- جنین (حاملگی)
- مواد غایطه (قبضیت)
- سیست مبیض
- تومور بزرگ احشای بطنی

- **حرکات بطن:** تمام بطن با تنفس به صورت یکسان حرکت می‌کند. بعضاً یک قسمت از جدار بطن یا تمام بطن با تنفس کمتر حرکت می‌کند یا هیچ حرکت نداشته که دلالت بر appendicitis موضعی یا عمومی یا peritonitis می‌کند. در حالت نارمل بطن در اثنای شهیق برجسته شده و در اثنای زفیر فرو می‌رود اما بعضاً حرکات بطنی معکوس می‌شود؛ یعنی با زفیر برجسته شده و با شهیق فرو می‌رود. این حالت اخیرالذکر در فلج دیافراگم به وجود می‌آید.
- **برجستگی (Bulging):** در صورت بزرگ شدن طحال قسمت چپ بطن و در صورت بزرگ شدن کبد قسمت راست بطن برجسته می‌باشد. در صورت بزرگ شدن کلیه‌ها برجستگی در flank مربوطه دیده می‌شود. در صورت موجودیت کتله appendicular برآمدگی در حفره حرقفی راست دیده می‌شود. موجودیت تومور یا بزرگ شدن یکی از احشای بطنی به صورت موضعی سبب ایجاد برآمدگی در ساحه مربوطه می‌شود. در فتق epigastric یا تغلف عضلات مستقیمه بطن زمانی که مریض رأس خود را در مقابل یک مقاومت بلند نماید در ناحیه مربوطه برآمدگی به وجود می‌آید.
- **نبضان بطنی (Abdominal pulsation):** نبضان در ناحیه epigastrium در واقعات ذیل دیده می‌شود:
 - عصبانیت
 - توسع بطین راست قلب
 - کبد نبضانی (عدم کفایه ترایکسپید)
 - تومور داخل بطنی که در قدام ابهر قرار گرفته باشد
 - انوریزم ابهر بطنی
 - اشخاص لاغر که در این صورت نبضان بطنی نارمل تلقی می‌شود.
- **تصبغات روی جدار بطن:** در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - به سبب تطبیق حرارت بالای جدار بطن جهت بهبود دردهای مزمن بطنی (chronic pancreatitis) با استفاده از بوتل‌های آب داغ، تصبغ خال‌مانند

قهوه‌ای روی بطن به وجود می‌آید که به نام erythema ab igne یاد می‌شود.

● **مرض Addison**

● در حاملگی linea nigra در خط متوسط تحت سره دیده می‌شود.

● **وریدهای برجسته روی بطن:** وریدهای روی بطن در حالات ذیل برجسته می‌شود:

● **فرط فشار ورید باب (Portal hypertension):** در این صورت در جریان portal داخل کبدی انسداد موجود بوده که از سبب آن خون به وریدهای paraumbilical (umbilical) سروی و وریدهای epigastric علوی و سفلی سرازیر می‌شود. بناءً این وریدها برجسته می‌شوند. بعضاً وریدهای برجسته محیط سروی یک منظره خاص را می‌سازد که به نام caput medusae یاد می‌شود. جریان خون در این وریدها از سره به طرف محیط می‌باشد.

● **میتود تعیین سمت جریان خون:** دو انگشت خود را بالای ورید قرار دهید در حالی که ورید زیر فشار است و آن‌ها را از هم دور نمایید. قسمتی از ورید که میان انگشتان قرار دارد عاری از خون می‌گردد. حالا یک انگشت خود را بلند نموده و زمان پر شدن ورید را ملاحظه نمایید؛ سپس عین میتود را تکرار کنید و این بار انگشت دوم خود را بلند نمایید و زمان پر شدن آن را یادداشت نمایید. در هر دو حالت فوق کمترین زمان، سمت جریان خون را نشان می‌دهد.

● **انسداد ورید اجوف سفلی (obstruction to IVC):** چون تفصّلات بین ریزابه‌های وریدهای epigastric سفلی، ورید femoral و ورید axillary موجود می‌باشد، از سبب انسداد، وریدهای ارتباط‌دهنده آن در قسمت‌های قدامی وحشی جذع برجسته می‌شوند. در این صورت سمت جریان از سفلی به علوی می‌باشد.

- **کنسر پیشرفته بطن:** در این صورت وریدهای جدار بطن در ناحیه مربوطه برجسته معلوم می‌شود.
- **امواج Peristaltic:** جهت مشاهده بهتر حرکات داخل بطنی، بطن مریض را در معرض روشنی یک چراغ قرار دهید. حرکات peristaltic در انسداد قسمی یا التهاب امعا متباز می‌باشد. سه نوع حرکات peristaltic مشاهده می‌شود:
 - در epigastrium: سمت این حرکات از چپ به طرف راست می‌باشد. این حرکات در تضیق پیلورس (pyloric stenosis) به سبب قرحات مزمن اثنا عشر یا کنسر معده به مشاهده می‌رسد.
 - انسداد قسمت بعیده امعای کوچک: علت معمول آن توبرکلوز است. در این صورت قسمت مرکزی بطن (ناحیه سروی) به علت توسع ileum و jejunum برجسته می‌باشد و حرکات مشخصی را در بطن ایجاد می‌کند که به نام منظره نردبان‌مانند (step ladder pattern) یاد می‌کنند.
 - انسداد کولون صاعده: در این صورت امواج peristaltic از سفلی به علوی در طرف راست بطن دیده می‌شود.
 - انسداد کولون نازل: در این حالت قسمت بعیده کولون متوسع می‌باشد. سمت حرکات peristaltic از علوی به سفلی در قسمت چپ بطن دیده می‌شود.
- **موهای عانه (Pubic hairs):** توزیع موهای عانه دو شکل دارد: شکل مردانه و شکل زنانه. شکل زنانه آن طور نیست که کنار علوی موها مقعر می‌باشد در حالی که در شکل مردانه محدب بوده تا به سره تمادی دارد. در صورتی که شکل مردانه موها در زنها موجود باشد دلالت بر موجودیت تومور مبیضی ترشح‌دهنده اندروجن می‌کند. به همین شکل اگر شکل زنانه موهای عانه در مردها دریافت گردد دلالت بر موجودیت تومور خصیوی ترشح‌دهنده استروجن می‌نماید.
- **سره (Umbilicus):** اول‌تر از همه موقعیت سره را ملاحظه نمایید. در حالت طبیعی سره در مرکز و نزدیک‌تر به ارتفاع عانه نسبت به xiphisternum

موقعیت دارد. در تومور مبیض، سره به علوی بیجا شده و تقریباً در وسط فاصله نواحی متذکره قرار می‌گیرد. سپس شکل سره را ملاحظه نمایید. بصورت نارمل سره کمی فرورفته می‌باشد (inverted umbilicus). در حین (ascites) یا فتق سروی (umbilical hernia) سره صعود نموده، به نام everted umbilicus یا ptosis یاد می‌شود.

● **فوهات فتقیه (Hernial orifices):** نواحی مغبنی، ناحیه epigastric و سروی را برای دریافت فتق‌ها مشاهده نمایید.

● **نواحی ۹ گانه بطن:**

● RH: right hypochondrium

● RF: right flank or lumbar region

● RIF: right iliac fossa

● E: epigastrium

● UR: umbilical region

● H: hypogastrium or suprapubic region

● LH: left hypochondrium

● LF: left flank or lumbar region

● LIF: left iliac fossa

● **سکارها و خطوط (Scars & striae):** موجودیت سکارها دلالت بر عملیات‌های قبلی می‌نماید. موجودیت خطوط (striae) دلالت بر تغییرات در این اواخر در اندازه بطن می‌نماید (مثلاً چاقی، حین حاملگی striae gravidarum و بعضی از امراض دیگر). خطوط گلابی‌رنگ در سندروم Cushing دیده می‌شود.

● **Grey Turner's sign:** موجودیت تغییر رنگ آبی در فلانک‌ها است که علامه تشخیصیه اما مؤخر pancreatitis نزفی می‌باشد. اگر این تغییر رنگ در جلد اطراف سره موجود باشد به نام Cullen's sign یاد می‌شود.

جس

قبل از انجام جس، اولاً باید بطن را توسط خطوط ذیل به ۹ ناحیه تقسیم نماییم:

- دو خط عمودی که شراییین femoral و نوک غضاریف ضلعی نهم را عبور می‌کند.

- دو خط افقی که یکی آن دو بارزه iliac را با هم وصل می‌کند و دوم آن کنار سفلی غضاریف ضلعی دو طرف را عبور می‌کند.

نام‌های نواحی ۹ گانه قرار ذیل اند:

- ناحیه umbilical: ناحیه اطراف سره.
- ناحیه epigastrium: در علوی ناحیه سروی بین کنارهای ضلعی دو طرف قرار دارد.
- ناحیه hypogastrium: در تحت ناحیه سروی و بالاتر از ارتفاع عانه قرار دارد.
- ناحیه hypochondrium راست و چپ: بالاتر و وحشی‌تر از ناحیه سروی قرار دارد.

- ناحیه iliac راست و چپ: پایین‌تر و وحشی‌تر از ناحیه سروی قرار دارد.
- ناحیه lumbar راست و چپ (فلانک‌ها): این نواحی در راست و چپ ناحیه سروی قرار دارد.

میتود جس:

داکتر باید در طرف راست مریض ایستاد شود. دست‌ها را با مالش دادن روی هم گرم نموده و جس را با دست راست آغاز نماید. دست باید به جدار بطن به صورت ملایم و ثابت گذاشته شود. انگشتان باید مستقیم و کمی در مفصل metacarpo-phalangeal قبض باشند. خوب است تا قبل از آغاز جس حقیقی یک بار تمام بطن با ملایمت لمس گردد زیرا این کار مریض را راحت می‌سازد.

- **وضعیت مریض هنگام جس:** مریض باید به شکل هموار بدون گذاشتن بالش روی بستر به طور آرام استراحت نماید. پاهای مریض باید قبض باشند. از مریض بخواهید تا تنفس عمیق بکشد، این عمل سبب راحت شدن مریض

می‌شود. برای جلوگیری از انتقال انتانات از طریق قطرات هوایی، بهتر است تا وجه مریض به طرف مقابل دور داده شود.

انواع جس:

چهار نوع جس بطن وجود دارد:

۱. سطحی

۲. عمیق

۳. Bimanual

۴. Dipping

(۱) جس سطحی:

از حفره حرقفی راست (RIF) شروع می‌شود. سمت آن بر خلاف حرکت عقربه ساعت است. میتود جس سطحی و عمیق با هم مشابه اند با این تفاوت که در شکل سطحی آن فشار کمتر بالای بطن وارد می‌شود. در این صورت مقویت عضلات (muscle tone)، شخی (rigidity)، حساسیت (tenderness) یا کتلات ارزیابی می‌شود. تون عضلی را می‌توان با حرکت فروبرنده سطحی جدار بطن معاینه نمود. افزایش تون عضلی محل درد را نشان می‌دهد.

در صورتی که حساسیت (tenderness) موجود باشد آن را طور ذیل درجه‌بندی می‌نماییم:

- درجه ۱: مریض اظهار می‌دارد که با تماس درد وجود دارد.
 - درجه ۲: در اثنای تماس در وجه مریض تغییرات به وجود می‌آید.
 - درجه ۳: در اثنای تماس مریض ناحیه مأوفه را دور می‌کند.
 - درجه ۴: در این حالت مریض به داکتر اجازه دست زدن را نمی‌دهد.
- در امراض التهابی (peritonitis) مریض با گرفتن و بلند کردن جلد بطن احساس درد می‌کند.

- **کتله قابل جس:** در صورت قابل جس بودن یک کتله نکات ذیل را باید مدنظر داشت:

- ناحیه‌ای که کتله در آن جس می‌شود.
- تعداد.
- اندازه و شکل.
- تحرکیت: کتله ثابت ممکن منشأ خلف پری‌توانی (پانکریاس) داشته باشد یا ممکن به جدار قدامی یا خلفی بطن توسعه نموده باشد. کتله توپرکلوزیک ileo-cecal و diverticulitis کولون سگموئید نیز ثابت می‌باشند. تورم‌های که از کبد، طحال، کیسه صفرا و کلیه منشأ گرفته باشد با شهیق به طرف سفلی حرکت می‌نمایند؛ در غیر آن با دست معاینه‌کننده قابلیت حرکت را ندارند. تومورهای امعای کوچک، کولون مستعرض و کتلات مزنتریک (mesenteric) با شهیق حرکت نداشته اما با دست می‌توان آن‌ها را متحرک ساخت.
- نبضان (pulsation): اگر یک کتله نبضانی باشد، دو انگشت خود را بالای آن بگذارید. اگر این انگشتان با هم موازی باقی بمانند دلالت بر این می‌کند که نبضان از تحت یعنی از ابهر منشأ گرفته است در حالی که اگر انگشتان از هم دور شدند، نشان می‌دهد که تورم یک انوریزم است.
- موقعیت (آیا کتله داخل بطنی است یا خارج بطنی؟):
- برای دانستن آن دست خود را بالای پیشانی مریض گذاشته و از وی بخواهید تا رأس خود را در مقابل قوه بلند نماید. با این طریقه عضلات بطنی تقلص می‌نمایند.
- اگر اندازه کتله کوچک گردد یا کتله ناپدید شود دلالت بر این می‌کند که کتله داخل بطنی است.
- اگر اندازه کتله زیاد گردد و بیشتر متبازر شود نشان می‌دهد که کتله خارج بطنی است.
- و بالاخره اگر اندازه کتله تغییر نکند اما با جدار بطن ملتصق باقی بماند نشان می‌دهد که کتله با جدار بطن مرتبط است.

- ملاحظه کنید که آیا در کتلات بطنی علوی سرحد علوی آن و در کتلات بطنی سفلی سرحد سفلی آن تعیین شده می‌تواند یا خیر. اگر سرحد علوی کتله تعیین شده نتواند دلالت به این می‌کند که کتله مذکور از کبد یا طحال یا معده منشأ گرفته و اگر سرحد سفلی آن جس شده نتواند ممکن کتله مذکور از مثانه یا مبیض منشأ گرفته باشد.
- ببینید که آیا کتله با دو دست قابل جس است یا خیر. کتلات کلیوی با دو دست قابل جس اند. کتله‌ای که از قسمت خلفی سفلی فص راست کبد و قسمت خلفی کیسه صفرا منشأ گرفته باشد نیز با دو دست قابل جس است.

(۲) جس عمیق:

- در صورت نیاز باید در پهلوی بستر مریض نشست. جس را با گذاشتن دست راست بالای جدار بطن به شکلی که تمام دست با بطن در تماس باشد، آغاز نمایید.
- انگشتان باید به شکل مستقیم و کمی در مفاصل metacarpophalangeal قبض باشند.
 - بطن به شکل ملایم اما عمیق فشار داده شود.
 - از فشار آوردن با نوک انگشتان باید اجتناب نمود.
- در اشخاص چاق و عضلی جس عمیق با دو دست انجام می‌شود. دست چپ خود را بالای دست راست گذاشته و فشار بیشتر وارد کنید.

● ترتیب و شیمای جس عمیق بطن:

- حفره حرقفی چپ (left iliac fossa)
- ناحیه قطنی چپ (کلیه چپ)
- ناحیه hypochondrium چپ (طحال)
- ناحیه hypochondrium راست و epigastrium (کبد و کیسه صفرا)
- ناحیه قطنی راست (کلیه راست)
- حفره حرقفی راست و hypogastrium (برای مثانه و جنین در خانم‌ها)
- ناحیه سروی برای عقدات لمفاوی محیط ابهر و مزنتریک

- هر دو ناحیه مغبنی را برای عقدات لمفاوی و شرابین femoral جس نمایید.
- فوهات فتقیه (hernial orifices) را جس نمایید.
- اعضای تناسلی خارجی را جس نمایید.
- **یادداشت:**
- ناحیه دردناک را در اخیر جس نمایید.
- جس عمیق را تکرار نمایید و از مریض بخواهید تا نفس عمیق بکشد.
- حساسیت رجعی (Rebound tenderness): برای دریافت آن با ملایمت بطن مریض را فشار دهید و دفعه‌تاً با سرعت دست خود را دور نمایید. در واقعه مثبت مریض درد شدید احساس می‌کند.

جس اعضای مخصوص:

طحال (Spleen):

- **اناتومی سطحی طحال:** طحال در قسمت علوی چپ بطن قرار دارد. فورمول عمومی برای طحال عبارت است از ۱۱۳۵۷۱۱؛ یعنی ۱ انچ ضخامت، ۳ انچ عرض، ۵ انچ طول، ۷ اونس وزن و در تحت اضلاع ۹، ۱۰ و ۱۱ قرار دارد.

• میتودهای جس طحال:

- میتود ۱: جس طحال را از حفره حرقفی راست (right iliac fossa) با دست راست آغاز نمایید و به شکل مایل به طرف hypochondrium چپ بالا بروید، زیرا طحال به همین سمت بزرگ می‌شود یعنی طحال سفلیاً به طرف حفره حرقفی راست بزرگ می‌شود. در اثنای جس از مریض بخواهید تا شهیق عمیق نماید. در این صورت حجاب حازر (diaphragm) پایین آمده و بدین وسیله طحال نیز پایین می‌آید و بهتر جس می‌شود. طحال در حالت نارمل قابل جس نمی‌باشد؛ زمانی قابل جس می‌شود که ۲-۳ مراتبه بزرگ شده باشد.
- میتود ۲: در این میتود اگر طحال کمی هم بزرگ شده باشد تشخیص می‌شود. مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري بالای بستر قرار گرفته و

- پاهای خود را در حالت قبض نگهدارد. بطن مریض باید کاملاً برهنه باشد. دست چپ خود را در تحت پایین‌ترین اضلاع طرف چپ در ناحیه خلفی وحشی قرار داده و دست راست خود را در تحت اضلاع چپ قرار دهید. از مریض بخواهید تا شهیق عمیق اجراء نماید. در عین زمان انگشتان دست راست خود را عمیقاً در تحت حفره تحت الضلعی چپ فرو ببرید و با دست چپ به طرف انسی و سفلی فشار وارد نمایید. جهت اطمینان بیشتر، مریض را کمی به طرف راست در حالی که پای چپ در حالت قبض باشد وضعیت داده و میتود را تکرار نمایید. این هم کمک‌کننده است که مریض در اثنای اجرای جس دست چپ خود را بالای شانه معاینه‌کننده بگذارد.
- میتود ۳: در این صورت در طرف چپ مریض قرار گرفته انگشتان دست چپ خود را در تحت اضلاع چپ داخل نمایید. در عین زمان مریض باید شهیق عمیق را انجام دهد.
 - طحال قابل جس سخت بوده و با شهیق به طرف سفلی حرکت می‌کند. کنار علوی آن قابل جس نبوده اما در کنار سفلی آن یک فرورفتگی جس می‌شود.

● اسباب بزرگ شدن طحال (Splenomegaly):

- Malaria
- Kalazar
- Leukemia (myeloid)
- Typhoid
- Cirrhosis of liver
- Hodgkin's disease
- Felty's syndrome

کبد (Liver):

- **اناتومی سطحی کبد:** در ناحیه hypochondrium راست قرار دارد. سرحد علوی آن در مسافه بین الضلعی چهارم یا در خلف ضلع ۵ موازی به خط

clavicular متوسط قرار دارد. سرحد سفلی آن با خطی که به شکل مایل به طرف علوی از غضروف ضلعی ۹ راست به ۸ چپ عبور نموده و خط متوسط بطنی را کمی بالاتر از نقطه متوسط بین سره و xiphisternum اتصال می‌کند، مطابقت دارد.

● میتودهای جس کبد:

- میتود ۱: مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري بالای بستر طوری قرار گیرد که پاهایش به حالت قبض باشند. دست خود را طوری در حفره حرقفی راست بگذارید که کنار radial انگشت شهادت تان با حوافی ضلعی دست موازی باشد. از مریض بخواهید تا شهیق عمیق را انجام داده و شما به شکل عمودی به طرف بالا جس را انجام دهید.
- میتود ۲ (بهتر): دست راست خود را به شکل هموار بالای بطن مریض طوری بگذارید که انگشتان اشاره و متوسط تان از کنار عضله مستقیمه دور باشد. انگشتان دست باید به طرف اضلاع متوجه باشد. در حالی که مریض شهیق عمیق را انجام دهد، انگشتان تان را به طرف داخل و علوی فشار دهید.
- در صورت بزرگ بودن (hepatomegaly)، کبد قابل جس می‌باشد. در اشخاص لاغر با وجود بزرگ نشدن آن نیز قابل جس می‌باشد. اگر کبد بزرگ شده باشد، چند سانتی‌متر سفلی‌تر از کنار ضلعی راست قابل جس می‌باشد.
- یادداشت: بعضاً یک فص زبان‌مانند ممکن به صورت ولادی وحشی‌تر از کیسه صفرا قابل جس باشد (Riedel lobe).
- زمانی که کبد قابل جس باشد نکات ذیل را ملاحظه نمایید:
 - وصف کناره‌های کبد: لشم، تیز، غیر منظم، ضخیم.
 - سطح کبد: آیا لشم است یا nodular.
 - حساسیت کبد: در حالات ذیل متورم و دردناک جس می‌شود: احتقان کبدی، Amoebic abscess، Infective hepatitis.

- نبضان: برای جس آن دست چپ خود را در خلف قسمت سفلی راست صدر قرار داده و با دست راست در ناحیه hypochondrium راست فشار وارد نمایید. نبضان کبدی در عدم کفایه ترایکسپید دیده می‌شود.
- **Spider naevi**: عبارت از اندفاعات عنکبوت‌مانند سرخ کوچک اند که از سبب توسع شریانچه مرکزی که از آن اوعیه کوچک متعدد به محیط سیر می‌نمایند به وجود می‌آید. این اندفاعات در بالای صدر بالاتر از حلیمه ثدیه، شانه‌ها، وجه، ساعد و بعضاً در ظهر دست‌ها به وجود می‌آید. بسیاری از جوانان تا حدود ۷ دانه از این اندفاعات را می‌داشته باشند. در سنین کهولت، حاملگی، اخذ استروجن و سیروز کبدی نیز دیده می‌شود.

کیسه صفرا (Gall bladder):

وضعیت دست معاینه‌کننده در جس کیسه صفرا عیناً مانند جس کبد می‌باشد. در حالت نارمل کیسه صفرا قابل جس نمی‌باشد. زمانی که قابل جس گردد، به شکل یک کتله مدور کرووی شکل وحشی‌تر از کنار عضله مستقیمه بطنی نزدیک غضروف ضلع نهم جس می‌شود. کیسه صفرا ممکن بسیار بزرگ شده و در حفره حرقفی راست قابل جس باشد و با کلیه مغالطه شود. کیسه صفرای قابل جس با تنفس حرکت می‌کند.

● کیسه صفرا در حالات ذیل قابل جس می‌باشد:

- کنسر رأس پانکریاس
- کیسه صفرا mucocoele
- کنسر کیسه صفرا (در این صورت کیسه صفرا سخت، سنگ‌مانند و غیر منظم می‌باشد)

- در تمام حالات فوق کیسه صفرا بزرگ و غیر حساس می‌باشد.

● علامه Murphy: هنگام جس کیسه صفرا از مریض بخواهید تا نفس عمیق

بگیرد. در عین زمان انگشتان خود را به طرف علوی در تحت اضلاع طرف راست داخل نمایید. کیسه صفرا با پایین آمدن دیافراگم به طرف سفلی حرکت می‌کند. در صورت التهاب کیسه صفرا (cholecystitis) مریض در جریان

شهيق دفعهتاً نفس خود را متوقف می‌نماید. توقف آئی تنفس نشان می‌دهد که این علامه مثبت است.

- **قانون Courvoisier:** در یرقان ناشی از انسداد سنگ صفراوی، کیسه صفرا به سبب التهاب مزمن آن که سبب فایبروز جدارهای آن می‌شود قابل جس نمی‌باشد.

ابهر، شرایین فخذی و عقدات لمفاوی بطنی:

- **ابهر:** در افراد لاغر به آسانی قابل جس است. برای جس آن نوک انگشتان هر دو دست از علوی به سفلی در ناحیه علوی‌تر و چپ‌تر از سره عمیقاً فشار داده می‌شود. بعد از احساس نبضان ابهر، انگشتان را به طرف راست بیجا نمایید تا عرض ابهر تخمین گردد. در صورت موجودیت انوریزم به آسانی قابل دریافت می‌باشد.

- **عقدات لمفاوی محیط ابهر:** در صورت تورم این عقدات، در نواحی سروی و epigastric نزدیک کنار چپ ابهر به شکل کتلات سخت و مدور جس می‌شوند. این‌ها ممکن جدا یا با هم چسپیده باشند. در بسیاری واقعات به جدار خلفی بطن تثبیت شده می‌باشند.

- **عقدات لمفاوی مغبنی:** این عقدات در تحت لگمنت مغبنی نزدیک عجان (perineum) جس می‌شوند.

- **شرایین فخذی:** برای جس اوعیه فخذی، نوک سه انگشت اول خود را در تحت لگمنت مغبنی در نقطه متوسط بین iliac spine قدامی علوی و ارتفاع عانه بگذارید.

- **عقدات لمفاوی مزنتریک:** این عقدات در ۲/۳ انسی خطی که iliac spine راست را به سره وصل می‌نماید قرار داشته و ۲-۳ سانتی‌متر به طرف چپ ادامه می‌یابد.

● **یادداشت:**

- در بطن Koch بطن به شکل خمیرمانند احساس می‌شود.

- در قبضیت‌های مزمن کتلات غایبی در یک قسمت از امعای بزرگ جس می‌شوند.

(۳) جس دو دستی (Bimanual palpation) – کلیه‌ها (Kidneys):

کلیه‌ها در ساحه قطنی موقعیت دارند.

- **کلیه راست:** قطب علوی آن در سویه فقره ۱۱ صدی و قطب سفلی آن یک انچ بالاتر از iliac crest در ناحیه ظهری قرار دارد.
- **کلیه چپ:** این کلیه نیم انچ بالاتر از کلیه راست موقعیت دارد.
- **فورمول ابعاد کلیه:** 12×4 است؛ یعنی ۱ انچ ضخامت، ۲ انچ عرض و ۴ انچ طول دارد.

● جس کلیه‌ها:

- مریض به وضعیت اضطجاع ظهری بدون گذاشتن بالشت زیر سر قرار گرفته و پاهایش باید به حالت قبض قرار بگیرند.
- برای جس هر کلیه باید معاینه‌کننده در طرف مربوطه ایستاد شود. یعنی برای جس کلیه چپ در طرف چپ و برای جس کلیه راست در طرف راست ایستاد شود. اول کلیه چپ و سپس کلیه راست جس گردد.
- برای کلیه چپ: دست چپ خود را در قدام در ناحیه قطنی گذاشته و دست راست تان را در خلف آن بگذارید.
- برای کلیه راست: دست راست خود را در قدام در ناحیه قطنی گذاشته و دست چپ خود را در خلف قرار دهید.
- با دستی که در خلف قرار دارد ناحیه را به طرف بالا تپله کنید و با دست دیگر جدار قدامی بطن را به خلف و داخل فشار دهید.
- مریض باید با گرفتن نفس‌های عمیق بطن خود را استرخا دهد.
- کلیه چپ در صورت عدم بزرگی قابل جس نمی‌باشد.
- کلیه راست در اشخاص لاغر قابل جس می‌باشد.
- کلیه‌ها در صورت بزرگ شدن به شکل تورم‌های مدور بین دست‌ها احساس می‌شوند. کلیه قابل جس به خلف تپله شده و بین هر دو دست

قرار می‌گیرد. این روش به نام میتود دو دستی (bimanual) یاد می‌شود. این میتود نشان می‌دهد که کتله قابل جس، کلیه است.

- نادراً کلیه‌ها در قطب سفلی با هم وصل بوده که در این صورت به نام کلیه‌های نعل اسپ مانند (horse shoe kidneys) یاد می‌شود.

تشخیص تفریقی کلیه و کیسه صفرای قابل جس:

کلیه شناور	کیسه صفرای متوسع
کلیه با زفیر ناپدید می‌شود که دوباره یافتن آن مشکل است.	کیسه صفرا را نیز می‌توان به شکل مؤقتی به خلف بیجا نمود اما دوباره به قدام حرکت می‌کند.
کلیه را می‌توان به طرف حوصله تیله نمود. حتی در اثنای زفیر عمیق نیز می‌توان آن را در آنجا نگهداشت.	به طرف سفلی تیله شده نمی‌تواند.
با دو دست قابل جس است.	با دو دست قابل جس نیست.

- **Murphy's renal punch:** مریض باید بالای بستر طوری نشسته باشد که ظهر وی به طرف داکتر باشد. در همین اثنا با انگشت شست در زاویه بین ستون فقرات و ضلع اخیر (زاویه کلیوی) ضربه وارد نمایید. احساس درد دلالت بر مثبت بودن معاینه می‌کند. مثبت بودن آن بیانگر آبسه اطراف کلیه (perinephric abscess)، hydronephrosis یا کدام مرض التهابی دیگر کلیوی است.

تشخیص تفریقی میان کلیه چپ و طحال:

طحال بزرگ شده	کلیه بزرگ شده
کنار تیز دارد	کنار مدور دارد
فرورفتگی موجود است	فرورفتگی موجود نیست
طحال به طرف سفلی و انسی بزرگ می‌شود	کلیه صرف به طرف سفلی بزرگ می‌شود
با دو دست قابل جس نیست	با دو دست قابل جس است
انگشتان بین کتله و کنار ضلعی داخل شده نمی‌تواند	انگشتان بین کتله و کنار اضلاع داخل شده می‌تواند
با قرع در قدام آن اصمیت (dullness) دریافت می‌شود	با قرع در ناحیه قدام کلیه ساحه resonant موجود می‌باشد

(۴) جس dipping:

از این میتود در حبن (ascites) استفاده می‌شود. در ascites اعضای بطنی به علت موجودیت مایع به آسانی قابل جس نمی‌باشد. با گذاشتن انگشتان و فشار دادن آن به سفلی (dipping)، مایع برطرف شده و نوک انگشتان با عضو بزرگ شده در تماس می‌آید.

سایر کتلات:

- در اشخاص لاغر کتلات غایبی در sigmoid colon احساس شده می‌تواند که ۱-۲ سانتی‌متر طول داشته و در حفره حرقی چپ موازی به لگمنت مغربی قرار می‌داشته باشد. این کتلات با تکرار عملیه جس ناپدید می‌شوند.
- کولون مستعرض ممکن در ناحیه epigastric قابل جس باشد، که سرحد علوی و سفلی آن واضح بوده و سطح قدامی آن محدب می‌باشد.
- **یادداشت:** cecum اغلباً به شکل یک کتله مدور و نرم با حدود واضح در حفره حرقی راست قابل جس می‌باشد.

مثانه (Urinary bladder):

مثانه زمانی قابل جس می‌گردد که کاملاً پر باشد.

● **میتود جس:** مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري (بدون گذاشتن بالش زیر سر) قرار گیرد. با دست راست ناحیه hypogastrium را جس نمایید. یک تورم لشم احساس خواهد شد. حالا با دست چپ سرحد علوی آن را تعیین نمایید. دست باید در hypogastrium طوری گذاشته شود که انگشت شست از سایر انگشتان جدا بوده و به طرف حوصله متوجه باشد. انگشتان باید به وضعیت نیمه عرضانی قرار داشته باشند. سپس کوشش نمایید تا کنار علوی آن را بین چهار انگشت اخیر و شست خود بگیرید. مانند یک رابر نرم احساس خواهد شد. سرحد سفلی آن تعیین شده نمی‌تواند.

● نزد خانم‌ها باید بین جنین و مثانه تشخیص تفریقی صورت گیرد. جنین قوام سخت داشته و متحرک می‌باشد.

فوهات فتقیه (Hernial orifices):

فوهات فتقیه مغبنی (inguinal) و فخذی (femoral) را جهت دریافت نبضان‌ها در اثنایی که مریض سرفه می‌کند جس نمایید.

اعضای تناسلی خارجی (External genitalia):

● مریضان مذکر:

● مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري بالای بستر طوری قرار گیرد که پاهایش کمی از هم دور باشند.

● ابتدا قضیب را از نظر اندازه مطالعه نمایید و ملاحظه کنید که آیا با سن مریض مطابقت دارد یا خیر. در hypogonadism ابتدائی و ثانوی قضیب مریض کوچک‌تر می‌باشد.

● فوهه احلیل را از نظر موقعیت آن مطالعه نمایید. Hypospadiasis (باز شدن فوهه احلیل در سطح سفلی قضیب) و epispadiasis (باز شدن فوهه احلیل در ظهر قضیب) دو انومالی ولادی معمول است.

● موجودیت قرحات و جروحات نیز ملاحظه شوند. در کنسر سفلیتیک ابتدائی یک قرحه بدون درد با قاعده و کنارهای سخت در تحت prepuce در میزابه coronal دیده می‌شود. قرحات خبیث در یک تعداد کمی از

- افراد مشاهده شده می‌تواند خصوصاً در نزد آنانی که در کارخانه‌هایی کار می‌کنند که از لباس‌های آلوده با تیل در آن استفاده می‌شود.
- قضیب را کمی فشار داده و ملاحظه کنید که آیا قیح از آن خارج می‌شود یا خیر.
 - سپس خصه‌ها را با ملایمت جس نمایید و تعداد خصه‌های نزول‌نشده یا cryptorchidism (تقریباً معمول است)، اندازه و حساسیت آن را ملاحظه نمایید.
 - اندازه scrotum ممکن به علت تجمع مایع (hydrocele) یا موجودیت کتله خبیث یا فتق بزرگ شده باشد.
 - Epididymis را از قطب علوی آن الی قسمت‌های خلفی آن در هر خصیه جس نمایید. به صورت یک کتله نرم و نودولیر با طول ۱-۲ سانتی‌متر جس می‌شود. در صورت التهاب (epididymitis) اندازه آن بزرگ می‌شود و با جس دردناک می‌باشد.
 - **مریضان مؤنث:** تفصیلات معاینه اعضای تناسلی مریضان مؤنث در فصل اخذ تاریخچه نسائی ارائه می‌شود.

قرع

با اجرای عملیه قرع امعا resonant و کبد dull است. در صورتی که گازها در امعا تجمع نماید با قرع tympanic می‌باشد.

قرع کبد:

کنارهای علوی و سفلی فص راست را می‌توان با قرع تعیین نمود. قرع را از مسافه بین الضلعی چهارم در خط متوسط ترقوی آغاز و تا زمانی به طرف سفلی ادامه می‌دهیم که ساحه وضاحت (resonant) به اصمیت (dullness) مبدل شود. در حالت نارمل سرحد علوی کبد بالاتر از مسافه بین الضلعی ۵ بلافاصله در تحت حلیمه ثدیه در مردها قرار دارد. ساحه اصمیت کبدی در خط متوسط ترقوی به صورت نارمل ۶-۱۲ سانتی‌متر است. ساحه اصمیت کبد در علوی در emphysema و pneumothorax کاهش می‌یابد.

در صورت موجودیت مایع در جوف پریتون آهنگ قرع stony dullness است. fluid thrill نیز موجود می‌باشد. اگر مقدار مایع کم باشد shifting dullness دریافت می‌شود.

اهتزاز مایع (Fluid thrill):

● میتود:

- مریض باید به شکل هموار بالای بستر قرار گرفته و پاهایش به حالت قبض باشند.
- معاینه‌کننده باید هر دو دست خود را به کار ببرد. طوری که کف یک دست خود را در flank دورتر قرار دهد و با انگشت دست دوم خود یک ضربه را بالای flank نزدیک وارد نماید.
- در صورت موجودیت مایع در جوف بطن اهتزاز مایع (fluid thrill) در کف دست معاینه‌کننده احساس می‌شود.
- چون این اهتزاز از طریق شحم نیز انتقال می‌شود بناءً برای تشخیص تفریقی یک شخص سوم باید کنار ulnar دست خود را به صورت عمودی بالای بطن مریض قرار دهد. در این حالت با وارد نمودن ضربه اهتزاز که در کف دست احساس می‌شود از مایع می‌باشد.

اصمیت تغییر کننده (Shifting dullness):

از این میتود زمانی استفاده می‌شود که مقدار مایع کم باشد و نتواند سبب ایجاد fluid thrill گردد.

● میتود:

- مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري با پاهای قبض قرار گیرد.
- قرع را از وسط بطن شروع نمایید و به طرف flank پیش بروید تا با قرع اصمیت دریافت گردد.
- ساحه را نشانی نموده و مریض را به یک طرف وضعیت دهید.

- بعد از ۱۰ ثانیه دوباره قرع را آغاز نمایید. در این صورت در ساحه موصوف بجای اصمیت (dullness)، وضاحت (resonance) دریافت می‌شود زیرا به علت تأثیر قوه جاذبه مایع به قسمت سفلی flank حرکت می‌کند.
- مثبت بودن این تست دلالت بر آزاد بودن مایع در جوف پریتون می‌نماید.
- اسباب حین (Ascites):
 - TB peritonitis
 - Malignant peritonitis
 - ترومبوز ورید کبدی (Budd-Chiari syndrome)
 - عدم کفایه احتقانی قلب (CHF)
 - Nephrotic syndrome
 - Hypoproteinemia
 - Chylous ascites
 - Meig's syndrome: در نزد خانم‌ها در این سندروم تومور مبیض، ascites و hydrothorax به صورت همزمان موجود می‌باشد.
- تشخیص تفریقی میان حین (Ascites) و سیست مبیضی (Ovarian cyst):

سیست مبیض	Ascites
bulging قدامی خلفی می‌باشد	bulging اکثراً در جوانب می‌باشد
اصمیت مرکزی است	اصمیت در فلانک‌ها می‌باشد
Shifting dullness موجود نیست	Shifting dullness موجود می‌باشد
سره به طرف بالا کش شده می‌باشد	سره متورم و برجسته می‌باشد
درز سره عمودی می‌باشد	درز سره عرضانی می‌باشد
اندازه محیط در سویه سره کمتر از قسمت پایانی می‌باشد	اندازه محیط بطن در سویه سره بزرگتر از محیط قسمت سفلی بطن می‌باشد

:Cystic thrill

جهت تشخیص تفریقی میان یک کتله جامد و یک سیست، از این تست استفاده می‌شود.

● **میتود:** سه انگشت شهادت، متوسط، حلقوی دست چپ خود را که از هم فاصله داشته باشند بالای ناحیه متورم بگذارید. انگشتان اشاره و حلقوی باید بالای جلد به صورت صمیمی قرار داشته باشند. سپس با انگشت متوسط دست راست (plexor) بالای انگشت متوسط دست چپ (pleximeter) ضربه وارد نمایید. در فاصله بین وارد کردن ضربات، انگشت متوسط باید در تماس جلد نباشد. در این صورت اگر کتله سیست باشد، دو انگشت دیگر (شهادت و حلقوی) اهتزازات مایع را احساس خواهند نمود.

قرع مثانه:

در این صورت قرع از epigastrium آغاز و به طرف hypogastrium ادامه می‌یابد. اگر مثانه متوسع باشد در hypogastrium اصمیت موجود می‌باشد. سرحد علوی مثانه در محلی است که در آن اصمیت آغاز می‌شود.

اصغا

دیافراگم ستیتوسکوپ را در طرف راست سره تا زمانی قرار دهید که آواز peristaltic را بشنوید. این آواز را به نام borborygmi نیز یاد می‌کنند. ستیتوسکوپ را از یک ناحیه به ناحیه دیگر حرکت دهید و نواحی مختلفه را اصغا نمایید. آوازهای نارمل معایی وصف غرغر (gurgle) را دارد. آوازهای معایی در انسداد امعا و اسهالات شدت کسب می‌کند. اگر آوازهای بطنی با وجود اجرای اصغا برای ۲-۳ دقیقه در چندین ساحه بطن اصغا شده نتوانست دلالت به paralytic ileus می‌نماید.

● **Bruit های وعایی:** عبارت از آوازهای سیستولیک اند که در انسداد اوعیه دموی بطن شنیده می‌شود. برای شنیدن این آوازه‌ها داکتر باید ستیتوسکوپ خود را به ملایمت بالای نواحی ذیل در بطن قرار دهد:

- در طرف چپ سره برای ابهر
- در epigastrium برای celiac trunk و اوعیه مزنتریک علوی و سفلی
- در فلانک‌ها برای شرابین کلیوی

- در حفرات حرقفی برای شراییین iliac
- **Venous hum**: این آوازا در ناحیه بین xiphisternum و سره زمانی شنیده می‌شوند که از سبب فرط فشار ورید باب، اوعیه جانبی به وجود آمده باشد.
- **آوازه‌های اصطکاکی (Friction sounds)**: این آوازا مشابه به آوازهایی است که در التهاب پلورا شنیده می‌شود. این آوازا در صورت التهاب نواحی محیط کبد و طحال در ساحات مربوطه اصغا می‌شوند.
- **Succussion splash**: این آوازا مشابه به تولید صداهایی است که از سبب تکان دادن یک بوتل که نصف آن توسط آب مملو شده باشد تولید می‌شود. این آوازا در حالت نارمل بعد از ۲-۳ ساعت از صرف غذا در معده شنیده شده می‌تواند. در تضیق پایلورس و توسع atonic معده (diabetic neuropathy) نیز شنیده شده می‌تواند. در انسداد امعا که لوپ‌های معایی به صورت قابل ملاحظه متوسع باشند نیز شنیده می‌شود.
- **میتود**: مریض باید به وضعیت ظهري قرار گرفته بعداً دیافراگم ستیتوسکوپ را بالای ناحیه epigastrium قرار دهید. سپس مریض را از یک پهلو به پهلو دیگر وضعیت داده و آوازه‌های ناشی از حرکت آب را اصغا نمایید.

معاینه مقعدی (Rectal examination)

تفتیش ناحیه مقعدی در موجودیت نور کافی اجراء می‌شود. مریض باید به وضعیت semipronation قرار بگیرد. در این حالت ناحیه مقعدی و معصره خارجی را تفتیش نمایید.

سپس انگشت دست پوشیده با دستکش (انگشت باید چرب شده باشد) را در کانال مقعدی قرار دهید. کوشش نمایید که اگر کدام تومور، قرحات، برآمدگی ترومبوتیک یا کدام جسم اجنبی موجود باشد، آن را دریافت نمایید.

بزرگ شدن پروستات را با رسانیدن انگشت به سرحد علوی آن ملاحظه نمایید. بعد از کشیدن انگشت، آن را برای دیدن خون، قیج یا مخاط مشاهده نمایید.

پاراسنتیز حبن (Tapping of ascites)

- **استطبابات:** استطبابات پاراسنتیز در یک واقعه حین قرار ذیل است:
 - موجودیت اختلالات قلبی یا تنفسی
 - موجودیت ناراحتی واضح بطنی
 - Oliguria به سبب اختلال جریان خون کلیوی
 - بی‌اشتهایی و سوء هضم
 - به تعقیب hematemesis در سیروز کبدی جهت کاهش احتقان
 - تعند در مقابل تداوی طبی
 - خطر اختناق فتق‌های ثانوی
- **وضعیت مریض:** مریض باید بالای یک چوکی یا در کنار بستر قرار گیرد.
- **محل اجرا:** ناحیه مناسب برای اجرای paracentesis خط متوسط بین سره و ارتفاع عانه است. در فلانک‌ها نیز صورت گرفته می‌تواند.
- **تکنیک:** مریض باید قبل از اجرای پروسیجر مثانه خود را خالی نموده باشد، زیرا امکان تمزق مثانه زیاد است. مریض باید وضعیت داده شود. یک شکم‌بند در تحت کنارهای ضلعی تثبیت شود تا از تغییر آنی وضعیت مریض در اثنای اجرای پروسیجر جلوگیری صورت گیرد. ناحیه را تعقیم نمایید. بعد از تطبیق انسنتیزی ۲٪ procaine یک سوزن کلان را که با سرنج وصل باشد داخل نموده و مقدار کم مایع را به هدف تشخیص خارج نمایید. جهت تداوم تخلیه یک تیوب رابری و polythene collecting bag را با سوزن مذکور وصل نمایید. یک سمپل این مایع نیز باید به لابراتوار جهت اجرای معاینه کیمیاوی، معاینات مایکروسکوپی و در صورت ضرورت برای کلچر و تست حساسیت فرستاده شود. بعد از کشیدن سوزن ناحیه را با گاز مغطوس شده در لیدوکائین بپوشانید.

ارتباط بین علایم فیزیکی و امراض معدی معایی

امراض کبدی

علایم مرض مزمن کبدی:

- وجه: یرقان

- دست‌ها: asterixis, palmar erythema, leukonychia
 - صدر: spider naevi, از بین رفتن موهای بدن, Gynecomastia
 - بطن: hepatomegaly, splenomegaly, ascites, فرط فشار ورید باب
 - اتروفای خصیه
 - پاها: اذیما، اتروفای عضلات
 - تب: در نزد ثلث مریضان دچار سیروز پیشرفته واقع می‌شود.
- موجودیت سه یا اضافه‌تر از سه علامه ذیل دلالت بر سیروز کبدی می‌نماید:
- spider nevi, palmar erythema, splenomegaly, ascites, collateral venous ها در بطن.

فرط فشار ورید باب (Portal hypertension):

- علایم: Splenomegaly, collateral veins, caput medusae, hum, varice
- variceهای مری و معدی، ascites, hematemesis, hemorrhoids.

Hepatic encephalopathy:

- علایم: تغییرات هوش، hepatic flap, fetor hepaticus
- تغییرات هوش آن دارای مراحل ذیل است:
- مرحله ۱: تخرشیت (irritability)
- مرحله ۲: خواب‌آلودگی (drowsiness)
- مرحله ۳: stupor
- مرحله ۴: coma

امراض التهابی امعا (Inflammatory bowel disease)

امراض التهابی امعا شامل دو مرض مزمن التهابی طرق معدی معایی با سبب نامعلوم است که عبارت اند از Crohn's disease و ulcerative colitis.

Ulcerative colitis:

در این حالت امعای بزرگ مأوف می‌باشد. بعضاً ایلئوم به صورت ثانوی مأوف می‌شود (back wash ileitis). مرض تقریباً همیشه rectum را مأوف می‌نماید و ممکن به سایر قسمت‌های کولون نیز انتشار کند.

● **علائم بطنی:** اگر تنها proctitis موجود باشد معمولاً یافته‌های خارج بطنی دریافت نمی‌شود. اتفاقاً ترکیدهای مقعدی ممکن موجود باشد. اگر colitis غیر اختلاطی باشد معاینه بطنی ممکن نارمل بوده یا ممکن tenderness (حساسیت در جس) یا guarding (تقلص عضلات در اثنای جس) در ناحیه کولون مأوفه موجود باشد.

● **علائم اختلاطات:**

● **علائم موضعی:** Toxic dilatation (Megacolon) از جمله خطرناک‌ترین اختلاطات بوده که در آن توسع بطن، تقلصیت عمومی، شخی (peritonism)، کاهش شدت آوازهای معایی، افزایش خونریزی مقعدی، تب و تکی‌کاردیا دریافت می‌شود. کنسر رکتوم که با جس دریافت شده می‌تواند.

● **علائم سیستمیک:** کم‌خونی، Arthritis، تظاهرات جلدی (Erythema nodosum): نودول‌های دردناک سرخ‌رنگ که معمولاً در ساق پاها تشکل می‌کنند). قرحات فمی معمول بوده که از سبب تقرحات aphthous می‌باشد. clubbing و episcleritis ممکن موجود باشد.

:Crohn

در این مرض تمام قسمت‌های طرق معدی معایی از دهن الی مقعد مصاب شده می‌تواند. معمولاً ایلئوم نهایی با یا بدون کولون مأوف می‌شود.

● **علائم بطنی:** اگر مرض صرف ایلئوم نهایی را مصاب کرده باشد معمولاً دریافت‌های غیر نارمل موجود نمی‌باشد. ممکن حساسیت در حفره حرقفی راست موجود باشد. مأوفیت مقعدی در ۷۵٪ مریضان مصاب به امراض امعای کوچک و در ۹۵٪ مریضان مصاب امراض امعای بزرگ دیده می‌شود. علائم عمده آن عبارت اند از ترکیدهای، فستول‌ها و آبسه‌ها. در صورت

مصابت کولون‌ها علایم مشابه به ulcerative colitis به وجود می‌آیند. Clubbing ممکن موجود باشد.

ارتباط بین علایم فیزیکی و امراض غده‌های اندوکرین

اعراض و علایم مریضان مصاب اختلالات غده‌های اندوکرین بر اساس مصابت غده‌های مختلفه متفاوت است.

Thyrototoxicosis:

مریضان مصاب thyrototoxicosis در معاینه کلینیکی تظاهرات ذیل را نشان می‌دهند:

- تظاهرات عمومی: مریض نگاه‌های مضطرب دارد. ضیاع وزن موجود می‌باشد. چشمان مریض برآمده می‌باشد.
- معاینه دست‌ها: از مریض بخواهید تا دست‌های خود را بسط نماید. دست‌های وی را به طرف خود کش نمایید. رعشه خفیف را ممکن احساس نمایید. جهت دیدن واضح این رعشه یک پارچه کاغذ را روی دست وی قرار دهید. کف دست‌های مریض سرخ می‌باشد (palmar erythema). با جس، دست‌های وی گرم و مرطوب می‌باشد.
- معاینه سیستم قلبی و عایی: نبض سریع بوده و ممکن وصف کولپس‌کننده را داشته باشد. با اصغا Tachycardia، Systolic flow murmur دریافت می‌شود. در بعضی واقعات ممکن عدم کفایه احتقانی قلب نیز به وجود آید.
- معاینه چشم‌ها: چشم‌های مریض برجسته و برآمده می‌باشند (exophthalmos). Lid lag: در این معاینه مریض باید انگشت دست داکتر را که به طرف سفلی حرکت می‌کند بدون تدور رأس تعقیب نماید. چون با تدور کره چشم به طرف پایین پلک علوی به عقب می‌ماند بناءً سفیدی sclera در علوی قرنیه نمایان می‌شود. در حالت نارمل چنین حالت دریافت نمی‌شود. مریض در تمرکز چشم‌ها روی یک نقطه نیز دچار مشکلات می‌باشد. نگاه‌های مریض خیره می‌باشد.

- معاینه غده Thyroid: تفصیل آن در فصل معاینه عمومی فیزیکی ارائه شده است.

Hypothyroidism:

در این آفت کمبود هورمون‌های غده تایراید موجود می‌باشد. هایپوتایریدیزم ممکن به سبب امراض خود غده باشد یا این که به صورت ثانوی از سبب امراض غده نخامیه متأثر شده باشد.

● **تظاهرات کلینیکی:**

- مریض از نظر فیزیکی و روانی سستی و تنبلی نشان می‌دهد. جلد مریض سرد، خشک و ضخیم می‌باشد. مریض ممکن کم‌خون باشد. نبض وی بطی و کم حجم می‌باشد.
- پاهای وی non-pitting edema را نشان می‌دهد. در وجه مریض اذیمای اطراف چشم دریافت می‌شود. ۱/۳ خارجی ابروها از بین رفته می‌باشد.
- در نزد بعضی مریضان xanthelasma (به سبب hypercholesterolemia) بالای پلک علوی نزدیک کناره‌های داخلی چشم‌ها موجود می‌باشد. موها نازک، خشک و پراکنده بوده و آواز خشن می‌باشد. مریض به آهستگی سخن می‌گوید.
- مریض از حساسیت در مقابل سردی شکایت دارد. بعضاً قبضیت دارد. جاغور ممکن موجود باشد.
- در تعداد کمی از واقعات ناشنوایی عصبی دریافت می‌شود (Pendred's syndrome).
- عکسه‌های عضلی مؤخر می‌باشد. به طور خاص در ankle jerk دیده می‌شود. معاینه مریض را بالای چوکی با پاهای آویزان بنشانید. با چکش رابری ضربه‌ای به وتر Achilles وارد نمایید. تقلص عضله نارمل بوده اما استرخای آن مؤخر می‌باشد.

Acromegaly و Gigantism:

این حالت به علت فرط ترشح هورمون رشد (growth hormone) توسط غده نخامیه به سبب eosinophilic adenoma به وجود می‌آید. اگر این حالت قبل از سن بلوغ (قبل از بسته شدن اپیفیز عظام) به وجود آید سبب gigantism و اگر بعد از سن بلوغ به وجود آید سبب acromegaly می‌شود. در gigantism افزایش رشد عظام، عضلات و انساج نرم دیده می‌شود در حالی که در acromegaly صرف انساج نرم و استخوان‌های هموار رشد فوق‌العاده را نشان می‌دهد.

● **تظاهرات کلینیکی:** وجه مریض بزرگ، الاشه پهن و ناحیه supraorbital برجسته می‌باشد. زبان بزرگ و دندان‌ها از هم دور می‌باشند. دست‌ها پهن، بیل‌مانند، گرم و مرطوب می‌باشند. غده تیروئید به شکل عمومی بزرگ می‌باشد. Cardiomegaly و عدم کفایه احتقانی قلب ممکن موجود باشد. مریض ممکن kyphosis داشته باشد. معاینه معدی معایی بزرگ شدن عمومی احشای بطنی (hepatomegaly، splenomegaly، کلیه‌های بزرگ) را نشان می‌دهد. تشوش دید، Glycosuria و فرط فشار خون موجود می‌باشد.

سندروم Cushing:

این سندروم از سبب فرط ترشح هورمون‌های glucocorticoid به وجود می‌آید.

● **تظاهرات کلینیکی:**

- وجه مهتابی، کوهان گاو وحشی (buffalo hump) در گردن، چاقی مرکزی، اطراف کوچک
- وجه سرخ‌رنگ
- Acne، hirsutism معمولاً موجود می‌باشد
- خطوط گلابی‌رنگ بالای بطن دیده می‌شود
- خونریزی‌های جلدی
- Glycosuria و فرط فشار خون

مرض Addison:

این مرض به سبب کاهش وظایف قشر ادرینل به وجود می‌آید. در این صورت تفریط ترشح هورمون‌های glucocorticoid و mineralocorticoid موجود می‌باشد. در کشور ما عمده‌ترین علت آن توپرکلوز و امراض autoimmune است.

● تظاهرات کلینیکی:

- اندام نحیف و لاغر
- صباغات سیاه در غشای مخاطی رخسارها، ناحیه تناسلی، خطوط کف دست‌ها، سکارها و نواحی قابضه اطراف
- نقاط بدون صباغ (vitiligo) و خال‌ها ممکن موجود باشند
- تفریط فشار خون (hypotension)
- تفریط فشار وضعیتی (postural hypotension)
- Hypoglycemia
- سویه cortisol پایین می‌باشد





فصل هشتم

معاینه سیستم حرکی

تاریخچه اعراض عضلی اسکلتی در نزد اکثر مریضان موجود می باشد. اکثراً یکی از اینها را می داشته باشند:

- درد و یا شخی در عضلات، مفاصل یا ناحیه ظهري.
- تورم مفاصل.
- مشکلات در حرکت (قدم زدن، ایستادن، نشستن، تدور رأس و غیره).

اخذ تاریخچه

- در زمان اخذ تاریخچه امراض عضلی اسکلتی، موارد ذیل باید ملاحظه شوند:
- **تاریخچه اعراض:** باید از زمان آغاز آن پرسیده شود.
 - **اوصاف درد:** در صورت موجودیت درد لازم است تا در مورد شدت، وصف (گنگ، تیز، سوزنده) و انتشار آن پرسیده شود:
 - درد گردن (Cervical Spondylitis) به شانه ها و بازوها انتشار می نماید.

- درد جذور عصبی صدری به صدر انتشار می‌نماید و با درد قلبی مغالطه می‌شود.
- درد قطنی به سرین‌ها و خلف پاها انتشار می‌نماید که به نام Sciatica یاد می‌گردد.

تظاهرات دیگری که در تشخیص کمک‌کننده هستند:

- **شخی صبحگاهی:** اگر شخی مفاصل در زمان صبح اضافه‌تر از ۳۰ دقیقه دوام نماید، دلالت به Rheumatoid Arthritis می‌نماید.
- **تعداد مفاصل مأوفه:** التهاب فقط یک مفصل دلالت به Infective Arthritis می‌کند.

● طرح مصابیت مفاصل:

- مصابیت متناظر مفاصل یک علامه Rheumatoid Arthritis و SLE است.
- التهاب حاد مفصل Metatarsophalangeal اول، نشان‌دهنده نقرس (Gout) است.
- درد و شخی کمر بند شانه و حوصله در Rheumatic Polymyalgia موجود می‌باشد.

● عود حملات درد:

- درد دوره‌ای مفاصل در روماتیزم عودکننده (Palindromic Rheumatism) دیده می‌شود.
- درد زودگذر یا مهاجرتی مفاصل (یعنی زمانی که در یک مفصل علائم بهبودی تظاهر نماید، مفصل دیگر مصاب می‌شود) در Rheumatic Fever و Gonococcal Arthritis دیده می‌شود. در Gonococcal Arthritis التهاب احلیل (Urethritis) یعنی افرازا قیح از احلیل موجود می‌باشد، در حالی که در Rheumatic Fever قلب مصاب می‌شود.

● تظاهرات مترافقه دیگر:

- التهاب مفصلی (Arthritis) مترافق با قرحات بولی-تناسلی یک علامه سندروم Behçet محسوب می‌شود.
- Arthritis با Conjunctivitis و Urethritis علامه سندروم Reiter است.
- Arthritis مترافق با موجودیت Tophi در صیوان گوش نشان‌دهنده نقرس (Gout) است.
- Arthritis مترافق با نودول‌ها بالای مفاصل Interphalangeal انگشتان (Heberden's nodes) در Osteoarthritis دیده می‌شود.
- **تاریخچه ترضیض:** تاریخچه ترضیض مفصل باید پرسیده شود.

معاینه مفاصل

معاینه کلینیکی مفاصل مشتمل است بر:

- تفتیش (Inspection)
- جس (Palpation)
- حرکات (Movements)

◆ ۱. تفتیش (Inspection)

مفصل را به دقت نگریسته و نکات ذیل را ملاحظه نمایید:

- **منظره مفصل:** متورم است یا نارمل؟ اگر تورم موجود باشد توسعه آن را ببینید؛ یعنی آیا محدود به مفصل است یا این که به سایر بخش‌های عضویت توسعه یافته است.
- **جلد بالای مفصل:** آیا سرخ است؟ اگر سرخی داشته باشد به التهاب حاد فکر می‌شود. آیا قرحات (Ulcers)، جیوب (Sinuses) یا لکه‌های نزفی (Hemorrhagic spots) موجود هستند؟
- **شکل مفصل:** آیا مفصل نارمل است یا این که کدام سوء شکل دارد؟ سوء اشکال مفاصل (انحراف زندی، دوک‌مانند شدن انگشتان) در Rheumatoid Arthritis دیده می‌شود.

- **طرح مصابیت مفصل:** ببینید که آیا توزیع آن متناظر است (Rheumatoid Arthritis) یا غیر متناظر (Psoriatic Arthropathy یا Gout).
- **موجودیت نودول‌ها یا قرحات:** اگر Osteoarthritis موجود باشد، یک تعداد نودول‌ها که به نام Heberden's nodes یاد می‌شوند در مفاصل Interphalangeal دیده می‌شوند. اندفاعات نکروتیک Punched out در SLE و Polyarteritis Nodosa دیده می‌شوند.

◆ ۲. جس (Palpation)

در زمان جس باید موارد ذیل ملاحظه شوند:

- **حساسیت در جس (Tenderness):** ناحیه مورد نظر را با ملایمت جس نمایید. حساسیت توسط درجه‌بندی ذیل ارزیابی می‌شود:
 - درجه ۱: مریض از درد شکایت می‌کند.
 - درجه ۲: مریض اخم‌هایش را در هم می‌کشد.
 - درجه ۳: بر علاوه در هم کشیدن اخم‌ها، ساحت ماؤوفه را نیز به عقب می‌کشد.
 - درجه ۴: مریض به معاینه‌کننده اجازه نمی‌دهد که مفصل را جس نماید. (اگر حساسیت تأیید گردید، لازم است تا دانسته شود که آیا منشأ آن مفصل است یا ساختمان‌های مجاور مانند Tendon، عضلات و غیره).
- **کریپیتوس (Crepitus):** عبارت از یک احساس صدای غرغر یا صدای شبیه به هم ساییدن دندان‌ها است که توسط دست در زمان حرکت دادن مفصل جس می‌گردد. در Osteoarthritis و Cartilaginous fragments موجود می‌باشد. Crepitus می‌تواند از کمپلکس عضلی-وتری در Rheumatoid Arthritis و Systemic Sclerosis نیز منشأ بگیرد.
- **اذیما و تورم:** اذیمای مفصل یا ناحیه اطراف آن باید دیده شود. موجودیت اذیما به التهاب مفصل دلالت می‌کند. اذیما ممکن است در مفصل یا در انساج مجاور آن در امراضی چون عدم کفایه احتقانی قلب و سندروم نفروتیک نیز

موجود باشد، اما Tenderness در این حالت به مشاهده نمی‌رسد. تورم پوش Tendon ممکن در نواحی که تحت فشار قرار دارند (مثلاً در وجه Olecranon آرنج) دیده شود.

● **عقدات تحت جلدی:** عقده‌های تحت جلدی در امراض ذیل قابل جس می‌شوند:

● Osteoarthritis

● Gout

● Rheumatoid Arthritis

● Hypercholesterolemia

● **بزرگ شدن عقدات لمفاوی (Lymphadenopathy):** ممکن است در بعضی از امراض مفصلی (Septic Arthritis) موجود باشد.

◆ ۳. حرکت مفصل (Movements)

مفصل به جهت‌های مختلف حرکت داده شود. مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از:

● قبض (Flexion)

● بسط (Extension)

● تدور (Rotation)

حرکت مفصل می‌تواند توسط داکتر (حرکت منفعل / Passive) یا توسط خود مریض (حرکت فعال / Active) اجرا شود. محدوده حرکت دیده شود؛ مثلاً حرکت در Ankylosing Spondylitis محدود می‌شود، اما در سندروم Ehlers-Danlos از حد معمول بیشتر می‌شود.

سیستم ارزیابی سیستماتیک GALS

تمام معاینات فوق باید به صورت منظم و سیستماتیک اجراء شوند. اختصار GALS را به یاد داشته باشید:

- **Gait – G** (رفتار / طرز راه رفتن): قدم زدن و دور خوردن مریض را به طرف خود مشاهده کنید. نوع رفتار نیز دیده شود (تفصیل در فصل معاینه سیستم عصبی مرکزی).
- **Arms – A** (دست‌ها): حرکات متعدد دست باید معاینه شوند؛ شامل قبض (Flexion)، بسط (Extension)، مشت کردن دست، بسط انگشتان و لمس کردن نوک انگشتان توسط انگشت شست.
- **Legs – L** (پاها): پاها باید به عین طریقه‌ای که دست‌ها معاینه شدند ارزیابی شوند. تفتیش انگشتان پا برای موجودیت قرحه یا Callosities مهم است.
- **Spine – S** (ستون فقرات): ستون فقرات مریض را زمانی که در وضعیت ایستاده قرار داشته باشد، از عقب مشاهده کنید. هرگونه سوء شکل ستون فقرات (مثلاً Scoliosis، Lordosis) باید ملاحظه گردد.

نکات تکمیلی معاینه:

- از مریض بخواهید تا خود را خم نموده و انگشتان پای خود را لمس نماید.
- از مریض بخواهید تا گردن خود را به سمت‌های مختلف تدور دهد.
- مریض باید شانه خود را به جوانب مختلف حرکت دهد.
- تمام فقره‌های ستون فقرات باید برای موجودیت حساسیت (Tenderness) جس شوند.





فصل نهم

معاینه سیستم عصبی

اناتومی سیستم عصبی

♦ **اناتومی سیستم حرکتی (Motor system)**

سیستم حرکتی متشکل از نیورون‌های ذیل است:

- نیورون‌های حرکتی علوی
- نیورون‌های حرکتی سفلی

الف) نیورون‌های حرکتی علوی (Upper motor neurons)

این نیورون‌ها در precentral gyrus و جدار قدامی میزاب مرکزی (central sulcus) قرار دارند. اکسون‌ها از قشر دماغ منشأ گرفته و از طریق corona radiata، کپسول داخلی (internal capsule)، دماغ متوسط (midbrain)، حذب (pons)، بصله (medulla) عبور نموده به نخاع شوکی (spinal cord) می‌رسند. اکسون‌های نیورون‌های حرکتی علوی در اطراف نیورون‌های حرکتی سفلی در قرن

قدامی ختم می‌شوند. اکسون‌های نیورون‌های حرکتی در زمان عبور از کپسول داخلی genu و دو ثلث قدامی اندام خلفی را اشغال می‌نمایند. در دماغ متوسط این الیاف $\frac{3}{5}$ متوسط سویق‌ها (peduncles) را اشغال می‌نماید.

در حذب این الیاف توسط هسته‌های حذب و الیاف حذبی جدا می‌شوند. در بصله این الیاف در قدام متراکم شده و یک ساختمان برجسته را به نام هرم (pyramid) می‌سازند.

۹۰٪ این الیاف در قسمت سفلی بصله تصالب می‌نمایند در حالی که ۱۰٪ متباقی آن‌ها تصالب نمی‌نمایند، بلکه در عین جهت در ستون‌های قدامی (anterior columns) به طرف سفلی رفته و بالاخره در سویه‌های سفلی commissure قدامی تصالب می‌نمایند.

بعضی از الیافی که تصالب نمی‌نمایند در طرق هرمی (pyramidal tract) عین طرف نزول می‌نمایند.

تمام الیاف هرمی به سویه‌های مختلف در ماده خاکستری ساق دماغ یا نخاع شوکی ختم می‌شوند. هسته‌های حرکتی اعصاب قحفی به استثنای دو عصب ذیل توسط طرق هرمی هر دو طرف تعصیب می‌شوند:

● عصب ۱۲ (عصب hypoglossal).

● یک قسمت از عصب ۷ که نصف سفلی وجه را تعصیب می‌نماید.

عملکرد pyramidal tract: این الیاف با آغاز فعالیت‌های حرکتی ارادی و مهارتی ارتباط دارند.

ب) نیورون‌های حرکتی سفلی (Lower motor neurons)

این‌ها شامل حجرات قرن قدامی و نیورون‌های مشابه آن در ساق دماغ هستند. این الیاف از طریق جذور عصبی نخاعی قدامی و اعصاب محیطی به عضلات می‌رسند. نیورون‌های حرکتی سفلی در هسته‌های حرکتی اعصاب قحفی نیز موقعیت دارند.

♦ آناتومی سیستم حسی (Sensory System)

سیستم حسی شامل نیورون‌های اولی، دومی و سومی است. جسم حجروی (cyton) نیورون‌های اولی در عقده‌های جذری (root ganglia) اعصاب نخاعی و قحفی قرار دارد. جسم‌های نیورون دومی در هسته gracilis و هسته cuneatus در بصله قرار دارد. جسم‌های نیورون‌های سومی در thalamus قرار دارند.

۱. **نیورون‌های اولی:** اکسون محیطی نیورون‌های اولی دو نوع حسیت را انتقال می‌دهد:

- حسیت از جلد یعنی حسیت تماس، درجه حرارت و درد.
- حسیت عمیق که شامل حسیت موقعیت، حسیت حرکات و اهتزازات، حسیت اندازه و شکل یک شی و حسیت‌های حرکات عضلی و مفصلی می‌باشد.

اکسون مرکزی نیورون اولی در محیط حجرات که در قاعده قرن خاکستری (grey horn) نخاع شوکی قرار دارند ختم می‌شوند. الیاف که حسیت‌های عمیق را انتقال می‌دهند در ستون سفید خلفی صعود نموده و سرانجام در هسته‌های gracilis و cuneatus ختم می‌شوند. از این هسته‌ها اکسون دومی جدید منشأ گرفته و به طرف مقابل عبور می‌نماید.

۲. **نیورون‌های دومی:** اکسون‌های نیورون‌های دومی سمت مقابل را عبور نموده و دو طرق را می‌سازند:

- **Anterior (ventral) spinothalamic tract:** تماس درشت و سگنل‌های فشار را انتقال می‌دهد.

- **Lateral spinothalamic tract:** سگنل‌های حرکت چرخشی و حرارت را انتقال می‌نماید. الیاف spinothalamic به طرف علوی از طریق نخاع شوکی و ساق دماغ عبور نموده و سرانجام در تلاموس ختم می‌شوند.

۳. **نیورون‌های سومی:** این نیورون‌ها در تلاموس موقعیت دارند. از اینجا، الیاف منشأ گرفته و به قشر حسی از طریق کپسول داخلی که در فص‌های جداری در خلف فیشره‌های (sensory tracts) Rolando قرار دارد می‌رسد. طرق حسی که

از طریق ساق دماغ عبور می‌نمایند الیاف را از هسته حسی عصب trigeminal حاصل می‌نمایند.

♦ آناتومی نخاع شوکی (Spinal cord)

نخاع شوکی از foramen magnum آغاز شده و تا کنار علوی فقره دوم قطنی ادامه دارد. غشاهای نخاع شوکی در فقره دوم عجزی ختم می‌شوند. چون نخاع شوکی کوتاه‌تر است، بناءً سگمنت‌های نخاعی با فقرات مطابقت ندارند. از لحاظ فزیولوژی، نخاع شوکی متشکل از سگمنت‌های ذیل است:

- سگمنت رقبی (cervical) = ۸
- سگمنت صدری (thoracic) = ۱۲
- سگمنت قطنی (lumbar) = ۵
- سگمنت عجزی (sacral) = ۵
- سگمنت عصعصی (coccygeal) = ۱

ارتباط بین فقرات و سگمنت‌های نخاعی: برای دانستن این که کدام سگمنت نخاع در مقابل کدام فقره قرار دارد، از قواعد ذیل استفاده می‌شود:

- برای ساحت رقبی عدد ۱ را با شماره فقره جمع نمایید. مثلاً فقره ۵ رقبی در مقابل سگمنت ۶ رقبی قرار دارد.
- برای فقره علوی صدری عدد ۲ را با شماره فقره جمع نمایید، در نتیجه شماره سگمنت نخاعی که در مقابل آن قرار دارد به دست خواهد آمد. مثلاً فقره ۳ صدری با سگمنت نخاعی ۵ مطابقت دارد.
- برای فقرات ۷ الی ۹ صدری عدد ۳ را با شماره فقره صدری جمع نمایید. مثلاً فقره ۸ صدری با سگمنت ۱۱ نخاعی مطابقت دارد.
- فقره ۱۰ صدری در مقابل سگمنت‌های ۱ و ۲ قطنی قرار دارد.
- فقره ۱۱ صدری در مقابل سگمنت‌های ۳ و ۴ قطنی قرار دارد.
- فقره ۱۲ صدری در مقابل سگمنت ۵ قطنی و سگمنت علوی sacral قرار دارد.
- فقره ۱ قطنی در مقابل سگمنت‌های سفلی عجزی و عصعصی قرار دارد.

♦ شرایین دماغ

ارواء دماغ توسط دو شریان فقری (vertebral) و دو شریان internal carotid می‌شود. شاخه‌های این شرایین با هم مرتبط شده و حلقه «Willis» را تشکیل می‌دهند.

هر دو شرایین فقری در سویه کنار سفلی حذب با هم یکجا شده و شریان قاعدوی (basilar artery) را می‌سازند. این شریان بعد از سیر کوتاه در وجه قدامی حذب به دو شریان دماغی خلفی (posterior cerebral artery) تقسیم می‌شود. از طرف دیگر هر شریان internal carotid یک شریان دماغی قدامی (anterior cerebral artery) را می‌دهد. هر دو شریان دماغی طرف راست و چپ باهم توسط یک شریان اتصال‌دهنده قدامی (anterior communicating) وصل می‌شوند.

شرایین دماغی خلفی شرایین اتصال‌دهنده خلفی (posterior communicating) را که با شرایین internal carotid طرف مربوطه تفمّم می‌نمایند می‌سازند. بدین وسیله یک حلقه شرایین تکمیل می‌شود. شریان دماغی متوسط (middle cerebral artery) یک شعبه شریان internal carotid است که بالنوبه به شعبات قشری (cortical) و مرکزی تشعب می‌نماید.

- شریان دماغی متوسط لوب frontal (شامل قشر حرکی) و قسمت‌های علوی فص‌های parietal و temporal را ارواء می‌نماید.
- شریان دماغی قدامی سطح داخلی نیم‌کره‌های دماغی، superior frontal gyrus، کپسول داخلی (قسمت قدامی) و عقدات قاعدوی (basal ganglia) را ارواء می‌نماید.
- شریان دماغی خلفی لوب occipital، قسمت‌های سفلی لوب temporal و کپسول داخلی (اندام خلفی) را ارواء می‌نماید.

اعراض امراض سیستم عصبی مرکزی

معمولترین اعراض آن قرار ذیل اند:

- سردردی
- اختلاج
- سنکوپ
- سرچرخي
- ضعف قسمت‌های مختلف بدن
- ضیاع شعور
- کړختی و سوزش

در مورد تمام اعراض فوق باید از مریض سوال شود تا تشخیص درست وضع گردد.

معاینه فیزیکی سیستم عصبی مرکزی

معاینه سیستم عصبی – ترتیب

۱. سویه شعور (GCS)	۲. تکلم
۳. وظایف قشری	۴. اعصاب قحفی
۵. اعصاب محیطی	۶. سیستم حسی
۷. سیستم حرکی: تون، قدرت، عکسات	۸. مخیخ
۹. تغییرات تروفیک	۱۰. سیستم اوتونوم
۱۱. علایم تخریش سحایا	

نقشه ذهنی ۹.۱: ترتیب معاینه سیستم عصبی

معاینه مفصل سیستم عصبی مرکزی شامل بخش‌های ذیل است:

۱. سویه شعور و سلوک مریض
۲. تکلم مریض
۳. معاینه وظایف قشری (وظایف شناختی)
۴. معاینه اعصاب قحفی
۵. معاینه اعصاب محیطی
۶. معاینه سیستم حسی
۷. معاینه سیستم حرکی
۸. معاینه مخیخ
۹. اختلالات تروفیک
۱۰. معاینات سیستم عصبی اوتونوم
۱۱. تست‌ها برای تخریش سحایا

♦ (۱) سویه شعور (Level of consciousness)

ببینید که آیا مریض شعور دارد یا خیر. فقدان شعور (unconsciousness) چهار درجه دارد:

- **درجه ۱:** مریض در مقابل دستوره‌های صوتی عکس‌العمل نشان می‌دهد. مریض را با اسم وی صدا کنید او چشمان خود را باز خواهد کرد. یا از وی بخواهید که یک اندام خود را حرکت دهد، آن را حرکت خواهد داد.
- **درجه ۲:** مریض در مقابل تنبیهات دردناک خفیف عکس‌العمل شدید نشان می‌دهد. توسط یک سنجاق یک اندام مریض را فشار دهید در این صورت مریض اندام خود را دور خواهد نمود.
- **درجه ۳:** مریض در مقابل تنبیه دردناک شدید عکس‌العمل خفیف نشان خواهد داد. کنار supraorbital مریض را به سختی فشار دهید در این صورت مریض رأس خود را به صورت خفیف حرکت خواهد داد تا از فشار اعظمی جلوگیری کند.

- **درجه ۴:** مریض در مقابل هر نوع تنبیه عکس‌العمل نمی‌نماید. این حالت فقدان شعور است.

Glasgow Coma Scale

عکس‌العمل حرکتی (M)	عکس‌العمل شفاهی (V)	باز کردن چشم (E)
۶ اطاعت از دستور	۵ آگاه (oriented)	۴ خودبخودی
۵ تعیین محل درد	۴ گیج (confused)	۳ به صدا
۴ دور کردن از درد	۳ کلمات نامناسب	۲ به درد
۳ قبض غیر نارمل	۲ آوازهای بی‌مفهوم	۱ هیچ
۲ بسط غیر نارمل	۱ هیچ	
۱ هیچ		
مجموع: ۳ تا ۱۵؛ ۸ یا کمتر = کوماً شدید (نیاز به حفاظت راه هوایی)		

جدول ۹.۲: Glasgow Coma Scale

توسط آن سویه شعور مریض تعیین می‌گردد. در این مقیاس سه کتگوری که عبارت از باز کردن چشم‌ها، عکس‌العمل شفاهی و عکس‌العمل حرکتی است، ارزیابی می‌شود و نمره‌ها نظر به اجراات مریض داده می‌شوند. عکس‌العمل حرکتی با فشار دردناک ناحیه supraorbital ارزیابی می‌شود. مجموع نمرات بعداً محاسبه می‌شود.

بهترین نمره ۱۵ است.

عکس العمل حرکتی	عکس العمل شفاهی (تکلم)	باز کردن چشم‌ها
اطاعت از دستورها - ۶	آگاهی از زمان و مکان - ۵	خود بخودی - ۴
تعیین موقعیت درد - ۵	گیج - ۴	در مقابل تکلم - ۳
دور کردن عضو از منبه دردناک - ۴	کلمات غیر مناسب - ۳	در مقابل درد - ۲
قبض غیر نارمل اطراف - ۳	آوازه‌های بی مفهوم - ۲	هیچ کدام - ۱
بسط غیر نارمل اطراف - ۲	هیچ کدام - ۱	
هیچ کدام - ۱		

سلوک مریض

مریض ممکن اعمال ابلهانه را انجام دهد یا ممکن به محیط خود بی‌علاقه باشد. مریض ممکن از لحاظ احساسات آشفته باشد یعنی ممکن به یک موضوع ساده گریه کند یا بخندد، ممکن ترسو یا خشن باشد، ممکن با داکتر نزاع و مشاجره نماید. مریض ممکن به این عقیده باشد که کسی او را می‌کشد (هذیان یا delusion) یا ممکن خود را یک پادشاه فکر کند. مریض ممکن از شنیدن، دیدن یا بوییدن برداشت نادرست کند (برسام یا hallucination).

از مریض اسم‌اش را و نیز زمان روز و ماه را بپرسید تا حافظه وی ارزیابی شود. سوالات بسیار ساده را مانند ۲ جمع ۲ چند می‌شود؟ بپرسید تا ذکاوت وی ارزیابی گردد. در مورد زمان خواب وی بپرسید آیا خواب وی کم است یا زیاد یا نارمل؟

♦ (۲) تکلم مریض

مرکز تکلم در اشخاص راست‌دست در نیم‌کره چپ قرار دارد. نیم‌کره که در آن مرکز تکلم قرار داشته باشد به نام نیم‌کره غالب (dominant) یاد می‌شود.

دو مرکز برای تکلم وجود دارد:

- **ناحیه Broca:** در ناحیه جبهی سفلی قرار دارد.
- **ناحیه Wernicke:** در فص صدغی خلفی و در ناحیه جداری مجاور قرار دارد. بعضی از صدمات موضعی، ترضیضات و امراض خاص دماغی سبب ضیاع تکلم یا تغییرات در تکلم شده می‌تواند. اختلالات تکلم به سه نوع اند:

- **Dysarthria:** در این صورت مشکلات در تلفظ کلمات موجود می‌باشد؛ یعنی در زبان، لب‌ها و حنک نرم نقیصه موجود می‌باشد. ممکن از سبب امراض التهابی موضعی یا از سبب فلج بصلی (bulbar palsy)، فلج بصلی کاذب (pseudobulbar palsy) یا فلج دماغی (cerebral palsy) باشد.

- **Dysphasia (aphasia):** در این صورت مریض از سبب تخریب مرکز تکلم قادر به تکلم نمی‌باشد.

- **Dysphonia (aphonia):** در این صورت مریض به سبب فلج حبل صوتی یا اختلالات حنجری قادر به تولید آواز نمی‌باشد.

تکلم ممکن یکی از انواع ذیل را داشته باشد:

- **لکنت زبان (Stammering):** نشان‌دهنده کدام آفت ارگانیک نیست.
- **تکلم کودکانه (Lalling):** مریض مانند یک طفل صحبت می‌کند. از سبب ناشنوایی ولادی و تأخر ذهنی به وجود می‌آید.
- **تکلم بریده بریده (Scanning):** در امراض مخیخی دیده می‌شود. مریض با بطائت صحبت می‌کند و از یک کلمه سه چهار کلمات می‌سازد. مثلاً مریض قسطنطنیه را به شکل قس-طن-طن-نی-یه تلفظ می‌کند.
- **Slurring:** در pseudobulbar palsy دیده می‌شود. در این صورت تلفظ بعضی کلمات غیر نارمل می‌باشد؛ مثلاً مریض عکس را عکش تلفظ می‌کند.

- **تکلم یکنواخت (monotonous speech):** در Parkinsonism دیده می‌شود. مریض در اثنای تکلم شدت آواز خود را تغییر نمی‌دهد و با یک تون صحبت می‌کند.

◆ (۳) معاینه وظایف قشری (شناختی)

تظاهرات آفت فص جداری (Parietal)

- **ناتوانی در تمایز تماسی:** در حالی که چشمان مریض بسته است، دست‌ها، انگشتان و قسمت‌های مختلفه وجه وی را با پنبه تنبیه نمایید. از مریض بپرسید که آیا شما به وی تماس نموده‌اید یا خیر؟ در عین حال او باید راست و چپ خود را از هم تفريق نماید. مریض باید آن انگشتی را که لمس شده نام بگیرد. این توانایی در آفات قسمت‌های خلفی سفلی قشر جداری از بین می‌رود.
- **از بین رفتن درک سه بعدی (asterognosis):** عبارت از ناتوانی تشخیص یک شی توسط اندازه، شکل و وزن آن توسط لمس نمودن آن است. در واقعیتی دیده می‌شود که angular gyrus فص جداری مأؤوف باشد. در این صورت یک سکه، کلید یا قلم را بالای کف دست مریض قرار دهید. از وی بخواهید تا با چشمان بسته اسم آن را بگیرد.
- **بی‌توجهی حسی:** در حالی که هر دو چشم مریض بسته است، هر دو دست وی را همزمان لمس نمایید. از وی بپرسید که با کدام دست وی تماس گرفته‌اید. مریض از تماس با طرف مأؤوف انکار می‌نماید. این حالت در آفات قشر حسی جداری دیده می‌شود.
- **عکسه دور کردن (avoiding reflex):** در صورت خراشیدن کنار ulnar کف دست مریض، دست خود را دور خواهد نمود.
- **ناتوانی در اجرای عمل آشنا (apraxia):** یک حالت کلینیکی است که در آن مریض نمی‌تواند یک عمل معین را با وجودی که مفهوم آن را فهمیده انجام دهد. به گونه مثال از مریض بخواهید تا یک چوبک گوگرد را روشن نماید.

او ممکن در باز کردن قطی گوگرد یا در خارج کردن چوبک گوگرد یا در روشن کردن آن مشکل داشته باشد.

● **Drift:** از مریض بخواهید که دستان خود را بطرف خارج بگیرد و کف دست‌های خود را به طرف علوی متوجه سازد در حالی که چشمان وی بسته باشد. سپس کنار ulnar دست وی را کمی بیجا نمایید. در این صورت یک drift وحشی در بازو دیده خواهد شد.

● مریض نمی‌تواند حساب نماید (dyscalculia)، بخواند (dyslexia) یا بنویسد (dysgraphia).

تظاهرات آفت فص جبهی (Frontal)

● **عکسه جلو آمدن لب‌ها (Pout reflex):** مالش زنج مریض باعث خواهد شد تا وی لب‌های خود را به شکل غنچه بیرون بیاورد.

● **عکسه راحی ذقنی (Palmomental reflex):** با خراشیدن کف دست مریض تقلص عکسوی یک‌طرفه عضله ذقنی زنج به وجود خواهد آمد.

● **عکس چنگ زدن (Grasp reflex):** یک تنبیه متحرک را با دست تان در بین شست و انگشت شهادت مریض وارد نمایید. مریض دفعتاً دست شما را در دست خود خواهد گرفت و مشت وی به آسانی باز نخواهد شد.

● **عکسه اخمسی (Plantar reflex):** کف پای مریض را با یک شی کند تنبیه نمایید. انگشتان پا به حالت قبض می‌آیند. این عکس همتای grasp reflex در طرف سفلی است.

● **عکسه پوزه زدن/وجهی (Facial / snout reflex):** لب‌های مریض را با انگشت خود به یک طرف با ملایمت کش نمایید. سپس توسط انگشت دیگر ضربه‌ای به این انگشت وارد کنید، لب‌های مریض پیش خواهند آمد. این حالت در آفت دو طرفه نیورون حرکی علوی دیده می‌شود.

● **عکسه زدن ساحه بین دو ابرو (Glabellar tap reflex):** با وارد کردن ضربات مکرر در ساحه بین ابروها (ناحیه glabella)، یک شخص نارمل چشمان خود را ۲-۳ بار باهم خواهد زد و بعداً این چشمک زدن نخواهد بود. در senile

dementia, parkinsonism یا تخریب وسیع فص جبهی، چشمک زدن با ضربات مکرر ادامه خواهد یافت.

یادداشت: تمام عکسات به نام عکسات آزاد شده (released reflexes) نیز یاد می‌شوند. این‌ها در زمان طفولیت به صورت نارمل موجود بوده اما بعداً ناپدید می‌شوند. در صورت آفات دماغی در کاهلان دوباره ظاهر می‌شوند.

تظاهرات صدمات فص قفوی (Occipital)

- **ناشناختی دیداری (Visual agnosia):** در این صورت به رغم این که دید مریض سالم است قادر به شناخت اشیا نخواهد بود.
- **بزرگ بینی یا خوردبینی (Macro or micropsia):** مریض اشیا را بزرگتر یا کوچک‌تر می‌بیند.
- **برسام دیداری (visual hallucination):** در این صورت مریض اشیا را به صورت غیر حقیقی آن می‌بیند یعنی وی اشیا را مغشوش می‌بیند یا این که اشیایی را می‌بیند که اصلاً موجود نمی‌باشند.

♦ (۴) معاینه اعصاب قحفی

اعصاب قحفی (cranial nerves) به سه گروه تقسیم می‌شوند:

- **اعصاب حسی:** شامل ۳ عصب است: اول، دوم و هشتم.
- **اعصاب حرکی:** شامل ۵ عصب است: چهارم، ششم، هفتم، یازدهم و دوازدهم.
- **اعصاب مختلط:** شامل ۴ عصب است: سوم، پنجم، نهم و دهم.

منشأ اعصاب قحفی:

چهار عصب اخیر (۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲) از بصله منشأ می‌گیرند. چهار عصب متوسط (۵، ۶، ۷ و ۸) از حذب منشأ می‌گیرند. اعصاب سوم و چهارم از دماغ متوسط و اعصاب اول و دوم خارج از ساق دماغ منشأ می‌گیرند.

۱. معاینه عصب بویایی (Olfactory nerve)

عصب olfactory با حس بویایی سروکار دارد.

- **معاینه:** سوراخ‌های بینی را به صورت جداگانه معاینه نمایید. قبل از انجام معاینه خود را متیقن سازید که سوراخ‌های بینی باز هستند. یک سوراخ بینی را مسدود نموده و بعضی از مواد کیمیای بودار مثلاً روغن گل میخک یا روغن نعناع یا موادی که مریض با آن آشنایی داشته باشد مانند میوه‌ها و صابون را به بینی مریض نزدیک نمایید. از وی بخواهید تا با چشمان بسته آن را بو نماید. ضیاع حس بو به نام anosmia و انحراف بو به نام parosmia یاد می‌شود.

اسباب anosmia:

- ترضیضات بسته رأس.
- meningioma فص جبهی.

اسباب parosmia:

- اکثراً سایکولوژیک می‌باشد.
- ممکن بعد از بهبودی قسمی عصب بویایی که قبلاً مورد ترضیض قرار گرفته واقع گردد.

برسام بو: در این صورت مریض شکایت می‌کند که بوهای مختلف را در محیط خود احساس می‌کند.

۲. معاینه عصب بینایی (Optic nerve)

عصب بینایی مسؤولیت دید را بر عهده دارد. این عصب برای موارد ذیل معاینه می‌شود:

- **تیزی دید (visual acuity):** عبارت از تیز حسی است که توسط آن جزئیات و طرح اشیاء درک می‌شود.
- **دید نزدیک:** در این صورت از مریض خواسته می‌شود تا کتاب را به فاصله ۱۵ انچ مطالعه نماید.
- **دید دور:** توسط چارت Snellen معاینه می‌شود. توسط آن دقت دید مطالعه می‌شود. دید نارمل ۶/۶ یا ۲۰/۲۰ است.

● **ساحه دید (visual field):** با نگاه کردن مستقیم در حالی که کره‌های چشم تثبیت شده باشند ساحه از جهان بیرونی که توسط یک چشم دیده شده بتواند به نام «ساحه دید» یاد می‌شود.

● **معاینه میتود مواجهه یا confrontational:** در این میتود داکتر ساحه دید خود را با ساحه دید مریض مقایسه می‌نماید. داکتر باید در مقابل مریض به فاصله ۱/۵ متر بنشیند. چشمان داکتر و مریض باید در عین سوپه قرار داشته باشند. در صورت معاینه نمودن چشم راست مریض، باید چشم چپ خود را با گذاشتن دست چپ خود بسته نماید و داکتر باید چشم راست خود را توسط گذاشتن دست راست بسته نماید. هر دو باید چشمان یکدیگر را به دقت ببینند. سپس دست چپ خود را در نصف فاصله بین خود و مریض به اندازه فاصله یک دست قرار دهید. انگشت خود را به طرف مرکز، در جریان آن از مریض بپرسید که آیا آن را دیده می‌تواند یا خیر، تا زمانی حرکت دهید که خود آن را دیده بتوانید. در صورت نارمل بودن ساحه دید هر دو مریض و داکتر به صورت همزمان انگشت را مشاهده خواهند نمود. اگر مریض انگشت را دیده نتواند در آن صورت دست تان را تا زمانی به چشمان مریض نزدیک نمایید که آن را دیده بتواند. به این طریقه ساحه دید را در تمام جهت‌ها به طرف بالا، پایین، راست و چپ معاینه نمایید. در این معاینه حدود ساحه دید تعیین شده می‌تواند. این تست با استفاده از دو اندیکاتور (چپ و راست) به صورت همزمان در هر دو چشم نیز معاینه شده می‌تواند. این تست به نام confrontation test یاد می‌شود.

● ساحه دید را توسط perimetry نیز می‌توان تعیین نمود.

● **معاینه توسط سنجاق با رأس سرخ (red hat pin test):** در این معاینه به عوض انگشت از یک سنجاق با رأس سرخ‌رنگ به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر یا پنسل با رأس سرخ استفاده می‌شود. حساسیت این تست بیشتر است به ویژه در معاینه ساحه مرکزی دید.

نقیصه‌های ساحه دید:

- **انقباض متحدالشکل ساحه دید** در اتروفی عصب بینایی دیده می‌شود. حالت پیشرفته آن به نام دید توبولر (tubular vision) یاد می‌شود.
- **scotoma**: نقیصه دید مرکزی macula. این حالت از سبب امراض به وجود می‌آید.

- **hemianopia**: به معنی ضیاع دید در نصف ساحه دید است؛ hemianopia به دو نوع است:

- **homonymous hemianopia**: در این حالت نصف‌های مشابه هر دو ساحه دید ماؤوف می‌باشد.

- **heteronymous hemianopia**: در این حالت نصف‌های متقابل هر دو ساحه دید ماؤوف می‌باشد. این حالت توسط تومور جسم غده نخامیه به وجود می‌آید.

- **دید رنگ (Color vision)**: مریض را برای شناخت رنگ‌های متعدد سرخ، آبی و سبز معاینه کنید. برای این منظور از چارت Ishihara و Holmgren's wool استفاده می‌شود.

- **معاینه fundus**: معاینه fundus توسط fundoscopy صورت می‌گیرد. Fundus در دیابت، فرط فشار خون، atherosclerosis و فرط فشار داخل قحف منظره وصفی می‌داشته باشد.

۳. معاینه اعصاب سوم، چهارم و ششم

تمام این اعصاب عضلات چشم را تعصیب می‌نمایند. عصب سوم (oculomotor) تمام عضلات چشم را به استثنای عضله منحره (oblique) علوی و مستقیمه (rectus) وحشی تعصیب می‌نماید. عکسات نوری و تطابق نیز توسط آن کنترل می‌شود.

عضله منحره علوی توسط عصب چهارم (trochlear) و عضله مستقیمه وحشی توسط عصب ششم (abducent) تعصیب می‌شود.

معاینه: انگشت شهادت تان را توسعه داده و آن را به فاصله یک متر در مقابل چشم مورد نظر قرار دهید. آن را به جهت‌های مختلفه به طرف انسی، وحشی، علوی، سفلی به صورت حرف (H) و به طرف مایل حرکت دهید؛ و از مریض بخواهید که بدون تدور رأس آن را دنبال نماید.

چشم‌ها برای حرکات رو به بالا و پایین نیز معاینه می‌شوند. در تقرب و تبعد مکمل از مریض بخواهید تا انگشت شما را به دقت ببیند و اگر دید دوگانه (double vision) موجود باشد آن را گزارش دهد. سمت دید دوگانه را یادداشت کنید. در حالت نارمل به سبب هماهنگی وظایف اعصاب سوم، چهارم و ششم، حرکات کره‌های چشم به طرف جوانب به صورت همزمان صورت می‌گیرد. این حالت به نام حرکات زوجی (conjugate) چشم‌ها یاد می‌گردد.

در اثنای معاینه حرکات چشم‌ها اگر nystagmus موجود باشد آن را ملاحظه نمایید. سمت که در آن nystagmus قابل ملاحظه وجود دارد یادداشت گردد. برای معاینه تقارب (convergence) چشم‌ها، از مریض بخواهید تا در زمانی که انگشت تان را به طرف بینی وی نزدیک می‌کنید آن را به دقت ببیند.

اعراض و علائم آفات اعصاب سوم، چهارم و ششم قرار ذیل اند:

- حرکات کره‌های چشم در سمت‌های معین محدود خواهند بود.
- مریض ممکن از diplopia (دو بینی) در اثنای که تلاش می‌ورزد تا عضلات فلج شده چشم‌ها را به کار ببرد، شکایت داشته باشد.
- قیچی (squint) موجود خواهد بود.
- حدقه سمت فلج شده متوسع و ثابت خواهد بود؛ یعنی اگر عصب سوم فلج باشد حدقه در مقابل نور عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.

عصب سوم:

اگر عصب سوم به صورت مکمل فلج شده باشد کره‌های چشم به طرف وحشی و سفلی انحراف خواهند نمود؛ سایر یافته‌های آن عبارت اند از:

- سقوط پلک علوی (ptosis)

- ضیاع تطابق
- ضیاع عکسه روشنی
- حدقه متوسع

در صورت که آفت قسمی موجود باشد یک یا دو یافته فوق موجود می‌باشد نه تمام آن‌ها.

Ptois: عبارت از سقوط پلک علوی است. برای معاینه آن لازم است تا عملکرد عضله occipitofrontal برطرف شود. برای این منظور دست خود را بالای پیشانی مریض گذاشته و به طرف سفلی آن را فشار دهید. از مریض بخواهید که به بالا نگاه کند. پلک علوی به بالا حرکت نخواهد نمود. Ptois در سندروم Horner نیز موجود می‌باشد.

معاینه برای تطابق: عیار شدن دستگاه بینایی برای دید اشیای نزدیک به نام تطابق (accommodation) یاد می‌شود. برای معاینه آن از مریض بخواهید که به ساحه دورتر نگاه کند بعداً به انگشتی که به طرف چشمان وی نزدیک می‌شود ببیند. در صورتی که تطابق موجود باشد کره‌های چشم تقارب می‌نمایند، حدقات تقبض می‌کنند و عدسیه ضخیم‌تر می‌شود (واکنش سه‌گانه).

مسیر عصب: عصب بینایی (optic nerve) ← lateral ← optic tract
 optic radiation ← geniculate body ← ساحه دید قشر دماغ ← ساحه دید در فص جبھی (از طریق کپسول داخلی) ← هسته عصب سوم طرف مقابل (Edinger-Westphal nucleus) ← ciliary ganglion ← معصره حدقه.

معاینه عکسه روشنی: اگر نور بالای شبکیه بتابد حدقات تقبض می‌نمایند. این به نام عکسه روشنی (light reflex) یاد می‌شود. برای معاینه آن از مریض بخواهید تا به یک شی نگاه کند بعداً روشنی را از یک طرف بالای چشم وی وارد نمایید و مشاهده کنید که آیا حدقه تقبض می‌نماید یا خیر. تقبض حدقه چشم مقابل به نام عکسه همخوانی (consensual reflex) یاد می‌گردد.

مسیر عصب: سیاله‌های دید در cone ها و rod ها ایجاد می‌شود ← شبکه را عبور نموده و به عصب بینایی می‌رسد ← ← optic tract ← optic chiasma ← pretectal area ← قسمت قدامی هسته Edinger-Westphal (هسته عصب سوم قحفی) ← ciliary ganglion ← اعصاب ciliary ← معصره حدقه. **معاینه حدقه (pupil):** در هنگام معاینه حدقه نکات ذیل را ملاحظه نمایید:

۱. **موقعیت:** در حالت نارمل حدقه در مرکز قرار دارد. آفات دماغ متوسط منجر به حدقه ectopic می‌شود.

۲. **نظم:** در حالت نارمل حدقه کاملاً منظم می‌باشد. در حالات ذیل غیر منظم می‌شود:

- در نزد اشخاص نارمل
- coloboma
- neurosyphilis

۳. **تساوی:** در حالت نارمل حدقات هر دو چشم با هم مساوی می‌باشند. در حالات ذیل نابرابری حدقه‌ها (anisocoria) مشاهده می‌شود:

- encephalitis
- خونریزی داخل قحف
- فلج عصب سوم

۴. **توسع:** حدقات متوسع در حالات ذیل مشاهده می‌شوند:

- اتروپین با atropine
- فلج عصب سوم
- انستیزی عمیق
- صرع
- اتروپی عصب بینایی
- تنبیه اعصاب سمپاتیک (مثلاً در ضلع رقیبی یا تومور منصفی)
- در حالات هیجانی

- حذقه خانمها نسبت به مردها بزرگتر می باشد.
- ۵. **تقبض:** تقبض حذقات در حالات ذیل مشاهده می شود:

- تسمم با opium
- خونریزی حذبه
- سندروم Horner
- Pancoast tumor
- iritis
- syringomyelia

- ۶. **حذقه ثابت:** در حالات ذیل مشاهده می شود:

- تسمم با اتروپین
- glaucoma

انواع حذقه ها:

- **حذقه Argyll Robertson:** در این نوع حذقه، عکسه تطابق موجود بوده اما عکسه روشنی موجود نمی باشد. در حالات ذیل دیده می شود:

- G.P.I
- Tabes dorsalis
- Encephalitis
- تومور بطین سوم

- **حذقه Holms-Adie (myotonic pupil):** در این صورت حذقه طویل تر از حالت نارمل می باشد. این نوع حذقه در مقابل ادویه فوراً جواب می دهد، اما عکسه روشنی معدوم می شود. تطابق بسیار بطی می باشد. این نوع حذقه در حالات ذیل دیده می شود:

- در نزد خانمهای جوان
- حالات که منجر به اختلال عکسه وتری می شود.

- **حذقه (Mecewen) (myotonic pupil):** این نوع حذقه در تسمم با الکل دیده می‌شود. در این حالت حذقات بسیار کوچک می‌شوند. اما اگر مریض تکان داده شود حذقات متوسع می‌شوند، در حالی که با استراحت مریض دوباره تقبض می‌نماید.
- **حذقه Hutchinson:** در ترضیضات رأس که منجر به خونریزی داخل قحف شود، حذقه سمت ماؤوفه اولاً تقبض می‌نماید و سپس توسع می‌نماید و حذقه دوم به تعقیب آن چنین تغییرات را نشان می‌دهد.

عصب چهارم:

در صورت فلج عصب چهارم مریض قادر به نگریستن به طرف انسی و سفلی نمی‌باشد. برای معاینه آن از مریض بخواهید تا به انگشت تان که در مسافه دو فت از وی قرار دارد نگاه کند. برای معاینه چشم راست انگشت را به طرف سفلی و چپ حرکت دهید و برای ارزیابی چشم چپ آن را به طرف سفلی و راست حرکت دهید.

عصب ششم:

در صورت فلج عصب ششم مریض قادر به تبعد چشمان خود نمی‌باشد؛ یعنی نمی‌تواند چشمان خود را به طرف وحشی حرکت دهد. برای معاینه آن از مریض بخواهید تا به انگشت شما که به طرف راست و چپ حرکت می‌نماید نگاه نماید و آن را تعقیب نماید.

آفات اعصاب سوم، چهارم و ششم می‌تواند infranuclear یا supranuclear باشد. تمام تست‌های فوق برای آفات infranuclear هستند. در آفات supranuclear اعصاب سوم، چهارم و ششم، علاوه بر فلج عضلات مربوطه حرکات زوجی (conjugate) چشم‌ها نیز از بین می‌رود.

۴. معاینه عصب Trigeminal

یک عصب مختلط بوده و از دو بخش حسی و حرکی ساخته شده است. بخش حسی وجه، منضمه و قرنیه را تعصیب می‌نماید.

تست‌ها برای ارزیابی حسیت وجه:

- وجه مریض را با سنجاق تنبیه نمایید. میتود معاینه حسیت تماس در بخش معاینه سیستم حسی تشریح شده است.
- معاینه باید به صورت دو طرفه در نقاط مشابه وجه صورت گرفته و باهم مقایسه شود.
- ضیاع حسیت جلد در طرف ماؤوفه وجه دیده خواهد شد. در صورت آفات هسته عصب پنجم ضیاع حسیت به صورت پیازمانند به مشاهده می‌رسد؛ یعنی ساحه ماؤوفه از انف به صورت دو طرفه و متحدالمرکز منتشر می‌باشد. **عکسه قرنی (Corneal reflex):** از مریض بخواهید تا به سقف اطاق خیره شود. یک کمی هوا را به داخل چشم مریض بدمید. بسته شدن چشم‌ها نشان‌دهنده سالم بودن عصب پنجم می‌باشد. هر دو چشم به صورت همزمان به سبب موجودیت interneuron بسته خواهند شد.

یادداشت: استفاده از پنبه خطرناک است فلذا پنبه را به بسیار دقت در کنار قرنیه تماس دهید.

بخش حرکی: بخش حرکی عصب پنجم عضلات جویدن شامل عضلات temporal، pterygoid و masseters را تعصیب می‌نماید.

تست‌ها:

- از مریض بخواهید که دندان‌های خود را با هم فشار دهد. عضلات masseter و temporal را جس نمایید. این عضلات سخت شده و برآمدگی پیدا می‌کنند که در هر دو طرف مشابه می‌باشد. در صورت فلج عصب پنجم عضلات سمت فلج‌شده سخت و برجسته نخواهند شد.
- از مریض بخواهید که الاشه خود را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهد.
- از مریض بخواهید که دهن خود را باز نماید. الاشه مریض به طرف ناحیه فلج شده انحراف خواهد نمود، زیرا توسط عضلات pterygoid طرف سالم به طرف مقابل تیله می‌شود.

- **تکان فک (Jaw jerk):** انگشت شهادت را در وسط زنج مریض قرار دهید. از مریض بخواهید تا دهن خود را کمی باز نماید. توسط انگشت دست دیگر یا توسط چکش وتری، ضربه‌ای به انگشت اول وارد نمایید. عضلات تقلص نموده و دهن بسته می‌شود. تشدید jaw jerk نشان می‌دهد که آفت بالاتر از حده قرار دارد.

۵. معاینه عصب وجهی (Facial nerve)

اناتومی: هسته عصب هفتم در قسمت سفلی حده قرار دارد. الیاف که از آن منشأ می‌گیرند به طرف خلف و انسی می‌روند. این الیاف کنار هسته عصب ششم را عبور نموده، سپس حده را ترک نموده و با عصب هشتم ادامه می‌یابد. در بین اعصاب هفتم و هشتم یک ناحیه بین‌البینی قرار دارد که به نام chorda tympani یاد می‌شود، به این ناحیه الیاف ذایقی از دو ثلث قدامی زبان می‌رسد.

عصب هفتم جوف خلفی قحف را عبور نموده و به قسمت petrous عظم temporal از طریق مجرای سمع داخلی داخل می‌شود. در این جا عصب در کانال وجهی سیر نموده و قحف را از طریق سوراخ styloid ترک می‌نماید و در داخل غده parotid سیر می‌نماید. بعد از بیرون شدن از قحف به شعبات وجهی تقسیم شده و عضلات وجه را تعصیب می‌نماید. این عصب قبل از عبور از styloid foramen یک شعبه می‌دهد که غده اشکی و عضله stapedius را تعصیب می‌نماید.

فلج idiopathic عصب هفتم به نام فلج بل (Bell's palsy) یاد می‌شود. بعضاً هسته geniculate در herpes zoster ماؤوف می‌شود. در این صورت همراه با نوع نیورون حرکی سفلی فلج وجهی (facial palsy) اندفاعات وعایی در داخل گوش دیده می‌شوند. این حالت به نام سندروم Ramsay Hunt یاد می‌شود.

تست‌ها:

- **در هم کشیدن اخم‌ها:** از مریض بخواهید تا بدون تدور رأس به بالا نگاه کند. خطوط افقی را در دو نصف پیشانی با هم مقایسه نمایید. در صورت که یک نصف پیشانی هموار باشد به فلج نیورون حرکی سفلی عصب هفتم عین طرف دلالت می‌کند.

- **بسته نمودن چشم‌ها:** از مریض بخواهید تا چشم‌های خود را با شدت بسته نماید. در این صورت کوشش نمایید تا چشم‌های مریض را باز نمایید. چشم طرف فلج شده یا درست بسته نمی‌شود یا این که با فشار اندک باز می‌شود. اگر چشم طرف ماؤوف باز باقی بماند در آن صورت حرکات کره چشم را به طرف علوی و انسی در زمانی که مریض کوشش می‌نماید تا چشم‌های خود را بسته نماید، بخواهید دید (پدیده Bell).
- **تفتیش التوای انفی شفوی:** هر دو التوا را با هم مقایسه نمایید. التوای سمت فلج شده یا موجود نمی‌باشد یا این که کمتر متباز می‌باشد.
- از مریض بخواهید تا دندان‌های خود را نشان دهد. زاویه دهن در طرف فلج شده عقب نخواهد رفت بناء دهن به طرف سمت سالم انحراف خواهد نمود.
- **تست اشپلاق زدن:** از مریض بخواهید تا اشپلاق نماید. مریض قادر به اشپلاق زدن نخواهد بود.
- **تست پرباد کردن:** از مریض بخواهید تا دهن خود را از هوا پر نماید. با انگشت خود بالای رخسارهای مریض ضربه‌ای وارد نمایید. هوا از طرف فلج شده به بسیار آسانی خارج خواهد شد.
- **تجمع غذا:** مریض ممکن از تجمع غذا در طرف فلج شده شاکمی باشد. مریض از خارج شدن لعاب دهن و آب در اثنای نوشیدن از سمت فلج شده شاکمی می‌باشد.

انواع آفات عصب هفتم:

- **آفات supranuclear:** در این صورت صرف قسمت‌های پایین وجه فلج می‌شوند. اتروفی عضلات وجهی مشاهده نمی‌شود. ذایقه نیز نارمل می‌باشد.
- **آفات nuclear و infranuclear:** در این صورت قسمت‌های علوی و سفلی وجه مساویانه ماؤوف می‌شود یعنی تمام نصف وجه فلج می‌شود. دلیل آن این است که نصف علوی وجه از هر دو نیم‌کره دماغی عصب می‌گیرد. بنابراین آفت supranuclear صرف سیاله‌های عصبی قسمت‌های سفلی وجه را قطع می‌کند. از طرف دیگر آفات infranuclear سبب قطع کامل تعصیب نصف

مربوطه وجه می‌شود فلهاذا قسمت‌های علوی و سفلی به صورت مساویانه
ماؤوف می‌شوند. ممکن اتروفی عضلات وجهی موجود باشد.

تست ذایقه دو ثلث قدامی زبان: برای این منظور از چهار محلول استفاده می‌شود:

- glucose
- citric acid
- saline
- quinine

از مریض بخواهید تا زبان خود را بیرون نماید. زبان را توسط پارچه گاز معقم پاک
نمایید. سپس یک قطره محلول گلوکوز را گرفته بالای زبان قرار دهید و از مریض
بخواهید تا به کاغذ که در آن نام‌های ذایقه‌های مختلف نوشته شده اشاره نماید.
از تماس زبان با کام باید جلوگیری شود زیرا حسیت ذایقه کام توسط عصب نهم
تأمین می‌شود.

بعد از معاینه یک ذایقه، زبان را خشک نموده و برای ذایقه دیگر آن را معاینه
نمایید.

معاینه ذایقه به ترتیب ذیل انجام می‌شود:

۱. شیرینی (گلوکوز): ذایقه شیرین در نوک زبان بهتر حس می‌شود.
۲. نمکی (سالین): ذایقه نمکی در تمام زبان حس می‌شود.
۳. ترش/شور (ستریک اسید): ذایقه ترش/شور در قاعده و کنارهای زبان حس
می‌شود.
۴. تلخ و تند (کینین): ذایقه تلخ و تند در پشت زبان احساس می‌شود.

ذایقه را با استفاده از تنبیه برقی با ولتاژ پایین نیز می‌توان معاینه کرد.

تست Schirmer: از این تست برای معاینه وظایف ترش‌چی حرکی غده اشکی
استفاده می‌شود. در این صورت یک پارچه کاغذ خاص در تحت پلک سفلی داخل
کرده می‌شود و بعد از ۵ دقیقه کشیده می‌شود. حداقل ۱۰ ملی‌متر این کاغذ باید
با اشک مرطوب شود.

۶. معاینه عصب هشتم (Vestibulocochlear nerve)

این عصب دو بخش دارد:

● **Cochlear**: برای شنیدن

● **Vestibular**: برای موازنه

معاینه بخش Cochlear عصب هشتم: این عصب مربوط حس شنوایی است. برای معاینه آن تست‌های ذیل انجام می‌شوند:

● **تست ساعت دستی (Watch test):** از مریض بخواهید تا چشمان خود را بسته نماید. یک ساعت دستی را از فاصله دورتر به گوش مریض تا زمانی نزدیک نمایید که وی آواز تکتک ساعت را بشنود. فاصله را اندازه‌گیری نمایید. سپس ساعت را تا زمانی به گوش مریض نزدیک نمایید که آواز آن را بشنود، این فاصله را نیز اندازه نمایید. اوسط این مسافه را با گوش خود مقایسه نمایید. این معاینه را در گوش دوم نیز انجام دهید.

● **یادداشت:** در اثنای معاینه یک گوش، گوش دوم باید با انگشت یا پنبه مسدود شده باشد.

● **تست نجوا کردن (Whisper test):** در نزدیک گوش مریض با آواز پایین صحبت کنید، از وی سوالات ساده را بپرسید. مثلاً اسم شما چیست؟ کجا زنده‌گی می‌کنید؟ جوابات درست بر سالم بودن عصب هشتم دلالت می‌نماید.

● **تست Weber:** در این معاینه انتقال عظمی هر دو گوش را با گذاشتن قاعده پنجه صوتی اهتزازکننده در وسط پیشانی مریض با هم مقایسه نمایید. مریض مصاب مرض گوش متوسط در طرف ماؤوفه به سبب بهتر بودن انتقال عظمی (bone conduction) نسبت به طرف سالم خود بهتر می‌شنود؛ اما مریض که مصاب ناشنوایی عصبی باشد در طرف ماؤوفه کمتر می‌شنود.

● **تست Rinne:** در این معاینه انتقال هوایی و انتقال عظمی گوش مورد نظر با هم مقایسه می‌شود. به صورت نارمل انتقال هوایی بهتر از انتقال عظمی می‌باشد.

● **طرز العمل:** اولاً پنجه صوتی اهتزازکننده را به گوش مریض نزدیک نموده و سپس قاعده آن را بالای بارزه mastoid بگذارید. حالا از مریض بخواهید که هر دو آواز را با هم مقایسه نماید. در حالت نارمل انتقال هوایی نسبت به انتقال عظمی بهتر است اما در مرض گوش متوسط معکوس می‌شود.

معاینه بخش vestibular عصب هشتم: بخش دهلیزی عصب هشتم با تأمین موازنه بدن ارتباط دارد. برای معاینه آن دو تست ذیل اجراء می‌شود:

● Rotation test

● Caloric test

این تست‌ها باید در کتب گوش و گلو مطالعه گردند.

۷. معاینه عصب نهم (Glossopharyngeal nerve)

دو معاینه ذیل باید اجراء شوند:

۱. **معاینه ذایقه ثلث خلفی زبان:** طرزالعمل آن قبلاً تشریح شد.

۲. **عکسه بلعومی / حنکی (pharyngeal/palatal reflex):** از مریض بخواهید که چشمان خود را بسته نموده و دهن خود را باز نماید. حالا با یک پروب جدار خلفی بلعوم را تنبیه نمایید. زبان را با یک depressor پایین نگه‌دارید. pillar of fauces تقلص می‌نماید. در صورت فلج عصب این عکسه موجود نمی‌باشد. از این تست برای معاینه عصب دهم نیز استفاده می‌شود.

۸. معاینه عصب دهم (Vagus nerve)

● **تست «آه»:** روی مریض را در حالی که دهن وی باز است به طرف روشنی تدور دهید. سپس زبان مریض را با depressor پایین بیاورید. از مریض بخواهید تا «آه» نماید. در این حالت حرکات حنک نرم را مشاهده نمایید. صعود حنک در طرف فلج شده مشاهده نمی‌شود. اما median raphe از سبب کشش عضلی نصف سالم کش می‌شود. حرکات حنک در صورت فلج دو طرفه vagus معدوم می‌باشد.

● **تغییرات در تکلم:** از مریض بخواهید تا کلمات معین از قبیل ریگ، لب وغیره را اداء نماید. در صورت فلج دوطرفه vagus کلمه ریگ را به شکل رنگ و کلمه

لب را به شکل لم تلفظ می‌نماید. علت آن این است که تلفظ این کلمات نیاز به بسته شدن کامل ناحیه انفی بلعومی دارد. در صورت فلج دو طرفه عصب دهم حنک نرم توان بلند کردن و بسته نمودن nasopharynx را ندارد لذا صدای انفی در آواز مریض ظاهر می‌شود.

- **برگشت غذا:** از مریض در مورد برگشت پارچه‌های غذایی از طریق دهن در زمان بلع سوال نمایید. این حالت در فلج کامل حنک نرم معمول است. علت آن قبلاً توضیح گردید.

- **عسرت بلع (dysphagia):** مریض در صورت آفت نیورون حرکی سفلی در بلع مواد، مخصوصاً مواد جامد مشکل می‌داشته باشد. اما در آفت نیورون حرکی علوی در بلع مایعات مشکل موجود می‌باشد.

- **اختلال آواز (dysphonia):** به سبب تخریب عصب حنجری راجعه، عضلات حنجری فلج می‌شوند لذا صدای مریض خشن و خشک می‌شود. ممکن سرفه گاوی (bovine cough) نیز داشته باشد.

۹. معاینه عصب یازدهم (Accessory nerve)

یک عصب حرکی بوده که عضلات trapezius و sternomastoid را تعصیب می‌نماید.

تست‌ها:

- **تدور وجه:** از مریض بخواهید تا وجه خود را در مقابل قوه که توسط دست داکتر به الاشه وی وارد می‌شود تدور دهد. حالا برجستگی عضله sternomastoid را تفتیش و جس نمایید. در صورت فلج عصب یازدهم عضلات مربوطه برجستگی پیدا نمی‌کنند. طرف چپ مریض را با تدور وجه به طرف راست و طرف راست مریض را با تدور رأس وی به طرف چپ معاینه نمایید.

- از مریض بخواهید تا راس خود را به طرف سفلی در مقابل قوه که بالای زنج وارد می‌شود تدور دهد. برجستگی هر دو عضله sternomastoid را در صورت سالم بودن عصب یازدهم معاینه نمایید.

- **بالا انداختن شانه‌ها:** از مریض بخواهید تا شانه‌های خود را در مقابل قوه که توسط دستانتان بالای شانه‌های وی وارد می‌شود بالا نماید. شانه طرف فلج شده ضعیف‌تر خواهد بود.

۱۰. معاینه عصب دوازدهم (Hypoglossal nerve)

عصب Hypoglossal یک عصب حرکی است. عضلات زبان و عضلات پایین‌کننده استخوان hyoid را تعصیب می‌نماید.

تست: از مریض بخواهید تا زبان خود را تا حد امکان بیرون نماید. نکات ذیل را ملاحظه نمایید:

- **موقعیت زبان:** در حالت نارمل زبان موقعیت مرکزی داشته و کمی به طرف راست منحرف می‌باشد. در صورت فلج عصب ۱۲ نوک زبان به طرف ساحه فلج شده تپله شده و یک مقعریت داس‌مانند را در آن طرف تشکیل می‌دهد.
- **تناظر زبان:** در آفت nuclear یا infranuclear زبان ممکن در طرف فلج شده اتروفیک، سوراخ سوراخ، کوتاه و چین خورده باشد.
- **Tremor یا fasciculation در زبان:** در سمت فلج شده ممکن tremor یا fasciculation موجود باشد.
- **حرکات زبان:** از مریض بخواهید تا زبان خود را به یک طرف و طرف دیگر حرکت داده و الفاظ «لاء، لاء، لاه» را تکرار نماید. همچنان از مریض بخواهید تا توسط زبان رخسارهای خود را فشار دهد. مشاهده کنید که آیا رخسارها متباز می‌شوند یا خیر. ضایعات زبان نشان‌دهنده آفت nuclear یا infranuclear است.

♦ ۵) معاینه اعصاب محیطی

مهم‌ترین اعصاب محیطی عبارت اند از:

- ضفیره brachial
- عصب circumflex
- عصب Bell
- عصب ulnar

- عصب radial
- عصب median
- عصب sciatic
- عصب lateral popliteal

در اثنای معاینه عصب دو عمل باید اجراء شود:

۱. **جس:** ضفیره brachial را توسط فشار دادن انگشتان دست در ناحیه ابطی طوری که دست مریض اندکی در حالت تقرب قرار داشته باشد جس نموده می‌توانیم.

عصب ulnar در تحت epicondyle وحشی humerus جس شده می‌تواند.

عصب lateral popliteal در نزدیک رأس fibula جس شده می‌تواند.

در leprosy اعصاب مانند طناب جس می‌شوند. در مرض Von Recklinghausen (neurofibromatosis) اعصاب قحفی، نخاعی و محیطی به صورت منتشر و نودیولر جس شده و تورم‌های متعدد در سطح بدن یافت می‌شوند.

۲. **معاینه نواحی از بدن که توسط این اعصاب تعصیب می‌شوند.**

ضفیره عضدی (brachial plexus)

دو نوع آفت دارد:

۱. **آفت علوی (فلج Erb-Duchenne):** این آفت به سبب تحت فشار قرار گرفتن رأس طفل در اثنای ولادت به میان می‌آید. در این مرض جذر پنجم یا بعضاً جذر ششم رقبی ماؤوف می‌باشد. عضلات biceps، brachialis و supinator/ brachioradialis فلج می‌باشند. میتود معاینه آن بعداً در بخش معاینه قوت عضلات ذکر می‌گردد. طرف علوی در کنار بدن آویزان بوده و به طرف داخل تدور می‌داشته باشد. ساعد pronate می‌باشد. این تظاهر وصفی به نام «policeman receiving tip» یاد می‌شود. در صورتی که صرف C5 ماؤوف باشد، ضیاع حسیت موجود نبوده اما عکسه radial معکوس می‌باشد (در بخش عکسات تشریح شده

است). اگر C6 نیز مأوف شده باشد یک ناحیه بی‌حسی در کنار وحشی بازو موجود می‌باشد.

۲. آفت سفلی (فلج Klumpke): این آفت در زمان سقوط یک شخص از بلندی، زمانی که تلاش می‌نماید تا به یک چیز خود را آویزان کند، واقع می‌شود. در این تصادم جذور عصبی سفلی به ترضیض معروض می‌شوند. مریضان مصاب فلج Klumpke اتروفی عضلات کوچک دست و ضیاع حسیت در ناحیه داخلی ساعد و سه و نیم انگشت انسی را نشان می‌دهند.

عصب Circumflex

این عصب از سبب کسر یا خلع رأس humerus مصدوم می‌شود. عضله deltoid فلج شده و اتروفی خواهد نمود. ممکن یک ساحه بی‌حسی در کنار وحشی قسمت علوی بازو دیده شود.

عصب Bell

عضله serratus anterior را تعصیب می‌نماید. ممکن توسط وارد شدن ضربه یا توسط انتقال اشیای سنگین روی شانه صدمه ببیند. فلج عضله serratus anterior سبب بال‌مانند شدن کتف می‌شود، یعنی کنار فقری و زاویه سفلی متبازر می‌شود.

عصب Ulnar

این عصب ممکن در نتیجه cubitus valgus یا کسر condyle انسی humerus صدمه ببیند.

● **تغییرات حرکی:** از سبب مأوفیت عصب ulnar، عضلات flexor carpi ulnaris و قسمت انسی flexor digitorum profundus فلج می‌شوند. در حالت نارمل تندون flexor carpi ulnaris قابل جس می‌باشد اما در صورت فلج غیر قابل جس می‌باشد. کنار انسی ساعد از سبب اتروفی عضلات هموار می‌باشد. از سبب فلج flexor digitorum profundus، انگشتان کوچک و حلقوی فرط بسط پیدا می‌کنند. سه عضلات lumbrical انسی و سایر عضلات کوچک دست به استثنای عضلات thenar و دو lumbrical‌های وحشی نیز

فلج می‌شوند. ضعف عضلات interosseous باید معاینه شود (تفصیل بیشتر در معاینه قوت عضلات).

- **علامه Froment:** اگر مریض یک پارچه کاغذ را در میان انگشت شست و سایر انگشتان خود بگیرد، فلنکس آخر شست مریض از سبب ضعف عضلات adductor pollicis وضعیت قابضه را به خود اختیار می‌کند.
- **تغییرات حسی:** تماس سطحی در قدام و خلف یک و نیم انگشت انسی از بین می‌رود.

عصب Radial

عصب radial ممکن در نواحی ذیل آسیب ببیند:

- در ابط: از سبب استفاده درازمدت عصای زیر بغل (فلج عصای زیر بغل یا crutch paralysis).
- در میزابه radial: به سبب فشار، مثلاً در صورت گذاشتن دست بالای کنار میز عملیات (Trendelenburg) یا ناحیه عقبی تیز چوکی (فلج شب شنبه یا saturday night paralysis) یا به سبب تطبیق تورنکت.
- کسر جسم humerus.
- تطبیق ادویه به صورت داخل عضلی.

تغییرات حرکتی: از سبب ماؤوف شدن عصب، عضلات triceps و عضلات extensor بند دست و انگشتان فلج می‌شوند، در نتیجه سقوط بند دست (wrist drop) به وجود می‌آید؛ یعنی مریض قادر به بسط نمودن بند دست نمی‌باشد. بسط قسمی انگشتان از سبب عمل عضلات lumbrical و interosseous به وجود آمده می‌تواند. در مراحل اخیر دست چنگال‌مانند می‌شود (claw hand).
تغییرات حسی: ناحیه بی‌حسی در ظهر ساعد و ظهر دست موجود می‌باشد.

یادداشت:

- اگر عصب radial در میزابه radial صدمه ببیند، عصب مربوط به anconeus جان سالم به در می‌برد.

- اگر عصب posterior interosseous صدمه دیده باشد سقوط بند دست (wrist drop) به وجود می‌آید.

عصب Median

این عصب در ناحیه آرنج یا مچ دست به سبب کسر یا خلع مفصل آرنج یا تطبیق تورنکت صدمه می‌بیند.

تغییرات حرکتی: عضلات pronator ساعد و flexor بند دست و انگشتان (به استثنای flexor carpi ulnaris و بخش انسی flexor digitorum profundus) فلج می‌شوند.

دست به طرف انسی قبض می‌شود اگر در مقابل یک مقاومت قبض شود. انگشت شهادت در مفصل phalangeal قبض نخواهد شد، فلها در زمانی که مریض دست خود را مشت می‌کند انگشت اشاره قبض نمی‌گردد (انگشت اشاره‌کننده).

فلج و اتروفی عضلات thenar به وجود آمده در نتیجه دست هموار می‌شود (دست میمون‌مانند). مریض قادر به لمس نمودن نوک انگشت کوچک با نوک انگشت شست نخواهد بود.

تغییرات حسی: حسیت تماس در انگشت شست و دو نیم انگشت radial (در قدام و خلف و متوسط phalanx قریبه) از بین می‌رود.

عصب lateral popliteal

این عصب در کسرهای نهایت علوی fibula یا به سبب وارد شدن فشار پلاستر یا splint صدمه می‌بیند.

تغییرات حرکتی: فلج تام عضلات extensor و peroneal به وجود آمده، که سبب talipes equinovarus می‌شود.

تغییرات حسی: از بین رفتن حسیت در طرف خارجی پا در دو ثلث سفلی و نواحی ظهري تمام انگشتان پا به استثنای خارج انگشت کوچک (که توسط عصب external saphenous (sural) تعصیب می‌شود) دیده می‌شود.

عصب Sciatic

نادراً به سبب زخم‌ها، کسرهای و تطبیق ادویه داخل عضلی صدمه می‌بیند. **تغییرات حرکی:** عضله flexor زانو فلج می‌شود. از سبب عمل عضلات sartorius و gracilis یک اندازه قبض ممکن خواهد بود. از سبب فلج در نزد مریض سقوط قدم (foot drop) دیده می‌شود (یعنی مریض پای خود را dorsiflex نموده نمی‌تواند).

تغییرات حسی: از بین رفتن کامل حسیت پایین‌تر از زانو به استثنای ناحیه که توسط عصب long saphenous تعصیب می‌شود.

Causalgia: یعنی حملات اشتدادی درد در صورت صدمه قسمی عصب.

یادداشت: عصب popliteal وحشی نسبت به عصب انسی آن ۹ مراتب بیشتر ماؤوف می‌شود.

نکته مهم: از سبب ماؤوف شدن اعصاب محیطی، تغییرات تروفیک از قبیل تشکل قرحات و تظاهر پلک‌ها ممکن مترافق با تغییرات حسی و حرکی در نواحی که توسط این اعصاب تعصیب می‌شوند، دیده شود.

◆ (۶) معاینه سیستم حسی

۱. حسیت تماس
۲. حسیت درد
۳. حسیت حرارت
۴. حسیت موقعیت و حرکات منفعله
۵. حسیت اهتزاز
۶. حسیت سه بعدی (stereognosis)

حسیت تماس: برای معاینه تماس سطحی از پنبه استفاده می‌شود اما برای معاینه درد سطحی از سنجاق استفاده می‌شود.

تست‌ها: جلد مورد نظر باید هنگام معاینه برهنه باشد. پنبه یا سنجاق را به تماس نقاط مشابه بدن مریض بیاورید. از انگشتان پا شروع نموده به طرف بالا حرکت

کنید بعداً قدام و خلف تنه را زمانی که مریض ایستاده باشد معاینه کنید. در صورت اختلال حسیت dermatome مربوطه را ملاحظه نمایید. از مریض بپرسید که پنبه با کدام قسمت در تماس آمد؟ این در مورد حس تعیین موقعیت تماس معلومات می‌دهد. سوال‌ها را در هر بخش بپرسید.

تست تفکیک دو نقطه (two-point discrimination test): دو ناحیه مجاور مریض را با پنبه یا با دو انگشت تنبیه نمایید و از مریض در مورد آن بپرسید. بصورت نارمل در نوک انگشتان دست دو نقطه که به اندازه ۲ میلی‌متر و در انگشتان پا به اندازه ۱ سانتی‌متر از هم فاصله داشته باشند تفکیک شده می‌تواند. در صورت صدمه anterior spinothalamic tract، حس تعیین موقعیت تماس و تفکیک دو نقطه مجاور مختل می‌شود.

حسیت تماس در حالات مختلف تغییر می‌نماید:

- **anesthesia:** زمانی که حسیت‌ها به طور مکمل از بین بروند.
- **hypoesthesia:** زمانی که ضیاع تفکیک تماس به صورت قسمی باشد.
- **hyperesthesia:** زمانی که مریض با تماس نارمل احساس درد سوراخ‌کننده یا سوزنده نماید (در neuritis محیطی موجود می‌باشند).

حسیت درد: توسط یک سنجاق معاینه می‌شود. سنجاق را در نقاط همتا فرو برده و از مریض در مورد احساس درد بپرسید. حس درد توسط lateral spinothalamic tract انتقال می‌شود فلذا صدمات آن سبب اختلال حس درد می‌شود.

درد فشاری (درد عمیق): با فشار دادن وتر Achilles، عضلات ساق، biceps و triceps ارزیابی می‌شود. از مریض در مورد احساس درد بپرسید.

دریافتهای غیر نارمل قرار ذیل اند:

- **Allodynia:** احساس درد توسط یک منبه که در حالت نارمل سبب ایجاد درد نمی‌شود (مثلاً تماس خفیف یا فشار خفیف). Allodynia یک علامه neuropathy مزمن است.

- **Hyperalgesia:** عبارت از افزایش حساسیت در مقابل تنبهاات دردناک است. در نواحی اطراف ترشیضات و التهابات دیده می‌شود.
- **Hypoalgesia:** عبارت از کاهش احساس درد است. در نواحی neuropathic (مثلاً در leprosy و دیابت) موجود می‌باشد.
- **حسیت حرارت:** توسط آب سرد و گرم که در ۲ تست تیوب قرار داشته باشند، معاینه می‌شود. نواحی معین را توسط آن تنبیه نمایید. از مریض بپرسید که سردی را احساس می‌کند یا گرمی را. آفات lateral spinothalamic tract سبب اختلال یا ضیاع این حسیت می‌شود.
- **۴. حسیت موقعیت و حرکات منفعله:** یک حس عمیق است. در این صورت حرکات بالای شست یا انگشت دست یا انگشت بزرگ پا معاینه می‌شود:
 - اولاً طرز اجرای حرکات شست یا انگشت کلان پا را که به طرف علوی و سفلی انجام می‌شود به مریض بیاموزانید.
 - از مریض بخواهید تا چشمان خود را بسته نماید.
 - Phalanx قریبه مریض را با انگشتان خود گرفته و مفصل interphalangeal را قبض نمایید.
 - از مریض در مورد جهت حرکت آن بپرسید که به طرف علوی است یا سفلی.
 - قبض باید ۱۰ درجه باشد.
 - در صورت عدم قناعت این معاینه را چندین مراتبه تکرار نمایید.
 - عین طرزالعمل را در طرف علوی نیز با حرکات انگشتان اشاره یا کوچک انجام دهید.
 - در صورت احساس درد در مفصل بعیده، معاینه را با حرکات مفصل قریبه تکرار نمایید.
 - چشمان مریض باید بسته باشد. طرف مریض را در یک وضعیت غیر نارمل قرار داده و از وی بخواهید تا طرف دیگر خود را نیز به همین شکل وضعیت دهد. لازم است تا قبل از گذاشتن طرف در یک موقعیت، آن را در جهت‌های مختلف حرکت دهید.

- در زمان معاینه دست، انگشتان مریض را در جهت‌های مختلف حرکت داده و از مریض بخواهید تا عین حرکات را با دست دیگر خود در حالی که چشمان وی بسته اند، انجام دهد.
 - مواظب باید بود که طرف معاینه شونده با کدام قسمت دیگر وجود مریض تماس ننماید در غیر آن مریض قادر خواهد بود تا موقعیت آن را تعیین نماید.
- ۵. حسیت اهتزاز:** توسط پنجه صوتی که دارای فرکانس ۱۲۸ فی ثانیه باشد معاینه می‌شود.
- پنجه صوتی را به حرکت درآورده سپس قاعده آن را بالای عظم قص مریض قرار دهید ببینید که آیا مریض آن را احساس می‌کند یا خیر.
 - در اطراف سفلی عملیه را از مفاصل interphalangeal آغاز نموده سپس به طرف علوی در نواحی بجلک، anterior tuberosity قصبه و iliac crest انجام دهید.
 - در اطراف علوی از مفاصل interphalangeal انگشت شهادت آغاز نموده سپس بارزه بند دست، آرنج و acromion شانه را تنبیه نمایید.
- در حالت نارمل احساس وز وز به وجود می‌آید. این احساس در سنین کهولت، از سبب polyneuropathy و بعضی از امراض posterior column از بین می‌رود.
- ۶. حسیت سه بعدی (stereognosis):** این اصطلاح برای احساس کردن شکل، اندازه و وزن یک شی استعمال می‌شود. برای معاینه آن:
- از مریض بخواهید تا چشمان خود را بسته نماید.
 - سپس یک کلید، سکه یا قلم را در دست مریض قرار دهید.
 - از مریض در مورد شی مذکور معلومات بخواهید.
 - برای معاینه احساس وزن اشیا، دو توپ با شکل و اندازه یکسان اما با وزن‌های مختلف را در دستان مریض قرار داده و از وی بپرسید که کدام آن سنگین‌تر است.

- برای تعیین اندازه، دو شی با وزن و شکل یکسان اما با اندازه مختلف را در دست‌های مریض قرار داده در حالی که چشمان مریض بسته اند، در مورد اندازه آن بپرسید.

ضیاع این حسیت که در آفات قشر حسی به وجود می‌آید به نام astereognosis یاد می‌شود.

حسیت‌های غیر نارمل: موجودیت حسیت غیر نارمل به نام paresthesia یاد می‌شود. معمول‌ترین آن‌ها عبارت اند از لرزش، خارش، کرحتی، سوزش و formication (احساس خزیدن حشره بالای جلد). این‌ها در neuritis محیطی دیده شده می‌تواند.

♦ (۷) معاینه سیستم حرکی

جهت معاینه سیستم حرکی نکات ذیل را باید ملاحظه نمود:

- تفتیش عضلات
- جس عضلات
- تون عضلات
- قوت عضلات
- هماهنگی حرکات
- موجودیت حرکات غیرارادی
- عکسات
- Clonus
- طرز ایستادن (stance)
- رفتار (gait)

تفتیش عضلات

همیشه دو طرف بدن را با هم مقایسه نمایید. اندازه عضلات اطراف را مشاهده نموده و مقایسه نمایید. عضلات اتروفیک نه تنها کوچک بوده بلکه نرم‌تر و سست‌تر نیز می‌باشند. اگر اتروفی عضلی مترافق با فایبروز باشد عضله سخت‌تر

جس می‌شود. اگر کوتاه شوند contracture به وجود می‌آید. Contracture در hypertonia درازمدت عضلات نیز موجود می‌باشد.

اتروفی عضلی ممکن به شکل ذیل باشد:

- **اتروفی عمومی:** در امراض نیورون حرکی سفلی، امراض مزمن (مانند توبرکلوز و لاغری شدید در کنسر) موجود می‌باشد.
- **اتروفی گروهی از عضلات:** گروهی از عضلات می‌تواند در امراض عضلی مانند myopathy (muscular dystrophy) اتروفی نمایند. علت این‌ها امراض عصبی نبوده بلکه تغییرات پتالوژیک خود عضلات است. در این حالت عضلات ساق، ران یا شانه به طور ویژه مأؤوف می‌شوند. در pseudohypertrophic muscular dystrophy عضلات بزرگ بوده اما ضعیف می‌باشند اما در صورت هایپرتروفی واقعی عضلات (مثلاً عضلات یک ورزشکار) عضلات بزرگ و قوی می‌باشند.
- **اتروفی موضعی:** علت آن ترضیض یا امراض مفصلی می‌باشد. این حالت در عضلات thenar مریضان مصاب ارتريت مفصل metacarpophalangeal یا در عضله quadriceps نزد مریضان مصاب امراض مفصل زانو دیده می‌شود. این حالت به نام اتروفی ناشی از عدم استفاده (disuse atrophy) یاد می‌گردد.

جس عضلات

عضلات اتروفیک نرم و سست می‌باشند. عضلات در فایبروز (دستروفی عضلی) و polymyositis سخت و غیر ایلاستیک می‌باشند.

مقویت عضلی (muscle tone)

عبارت از حالت کشش یا تقلص است که در عضلات سالم موجود می‌باشد. مقویت عضلی می‌تواند زیاد یا کم شود، کاهش مقویت عضلی به نام hypotonia و افزایش آن به نام hypertonia یاد می‌شود.

Hypotonia در حالات ذیل موجود می‌باشد:

- امراض نیورون حرکی سفلی.

- عدم موجودیت شعور.
- شاک عصبی (مراحل مقدم آفت نیورون حرکی علوی).
- امراض مخیخ.

Hypertonia در حالات ذیل موجود می‌باشد:

- امراض نیورون حرکی علوی.
- آفات (basal ganglia (Parkinsonism).
- تمارض (hysteria).
- اضطرابات.

شخی یا سفتی (Rigidity) عبارت از افزایش تون عضلی در حالت استراحت است.

انواع:

- **نوع چاقوی ضامن‌دار (clasp knife type):** در این نوع زمانی که داکتر کوشش می‌نماید تا اطراف را به حالت قبض در آورد، افزایش پیشرونده در مقویت به وجود می‌آید اما بعد از درجه معین قبض، مقاومت دفعتهاً ناپدید می‌شود. عین حالت در صورت بسط نیز مشاهده می‌شود. در آفات نیورون حرکی علوی دیده می‌شود. این حالت به نام spastic catch نیز یاد می‌شود.
- **نوع چرخ دندانه‌دار (cog wheel type):** در این نوع مقاومت در مقابل حرکات منفعله نوسانی می‌باشد؛ یعنی اگر کوشش نمایید که آرنج را به حالت قبض در آورید، به شکل پرشی قبض می‌شود. این حالت در آفات خارج هرمی مانند parkinsonism موجود می‌باشد. حرکات پرشی در صورت مشت کردن دست دوم بیشتر می‌شود. این به نام مانور Jendrassik یاد می‌شود.
- **نوع لوله سربی (lead pipe (paratonic) type):** نوع پلاستیک شخی است. شخی یکسان در تمام حرکات منفعل موجود می‌باشد (مثلاً قبض یا بسط). در حالاتی که شعور مریض مختل باشد دیده می‌شود. در dementia نیز دیده می‌شود.
- **نوع تمارضی:** در این نوع، مقاومت اندام مریض متناسب با قوه‌ای که داکتر جهت قبض و بسط به کار می‌برد افزایش می‌یابد.

جهت تشخیص تفریقی این که فرط مقویت (hypertonicity) طرف سفلی مریض ارگانیک است یا وظیفوی، معاینه ذیل انجام می‌شود:

علامه بالا آمدن Babinski (علامه Hoover): مریض باید بالای بستر طوری بخوابد که پاهایش در حال بسط باشند. از وی بخواهید تا بدون کمک دستان خود از جا برخیزد. در فلج سپاستیک عضوی، یک پا طرف ماؤوفه از سبب شخی اول‌تر بالا خواهد شد اما در فلج وظیفوی این حالت واقع نمی‌شود.

میتوذهای معاینه تون عضلی: تون عضلی توسط حرکات منفعله رو به خلف یا رو به قدام کل طرف ارزیابی می‌شود. این می‌تواند در مورد تون منحنیث یک کل معلومات بدهد. در ضمن آن، حرکات مفاصل مختلفه نیز به صورت جداگانه صورت گرفته می‌تواند.

● **اطراف علوی:** قبض و بسط منفعل مفاصل metacarpophalangeal، مچ دست و آرنج انجام شود. در مفصل بند دست، حرکات pronation و supination نیز صورت گیرند.

● **اطراف سفلی:** قبض و بسط منفعل مفاصل metatarso-phalangeal، بجلک و زانو انجام شود. تون مفصل بجلک توسط غلتاندن پای بسط شده نیز ارزیابی می‌شود در حالی که مریض در بستر دراز کشیده است.

قدرت عضلات (Power of Muscles)

برای ارزیابی قدرت عضلات از مریض خواسته می‌شود تا آن را در مقابل مقاومت که از طرف داکتر وارد می‌شود، حرکت دهد.

در اینجا صرف عضلات مهم مورد بحث قرار می‌گیرند:

● **عضلات تنه:** مریض قادر به بلند شدن از بستر بدون به کار بردن بازوها نخواهد بود.

● **اطراف علوی:**

● **Abductor pollicis brevis:** این عضله توسط عصب median تعصیب

می‌شود. از مریض بخواهید که انگشت شست خود را در یک مستوی که

با وجه راحی انگشت شهادت زاویه قائمه را بسازد، تبعد دهد. این عضله تقلص خواهد کرد.

● **Opponens pollicis:** از مریض تقاضا نمایید تا نوک انگشت کوچک را با نوک انگشت شست تماس دهد.

● **Card test:** این معاینه برای ارزیابی عضلات interossei به کار می‌رود. یک کارت را در بین انگشتان که به صورت مکمل بسط نموده باشند بگذارید و از مریض بخواهید تا آن را محکم بگیرد. حالا تلاش کنید که کارت را دور نمایید. این عمل قدرت عضلات مذکور را نشان می‌دهد.

● **عضلات قابضه انگشتان:** از مریض بخواهید تا انگشتان تان را فشار دهد. به صورت نارمل، دو انگشت متوسط و اشاره برای این هدف به کار می‌روند. برای جلوگیری از ترضیض انگشتان تان توصیه می‌شود تا انگشت متوسط تقرب داده شود، بدین صورت در امتداد انگشت شهادت قرار می‌گیرد.

● **عضلات باسطه انگشتان:** از مریض بخواهید که مشت خود را در مقابل مقاومت که به انگشتان قبض شده وارد می‌شود، باز نماید.

● **عضلات قابضه میج دست:** از مریض بخواهید که نوک انگشتان خود را به طرف ساعد بیاورد در حالی که کف دست به طرف بالا گرفته شده است.

● **عضلات باسطه میج دست:** مریض دست خود را طوری وضعیت دهد که کف دست وی به طرف پایین متوجه باشد. حالا دست مریض را محکم گرفته و از وی بخواهید تا دست خود را تا حد امکان به طرف بالا و به طرف عقب قات کند. فلج یا ضعف عضلات باسطه میج دست به حالتی که به نام سقوط بند دست (wrist drop) یاد می‌شود، منتهی می‌گردد. این حالت در فلج عصب radial به وجود می‌آید.

● **عضله Biceps:** آرنج مریض باید در مقابل پهلویش محکم گرفته شود. حالا از وی بخواهید که ساعد خود را قبض نماید، در حالی که مقاومت توسط گرفتن دست یا میج دست وارد می‌شود. Biceps سالم برجسته خواهد شد.

- **عضله Triceps:** از مریض بخواهید که ساعد قبض شده خود را در مقابل مقاومت که توسط معاینه‌کننده وارد می‌شود مستقیم سازد.
- **عضله Deltoid:** از مریض بخواهید که بازوی خود را در مقابل مقاومت تبعید دهد.
- **اطراف سفلی:**
- **plantar flexion و Dorsiflexion پا:** از مریض بخواهید که پای خود را در مقابل مقاومت plantarflex و dorsiflex نماید.
- **عضلات باسطه زانو:** مریض بالای بستر قرار گرفته و زانوهای خود را قبض نماید. حالا بالای پای مریض قوه وارد کنید و از وی بخواهید تا پای خود را مستقیم نماید.
- **عضلات قابضه زانو:** مریض باید طرف سفلی خود را از بستر بلند نماید. حالا ران وی را با دست چپ و مچ پای وی را با دست راست حمایه نمایید. حالا از وی بخواهید که زانوی خود را در مقابل مقاومت قبض نماید.
- **عضلات باسطه ران:** مریض باید زانوهای خود را دراز نماید. حالا پای مریض را از بستر بلند کنید از مریض بخواهید که آن را در مقابل مقاومت که وارد می‌شود پایین نماید.
- **عضلات قابضه ران:** در حالی که زانوها هموار باشند از مریض بخواهید که پای خود را از بستر در مقابل مقاومت بلند نماید.
- **تست برای ضعف diaphragm:** از مریض بخواهید تا نفس عمیق بگیرد و بعداً آن را به آهستگی بشمارید. در یک شخص نارمل با یک تنفس عمیق تا عدد ۲۰ شمرده می‌توانیم در صورت ضعف دیافراگم تا ۲۰ شمرده نمی‌شود.

درجه‌بندی ضیاع قدرت عضلی:

- **۰ درجه:** فلج مکمل یعنی هیچ نوع حرکت موجود نمی‌باشد.
- **۱ درجه:** موجودیت اهتزاز جزئی تقلص عضلی.

- **۲ درجه:** مریض قادر به حرکت عضو است، اگر تأثیر جاذبه زمین نادیده گرفته شود (یعنی توسط گذاشتن طرف بالای بستر و حرکت دادن آن به طور افقی).
- **۳ درجه:** مریض طرف خود را در مقابل قوه جاذبه زمین بلند می‌کند، اما نه در مقابل مقاومت.
- **۴ درجه:** مریض در مقابل مقاومت، طرف خود را بلند نموده، اما قدرت آن کم یا متوسط می‌باشد.
- **۵ درجه:** قدرت عضلی نارمل است.

یادداشت: همیشه اطراف را به صورت دو طرفه ارزیابی نمایید. بدین وسیله، کاهش قوت در گروهی از عضلات دریافت شده می‌تواند.

اصطلاحات ذیل معمولاً استعمال می‌شود:

- **hemiplegia:** یعنی فلج نصف تمام بدن.
- **paraplegia:** زمانی که اطراف سفلی فلج باشند.
- **monoplegia:** زمانی که یک طرف دست یا پا فلج باشد.

هماهنگی حرکات (Coordination)

توسط هماهنگی فعالیت عضلات مختلفه یا گروهی از عضلات که عمل معین را انجام می‌دهند دانسته می‌شود.

تست:

در اطراف علوی:

- تست انگشت بینی (nose-finger test)
- تست انگشت به انگشت (finger to finger test)
- ترسیم یک دایره در فضا

در اطراف سفلی:

- قدم زدن به امتداد خط مستقیم
- تست پاشنه ساق (heel-shin test)

(تفصیل آن در مبحث معاینه مخیخ ارائه شده است)

حرکات غیرارادی (Involuntary Movements)

انواع مختلف تقلصات غیرارادی عضلات وجود دارند. عضله ممکن در حالت spasm قرار داشته باشد. این سپازم ممکن tonic یا clonic باشد.

● **Tonic:** زمانی که تقلصات دوامدار باشد.

● **Clonic:** زمانی که تقلصات به صورت مسلسل باشد.

حرکات غیر نارمل در تیتانی نیز موجود می‌باشد. علایم ذیل در نزد مریضان مصاب تیتانی موجود می‌باشد:

● **علامه Trousseau:** اگر توسط تطبیق یک تورنکیت یا کیسه آلِه فشار بالای

بازو فشار وارد شود یک سپازم وصفی ایجاد می‌شود (دست قابله).

● **علامه Chvostek:** وارد نمودن ضربه بالای عصب وجهی در قدام لوب گوش

باعث حرکت عضلی در تمام آن سمت وجه می‌شود.

● **علامه Peroneal:** وارد کردن ضربه بالای سطح وحشی fibula در ناحیه

پایین‌تر از رأس آن سبب dorsiflexion و abduction پا می‌شود.

سایر حرکات غیرارادی عبارت اند از:

● **رعشه (tremor):** عبارت از اهتزازات ریتمیک یک قسمت یا قسمت‌های

مختلفه یک طرف است. انواع آن عبارت اند از:

● **ظریف (fine):** در thyrotoxicosis و الکولیزم موجود می‌باشد. برای

دریافت آن از مریض بخواهید تا دستان خود را به حالت بسط در آورد.

حالا یک پارچه کاغذ را بالای انگشتان که به وضعیت بسط قرار گرفته

اند بگذارید.

● **خشن (coarse):** در Parkinsonism موجود می‌باشد. به نام حرکات pill

rolling نیز یاد می‌شود.

● **پیری (senile):** این نوع رعشه در دست‌ها و پاهای اشخاص مسن

موجود می‌باشد.

- **تمارضی (hysterical):** در این صورت رعشه ممکن در یک طرف یا تمام بدن موجود باشد. اگر بخواهیم آن را متوقف سازیم، شدت آن افزایش می‌یابد.

رعشه می‌تواند متقطع، متداوم، منظم یا غیر منظم باشد.

رعشه‌ای که در نتیجه تلاش مریض برای به کار بردن عضلات ماؤوفه‌اش ایجاد می‌شود به نام رعشه قصدی (intention tremor) یاد می‌شود. این شکل رعشه در امراض مخیخ موجود می‌باشد.

- **Flapping tremor (asterix):** این نوع رعشه در مفاصل metacarpophalangeal دست‌ها موجود بوده و مشابه به حرکت بال‌های پرند می‌باشد. برای مشاهده آن از مریض بخواهید تا دست‌های خود را در پیشروی خود دراز نماید. در حالات ذیل موجود می‌باشد:

- عدم کفایه کبد

- عدم کفایه تنفسی

- Uremia

- **Fasciculation و Fibrillation:** عبارت از تقلصات کلونیک بندل‌های الیاف در یک عضله می‌باشد. در حالات ذیل موجود می‌باشد:

- آفت نیورون حرکی سفلی

- اτροφی پیشرفته عضلی

- Syringomyelia

میتود: تحریک ضربه‌یی را بالای عضلات ران یا ساق وارد نمایید و تقلصات آن را مشاهده نمایید.

تقلص فایبر واحد یک عضله به نام fibrillation یاد می‌شود. توسط چشم‌های عادی قابل دید نیست بلکه توسط electromyography دریافت می‌شود.

- **Myoclonus**: عبارت از حرکات سریع، غیر منظم و پرشی یک طرف یا تمام بدن است. ممکن در اثنای خواب یا در جریان قدم زدن دیده شود. ممکن نارمل باشد اما شکل شدید آن دلالت بر epilepsy یا امراض استحالوی می‌کند.
- **Hemiballismus**: عبارت از حرکات سریع شدید است که در نصف بدن دیده می‌شود. در حالاتی دیده می‌شود که آفت در ناحیه پایین‌تر از تلاموس باشد.
- **Tics**: عبارت از حرکات هماهنگ مکرر و هدفمند است که در نتیجه اسباب خارجی یا یک مفکوره ایجاد می‌شوند. این‌ها عبارت اند از:
 - چشمک زدن مکرر
 - تکان دادن رأس
 - به هم فشردن لب‌ها
- **Athetosis**: حرکات بطی تقلصات عضلی اند که منجر به حرکات متداوم و حرکات پرپیچ عمده به صورت چرخشی می‌شود. این حرکات خصوصاً در دست‌ها و پاها دیده می‌شود، اما بعضاً به تمام طرف یا تنه توسعه می‌نماید. این حرکات در آفات هسته putamen پدید می‌آیند.
- **Spasmodic torticollis**: عبارت از حرکات clonic یا tonic عنق به یک سمت معین است و در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - ارتربت ناحیه عنق
 - آفات هسته lenticular
- **Titubation**: عبارت از اهتزازات عمودی عنق است که در آفات مخیخی دیده می‌شود.
- **Dystonia**: حرکات بطی اند که قسمت‌های قریبه اطراف و تنه را متاثر می‌سازد و تمایل به چرخش دارند. در infantile encephalitis مشاهده می‌شود.
- **Choreiform**: عبارت از حرکات هدفمند غیر مکرر و پرشی وجه، زبان یا اطراف اند. موجودیت این حرکات دلالت به این می‌کند که کدام عمل در حال وقوع است اما دفعه‌تاً توسط کدام حرکت بی‌هدف دیگر مختل می‌شود. و در حالات ذیل دیده می‌شوند:

● تب روماتیک

● Encephalitis

عکسات (Reflexes)

قبل از معاینه عکسات، نکات ذیل باید ملاحظه شوند:

- مریض باید بالای بستر در حالت خوابیده یا نشسته قرار داشته باشد.
- مریض باید در حالت استراحت قرار داشته و نسبتاً گرم باشد. زیرا در صورت مضطرب بودن مریض عکسات تشدید می‌شوند.
- ناحیه مورد نظر باید برهنه باشد.
- معاینه باید با استفاده از چکش وتری صورت گیرد. داکتر باید در عین سمت مریض ایستاد باشد.
- به مریض اطمینان دهید که در هنگام اجرای معاینه به وی آسیب نمی‌رسد.
- در صورت مشکوک بودن نتیجه معاینه را تکرار نمایید.

انواع عکسات:

- سطحی
- عمیق
- ارگانیک

الف. عکسات سطحی:

شامل عکسات ذیل است:

- **عکسه ملتحمه:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه قرنیه:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه حدقی:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه بلعومی:** قبلاً تشریح شده است.
- **عکسه کتفی:** جلد ناحیه بین الکتفی را خراشیده یا ضربه‌یی به آن وارد کنید.
- **نتیجه:** عضلات کتفی تقلص خواهند کرد.
- **تعصیب:** سگمنت‌های پنجم رقبی الی اول صدری.

- **عکسه بطنی:** توسط یک سنجاق کلید یا چوبک، بطن را در خطوط درماتومها از خارج به خط متوسط به صورت مسلسل تحریک نمایید.
- **نتیجه:** به صورت نارمل حرکات سره و تقلص عضلات بطنی دیده می‌شود.
- این عکسه در حالات ذیل معدوم می‌باشد:
 - آفت نیورون حرکی علوی زمانی که آفت بالاتر از سویه تعصیب عضلات بطنی باشد یعنی بالاتر از سگمنت هفتم صدری.
 - اشخاص چاق.
 - اشخاص مسن.
 - بعد از حمل‌های متعدد.
- **تعصیب:** از xyphoid process الی سره، تعصیب عضلات توسط اعصاب هفتم الی دهم صدری صورت می‌گیرد. از سره الی ارتفاع عانه تعصیب عضلات توسط اعصاب دهم الی دوازدهم صدری صورت می‌گیرد.
- **عکسه cremasteric:** قسمت انسی و علوی ران را توسط یک آلّه نوک تیز تخریش نمایید.
- **نتیجه:** در حالت نارمل عضلات cremasteric آن طرف تقلص نموده و خصیه همان طرف بالا می‌رود.
- **تعصیب:** سگمنت اول و دوم قطنی. این عکسه در آفت L1 یا بالاتر از آن معدوم می‌باشد.
- **عکسه plantar (علامه Babinski):** کنار وحشی کف پای مریض را از کری الی پنجه پا با کلید تخریش نمایید.
- **نتیجه:** به صورت نارمل:
 - انگشت کلان به طرف سفلی حرکت می‌کند.
 - قبض و تقرب سایر انگشت‌ها به وجود می‌آید.
 - پا قبض ظهري نموده و invert می‌شود.

- این به نام علامه Babinski منفی یا plantar های قابضه یاد می‌شود. در صورتی که انگشت کلان پا به علوی حرکت کند و سایر انگشتان بسط نمایند به نام علامه Babinski مثبت یا plantar های باسطة یاد می‌شود.
- در حالات ذیل مثبت می‌باشد:
- آفات نیورون حرکی علوی
- در اثنای خواب
- در نوزادان
- بعضاً پس از حملات صرع و در کوما
- **تعلصیب:** توسط جذور پنجم قطنی و اول عجزی تعلصیب شده است.
- بعضاً تمام پا دفعتاً قبض می‌شود و انگشت کلان بسط می‌شود. این حالت در امراض دو طرفه نیورون حرکی علوی، امراض نخاع شوکی، multiple sclerosis و استحالته تحت الحاد نخاع شوکی دیده می‌شود.
- **علامه Oppenheim:** کنار انسی قصبه را به سختی فشار دهید. انگشت کلان به علوی حرکت خواهد کرد. این علامه به نام علامه Babinski وادار شده نیز یاد می‌شود.
- **عکسه Gordon:** وتر Achilles را در میان انگشتان خود فشار دهید. انگشت کلان به علوی حرکت خواهد کرد.
- هر دو علامه فوق در آفات نیورون حرکی علوی موجود می‌باشد اما ارزش آن کمتر است.
- **عکسه bulbocavernous:** توسط وارد کردن فشار بالای glans penis، ظهر آن تحریک می‌شود.
- **نتیجه:** عضلات bulbocavernous تقلص می‌کنند.
- **تعلصیب:** توسط جذور عصبی سوم و چهارم عجزی تعلصیب شده است. موجودیت آفات در این جذور سبب معدومیت این عکسه می‌شود.
- **عکسه مقعدی:** جلد نزدیک مقعد را با یک شی نوک تیز تخریش نمایید.
- **نتیجه:** معصره مقعدی تقلص خواهد نمود.

- **تعصیب:** توسط جذور سوم و چهارم عجزی تعصیب شده است. در صورت آفات این جذور، عکسه فوق معدوم می‌شود.

ب. عکسات عمیقه:

عکسات عمیقه شامل عکسات ذیل است:

- biceps jerk
- triceps jerk
- radial/supinator jerk
- knee jerk
- ankle jerk

یادداشت: قبل از معاینه این عکسات، سه مورد ذیل را باید ملاحظه کرد:

- امراض مفصلی باید در طرفی که معاینه می‌شود موجود نباشند.
- مریض باید کاملاً آرام بوده و طرفی که معاینه می‌شود باید برهنه باشد.
- در اثنای وارد کردن ضربه، حرکات عضله را باید زیر نظر داشت.

:Biceps jerk

میتود اول:

- طرف علوی باید در آرنج قبض باشد.
- ساعد بالای بطن گذاشته شود.
- انگشت شهادت خود را بالای وتر عضله biceps قرار داده و آن را کمی فشار دهید.
- توسط چکش، ضربه‌یی بالای انگشت وارد نمایید.

میتود دوم:

آرنج مریض را در دست چپ خود طوری قرار دهید که شست تان بالای وتر biceps قرار گیرد. دست مریض باید در حالت قبض و استراحت کامل قرار داشته باشد. وتر را با انگشت شست خود کمی فشار داده و ضربه‌یی به آن وارد کنید.

نتیجه: تقلص عضله biceps به وجود می‌آید.

تعصیب: جذور پنجم و ششم رقبی.

:Triceps jerk

میتود:

- طرف علوی را در آرنج قبض نمایید.
- ساعد را بالای بطن مریض قرار دهید.
- بالای وتر عضله triceps ضربه‌یی وارد نمایید.

نتیجه: عضله triceps تقلص می‌کند.

تعصیب: جذور هفتم و هشتم رقبی.

:Supinator jerk (Radial jerk)

- طرف علوی را در آرنج قبض نمایید.
- ساعد را بالای بطن در وضعیت semipronate قرار دهید.
- دست را کمی به طرف ulnar انحراف دهید.
- بالای styloid process کعبه ضربه وارد کنید.

نتیجه: عضله brachioradialis تقلص می‌کند.

تعصیب: اعصاب C5 و C6.

وارونه شدن عکسه عمیق و تری: در صورت معاینه عکسات biceps، triceps و supinator اگر قبض شدید انگشتان دیده شود به نام وارونه شدن یا inversion عکسه عمیق و تری یاد می‌شود. این حالت در صورت یکجا بودن پتالوژی‌های جذور عصبی و نخاع شوکی دیده می‌شود. این پدیده در spondylosis رقبی زمانی که آفت در C5 و C6 باشد دیده می‌شود.

علامه Hoffmann: دست و بند دست مریض باید کمی قبض باشند. دست باید به حالت بسط باشد. فلنکس بعیده انگشت شهادت یا متوسط را در میان شست و انگشت دیگر بگیرید ضربه آهسته را همراه با فشار دادن شست خود به طرف سفلی طوری که بالای ناخن بلغزد وارد نمایید.

نتیجه: عکس العمل مثبت شامل یک تکان سریع، تقرب و قبض شست و قبض انگشتان می باشد. این عکسه علامه هایپرتونیای عضلی بوده و به آفت نیورونی حرکی علوی دلالت نمی کند. این علامه همیشه موجود نمی باشد.

:Knee jerk

میتود: سه میتود برای معاینه knee jerk موجود است:

- **میتود ۱:** مریض را در کنار میز طوری قرار دهید که پاهایش آویزان باشند. ران های وی را برهنه نموده و وتر quadriceps femoris را تعیین موقعیت نمایید. سپس یک ضربه به آن وارد نمایید.
 - **میتود ۲:** هر دو مفصل زانوی مریض را در حالی که بالای بستر قرار داشته باشند به حالت قبض بیاورید. دست خود را در تحت زانوی مورد نظر داخل نموده و بالای پای دوم وی قرار دهید بدین وسیله زانوی مورد نظر بالای ظهر بند دست تان آویزان می شود. حالا مریض را به طرف دیگر متوجه نمایید و یک ضربه را توسط چکش وتری بالای وتر quadriceps در بین patella و tibial tuberosity وارد نمایید.
 - **میتود ۳:** مریض را به وضعیت ظهری قرار داده و اطراف سفلی وی را در مفصل زانو و ران کمی قبض نمایید و فخذ را طوری به طرف وحشی تدور دهید که پاشنه ها با هم نزدیک شوند. سپس ضربه یی به وتر این عضله وارد نمایید.
- نتیجه:** عضله quadriceps femoris تقلص نموده و زانو بسط می شود.
- تعییب:** L2, L3, L4.

مانور تقویت (reinforcement method / Jendrassik): در اشخاص نارمل بعضاً مشکل است تا knee jerk را تحریک نماییم. از مریض بخواهید تا دست های خود را به هم قلاب نماید و در مقابل هم کش نماید یا این که دندان های خود را به هم فشار دهد، یا این که دست های خود را مشت نماید. سپس ضربه یی به وتر quadriceps وارد نمایید. در این حالت دریافت knee jerk آسان می شود.

در حقیقت با این طریقه ما حساسیت نهایات حسی سپندل‌های عضلی را جهت کشش افزایش می‌دهیم.

Ankle jerk

میتود: اطراف سفلی مریض بالای بستر قرار گرفته طوری که حالت eversion و کمی قبض را در زانو داشته باشد. سپس پا را اندکی dorsiflex نموده و ضربه‌یی به وتر Achilles وارد نمایید.

وضعیت دیگر برای آن این است که از مریض بخواهید تا بالای چوکی زانو بزند طوری که هر دو پای وی از چوکی به طرف زمین باشند. به وتر Achilles ضربه بزنید. **نتیجه:** عضلات ساق تقلص نموده و پا وضعیت plantar flexion را به خود می‌گیرد.

تعصیب: S1, S2.

یادداشت:

- تمام عکسات فوق در آفات نیورون حرکی علوی تشدید شده و در آفات نیورون حرکی سفلی خفیف می‌شوند.
- در myxoedema کاهش می‌یابند یعنی زمان استرخای شان طولانی می‌شود. طولانی شدن زمان استرخا در ankle jerk بهتر تشریح می‌شود.
- ضیاع یک عکسه نشان می‌دهد که صدمه در آن جذر نخاعی است که jerk مذکور را تعصیب می‌نماید.
- **Crossed reflex:** در آفات نخاع شوکی عکس‌العمل عکسوی در اثنای معاینه یک طرف در طرف مقابل نیز موجود می‌باشد. طوری که با معاینه knee jerk چپ عکس‌العمل عکسوی در طرف راست ایجاد می‌شود.
- **علامه Rossolimo:** این علامه همتای علامه Hoffmann در اطراف سفلی است. در این صورت فلنکس‌های بعیده پنجه پا را با دست به وضعیت بسط

قرار دهید عکس‌العمل مثبت عبارت از plantar flexion تند انگشت بزرگ است. این علامه hyperreflexia پتالوژیک را نشان می‌دهد.

● **Finger jerk:** انگشتان اشاره و متوسط خود را در مقابل سطح راحی فلنکس‌های قریبه انگشتان در حال بسط قرار دهید. سپس ضربه‌یی با چکش وتری بالای انگشتان خود وارد نمایید. در حالت نارمل انگشتان مریض یک قبض جزئی را نشان می‌دهد در آفات نیورون حرکی علوی قبض انگشتان شدید می‌باشد.

● **عکسه pectoral:** انگشتان اشاره و متوسط خود را بالای کنار وحشی عضله pectoralis قرار دهید با چکش وتری ضربه‌یی به آن وارد کنید. تقلص قابل ملاحظه عضله pectoralis دلالت بر آفات نیورون حرکی علوی می‌نماید.

● **عکسه deltoid:** انگشت شهادت خود را بالای عضله deltoid در بالای شانه مریض قرار دهید. ضربه‌یی به انگشت خود وارد نمایید. تقلص سریع عضله deltoid آفات نیورون حرکی علوی را نشان می‌دهد.

ج. عکسات ارگانیک (معصروی):

عکسات ارگانیک عبارت اند از:

- عکسه تنفس
- عکسه بلع
- عکسه تغوط
- عکسه تبول

درجه‌بندی عکسات: وتری طور ذیل درجه‌بندی می‌شوند:

- ۰ درجه: عدم موجودیت عکسه
- ۱ درجه: موجود است (نارمل)
- ۲ درجه: تند مثل knee jerk نارمل
- ۳ درجه: بسیار تند
- ۴ درجه: clonus

Clonus:

اکثراً زمانی به وجود می‌آید که عکسات وتری تشدید شوند. کلونس ممکن پایدار (sustained) یا ناپایدار (non-sustained) باشد. کلونس پایدار نشان‌دهنده hyperreflexia آفت نیورون حرکی علوی است، در حالی که کلونس ناپایدار در افراد مضطرب و عصبی دیده می‌شود. کلونس به دو نوع است:

- **Patellar clonus:** وتر عضله quadriceps را در کنار علوی رصفه (patella) محکم بگیرید. دو یا سه ضربه ملایم را به طرف سفلی وتر وارد نمایید. در صورت مثبت بودن، سلسله‌ای از تقلصات کلونیک quadriceps را به صورت پایدار خواهید دید patella یکجا با آن حرکت می‌کند.
- **Ankle clonus:** زانوی مریض را قبض نمایید مفصل زانو را نیز به یک اندازه کم قبض نمایید و با دست خود آن را استناد بدهید. حالا قسمت قدامی پا را با دست دیگر خود محکم گرفته و دو تا سه حرکات dorsiflexion را آنجا انجام دهید. در هنگام حرکات dorsiflexion فشار بالای کف پا باید به صورت دوامدار حفظ شود. در صورت مثبت بودن عکسه، شما تقلصات دوامدار را در عضلات ساق خواهید دید همچنان اهتزازات مکرر را در مفصل بجلک خواهید دید.

طرز ایستادن (Postural Stability / Stance)

توسط این‌ها حفظ می‌شود:

- عصب vestibular (برای موقعیت و حرکت رأس)
 - حسیت عمیقه (proprioception) از عنق، عضلات محوری، تنه، پاها و مفاصل بدن.
 - مخیخ.
- معلومات که از ثبات وضعیتی حاصل می‌شوند با معلومات بینایی درباره موقعیت شخص ترکیب گردیده بالآخره stance را به وجود می‌آورد.

ارزیابی Stance:

- **Romberg's test:** مریض در مقابل شما طوری ایستاد شود، که پاهایش با هم نزدیک باشند. حالا برایش بگویید که چشمانش را ببندد. در صورتی که نقایص در طرق دهلیزی (vestibular pathway) یا طرق حسیت‌های عمیق (proprioception)، مثلاً تخریب الیاف خلفی که اکثراً در tabes dorsalis دیده می‌شود، موجود باشد مریض قادر به نگهداشتن ثبات خود نبوده و خواهد افتاد (sensory ataxia). در امراض مخیخی مریض در حالی که پاهایش با یکدیگر نزدیک باشد و چشمانش نیز باز اند قادر به نگهداشتن ثبات خود نمی‌باشد (motor ataxia).
- **Unterberger's test:** این معاینه برای تشخیص آفات دهلیزی به کار می‌رود. از مریض بخواهید که با چشمان بسته به طرف بالا و پایین به صورت سریع خیز بزند بعد از توقف آن مریض به طرف آفت دور خواهد خورد.
- **تست عکسه وضعیتی (postural reflex test):** از مریض بخواهید که ایستاد شود. حالا مریض را دفعه‌تاً از شانه‌هایش کش یا تيله نمایید. یک شخص نارمل با این وضعیت بدن خود را حفظ خواهد کرد. در مرض پارکنسنیسم، مرض عقدات (قاعدوی) و آفات فص جبهی با این حرکت مریض تعادل خود را از دست می‌دهد و قادر به حفظ ثبات خود نمی‌باشد.

طرز رفتار (Gait)

اگر مریض قادر به راه رفتن باشد از وی بخواهید که بالای یک سطح هموار در امتداد یک خط مستقیم رسم شده قدم بزند.

اشکال غیر نارمل رفتار (gait) قرار ذیل اند:

- **رفتار اسپاستیک (spastic gait):** به نام sticky gait نیز یاد می‌شود. در مریضان که آفات یک‌طرفه طرق هرمی داشته باشند، دیده می‌شود. مریض در قبض کردن مفصل زانو مشکل داشته، لذا انگشتان پای خود را بالای زمین توسط برگرداندن پای خود در هر گام کش می‌کند. چنانچه وی به طرف قدام گام برمی‌دارد وی ران خود را بالا کرده و به قدام به شکل نیم دایره تاب می‌خورد.

- **رفتار قیچی مانند (scissor gait):** در وقت رفتار، پاها یکدیگر را مانند قیچی تصالب می‌نمایند و در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - آفات دو طرفه نیورون‌های حرکی علوی
 - فلج دو طرفه مخ (ولادی).
- **رفتار پارکنسنی (festinant gait):** هنگام قدم زدن مریض خود را به قدم خم کرده و قدم‌های بسیار کوچک برمی‌دارد به نام shuffling gait نیز یاد می‌شود دست‌های وی تاب نمی‌خورند.
- **پدیده retropulsion:** اگر یک مریض پارکنسن دفعه‌تاً به طرف عقب کش شود به قدم زدن به طرف عقب شروع کرده و قادر به توقف خود نمی‌باشد.
- **رفتار مستانه (drunken gait):** در مریضان با آفات مخیخی دیده می‌شود. در این صورت مریض در یک ساحه بزرگ قدم می‌زند و در وقت رفتار قدم‌ها را به فاصله زیاد از یکدیگر می‌گذارد. مریض قادر به قدم زدن بالای یک خط مستقیم نمی‌باشد، یعنی قادر به گذاشتن پاشنه پا در قدام پنجه پای دیگر نمی‌باشد.
- **رفتار مرغابی مانند (waddling gait یا oscillating gait):** مانند رفتار مرغابی می‌باشد در این صورت مریض در وقت رفتار خود را به یک طرف و بعداً به طرف دیگر مایل می‌سازد و پنجه و پاشنه پا خود را در عین وقت بالای زمین می‌گذارد. در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - خلع دو طرفه مفصل زانو به شکل ولادی
 - pseudohypertrophic muscular dystrophy
- **رفتار با گام‌های بلند (high-stepping gait):** این نوع رفتار در مریضان که foot drop را از باعث فلج عصب peroneal یا آفت عصب L5 داشته باشند دیده می‌شود در هنگام قدم زدن مریض پای خود را بسیار بلند کرده و دوباره به زور بالای زمین می‌زند.
- **Apraxic gait:** در این نوع مریض مفهوم قدم زدن را فراموش می‌کند یعنی گام‌های بسیار خورد و بسیار محکم برمی‌دارد. در مریضان مصاب آفات فص جداری دیده می‌شوند.

- رفتار دهلیزی (vestibular gait): مریض در هنگام قدم زدن به طرف آفت دهلیزی کج می‌شود.

معاینه مخیخ (Cerebellum)

مخیخ ریت، محدوده ریتم و قوت تقلصات عضلات را تنظیم می‌نماید. آفات مخیخ وظایف آن را متأثر می‌سازد در صورت مأوف شدن آن علایم ذیل به وجود می‌آیند:

- ضعف (asthenia): عضلات ضعیف خواهند بود.
- ناهماهنگی حرکی (ataxia): از سبب ناهماهنگی مریض با چشمان باز قادر به قدم زدن بالای یک خط مستقیم نمی‌باشد.
- Adiadochokinesis (dysdiadochokinesis): به معنی ضیاع حرکات متناوب مکرر است.

● تست:

- از مریض بخواهید که مفصل آرنج خود را به زاویه ۹۰ درجه قبض نموده و ساعد خود را دفعتاً pronate و supinate نماید. مریض در انجام این کار قادر نخواهد بود یعنی حرکات وی بطی و نامکمل خواهند بود.

- از مریض بخواهید که کف دست شما را با نوک انگشتان خود به سرعت ضربه بزند. مریض قادر به این عمل نمی‌باشد.

- از مریض بخواهید که یک کف دست خود را بلند گرفته، سپس بالای کف دست و بعداً بالای سطح دست دیگر خود به سرعت بزند. او قادر به این کار نخواهد بود.

● ناهماهنگی (asynergia):

● تست:

● در طرف علوی:

- تست انگشت به بینی (finger to nose test): از مریض بخواهید تا اولاً انگشت شهادت شما را (که تقریباً دو فوت از وی فاصله دارد) با انگشت شهادت خود تماس دهد و سپس به بینی خود تماس

دهد. انگشت خود را تغییر موقعیت داده و از مریض بخواهید که عمل قبلی را با سرعت بیشتر انجام دهد مریض قادر به این عمل نخواهد بود.

- از مریض بخواهید که یک دایره بزرگ خیالی را در هوا توسط انگشت شهادت خود ترسیم نماید. او قادر به این عمل نمی‌باشد.

● در طرف سفلی:

- تست پاشنه ساق (heel-shin test): مریض باید در بستر به وضعیت اضطجاع ظهري قرار داشته باشد از مریض بخواهید که پاشنه یک پا را بالای زانوی پای دیگر خود قرار داده و آن را در طول ساق مالش دهد. بعداً پاشنه پای خود را بلند کرده و دوباره بالای زانو قرار دهد. مریض قادر به این عمل نخواهد بود.

- تست پاشنه پنجه (heel-toe test): از مریض بخواهید که بالای یک خط مستقیم طوری قدم بزند که پاشنه یک پا با پنجه پای دیگر به صورت مستقیم در تماس باشد و قدم بزند (tandem gait).
- از مریض بخواهید که یک دایره بزرگ را در هوا توسط پنجه پای خود رسم نماید. وی قادر به این عمل نخواهد بود.

- **علامه Romberg:** قبلاً در بخش stance توضیح گردید.

- **وضعیت غیر نارمل (abnormal posture):** در آفات یک‌طرفه مخیخ مریض به طرف آفت کج شده می‌باشد یعنی رأس به طرف آفت کج و شانه همان طرف شکل آویزان را می‌داشته باشد اگر آفت مخیخی دو طرفه باشد، هیچ وضعیت غیر نارمل دیده نمی‌شود.

- **عدم مقویت (atonia):** به معنی ضیاع مقویت عضلی می‌باشد. معاینه مقویت عضلی قبلاً تشریح گردید.

- **پدیده برگشت (rebound phenomenon):** از مریض بخواهید که آرنج خود را آهسته قبض نماید. حالا از مریض بخواهید تا آن را در مقابل یک مقاومت قبض نماید یعنی دست‌اش را محکم بگیرید و بعداً دفعتاً رها نمایید. مریض

دفعه‌تاً به روی خود خواهد زد که نشان‌دهنده پدیده برگشت می‌باشد که در اشخاص نارمل منفی می‌باشد.

● **Nystagmus**: عبارت از حرکات غیر ارادی زوجی، رتمیک و ارتعاشی کره‌های چشم است به شکل افقی، عمودی یا دورانی می‌باشد. چشمان در یک مسیر نسبت به مسیر دیگر سریع‌تر حرکت می‌کنند. در آن سمت که چشم‌ها سریع‌تر حرکت می‌کنند در همان طرف nystagmus وجود دارد.

● **تست**: از مریض بخواهید که به پیشروی خود مستقیماً نگاه کند و بعداً به چشمانش نگاه کنید که ثابت باقی می‌ماند یا خیر. حالا یک پنسل یا انگشت شهادت خود را به فاصله $\frac{1}{2}$ فوت در پیشروی مریض در مقابل چشم‌هایش قرار بدهید. حالا همین شی را به طرف راست بعد به طرف چپ بعداً به طرف بالا سپس به طرف پایین حرکت داده و برای یک مدت در همان طرف توقف دهید. حالا از مریض بخواهید که چشمانش را بدون تدور رأس به طرف شی حرکت دهد در حالات مثبت، شما حرکات رتمیک ارتعاشی را در چشم‌ها مشاهده خواهید کرد. دامنه حرکت، تعادل و تعداد nystagmus را ملاحظه نمایید.

● **Scanning speech**

● **Drunken gait**

● **Intention tremors**

● **Past pointing**

یادداشت: ترکیب تکلم بریده بریده، nystagmus و رعشه قصدی باهم به نام سه پایه Charcot یاد می‌شود.

(۹) تشوشات تروفیک

در امراض سیستم عصبی، تغذیه قسمت ماؤوفه به تشوش دچار می‌شود. وقتی که یک طرف فلج می‌شود، سیستم خودکار یا اتونوم آن به تشوش دچار می‌شود.

زمانی که یکجا با آن سیستم حسی نیز ماؤوف شود، در آن طرف تشوشات تروفیک یا تغذیوی به وجود می‌آید.

تشوشات تغذیوی در قسمت‌های ذیل به وجود می‌آیند:

- **عظام:** عظام بالآخره شکنند شده یا کسرهای خود بخودی در آن به وجود می‌آید (osteopathy).
- **مفاصل:** ممکن انصباب بدون درد یا بدون اتروفی موجود باشد (arthropathy).
- **جلد:** احمرار، تقرح، زخم بستر یا صباغات ممکن مشاهده شوند. تقرحات معمولاً بالای انگشتان یا کف پا ظاهر می‌گردد. بعضاً از باعث تشوشات اروایی گانگرن نیز به وجود آمده می‌تواند.
- ریزش موها، خشکی جلد و شکننده‌گی ناخن‌ها نیز معمول می‌باشد.
- **عضلات:** ممکن اتروفی نمایند.

(۱۰) معاینه سیستم عصبی اوتونومیک

آفات زنجیر سمپاتیک رقبی باعث نقیصه‌های ذیل می‌شود:

- سقوط پلک (ptosis)
 - فرورفتن کره چشم به داخل (enophthalmos)
 - تقبض حدقه (miosis)
 - عدم تعرق (anhidrosis)
 - ضیاع عکسه cilio-spinal
- علائم فوق در طرف ماؤوفه موجود می‌باشد. ۵ علامه فوق مجموعاً به نام سندروم Horner یاد می‌شوند.

عکسه Ciliospinal: یک طرف عنق را نیشگون کنید. در عین زمان توسع حدقه را مشاهده خواهید کرد توسع از سبب تنبیه سیستم سمپاتیک به وجود می‌آید. این عکسه در امراض زنجیر سمپاتیک رقبی از بین می‌رود.

یک تعداد حالات دیگر که در آن وظایف سیستم عصبی خودکار برهم می‌خورند عبارت اند از:

- **مانور Valsalva:** تأثیر مانور Valsalva موجود نخواهد بود، یعنی جهد زفیری قوی با بستن دهن و بینی باعث تنقیص نبض نخواهد شد.
- فشار خون و تعداد نبض در حالت ایستاده به صورت نارمل بالا می‌رود. در حالی که در آفات سیستم عصبی خودکار چنین حالت دریافت نمی‌شود.
- **تفریط فشار وضعیتی:** مریضان تفریط فشار وضعیتی پیدا خواهند کرد. برای معاینه آن اولاً فشار خون مریض را که در بستر دراز کشیده چک نمایید، بعداً از مریض بخواهید که ایستاد شود فشار خون را سه دقیقه بعد چک کنید. یک سقوط ۲۰ ملی‌متر ستون سیماپ در فشار سیستمولیک بیانگر عدم کفایه کنترل سیستم خودکار می‌باشد.
- **تست تنفس‌های عمیق:** در حالی که مریض در بستر استراحت است تعداد نبض را حساب کنید. حالا از مریض بخواهید که برای ۶ بار تنفس عمیق کند. تعداد نبض را یادداشت نمایید کاهش تعداد ضربان به کمتر از ۱۰ ضربان فی دقیقه نشان‌دهنده عدم موجودیت کنترل سیستم عصبی خودکار می‌باشد.
- **چنگ گرفتن دست:** فشار دادن دست یک شخص نارمل باعث افزایش فشار خون می‌شود. عدم ازدیاد فشار خون نشان‌دهنده از بین رفتن کنترل سیستم عصبی خودکار می‌باشد.

(۱۱) علایم تخریش سحایا

علایم ذیل در صورت تخریش سحایا (meningeal irritation) دیده می‌شود:

- **شخی گردن (neck rigidity):** دست خود را در خلف ناحیه قفوی مریض گذاشته و تلاش نمایید تا عنق وی را به حالت قبض درآورید و فک سفلی (زنج) وی با صدر تماس پیدا نماید. به صورت نارمل، فک سفلی بدون درد و سختی با صدر تماس می‌نماید اما در صورت تخریش سحایا زنج با صدر تماس پیدا کرده نمی‌تواند زیرا مریض احساس درد می‌نماید. شخی گردن در امراض فقرات رقبی نیز به وجود آمده می‌تواند.
- **علامه Kernig:** مفصل ران را به صورت مکمل قبض نمایید و کوشش نمایید تا پا را در قسمت زانو بسط دهید در صورت مثبت بودن مریض احساس درد

را از باعث سپازم عضلات hamstrings خواهد نمود. اگر شخی گردن منفی و علامه Kernig مثبت باشد نشان می‌دهد که مریض مصاب تخریش سحایای شوکی است.

● علامه Brudzinski:

- **میتود:** گردن مریض به صورت هموار بالای بستر قرار بگیرد. تلاش کنید که عنق مریض را قبض نمایید این عمل باعث قبض هر دو مفصل زانو می‌شود در حالت نارمل قبض زانوها دیده نمی‌شود.
- **میتود پا:** یک پا را در مفصل زانو و ران قبض کنید. پای دیگر به طور خودکار در زانو قبض خواهد شد.

جدول مقایسه‌ای نیورون حرکی سفلی و علوی:

علامه	UMN	LMN
تون	↑ (spasticity)	↓ (flaccid)
اتروفی	ندارد/خفیف	واضح
fasciculation	ندارد	موجود
عکسات عمیق	↑ + clonus	↓ / معدوم
Babinski	مثبت (extensor)	منفی (flexor)
توزیع فلج	گروهی از عضلات/طرف	عضلات منفرد/عصب

جدول خلاصه ۹.۳: علایم کلیدی UMN و LMN

نیورون حرکتی سفلی	نیورون حرکتی علوی
۱. عضله واحد فلج می‌شود.	۱. فلج، حرکات گروهی از عضلات را متأثر خواهد ساخت.
۲. تون عضلات کاهش می‌یابد.	۲. تون عضلات متزاید می‌باشد.
۳. اتروفی عضله ماؤوفه موجود می‌باشد.	۳. اتروفی عضلی موجود نیست.
۴. حرکات غیر ارادی مثلاً fasciculation موجود می‌باشد.	۴. حرکات غیر ارادی موجود نمی‌باشد.
۵. علامه Babinski منفی می‌باشد.	۵. علامه Babinski مثبت می‌باشد.
۶. عکسات عمیق متناقض یا معدوم می‌باشد.	۶. عکسات عمیقه شدت کسب می‌کنند.
۷. Clonus موجود نمی‌باشد.	۷. Clonus موجود می‌باشد.
۸. تغییرات تروفیک موجود می‌باشند.	۸. تغییرات تروفیک موجود نمی‌باشد.
۹. عکس‌العمل استحالوی در تحریک برقی موجود می‌باشد.	۹. عکس‌العمل استحالوی موجود نمی‌باشد.
۱۰. آفات در عصب یا آفات حجرات قرن قدامی.	۱۰. —
۱۱. شروع آن به صورت آنی می‌باشد.	۱۱. شروع مرض تدریجی می‌باشد.
۱۲. هر دو سیستم حرکتی و حسی مصاب می‌باشد.	۱۲. تنها سیستم حرکتی مصاب می‌باشد.
۱۳. اختلالات معصروی موجود می‌باشد.	۱۳. تشوشات معصروی موجود نمی‌باشد.

معاینه مریضان فاقد شعور:

برای وضع تشخیص یک مریض فاقد شعور نخست باید تاریخچه از دوستان یا اقارب اخذ گردد، بعداً معاینه مریض باید به طور مفصل انجام شود و در اخیر معاینات لابراتواری اجرا شود.

تاریخچه:

- تاریخچه سقوط، ترضیض، تصادم یا کدام صدمه دیگر.
- تاریخچه اخذ دواء، الکول یا مخدرات دیگر.
- تاریخچه تب، استفراغ، اسهال، اختلاج.
- تاریخچه امراض قلبی، کبدی و کلیوی.
- تاریخچه فرط فشار خون، دیابت، استمای قصبی یا امراض روانی.

معاینه کلینیکی:

- در صورت آسیب، تصادم یا ترضیض، قحف و فقرات را برای دریافت کسور معاینه نمایید. ضیاع بیش از حد خون باعث شک می‌گردد.
- **معاینه فشار خون:** فرط فشار خون زمینه را برای CVA مساعد می‌سازد. اگر فشار خون قابل ثبت نباشد نشان‌دهنده شک است.
- **نبض:** نبض غیر منظم اریتمیای قلبی را نشان می‌دهد. ممکن باعث امبولی گردد.
- **تنفس:** تنفس رتمیک دوره‌یی و انحطاطی ممکن بیانگر عدم کفایه تنفسی باشد.
- **درجه حرارت:** درجه حرارت بلند در encephalitis، meningitis، هوای گرم (heat stroke) و خونریزی حده دیده می‌شود. سردی اطراف در hypothermia و شک دیده می‌شود.
- **بوی تنفس:** بوی میوه‌یی در کیتو اسیدوز دیده می‌شود. بوی الکولی و مواد مخدر در حالت که الکول یا اوپیوم یا داتوره استفاده شده باشد احساس می‌شود. بوی ماهی مانند در کوما ی کبدی موجود می‌باشد بوی موش مانند در یوریمیا حس می‌شود.
- **یرقان:** در کوما ی کبدی موجود می‌باشد.

- **سیانوز:** در امراض پیشرفته امراض قلبی و تنفسی دیده می‌شود.
- **دی هایدریشن:** زبان خشک، چشمان فرورفته و جلد غیر ایلاستیک در hypovolemic shock از سبب ضیاع بیش از حد آب مثلاً در اسهالات و استفراغات شدید و طولانی مدت به وجود می‌آید. گرم‌زده‌گی و کیتواسیدوز شدید نیز سبب دی هایدریشن شدید می‌شود.
- **شخی گردن:** در تخریش سحایا، encephalitis، ملاریای دماغی و خونریزی تحت عنکبوتیه دیده می‌شود.
- **معاینه حدقه‌ها:** حدقه‌های متوسع و دو طرفه که تثبیت شده باشند در تخریب دماغ متوسط دیده می‌شود. حدقه‌های متوسع که در مقابل نور عکس‌العمل نشان دهد در تسممات داتوره و اخذ بیش از حد دواهای ضدافسرده‌گی برای سایکلیک دیده می‌شود. حدقه‌های نقطوی دو طرفه در تسممات اوپیوم، فاسفورس‌های عضوی و خونریزی‌های حذبوی دیده می‌شود. حدقه متوسع تثبیت شده یک‌طرفه نشان‌دهنده کتلالت دماغی یا CVA می‌باشد. از بین رفتن حرکت چشم گدی (doll's eye movement) از باعث آفات ساق دماغی می‌باشد.
- **معاینه برای Doll's eye movement:** رأس مریض را در بین هر دو دست تان بلند بگیرید. توسط انگشت‌های شست هر دو پلک را بلند نموده و با ملایمت چشم‌ها را باز نمایید. حالا رأس را به طرف راست و چپ به زاویه ۷۰ درجه و بعداً عنق را به ترتیب قبض و بسط دهید در هنگام اجرای این عمل به حرکت چشم‌ها نگاه کنید با حرکت راس چشم‌ها به عین طرف حرکت نموده و در صورت نارمل بودن دوباره به موقعیت اصلی برمی‌گردد. در صورت آفات ساق دماغی دوباره به حالت دومی بر نمی‌گردد بلکه به طرف که رأس حرکت نموده باقی می‌ماند.
- **Fundoscopy:** برای دیدن papilledema اجرا می‌گردد.
- **معاینه سیستم قلبی و عایی:** موجودیت مرم و اریتمیا نشان‌دهنده پدیده امبولیک است.

- **معاینه سیستم عصبی مرکزی:** عکسات و تون عضلات معاینه شوند و نیز کوشش شود تا موقعیت آفت تعیین گردد.

معاینات لابراتواری:

معاینات بیوشیمیک خون از قبیل سویه شکر، معاینه وظایف کبدی (LFTs)، urea، creatinine و سویه الکترولیتها باید تعیین گردد. کیتونهای ادرار باید تعیین گردد. بالآخره LP صورت گیرد.

معاینه برای مرگ دماغی:

قبل از اجرای معاینه برای مرگ دماغی لازم است تا اسباب تخریب غیر رجعی دماغ مانند encephalitis، CVA، meningitis دریافت گردد.

عوامل قابل برگشت از قبیل hypothermia، تسممات دوائی و تشوشات متابولیک مانند hypoglycemia، uremia، ketoacidosis و کومای کبدی باید رد گردند. درجه حرارت مرکزی بدن باید ۳۶ درجه سانتیگرید یا بیشتر باشد (AAN 2023) ماشین تهویه باید موجود باشد.

از بین رفتن وظایف ذیل نشان دهنده مرگ دماغی می باشد:

- عکسه حدقه ها در مقابل نور
 - عکسه قرنیه
 - عکسه عینی دهلیزی (oculovestibular reflex)
 - عکسه اغ زدن
 - عکسه سرفه
 - تنفس خود بخودی زمانی که فشار CO2 شریانی به ۶۰ ملی متر ستون سیماپ یا بیشتر برسد (AAN 2023).
 - عکس العمل در مقابل تنبهاات دردناک در قلمرو اعصاب قحفی
- معاینه برای مرگ دماغی باید توسط دو متخصص مجرب به صورت گروهی یا به صورت جداگانه صورت بگیرد.
- این معاینات بعد از ۲۴ ساعت دوباره تکرار گردند.

تعیین محل آفت در سیستم عصبی مرکزی:

۱. آفت در قشر: اعراض و علایم:

- monoplegia
- اختلاجهای Jacksonian

۲. آفت در corona radiata: اعراض و علایم:

- hemiplegia ناتام
- hemianesthesia ناتام

۳. آفت در کپسول داخلی: اعراض و علایم:

- Hemiplegia ناتام
- Hemianesthesia ناتام
- آفت supranuclear زوج هفتم

۴. آفت در دماغ متوسط: اعراض و علایم:

● Weber syndrome

- ماؤوفیت عصب سوم یک طرف
- در طرف مقابل hemiplegia

● Benedict's syndrome

- ماؤوفیت عصب سوم یک طرف
- hemianesthesia و رعشه در طرف مقابل

۵. آفت در محل اتصال دماغ متوسط با حده: اعراض و علایم:

- آفات supranuclear عصب هفتم به صورت دو طرفه
- ضیاع conjugate افقی، انحراف چشم

۶. آفت در حده: اعراض و علایم:

- ماؤوفیت عصب پنجم، ششم، هفتم و هشتم یک طرف
- در طرف مقابل hemiplegia
- حدقه نقطوی

- تب
- سقوط پلک (ptosis)
- فرورفتن چشم (enophthalmos)
- **Foville's syndrome**: ماؤوفیت عصب ششم و هفتم در یک طرف و در طرف مقابل hemiplegia

۷. آفت در بصله: اعراض و علایم:

- اگر آفت در مرکز بصله باشد: quadriplegia موجود خواهد بود، زیرا طرق هرمی در این ساحه تصالب می‌نماید.
- اگر آفت کمی به طرف وحشی باشد:
- عصب دوازدهم یک طرف فلج می‌باشد
- در طرف مقابل hemiplegia
- اگر آفت در ناحیه گوه‌مانند بصله باشد به نام سندروم postero-inferior cerebellar artery یا سندروم Wallenberg نیز یاد می‌شود:
- یافته‌های عین طرف:

- Hemianesthesia نصف وجه
- سندروم Horner
- حرکات آن نصف کام از بین می‌رود
- اعراض و علایم آفات مخیخی
- دریافت‌ها در طرف مقابل: تنها hemianesthesia موجود می‌باشد.

۸. آفت در فص جداری: اعراض و علایم:

- گم گشتگی
- Apraxia، یعنی از بین رفتن حرکات ماهرانه
- Agnosia، یعنی ناتوانی در شناخت اشیا
- بی‌توجهی حسی (allocheiria)
- Dysphasia أخذوی

۹. آفت در نخاع (قطع نصف نخاع) (بالتر از سویه C5) (Brown-Séquard syndrome): اعراض و علائم پایینتر از سویه آفت:

- علائم در عین طرف آفت:
 - اختلال تماس سطحی
 - تشوش در حسیت اهتزاز
 - علائم طرق قشری نخاعی
 - علائم در طرف مقابل آفت:
 - اختلال حسیت درد
 - اختلال حسیت حرارت
 - در سویه آفت:
 - hyperpathia (درد) ناحیه سگمنتل
 - بعضاً علائم نیورون حرکی سفلی در این سویه (یعنی در بازو)
- ## ۱۰. آفت در cauda equina: اعراض و علائم:
- اتروفی عضلی در پاها (عضلات ساق)
 - انستیزی زمینمانند در اطراف مقعد
 - paresthesia نوع نیورون حرکی سفلی
 - تشوشات معصروی

یادداشت: یک اصل عمومی در مورد محل آفت اینست که اگر hemiplegia در یک طرف باشد و اعصاب قحفی در طرف دیگر مأوف شده باشد محل آفت در ساق دماغی (در دماغ متوسط یا حدبه یا بصله) موقعیت دارد اما اگر hemiplegia و مأوفیت اعصاب قحفی در عین طرف باشد آفت بالاتر از ساق دماغی موقعیت دارد یعنی ممکن در کپسول داخلی یا قشر (crossed radiation) باشد.

بذل قطنی (Lumbar Puncture):

استطابات:

- به هدف تشخیص اگر یکی از حالات ذیل موجود باشد:
- تخریش سحایا
- کوما
- شواهد خونریزی‌های تحت عنکبوتیه
- انتانات دماغی
- بذل قطنی برای اهداف تشخیصیه در encephalography که هوا زرق می‌شود و myelography که مواد کثیفه زرق می‌شود استفاده شده می‌تواند.
- به هدف تداوی در meningitis تطبیق انتی‌بیوتیک در مسافه تحت عنکبوتیه.
- برای انسستیزی نخاعی زرق مواد انسستیک توسط intrathecal puncture.

مضاد استطباب:

- فشار خون پایین‌تر از ۱۰۰ ملی‌متر ستون سیماب
- شک شدید.
- افزایش فشار داخل قحف که توسط papilledema نشان داده می‌شود.
- انتان موضعی در ناحیه بذل قطنی

وضعیت مریض هنگام پروسیجر: مریض به یک جانب در کنار بستر قرار گرفته طوری که زانوهای را بالا گرفته و رأس خود را به قدام خم نماید تا قبض اعظمی فقرات حاصل شود.

ساحه زرق: معمولاً مسافه بین فقرات ۳ و ۴ یا ۴ و ۵ انتخاب می‌شود. قابل ذکر است که خطی که بلندترین نقطه iliac crest ها را با هم وصل می‌نماید به فاصله بین شوک‌های فقرات ۴ و ۵ مطابقت می‌نماید.

میتود: جلد ناحیه مورد نظر را توسط سپریت یا یک انتی‌سپتیک دیگر تعقیم نمایید. سپس ناحیه تعقیم شده به شمول جلد و صفاق را توسط یک انسستیک موضعی پروکاین (۲٪) بی‌حس نمایید. سوزن معقم بذل قطنی را در ناحیه تعقیم شده در خط متوسط به طرف قدام و خفیفاً به طرف بالا حرکت دهید تا به spinous ligament برسد و آن را سوراخ کند. از بین رفتن آنی مقاومت نشان

می‌دهد که سوزن dura را عبور نموده و به مسافه intrathecal داخل شده است. ستلیت بعداً برطرف می‌شود. مایع باید به یک باره‌گی خارج گردد. این مایع در یک تست تیوب اخذ گردیده و برای معاینات بیوشیمی، میکروسکوپی، کشت و تست حساسیت به لاپراتوار فرستاده می‌شود. سوزن خارج گردیده و ناحیه و خذ شده جلد باید توسط یک پارچه گاز که در محلول آیودین مغطوس شده باشد، پوشانده شود.

اهمیت: رأس مریض توسط بالا کردن نهایت پایین بستر پایان کرده می‌شود. این وضعیت باید برای ۲-۳ ساعت حفظ گردد.

ارتباط علائم فیزیکی با امراض عصبی:

:Parkinsonism

یک مرض طرق خارج هرمی است تظاهرات کلینیکی آن قرار ذیل اند:

- قیافه بدون تجلی وجه (مشابه به نقاب)
- وضعیت قبض
- رعشه هنگام استراحت بالخصوص انگشت شست و انگشتان (حرکات pill rolling را نشان می‌دهد).
- حرکات بطی می‌باشند.
- مقویت عضلات افزایش می‌یابد این افزایش مقویت از نوع چرخ دندانه‌دار (cog wheel) می‌باشد، یعنی هنگام معاینه مقویت عضلی یک تعداد تکان‌های خود بخودی عضلی در عضلات دیده می‌شود هاپیرتونیای بعضاً از نوع لوله سربی (lead pipe) می‌باشد، یعنی پایدار و متداوم می‌باشد. این حالت وقتی مشاهده می‌شود که رعشه قابل ملاحظه نباشد.
- تکلم مریض یک‌نواخت می‌باشد. Gait از نوع shuffling می‌باشد. یعنی، بازوها هنگام قدم زدن تاب نمی‌خورند.
- مریض بسیار کوچک کوچک می‌نویسد (micrographia).
- در این مریضان تست ضربه زدن glabella مثبت می‌باشد، یعنی هر قدر توسط انگشت شهادت بالای وسط پیشانی مریض ضربه وارد نمایید به همان اندازه

زیاد پلک می‌زند. در حالی که در اشخاص نارمل پلک زدن‌ها موجود می‌باشد، اما بعداً توقف می‌نماید.

- فشار خون مریضان معمولاً پایین می‌باشد.

:Meningitis

عبارت از التهاب سحايا است تظاهرات کلینیکی آن قرار ذیل اند:

- مریض قیافه توکسیک دارد.
- استفراغ فورانی دارد.
- از سردردی شدید شاکی می‌باشد.
- اکثر مریضان نیمه به هوش می‌باشند.
- شخی گردن موجود می‌باشد.
- علامه Kernig مثبت می‌باشد.
- شاید فلج یکی از اعصاب قحفی موجود باشد.

مریض فاقد شعور:

مریض توسط افراد دیگر به شفاخانه آورده می‌شود در حالی که حکایه می‌نمایند که وی را در کنار جاده به حالت فاقد شعور یافته‌اند. مریض طوری ذیل معاینه می‌گردد:

- **تفتیش عمومی:** علایم ترضیض یا آسیب دماغ را ببینید.
- **تنفس:** شکل تنفس را ملاحظه کنید:
- تنفس Cheyne Stokes نشان‌دهنده ترضیض قحفی است.
- تنفس عمیق و سریع (تنفس Kussmaul) بیانگر اسیدوز است.
- تنفس غیر منظم (تنفس Biot) بیانگر آفت شدید ساق دماغی است.
- **دوران خون:** نبض و فشار خون را چک نمایید.
- نبض غیر منظم بیانگر اریتمیای قلبی است بیهوشی ممکن از سبب پدیده امبولیک ناشی از اریتمیا قلبی باشد.

- فشار بلند خون نشان‌دهنده CVA یا hypertensive encephalopathy می‌باشد.
- تفریط فشار خون بیانگر شاک می‌باشد.
- دریافت‌های دی هایدریشن و درجه بلند حرارت نشان‌دهنده hyperpyrexia یا گرم‌زده‌گی است.
- اگر سیانوز موجود باشد امراض ذیل باید جستجو گردند:
 - امراض سیانوتیک قلبی
 - عدم کفایه تنفسی
 - تسممات
 - توقف قلبی
- **وضعیت:** وضعیت مریض را مشاهده نمایید. انواع آن عبارت اند از:
 - عقب رفتن گردن در مریضان مصاب meningitis دیده می‌شود.
 - وضعیت باسطه یعنی بازوها بسط بوده به طرف داخل تدور داشته می‌باشد. در حالی که مچ دست‌ها قبض بوده و پاها بسط می‌باشد که به نام وضعیت decerebrate نیز یاد می‌شود در آفات دماغ متوسط این حالت مشاهده می‌شود.
 - وضعیت قابضه یعنی قبض و تدور انسی دست‌ها و بسط پاها، یعنی وضعیت decorticate در این حالت آفات اکثراً بالاتر از ساق دماغ موجود می‌باشد.
- **حرکات غیر ارادی:** موجودیت ریشه‌های متکرر یا متداوم بیانگر epilepsy است. ریشه‌های myoclonic در صدمات هاپیوکسیک دماغی به وجود آمده می‌تواند.
- **درجه‌بندی سویه شعور:**
 - درجه ۱: مریض در مقابل تنبهاات صوتی جواب می‌دهد.
 - درجه ۲: مریض در مقابل یک تنبیه دردناک خفیف عکس‌العمل اعظمی نشان می‌دهد.

- **درجه ۳:** مریض در مقابل یک تنبیه دردناک شدید عکس‌العمل کم نشان می‌دهد.
- **درجه ۴:** مریض هیچ جواب یا عکس‌العمل نمی‌نماید.
- **چشم‌ها:** تغییرات حدقه و حرکات چشم گدی را مشاهده نمایید. تفصیل آن قبلاً ارائه شده است.
- **شخی گردن:** معاینه گردد. در صورت موجودیت، تشخیص meningitis وضع می‌گردد.
- **عکسات** در اطراف علوی و سفلی معاینه شوند. نتیجه آن تفسیر گردد.
- اطراف مریض را برای موجودیت علایم زرقیات مشاهده نمایید تا اعتیاد دوایی رد گردد.
- **معاینه سیستمیک:** ریه‌ها، قلب و بطن را به صورت روتین انجام دهید.

معاینات لابراتواری:

- معاینه خون برای یوریا و گلوکوز
- معاینه ادرار برای گلوکوز، کیتون‌ها و پروتئین‌ها
- در صورتی که به موجودیت تسمم مشکوک شدید، محتویات معدی را غرض ارزیابی به لابراتوار بفرستید.





فصل دهم

معاینه ولادی

تاریخچه

اخذ تاریخچه یک واقعه ولادی با واقعات طبی یا جراحی فرق دارد.

طرز العمل اخذ تاریخچه ولادی قرار ذیل است:

- اسم مریضه
- سن
- دین
- محل سکونت
- تاریخ ازدواج
- سن در اولین عادت ماهوار (menarche)
- **gravida**: عبارت از تعداد مکمل حمل‌ها بدون در نظر داشت پیامدهای آنها است. مثلاً سقط خود بخودی، سقط‌ها، تولدهای مرده، ولادت‌های نارمل.

- **parity:** عبارت از تعداد تولدهای زنده بعد از هر مدت حمل یا تولدهای مرده بعد از هفته ۲۴ است. مثلاً یک خانم که دو سقط و یک ولادت نارمل داشته و در اثناي معاینه نیز حامله است طور ذیل ارائه می‌گردد:
● Gravid 4, para 1+2 اما $G4=P1+2$.
- **LMP (last menstrual period):** عبارت از اولین روز آخرین عادت ماهوار نارمل است.
- **تاریخ متوقعه ولادت (expected date of delivery - EDD):** تاریخ متوقعه ولادت را می‌توان با قانون Naegele تعیین نمود.
- **قانون ۹ Naegele:** ماه و ۷ روز را با روز اول آخرین عادت ماهوار جمع نمایید، در نتیجه تاریخ تخمینی ولادت حاصل می‌شود. این فورمول در خانم‌هایی صدق می‌کند که عادت ماهوارشان ۲۸ روز باشد. مثلاً یک خانم روز اول آخرین عادت ماهوار خود را ۳ دسمبر بیان می‌کند. حالا نظر به قانون نیگل تاریخ تخمینی ولادت وی عبارت است از:
● ۳ دسمبر + ۹ ماه = ۳ سپتمبر سال آینده؛ ۳ سپتمبر + ۷ روز = ۱۰ سپتمبر سال آینده.
- اوسط مدت حاملگی تقریباً ۴۰ هفته است. تاریخ تخمینی ولادت را با استفاده از کارت حلقوی (چرخ) نیز می‌توان تعیین نمود.

فکتورهای ریسک

فکتورهای ریسک حاملگی باید شناخته شوند. فکتورهای ریسک مهم دوران حاملگی عبارت اند از: فرط فشارخون، diabetes mellitus، امراض کلیوی، ترومبوز وریدهای عمیق، eclampsia، epilepsy و تاریخچه AIDS.

تاریخچه دوائی

اخذ ادویه غرض تداوی امراض مختلفه باید پرسیده شود. اکثریت دواها برای جنین مضر اند. تاریخچه اعتیاد به ادویه و الکول باید گرفته شود.

تاریخچه گذشته

تاریخچه گذشته شامل بخش‌های ذیل است:

- **تاریخچه گذشته طبی:** شامل تاریخچه تب روماتیک، سرخکان، توبرکلوز، سفلیس، امراض قلبی و وعایی، امراض سیستم بولی تناسلی و eclampsia است.
- **تاریخچه گذشته جراحی:** در این رابطه باید از مریض در مورد حوادث ترافیکی، نقل الدم، عملیات‌های سیستم بولی تناسلی پرسیده شود. تاریخچه سقط‌های خود بخودی یا عمدی باید گرفته شود.

تاریخچه خانواده‌گی

تاریخچه دوگانگی‌ها و تولد نوزاد غیر نارمل باید پرسیده شود. در مورد ازدواج‌ها با خویشاوندان باید پرسیده شود، زیرا واقعات تولدهای غیر نارمل از قبیل microcephaly، تأخر دماغی و امراض ارثی در میان خویشاوندان درجه یک بیشتر است.

تاریخچه ولادی

تاریخچه ولادی شامل بخش‌های ذیل است:

- **حمل‌های قبلی:** هر یکی از حمل‌های قبلی باید نظر به شیمای ذیل ثبت گردد:
- شیمای / جدول ثبت:

تعداد	تاریخ ولادت	مدت حمل	اختلال طرز ولاد/محل ولادت	نفاس	تاریخچه فعلی
۱	اکتوبر ۱۹۷۱	۴۰ هفته	- خود بخودی/شفاخانه CS یا خانه	نارمل	-
۲	دسمبر ۱۹۷۳	۳۹ هفته	- خود بخودی	-	-
۳	جنوری ۱۹۷۵	۱۲ هفته تاریخچه اختلاج/ سقط	-	تب	تاریخچه تب

- **حمل فعلی:** تاریخچه مکمل حمل فعلی باید ثبت گردد. به این منظور داکتر باید در مورد وقوع دلبدی صبحانه، افزایش مهبلی، اختلالات بولی، قبضیت و غیره بپرسد.

معاینه کلینیکی

معاینه ولادی

تاریخچه

Naeglele: +۹ (قانون) G/P, LMP, EDD
ماه ۷+ روز، فکتورهای ریسک

معاینه عمومی

BP، وزن، اذیما، خسافت، ادرار (پروتئین)

معاینه بطن

ارتفاع fundus (SFH ≈ هفته حمل)،
مانورهای ۱۶-۱۱/Leopold, FHS/دقیقه

نقشه ذهنی ۱۰.۱: خلاصه معاینه ولادی

معاینه کلینیکی شامل بخش‌های ذیل است:

الف – معاینه فیزیکی عمومی

توضیحات بیشتر در فصل اول ارائه گردیده است. در این صورت باید تأکید خاص بالای اذیما صورت گیرد. اذیما می‌تواند در حمل‌های نارمل در پاها موجود باشد، اما در صورت شدید بودن آن و خصوصاً اگر با albuminuria و فرط فشار خون همراه باشد به یک واقعه pre-eclampsia دلالت می‌کند که باید به آن رسیده‌گی شود. تعیین قد و وزن مریضه با ارزش است. در خانم‌هایی که وزن پایین دارند ریسک تأخر رشد جنین زیاد است و در صورت چاق بودن مادر چانس مصابیت به دیابت و فرط فشار ولادی بسیار زیاد است. هر دو حالت، هم چاقی و هم لاغری با افزایش وفیات زمان حمل و بعد از ولادت همراه است.

ب - معاینه سیستمیک

تفصیل آن قبلاً ذکر گردیده است.

ج - معاینه ولادی

شامل بخش‌های ذیل است:

- معاینه ثدیه‌ها
- معاینه از طریق بطنی (per-abdominal)
- معاینه از طریق مهبل (per-vaginal)

♦ (۱) معاینه ثدیه‌ها

- **تفتیش:** بزرگ شدن ثدیه‌ها به سبب تراکم شحمیات و افزایش عناصر غدوی از جمله تغییرات مترافقه حمل محسوب می‌شوند. ممکن وریدهای برجسته در تحت جلد و striaها نیز مشاهده شوند. حلیمات بزرگتر بوده و انتعاذی می‌باشند. هاله اطراف حلیمات بسیار تاریک خواهد بود. تبارزات متعدد sebaceous که عبارت از غده‌های ضخاموی (tubercle of Montgomery) هستند ممکن در اطراف هاله دیده شوند.
- **جس:** ثدیه‌ها باید با ملایمت جس شوند. با جس ثدیه‌ها ممکن سخت، حساس و نودولیر احساس شوند. تبارزات کوچک و نازک (tubercle of)

Montgomery) ممکن در اطراف هاله احساس شوند. colostrum ممکن بعد از ماه سوم یا چهارم از حلیمه سرازیر گردد.

♦ (۲) معاینه از طریق بطنی (Per-abdominal) تفتیش

مریضه به وضعیت اضطجاع ظهري طوری قرار بگیرد که پاهایش در حالت قبض و رأس‌اش کمی بلندتر قرار گیرد. بطن باید به اندازه کافی برهنه باشد. معاینه کننده باید در طرف راست مریضه قرار گرفته و بطن وی را از نظر شکل، موجودیت خطوط و سکارها و موقعیت سره ارزیابی نماید.

- **شکل بطن:** بطن بعد از هفته ۱۲ برآمدگی پیدا می‌کند.
- **خط سیاه (linea nigra):** عبارت از یک خط صباغی است که در وسط بطن قرار داشته و از سره الی ارتفاع عانه امتداد دارد. این خط معمولاً بعد از هفته ۱۲ قابل دید است.
- **خطوط حاملگی (striae gravidarum):** این خطوط در وسط حمل تظاهر می‌نماید، گلابی رنگ بوده، در جوانب و قدام قسمت سفلی بطن در نخستین حمل تظاهر می‌نماید و با گذشت زمان به خطوط سفید نقره‌یی (linea albicans) مبدل می‌شوند. این خطوط ممکن بالای ثدیه‌ها نیز تشکل نماید.
- **علائم سکار (scar marks):** موجودیت سکار در وسط قسمت سفلی بطن نشان دهنده عملیات قبلی حوصلی است.
- **سره (umbilicus):** سره بلندتر از سطح جلد موقعیت داشته و بعضاً برآمدگی واضح نشان می‌دهد.

جس

بطن باید با ملایمت جس گردد. در زمان جس باید از انگشتان هر دو دست استفاده شود. انگشتان بالای بطن بگونه هموار قرار می‌گیرد. دست‌ها باید گرم کرده شود. در صورت مضطرب بودن مریضه لازم است تا با مریضه مکالمه کوتاه داشته باشیم تا از این حالت خارج شود. نکات ذیل را در مورد رحم ملاحظه نمایید:

- **ارتفاع فندس (Symphysis fundal height - SFH):** ارزیابی آن توسط جس فندس که معمولاً در طرف راست خط متوسط قرار دارد صورت می‌گیرد. به این منظور کنار زندی دست چپ خود را در علوی‌ترین سویه رحم گذاشته و آن نقطه را نشانی می‌نماییم، زیرا در ارزیابی زمان حمل کمک کننده است.
- **تخمین تقریبی:** با انچه‌ها، ارتفاع fundal مساوی به تعداد هفته‌های حمل است. به سانتی‌متر در حقیقت اگر به صورت دقیق اندازه‌گیری شود SFH دو سانتی‌متر کمتر از تعداد هفته‌های حمل است. این قانون تا هفته ۳۶ حمل صدق می‌کند، بعد از آن به سبب حرکت نزولی جنین به طرف حوصله SFH کاهش می‌یابد. جنین قبل از هفته ۱۲ از طریق بطن قابل جس نمی‌باشد، زیرا در سه ماه اول حمل جنین به صورت یک عضو حوصلی باقی می‌ماند.

SFH در حالات ذیل بزرگتر است:

- اشتباه بودن LMP
- دوگانگی‌ها
- polyhydramnios
- تومور حوصلی مترافق با حمل
- macrosomia

SFH در حالات ذیل کوچکتر است:

- مرگ داخل رحمی
- oligohydramnios
- تأخیر رشد داخل رحمی
- اشتباه بودن LMP
- **شکل رحم:** در ۳ ماه اول حمل شکل هرمی خود را از دست داده و بیشتر کروی می‌شود. بعد از ماه ۴ دوباره شکل بیضوی را به خود گرفته و داخل بطن رشد می‌کند.
- **قوام رحم:** در هفته‌های اول حمل رحم بیشتر نرم و ایلاستیک می‌شود.

- **تقلصات رحمی (Braxton Hicks sign):** سخت شدن بدون درد (تقلص) و نرم شدن (استرخا) رحم را می‌توان بعد از هفته ۱۶ با دو دست احساس نمود. معاینه کننده باید کف‌های هر دو دست خود را در دو طرف رحم قرار دهد.
- **یادداشت:** این تقلصات در myoma و hematometria نیز موجود بوده می‌تواند.
- **قطب جنینی:** قطب جنینی عبارت از قسمت برجسته و قابل جس جنین (رأس یا سرین) در هفته ۳۴ است. رأس جنین نسبت به قسمت‌های سفلی وی بیشتر مدور و سخت‌تر می‌باشد. اگر قطب واحد جس گردد این بدین معنی است که حمل یگانگی است و اگر قطب‌های متعدد جس گردد در آن صورت ممکن حمل دوگانگی یا چندگانگی باشد.
- اگر SFH بزرگتر ملاحظه شود اما اعضای جنینی درست قابل جس نباشند، ممکن polyhydramnios موجود باشد. اگر SFH کوچکتر بوده و اعضای جنینی به آسانی قابل جس باشد ممکن oligohydramnios موجود باشد.
- **محور رحم (axis of uterus):** در حالت نارمل رحم anteverted و anteflexed می‌باشد. با معاینه، جسم رحم retroverted می‌باشد. در صورتی که retroverted باشد، رحم بزرگتر و نرم‌تر بوده و در قسمت خلف احساس می‌شود و با معاینه مهبل‌ی عنق رحم بلندتر بوده و به قدام متوجه می‌باشد.
- **محتوی مایع (liquor amnii):** برای دانستن موجودیت liquor amnii یک معاینه به نام external ballotment انجام می‌شود. مریضه باید به وضعیت اضطجاع ظهری قرار بگیرد. هر دو دست خود را بالای جوانب رحم قرار دهید؛ با دست چپ خود رحم را کمی به طرف راست فشار دهید؛ دست راست یک تماس را با جسم آزاد و متحرک داخل رحمی (جنین) احساس خواهد نمود. این علامه بعد از هفته ۲۰ دریافت می‌شود، زیرا در این مدت جنین نسبت به liquor amnii خوردتر است. بعضاً اهتزاز مایع (fluid thrill) در تمام جوانب رحم متوسع احساس شده می‌تواند.

جنین (Fetus)

نکات ذیل را در مورد یک جنین ملاحظه نمایید:

- **قرار (lie):** قرار، محور طولانی جنین را نسبت به محور طولانی رحم نشان می‌دهد. lie می‌تواند طولانی، مایل یا عرضانی باشد.
- **Longitudinal lie (۹۹%):** اگر قطب جنینی در حوصله قرار گرفته باشد محور طولانی است. (شامل Cephalic به میزان ۹۵٪ و Breech به میزان ۴٪).
- **Oblique lie:** اگر قطب جنینی به یک طرف متمایل باشد محور مایل است.
- **Transverse lie (۱%):** در شکل عرضانی جنین به صورت افقی در بطن قرار می‌داشته باشد.
- **اعتلان (presentation):** قسمتی از جنین است که در سگمنت سفلی رحم (بالتر از فوهه داخلی عنق رحم) قرار گرفته باشد. ۵ شکل آن وجود دارد که عبارت اند از:
 - فرق سر (vertex)
 - سرین (breech)
 - شانه (shoulder)
 - وجه (face)
 - ابرو (brow)
- **موقعیت (position):** این اصطلاح موقعیت جنین را نظر به حوصله مادر نشان می‌دهد. در این صورت یک نقطه مشخص عضو معتلنه در نظر گرفته می‌شود که به نام denominator یاد می‌شود. برای هر اعتلان چهار وضعیت ممکنه این نقطه موجود می‌باشد. این چهار وضعیت نظر به چهار ربع حوصلی تعیین می‌شود که شامل راست و چپ قدامی و راست و چپ خلفی است. نقطه denominator در رأس جنین occiput است، در breech سکروم و در وجه زنج است.

- **Attitude:** این اصطلاح ارتباط اطراف و رأس جنین را نظر به جذع جنین نشان می‌دهد. اگر رأس و اطراف در حالت قبض باشند flexed attitude و اگر در حالت بسط باشند extended attitude است.
- **Engagement:** عبور بزرگترین قطر عضو معتلنه را در حوصله نشان می‌دهد. رأس جنین را به صورت فرضی از vertex الی زنج به ۵ ناحیه تقسیم نموده‌اند. اگر vertex در سویه ارتفاع عانه قرار گیرد کاملاً قابل جس بوده و متحرک از طریق بطن می‌باشد. در این صورت engagement آن ۵/۵ نمره گذاری می‌شود. با گذشت زمان طوری که رأس به طرف سفلی نزول می‌کند کمتر قابل جس می‌شود و نمره‌گذاری آن ۴/۵، ۳/۵ می‌شود. اگر رأس تحرکیت خود را از دست دهد مرحله ۲/۵ تا ۱/۵ است. رأس در هر دو دست گرفته شده و کوشش شود تا از یک طرف به طرف دیگر حرکت داده شود.
- **Station:** عمق حوصله را نشان می‌دهد جایی که عضو معتلنه رسیده است. یک خط فرضی بین دو ischial spine منحنیث نقطه صفر قبول شده است. مسافه بالاتر از این خط به سانتی‌متر منفی و پایین‌تر مثبت تلقی می‌شود.

مانورهای معاینه لمسی (Grips)

جهت تشخیص اصطلاحات فوق‌الذکر از میتودهای ذیل استفاده می‌شود:

- **Fundal grip:** در این میتود دریافت می‌شود که کدام قسمت جنین در غور رحم قرار دارد.
- **میتود:** داکتر باید در مقابل خانم ایستاد شده و حدود رحم را با جس سطحی معلوم نماید. سپس هر دو دست خود را بالای غور (fundus) رحم گذاشته و با نوک انگشتان خود قطب جنینی را با ملایمت جس نماید. اگر breech در غور رحم قرار داشته باشد، در این صورت بزرگتر، غیر منظم با حدود نرم احساس می‌شود؛ اما اگر رأس در fundus قرار داشته باشد در آن صورت سخت، مدور، متحرک و شناور احساس می‌شود، یعنی به صورت آزادانه حرکت کرده می‌تواند. fundus رحم معمولاً در صورت موجودیت رأس در آن نسبت به قرار گرفتن breech در آن نازک‌تر می‌باشد.

● **Lateral or umbilical grip:** از این مانور برای تعیین قسمت‌های جنین که در جوانب قرار دارد استفاده می‌شود.

● **میتود:** در قدام مریضه ایستاده شده و با انگشتان هر دو دست هر دو جانب رحم را جس نمایید. در صورت اعتلان cephalic ظهر جنین با کنار زندی دست جس می‌شود که در این صورت به شکل هموار در یک خط متوسط احساس می‌شود، اما دست و پا به شکل ساختمان‌های نودیول مانند در طرف دیگر احساس می‌شود.

● **Pelvic grip:** در حالی که وجه تان به طرف پاهای خانم متوجه است، چهار انگشت هر دو دست خود را به دو طرف خط متوسط بالاتر از لگمنت مغبنی بگذارید. با انگشتان باید به طرف سفلی و خلف حاشیه حوصلی فشار وارد نمایید تا قطب جنینی را که در آنجا قرار دارد جس نمایید. در این صورت معلومات در مورد attitude جنین، اعتلان (presentation) و engagement عضو معتلنه حاصل می‌شود. با انگشتان هر دو دست بالای عضو معتلنه فشار وارد نمایید تا تحرکیت عضو معتلنه دریافت گردد. اگر انگشتان هر دو دست در تحت عضو معتلنه باهم یکجا شده و حرکت نماید این بدین معنی است که عضو معتلنه engage نشده است. اما اگر انگشتان هر دو دست باهم یکجا شده نتوانند و موازی باقی بمانند به این معنی است که engagement صورت گرفته است.

● **Pawlik's grip:** در این صورت در طرف راست مریض ایستاد شده و وجه خود را به طرف رأس مریض متوجه ساخته و دست راست خود را بالاتر از ارتفاع عانه بگذارید. شست دست خود را در طرف راست و چهار انگشت اخیر خود را در طرف چپ رحم و کنار زندی کف دست را در کنار علوی ارتفاع عانه قرار دهید. حالا کف دست‌ها را جمع نموده و کوشش نمایید تا عضو معتلنه را در دست گرفته و تحرکیت آن را تثبیت نمایید. با تجربه می‌توان با این میتود در مورد اعتلان، engagement و position عضو معتلنه معلومات حاصل نمود.

قرع

اگر در زمان حمل بالای رحم قرع صورت بگیرد dullness نشان می‌دهد.

اصغا

برای شنیدن آوازهای ذیل اجراء می‌شود:

- **آوازهای قلب جنین (FHS):** این آوازا در بطن توسط Pinard stethoscope یا fotoscope در جایی که صدر جنین در نزدیک جدار بطن قرار داشته باشد شنیده می‌شود. توسط داپلر نیز می‌توان این آوازا را با وضاحت بیشتر شنید که در این صورت مادر طفل نیز می‌تواند آوازهای قلب طفل خود را بشنود.
- **وصف FHS** مانند تکتک ساعت زیر بالشت است. با Pinard stethoscope آوازهای قلب جنین معمولاً از هفته ۲۰-۲۴ به بعد شنیده می‌شود (با Doppler از هفته ۱۰-۱۲). ریت نارمل آن ۱۱۰-۱۶۰ فی دقیقه است (FIGO). بعد از هفته ۲۴ در هر ملاقات قلب جنین باید اصغا گردد.
- **سوفل رحمی (uterine souffle):** یک مرمر سستولیک وزشی ملایم است. با نبض مادر همزمان شنیده می‌شود. این مرمر از سبب عبور خون از طریق شرابین رحمی که توسعه نموده‌اند ایجاد می‌شود. این‌ها در جوانب رحم بعد از هفته ۲۰ شنیده شده می‌توانند.
- **funic souffle:** آواز مشابه وزش ملایم است که همزمان با آوازهای قلبی جنین می‌باشد. این مرمر به سبب فرط جریان خون از طریق شرابین سروی است. همیشه موجود نمی‌باشد، صرف در ۱۵٪ واقعات که حبل سروی در تحت سیتوسکوپ قرار داشته باشد اصغا می‌شود.
- **آوازهای معایی:** این آوازا نیز در صورت برجسته بودن رحم قابل اصغا اند.

◆ (۳) معاینه (PV) per-vaginal

معمولاً دو معاینه اجراء می‌گردد. اول در مراحل مقدم جهت بررسی حمل و دریافت موقعیت غیر نارمل رحم و تومورهای مبیضی صورت می‌گیرد. دوم در نزدیک زمان ولادت برای ارزیابی ظرفیت حوصله صورت می‌گیرد.

الف – P.V مقدم

مشمول است بر:

- معاینه مهبل (vaginal examination)
- معاینه مهبل بطنی یا دو دستی (bimanual examination)

یادداشت: قبل از انجام معاینه PV موافقت خانم شرط بوده و در اثنای انجام آن باید یک نرس زنانه حاضر باشد.

- **معاینه مهبل:** خانم باید مثانه خود را تخلیه نموده و به وضعیت اضطجاع ظهري قرار بگیرد و پاهای خود را در حالت قبض قرار دهد. بعضی داکتران این معاینه را به وضعیت جنبی ترجیح می‌دهند. شرایط اسپسی باید جداً مراعات شود. اولاً باید دست‌ها را شسته و بعداً با دستکش‌های معقم بپوشانید. به تراشیدن موها و تطبیق انستیزی نیاز نیست.

● معاینه خارجی:

- **عجان (vulva):** عجان را تفتیش نموده و به دقت معاینه نمایید. آن را برای مشاهده افرازات، حساسیت، اذیما، وریدهای وریکوزی یا اختلالات دیگر بررسی نمایید. در صورت موجودیت اذیمای شفتان، آن را با شست و انگشت اشاره جس نمایید.

- **مهبل (vagina):** شفتان صغیره را با دست چپ از هم دور نموده و introitus را تفتیش نمایید. آن را برای موجودیت التهاب، انشقاق یا کدام اختلال دیگر مشاهده نمایید. حالت فوهه احلیل نیز باید ملاحظه گردد. سپس با استفاده از speculum قبه مهبل و عنق رحم را مطالعه نمایید. جدارهای مهبل آبی رنگ و مرطوب نمایان می‌شود (Jacquemier's sign). عنق رحم نیز آبی رنگ نمایان می‌شود که علت آن احتقان وریدی است. بعضاً وریدهای وریکوزی در نهایت سفلی مهبل ممکن قابل دید باشد. افرازات و خونریزی مهبل نیز ملاحظه گردد.

● معاینه داخلی:

- انگشتان معاینه کننده را با لوشن یا کریم انتی سپتیک مرطوب نمایید. به خانم باید اطمینان داده شود و خواهش گردد تا خود را آرام سازد. سپس با انگشت شست و اشاره دست چپ شفتان صغیره را از هم دور نموده و انگشتان اشاره و متوسط دست راست خود را داخل مهبل فرو برید. در زمان اجراء این پروسیجر انگشت شست دست راست در حالت بسط و انگشتان چهارم و پنجم را در حالت قبض نگهدارید.
- بعد از داخل نمودن انگشتان دست راست در مهبل، دست چپ باید در قسمت سفلی بطن قرار داده شود. سپس جدارهای مهبل را برای دریافت تورم‌ها جس نمایید. مثانه و رکتوم را جس نموده و ملاحظه کنید که آیا خالی اند یا متوسع.
- موجودیت حساسیت، تومور حوصلی یا سیست را ملاحظه نمایید. سپس انگشتان را بیشتر تپله نموده و عنق رحم را جس نمایید. کوشش نمایید تا سمت آن را دریابید که به طرف قدام است یا خلف. در حاملگی معمولاً به طرف علوی و خلف بیجا شده می‌باشد. قدام آن را جس نمایید که نرم است یا سخت.
- **علامه Goodell:** در حاملگی عنق رحم از حالت نارمل آن که سخت است مانند نوک بینی، به حالت نرم مانند لب‌ها تغییر می‌کند. نرم بودن fornixها از جمله علایم حاملگی است.
- **علامه Hegar (معاینه دو دستی):** انگشتان اشاره و متوسط (انگشتان مهبل) را در fornix قدامی قرار داده و انگشتان دیگر (انگشتان بطنی) را در خلف رحم قرار دهید. حالا با ملایمت هر دو را با هم نزدیک سازید. این‌ها ممکن از طریق ناحیه نرم و خالی isthmus عنق رحم باهم متلاقی شوند. این معاینه باید با ملایمت زیاد اجراء گردد، زیرا کوشش زیاد سبب انفعال ovum شده می‌تواند. این علامه در بین هفته‌های ۸ الی ۱۲ حمل مثبت می‌باشد. سپس انگشتان را خارج نموده و موجودیت افرازات یا خونریزی را بالای انگشتان خود مشاهده نمایید.

ب - معاینه P.V مؤخر

این معاینه معمولاً در هفته ۳۶ حمل صورت می‌گیرد. این معاینه برای ارزیابی جوف رحم صورت می‌گیرد. بعد از داخل نمودن انگشتان به داخل مهبل ملاحظه نمایید که آیا انگشتان به بارزه سکروم (sacral promontory) تماس نموده‌اند یا خیر. در حالت نارمل بارزه سکروم خارج از دسترس انگشتان معاینه کننده می‌باشد. در صورت جس شدن آن، diagonal conjugate (قطر بین بارزه سکروم و سرحد سفلی pubis) باید اندازه‌گیری شود. معلومات بیشتر در مورد اندازه و شکل جوف حوصلی را با جس جدارهای جوانب حاصل نموده می‌توانیم. جدارهای جنبی باید موازی باشند و نباید از هم متفاوت باشند. سپس ischial spine را جس نمایید. اگر حوصله نارمل باشد، تیز و متبازر جس نمی‌شوند. در اخیر قطر intertuber ischial را با مشت اندازه‌گیری نموده و در عین زمان infrapubic arch را برای ارزیابی زاویه آن جس نمایید. زاویه بیش از ۹۰ درجه حوصله کافی را نشان می‌دهد.

● **یادداشت:** هر خانم که حامله باشد (۲۸ هفته یا بیشتر) و خونریزی مهبلی داشته باشد، نباید معاینه مهبلی نزدش صورت گیرد مگر این که در اطاق عملیات برای عملیات عاجل آماده باشد.

● **مضاد استطباب معاینه P.V:**

- placenta previa
- تمزق قبل از ولادت غشاها

Internal ballottement

این را می‌توان بعد از هفته‌های ۱۶-۲۸ انجام داد. قبل از اجراء آن لازم است تا خانم به وضعیت اضطجاع ظهري طوری قرار داشته باشد که رأس و شانه‌هایش بلندتر قرار بگیرد. انگشتان اشاره و متوسط دست راست را داخل مهبل نموده، آن‌ها را در fornix قدامی در قدام عنق رحم قرار داده و دست چپ خود را به صورت محکم بالای غور رحم قرار دهید. رأس جنین یا کدام قسمت دیگر وی با انگشتان تماس خواهد نمود. جنین را به کمک انگشتان با ملایمت به طرف بالا

تیلِه نمایی؛ جنین به طرف بالا حرکت نموده و برای یک لحظه تماس با رأس وی از میان رفته اما بعد از مدتی رأس توسط انگشتان داخلی احساس خواهد شد.

تأیید حمل

اگر یک خانم اعراض متعدد حمل از قبیل حساس بودن ثدیه‌ها، دلبدی صبحانه، amenorrhea و فرکانس ادرار را حکایه نماید، در آن صورت علایم حمل از قبیل Goodell را جستجو نمایید. *linea nigra*، *striae gravidarum*، Jacquemier's sign و علامه Hegar علامه

تمام این مشاهدات باید با اجرای معاینات ادرار، تست حاملگی و التراسوند حوصلی تعقیب گردد. این معاینه‌ها باید قبل از تظاهر حمل یک خانم مثبت باشند.





فصل یازدهم

معاینه نسایی

تاریخچه

نکات ذیل را از مریضه بپرسید:

۱. اسم
 ۲. اسم پدر یا شوهر
 ۳. سن
 ۴. دین
 ۵. محل سکونت
 ۶. حالت مدنی: داکتر باید از مریضه بپرسد که متأهل است یا مجرد یا طلاق شده یا بیوه. اگر متأهل باشد، Gravidity و Parity را ملاحظه نمایید.
- **Gravidity**: تعداد حمل‌ها را بدون در نظر داشت مدت و عواقب حمل نشان می‌دهد.

● **Parity:** تعداد حمل‌هایی را شامل می‌شود که ۲۸ هفته را تکمیل نموده باشد.

۷. شکایات عمده: شکایات باید به ترتیب زمانی آن درج گردند.

۸. تاریخچه مرض فعلی: جزئیات هر شکایت را به صورت منظم بپرسید:

● مدت

● طرز شروع

● دوام

● عوامل تشدیدکننده یا بهبوددهنده

از مریضه بپرسید که آیا به کدام حکیم یا دایه مراجعه نموده است یا خیر؟ و نیز بپرسید که کدام نوع ادویه یا مواد را اخذ نموده است. آیا مریضه کدام ادویه فمی یا موضعی یا کریم یا تابلیت‌های داخل مهبل را اخذ نموده یا خیر؟

۹. تاریخچه سابقه: داکتر باید در مورد امراض گذشته از قبیل توبرکلوز، سفلیس، تب روماتیک، امراض قلبی و وعایی، امراض کلیوی یا انتانات حوصلی معلومات حاصل نماید. تاریخچه عملیات‌های حوصلی نیز باید یادداشت گردد. تاریخچه Cesarean section نیز باید پرسیده شود.

۱۰. تاریخچه عادت ماهوار شامل بخش‌های ذیل است:

● سن در اولین عادت ماهوار (Menarche)

● LMP (آخرین عادت ماهوار): از مریض باید در مورد روز اول آخرین عادت ماهوار پرسیده شود. در صورتی که این تاریخ را دقیقاً به یاد نداشته باشد، باید با مطرح نمودن سوالات متعدد در مورد روزها و هفته‌های گذشته یک مفکوره را در مورد این تاریخ حاصل نمود.

۱۱. تاریخچه ولادی: اگر مریض متأهل باشد در مورد زمان ازدواج و تعداد حمل‌های وی معلومات حاصل نمایید. در مورد تعداد حمل‌ها، مدت و دوام هر کدام و عواقب آن‌ها سوالات را مطرح نمایید. در صورت موجودیت تاریخچه سقط، در مورد مدت زمان حمل سقط‌شده بپرسید.

در مورد ولادتها باید پرسیده شود که آیا در خانه صورت گرفته یا در شفاخانه؛ آیا به صورت خودبخودی واقع شده یا به کمک Forceps یا C/S صورت گرفته است. آخرین ولادت چقدر زمان را در بر گرفت؟ آیا تاریخچه استفراغات، تب، خونریزی مهبل در اثنای حمل موجود بود؟

در مورد نفاس بپرسید. نفاس بعد از تولد نوزاد شروع میشود و تا زمانی ادامه پیدا میکند که Involution تکمیل گردد. معمولاً ۸-۶ هفته را در بر میگیرد. از مریض در مورد تب، اعراض بولی یا مشکلات تغذی در زمان نفاس بپرسید. در اخیر در مورد طفل بپرسید. آیا طفل تا فعلاً زنده است یا مرده؟ اگر زنده باشد از چگونگی صحت وی بپرسید.

۱۲. تاریخچه شکایات بولی: در مورد مشکلات و اعراض بولی بپرسید. اگر مریض مشکلات بولی را حکایه نماید، در آن صورت موارد ذیل را بپرسید:

- تکرر تبول
- تبول دردناک (Dysuria)
- عدم کنترل ادرار

۱۳. تاریخچه افرازات مهبل: اگر افرازات مهبل موجود باشد، آن را ملاحظه نمایید. در مورد مقدار، رنگ، قوام، محتویات و بوی افرازات بپرسید.

● **افرازات مهبل نارمل:** این افرازات سفید رنگ بوده متشکل از افرازات علقه شده عنق رحم و حجرات اپتیلیل می باشد. به صورت نارمل قبل از عادت ماهوار افزایش می یابد.

● **Leucorrhea:** به معنی تزاید افرازات نارمل می باشد.

● **سایکل عادت ماهوار (Menstrual cycle):** عبارت از خونریزی نارمل، فزیولوژیک و دوره ای رحم است. برای هر خانم سایکل عادت ماهوار به شمول دوام خونریزی، مقدار ضیاع خون و طول سایکل متفاوت است. این یافته ها در مثال ذیل ملاحظه می شوند:

- اگر یک خانم برای ۵ روز خونریزی داشته و سایکل وی هر ۲۹ روز تکرار شود، در آن صورت به شکل ۲۹/۵ ملاحظه می‌شود.
- در صورتی که هر دو مدت فوق متغیر باشد یعنی خونریزی ۷-۳ روز و تکرار عادت ماهوار هر ۳۰-۲۶ باشد به شکل ۳۰-۲۶/۷ نوشته می‌شود. در صورت به وجود آمدن تغییرات در زمان‌های فوق، ممکن کدام مرض موجود باشد. به گونه مثال، در صورتی که زمان تحیض یک خانم قبلاً ۲۸/۳ بود اما حالا به ۲۸-۲۵/۷-۶ تغییر نموده است نشان‌دهنده بعضی از امراض است، اما اگر از ابتداء ۲۸-۲۵/۷-۶ باشد در این صورت کدام اختلال را نشان نمی‌دهد.
- **مقدار ضیاع خون:** ممکن نارمل (۷۰-۳۰ سی‌سی) یا وافر باشد یا کم و اندک باشد. از مریضه باید در مورد حالات ذیل نیز پرسیده شود:
 - **Menorrhagia:** عبارت از افزایش خونریزی حیض از نظر مقدار و دوام است، یعنی ممکن مقدار ضیاع خون روزانه زیاد باشد یا این که دوام روزهای خونریزی زیاد باشد یا هر دو حالت موجود باشد.
 - **Polymenorrhea:** در این صورت مقدار ضیاع خون نارمل بوده اما وقفه‌های زمانی بین‌شان کوتاه می‌باشد. مریضه بعد از هر ۲۰-۱۰ روز برای ۶-۴ روز (زمان نارمل خونریزی) خونریزی داشته باشد. در حالت نارمل یک خانم باید در یک سال ۱۳ سایکل داشته باشد. در polymenorrhea تعداد این سایکل‌ها اضافه‌تر از ۱۳ می‌باشد.
 - **Metrorrhagia:** عبارت از خونریزی با مقادیر متفاوت بوده، که با سایکل ارتباط نداشته ممکن به شکل غیرمنظم واقع گردد یا به شکل متداوم باشد.
 - **Oligomenorrhea:** اگر خونریزی حیض از لحاظ مقدار کم باشد، به نام اولیگومینوریا یاد می‌شود.

یادداشت: مقدار ضیاع خون را می‌توان با پرسیدن در مورد استعمال تعداد پارچه‌های بهداشتی روزانه تخمین نمود. موجودیت تاریخچه عبور علقه‌های خون دلالت بر ازدیاد خونریزی می‌کند.

- **Dysmenorrhea:** حیض دردناک به نام dysmenorrhea یاد می‌شود. بسیاری از خانم‌ها در اثنای عادت ماهوارشان از بعضی ناراحتی‌ها و دردها شکایت می‌کنند. مثلاً درد کمر، درد در قسمت سفلی بطن. این‌ها نارمل هستند، اما اگر دوام آن زیاد شود بر بعضی از امراض دلالت می‌کند.
 - **Menopause:** از مریضان مسن باید در مورد انقطاع طمث (Menopause) پرسیده شود. Menopause اکثراً در سنین ۴۵-۵۵ سالگی واقع می‌شود.
 - **افرازات زرد قیحی:** عبور افرازات زرد قیحی دلالت به انتانات عنق رحم یا مهبل می‌کند.
 - **افرازات مخرش سبز کفدار:** این نوع افرازات در انتان Trichomonal دیده می‌شوند.
 - **افرازات بسته‌شده سفید:** این افرازات مخرش بوده و نشان‌دهنده انتان Monilial است.
 - **افرازات رنگ شده با خون:** در صورت موجودیت کنسر دیده می‌شود. در واقعات Cervicitis و Vaginitis نیز دیده شده می‌تواند.
۱۳. وضعیت اقتصادی اجتماعی مریضه: در فصل اول تشریح شده است.
۱۴. تاریخچه خانوادگی: در فصل اول تشریح شده است.

معاینه نسایی

معاینه نسایی شامل بخش‌های ذیل است:

۱. **معاینه ثدیه‌ها:** در زمان معاینه مریضه لازم است تا علایم حمل جستجو گردند. موجودیت کتله و نودول را مشاهده کنید. با ملایمت زیاد آن‌ها را

جس نمایید. در کتله تعداد، محل، اندازه، شکل، قوام، حساسیت، التصاق با جلد یا انساج عمیق را ملاحظه نمایید. در صورت موجودیت قرحات توضیح اندازه، کنارها، زمین، قاعده و افرازات آن را ملاحظه نمایید. در اخیر جس عقدات لمفاوی را فراموش نکنید.

۲. **معاینه از طریق بطنی:** علایم حمل را در بطن جستجو نمایید (توضیحات در فصل معاینه ولادی). علوتاً بطن را برای دریافت کتلات (تومورها یا سیستهای احشای بطنی) نیز جس نمایید.

۳. **معاینه حوصلی:** شامل بخش‌های ذیل است:

● **معاینه عجان:** مریض باید به وضعیت اضطجاع ظهري قرار گیرد. اولاً باید شکل توزیع موهای عانه ارزیابی گردد. در حالت نارمل در خانم‌ها سرحد علوی موهای عانه محدبیت سفلی دارد (به سره نمی‌رسد)، در صورت موجودیت شکل مردانه آن دلالت بر موجودیت تومورهای تولیدکننده اندروجن می‌کند. همچنان متقن بودن فولیکول‌های موها را مشاهده نمایید، اگر موجود باشد به انتان موضعی دلالت می‌کند. سپس شفتان، Clitoris و احلیل را معاینه نمایید. ملاحظه کنید که آیا این‌ها نارمل اند یا علایم التهاب را نشان می‌دهند. موجودیت خراش‌ها نشان‌دهنده افرازات مخرش است. رنگ ارغوانی و موجودیت خارش دلالت بر دیابت می‌کند. سپس کوشش نمایید تا غده بارتولین را با گذاشتن انگشت اشاره در مهبل و شست در خارج جس نمایید. اگر تورم‌ها و حساسیت‌های داخل مهبل موجود باشند، آن را دریابید. در حالت نارمل این غده قابل جس نیست؛ صرف در موجودیت انتانات یا تشکل سیست‌ها قابل جس می‌شود. در اخیر مقعد را برای موجودیت بواسیر (Hemorrhoid)، Fissure یا موجودیت آفات دیگر تفتیش نمایید.

● **معاینه حوصلی دودستی (Bimanual):** قبل از اجرای این معاینه مثانه مریضه باید خالی باشد. انگشت اشاره و انگشت متوسط دست راست را داخل مهبل نموده و دست چپ را بالای بطن قرار دهید. اگر جنین موجود باشد یا خانم باکره باشد از این معاینه خودداری گردد. در صورت نیاز جدی لازم است

تا موافقت‌نامه مریضه اخذ گردد و به عوض آن معاینه از طریق رکتوم صورت گیرد. در اثنای معاینه مهبل نقاط ذیل را ارزیابی نمایید:

- **Fornices:** فورنکس‌های جنبی، قدامی و خلفی برای موجودیت تورم‌ها جس شوند.

- **عق رحم:** اندازه، قوام یا موجودیت آفات آن را ارزیابی نمایید.

- **رحم:** تمام رحم را معاینه نموده؛ اندازه، شکل، موقعیت (Anteverted, Midposition, Retroverted)، تحرکیت و حساسیت آن ملاحظه گردد.

- **Adnexae:** در حالت نارمل قابل جس نیستند مگر این که کدام آفت موجود باشد. بعضاً مبیض‌ها زمانی قابل جس می‌شوند که حاوی Corpus luteum باشند.

- **معاینه Recto-vaginal:** با قرار دادن انگشت اشاره در رکتوم و انگشت شست در مهبل، حجاب بین رکتوم و مهبل را از نظر موجودیت کتلات یا حساسیت‌ها جس نمایید.

- **معاینه Per-speculum:** این معاینه با استفاده از سپیکولم (Cusco's bivalve speculum) و Sim's speculum صورت می‌گیرد.

- **معاینه با سپیکولم Cusco's:** سپیکولم را در حالی که مریضه به وضعیت نسایی قرار گرفته به زاویه ۴۵ درجه در پلان عمودی به پیش ببرید. بعد از داخل کردن آن به مهبل در سویه عق رحم آن را با ملایمت زیاد باز نمایید. شکل و رنگ عق، موجودیت ساییده‌گی، Crypt یا Granularity در فوهه آن ارزیابی گردد. سپس جدارهای جنبی مهبل را برای دریافت اختلالات ارزیابی نمایید.

- **معاینه با سپیکولم Sim's:** شکل این سپیکولم طوری ساخته شده است که بالای جدار خلفی مهبل قرار گرفته و جدار قدامی و عق رحم را نمایان می‌سازد. این سپیکولم برای ارزیابی Rectocele و Enterocele نیز کمک‌کننده است. در این صورت مریضه باید به وضعیت جنبی قرار داشته باشد.

Papanicolaou smear (Pap smear)

بخش مهم معاینه نسایی را تشکیل می‌دهد. این معاینه باید حداقل سال یک بار مخصوصاً در خانم‌های متأهل بعد از سنین ۳۰ سالگی انجام شود. مریضان با ریسک بلند کنسر عنق رحم یا مهبل باید با فواصل زمانی کوتاه‌تر این معاینه را انجام دهند.

پروسیجر: سپیکولم را بعد از گرم نمودن و مغطوس کردن در آب در مهبل قرار دهید. عنق رحم را نمایان ساخته، سپس با Ayre's spatula یک تعداد حجرات را از عنق رحم برداشته و با تغییر دادن موقعیت سپیکولم، حجرات را از سطح Fornix خلفی بردارید. این حجرات را روی سلاید قرار داده و مواد محافظه‌کننده را به آن علاوه نمایید.

سلاید را با ورقه شناسایی مریضه که شامل سن مریضه، تاریخچه و دریافت‌های کلینیکی است به لابراتوار بفرستید.

یادداشت: Pap smear فقط یک تست سکریننگ است. اگر این معاینه مثبت باشد، استتباب اجراء سایر پروسیجرهای تشخیصیه از قبیل بایوپسی عنق رحم، Conization، Endometrial biopsy و D&C وجود دارد. Pap smear کنسر عنق رحم را در ۹۸٪ واقعات و کنسر اندومتر را در ۸۰٪ واقعات دریافت کرده می‌تواند.





فصل دوازدهم

معاینه اطفال

اخذ تاریخچه

اخذ تاریخچه اطفال با تاریخچه کاهلان فرق می‌کند. لازم است تا موارد ذیل پرسیده شوند:

۱. **تاریخچه مرض فعلی:** تاریخچه مرض فعلی کودکان باید عیناً مانند تاریخچه مرض فعلی کاهلان اخذ گردد (تفصیل بیشتر در فصل دوم). چگونگی پرسیدن اعراض باید طوری باشد که در فصل اول ذکر گردیده است.
۲. **تاریخچه تولد:** تاریخچه تولد باید گرفته شود. نکات ذیل باید پرسیده شوند:

- آیا مادر در زمان حمل مصاب کدام مرض بود؟
- تاریخچه اخذ ادویه و الکول در زمان حمل باید یادداشت گردد.
- آیا تولد نوزاد با ميعاد بود؟
- وزن و حالت کودک در زمان تولد باید پرسیده شود.
- آیا نوزاد در زمان تولد یرقان یا کدام مشکل تنفسی داشت؟

۳. **تاریخچه تغذی:** در مورد تغذی کودک پرسان شود. آیا وی از شیر مادر تغذی می‌نماید یا از شیر پودری؟ مدت تغذی با شیر مادر یا شیر پودری باید پرسیده شود.

۴. **رشد و انکشاف (مراحل مهم):** در این بخش لازم است تا از تغییرات ذیل با در نظر داشت سن کودک پرسیده شود:

سن	تغییرات (مراحل مهم)
در ۶ هفتگی	قات شدن رأس به طرف عقب
در ۳ ماهگی	نگهداشتن رأس در مستوی بدن
در ۶ ماهگی	نشستن در پهلوی دیوار
در ۹ ماهگی	نشستن بالای زمین، ایستاد شدن به کمک دیگران
در ۱ سالگی	توانایی در ایستاد شدن و به کمک دیگران حرکت کردن
در ۱ و نیم سالگی	بالا شدن در زینه به کمک دیگران
در ۲ سالگی	قدم زدن، لگد زدن توپ
در ۳ سالگی	بالا شدن در زینه
در ۴ سالگی	خیز زدن، پایین شدن در زینه

۵. **تطبیق واکسین و معافیت‌سازی:** آیا طفل واکسین شده است؟ اگر جواب مثبت باشد، پس کدام نوع واکسین‌ها در کدام سن تطبیق شده‌اند.

۶. **تاریخچه امراض سابقه مادر:** چگونگی صحت مادر را در دوران حمل بپرسید. سوالات ذیل باید پرسیده شوند:

- آیا مادر مصاب امراض فرط فشار، دیابت یا امراض کلیوی، قلبی یا کبدی بود؟
- آیا وی مصاب ملاریا، سرخکانه، توبرکلوز یا انتانات طرق بولی بود؟
- آیا وی کدام تاریخچه امراض مهملی دارد؟
- آیا وی مصاب امراض تایراید (hypo/hyperthyroidism)، SLE یا rheumatoid arthritis بود؟
- آیا وی pre-eclampsia یا خونریزی قبل از ولادت داشت؟

۷. **تاریخچه خانواده‌گی:** سن والدین باید پرسیده شود. اگر والدین از کدام مرض خانواده‌گی رنج می‌برند باید ملاحظه گردد. در مورد صحت عمومی سایر اعضای خانواده نیز باید پرسیده شود.
۸. **تاریخچه اجتماعی و محیطی:** حالت اجتماعی و اقتصادی والدین باید پرسیده شود. شرایط زندگی در خانه و محیط آن باید پرسیده شود. تاریخچه اعتیاد والدین باید یادداشت گردد. موجودیت حیوانات خانگی باید پرسیده شود. در مورد خوردن، خوابیدن و سایر عادات کودک باید پرسیده شود.

معاینه طفل

سن	نبض (فی دقیقه)	تنفس (فی دقیقه)	BP تقریبی (mmHg)
نوزاد	≈ 140	≈ 40	65/45
۱ ساله	≈ 110	≈ 35 (2 y)	75/50
۳-۴ ساله	≈ 100	25-30	85/60
۸ ساله	≈ 90	≈ 20 (> 5 y)	95/65
۱۰-۱۱ ساله	≈ 80	≈ 20	100/70

جدول خلاصه ۱۲.۱: علایم حیاتی نارمل اطفال (از متن همین فصل)

شامل معاینه موضعی، معاینه فیزیکی عمومی و معاینه سیستمیک است.

♦ (۱) معاینه موضعی

۱. **رأس:** اندازه محیط و تناظر رأس باید بررسی شود. استحکام fontanel قدامی باید معاینه شود. اندازه آن در زمان تولد $2/5 \times 2/5$ سانتی‌متر بوده و در سن ۱۸ ماهگی بسته می‌شود. در rickets و hydrocephalus به تعویق می‌افتد. در حالات دی‌هایدریشن فرو می‌رود و در meningitis برآمدگی پیدا می‌کند.

۲. گوش، چشم و بینی: این اعضاء باید به منظور دریافت التهاب، افرازات یا کدام نقیصه ولادی بررسی شوند.

۳. دهن و دندان‌ها: رنگ لب‌ها ملاحظه گردد. لب‌های نارمل گلابی‌رنگ می‌باشند.

- لب‌های خاسف نشان‌دهنده کم‌خونی است، در حالی که لب‌های آبی‌رنگ نشان‌دهنده سیانوز است.

- اگر کدام التهاب، تورم یا ترکیدگی لب‌ها و زاویه دهن موجود باشد آن را ملاحظه نمایید.

- خونریزی لب‌ها یا غشای مخاطی دهن نیز باید دیده شود.

- Koplik's spots: باید در سطح داخلی رخسار دیده شود. این‌ها لکه‌های کوچک سفیدرنگ و به اندازه سر سنجاق بوده و دارای قاعده سرخ‌رنگ می‌باشند. در سرخکان به وجود می‌آیند.

- رنگ، اندازه و تناظر زبان باید معاینه شود. خشکی زبان (دی‌هایدریشن) و مرطوب بودن آن دیده شود. تمام حالاتی که بر طبیعی بودن آن دلالت نماید، باید ملاحظه گردد.

- موجودیت قرچه در زبان یا خنک باید دیده شود.

- تعداد و رشد دندان‌ها باید با در نظر داشت سن بررسی گردد.

۴. عنق: تورم و کوتاه بودن عنق باید دیده شود. JVP، نبضان، و ضخامه عقدات لمفاوی باید چک شود. آیا عنق، رأس را حمایه می‌کند؟ شخی عنق باید توسط قبض منفعل آن به طرف صدر دیده شود.

۵. اطراف و ستون فقرات:

- ظهر باید به دقت دیده شود. سوء اشکال ستون فقرات از قبیل scoliosis (مانند S شدن ستون فقرات)، kyphosis یا lordosis باید دیده شود. دیده شود که آیا spina bifida موجود است یا خیر؟

- دست‌ها باید برای موجودیت سوء اشکال یا نقیصه‌های ولادی (مثلاً polydactyly) معاینه شوند.

- قوسی شدن پاها در سن دو سالگی معمول است.

- هموار بودن پاها دیده شود.
- دست برای موجودیت clubbing و سوء اشکال ولادی معاینه شود.
- مفاصل اطراف علوی و سفلی برای دریافت تورم، درد، احمرار، محدودیت حرکات و موجودیت نودولها معاینه شود.
- زانو، بجلک پا، آرنج و بند دست باید معاینه شود.
- مفصل ران برای موجودیت خلع ولادی معاینه شود.
- از مریض بخواهید تا قدم بزند. در صورت موجودیت کدام اختلال، آن را ملاحظه نمایید.
- عضلات برای دریافت اتروفی، هایپرتروفی، فلج، تورم و حساسیت معاینه شوند.

♦ (۲) معاینه فیزیکی عمومی

مانند کاهلان در اطفال نیز مشاهدات ذیل صورت می‌گیرد:

- **نبض (pulse):** نبض‌های radial, brachial, femoral و carotid باید بررسی شوند. نبض‌های هر دو طرف باید با هم مقایسه شوند. نبض نارمل با در نظر داشت سن متفاوت است:
 - طفل نوزاد: ۱۴۰ فی دقیقه
 - طفل یک‌ساله: ۱۱۰ فی دقیقه
 - طفل سه‌ساله: ۱۰۰ فی دقیقه
 - طفل هشت‌ساله: ۹۰ فی دقیقه
 - طفل یازده‌ساله: ۸۰ فی دقیقه
- **درجه حرارت:** درجه حرارت در ابط، رکتوم و دهن تعیین می‌گردد. درجه حرارت ابطی نسبت به درجه حرارت رکتوم ۰/۵ درجه سانتی‌گرید پایین‌تر است، اما نسبت به درجه حرارت فمی به اندازه یک درجه سانتی‌گرید بلندتر است. در گریه کردن، ترس و فعالیت بلند می‌شود.
- **فشار خون:**

- برای بررسی فشار خون اطفال از آلله فشار که دارای کف کوچک باشد طوری که ۳/۲ طول بازو را بپوشاند استفاده می‌شود.
- برای اطفال بزرگتر از ۳ سال از میتود اصغا استفاده می‌شود، اما در اطفال کوچکتر از میتود جس استفاده می‌شود.
- Flush method در نوزادان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میتود کف در قسمت علوی بازو بسته می‌شود. بعداً از هوا مملو می‌شود. در این صورت نواحی بعیده سفید می‌شوند. حالا هوا را از کف به تدریج خارج نمایید. زمانی که نواحی بعیده گلابی‌رنگ شوند، عدد را یادداشت نمایید. این عدد تقریباً مساوی با فشار سیستولیک است.
- فشار خون در نوزادان ۶۵/۴۵ ملی‌متر ستون سیماپ است.
- فشار خون در اطفال ۱ ساله ۷۵/۵۰ ملی‌متر ستون سیماپ می‌باشد.
- فشار خون در اطفال ۴ ساله ۸۵/۶۰ ملی‌متر ستون سیماپ است.
- فشار خون در اطفال ۸ ساله ۹۵/۶۵ ملی‌متر ستون سیماپ می‌باشد.
- فشار خون در اطفال ۱۰ ساله ۱۰۰/۷۰ ملی‌متر ستون سیماپ می‌باشد.

♦ (۳) معاینه سیستمیک

۱. معاینه سیستم تنفسی:

- صدر اطفال سرخ‌رنگ می‌باشد.
- ریت تنفسی در نوزاد ۴۰ فی دقیقه می‌باشد. در دو سالگی به ۳۵ فی دقیقه سقوط می‌کند و بعد از پنج سالگی ۲۰ فی دقیقه می‌گردد.
- تفتیش، جس، قرع و اصغا به طریقه معمول اجراء می‌گردد. جس و قرع باید با ملایمت زیاد انجام شود.
- تنفس نارمل در نزد اطفال نسبت به کاهلان با فرکانس بلند می‌باشد. وصف آن مانند تنفس bronchial کاهلان است و به نام تنفس کودکانه (puerile) یاد می‌شود.

۲. معاینه سیستم قلبی و وعایی:

- تفتیش: تفتیش آن عیناً مانند تفتیش کاهلان است.

- **جس:** Apex beat در مسافه بین الضلعی چهارم در خط متوسط ترقوی است. tapping و heaving مانند کاهلان جس می‌شود.

● اصغا:

- تمام نواحی چهارگانه قلب و کنار چپ عظم قص باید اصغا شود.
- در اطفال P2 اکثراً split می‌باشد.
- Venous hum و مرمرهای فزیولوژیک بعضاً در اطفال کوچک به صورت نارمل موجود می‌باشند.
- اگر مرمر قابل سمع موجود باشد باید اوصاف آن از قبیل محل انتشار، شدت و زمان آن ملاحظه شود.

۳. معاینه طرق معدی معایی:

- **تفتیش:** تا سه سالگی بطن از سبب حوصله کوچک برآمدگی می‌داشته باشد. اسباب اتساع آن عیناً مانند کاهلان است.

● جس:

- جس باید با دست‌های گرم اجراء گردد.
- کبد به صورت نارمل تا ۴ سالگی تا ۲ سانتی‌متر پایین‌تر از حافیه ضلعی راست قابل جس می‌باشد.
- در موجودیت انتانات، طحال قابل جس می‌گردد.
- طحال در اطفال کوچک به طرف حفره حرقفی چپ بزرگ می‌شود اما در اطفال بزرگتر به طرف حفره حرقفی راست بزرگ می‌شود.
- کتلات غایبی در حفره حرقفی راست در صورتی قابل جس می‌باشد که اطفال مصاب قبضیت باشند.

● قرع:

- قرع باید با ملایمت زیاد اجراء گردد.
- به طریقه معمول قرع می‌شود (shifting dullness و fluid thrill).
- در صورتی که مثانه مملو از ادرار باشد یک dullness در قسمت سفلی بطن موجود می‌باشد.

- **اصفا:** عیناً مانند کاهلان است.

۴. معاینه عجان و اعضای تناسلی:

- مقعد باید برای دریافت فیشر، درد یا پرولپس معاینه شود.
- احمرار اطراف مقعد در اسهالات، انتانات فنگسی و کرم‌ها از سبب خارش دیده می‌شود.
- تون معصره مقعدی، تنگی و اتساع آن باید دیده شود.
- موجودیت هر گونه افرازات ملاحظه گردد.
- اندازه، شکل و فوهه قضیب باید معاینه گردد. ممکن فوهه تنگ (phimosis) یا hypospadias موجود باشد.
- خصیه باید معاینه گردد تا cryptorchidism رد گردد.
- اعضای تناسلی دختران کوچک به منظور دریافت احمرار، افرازات، بزرگ بودن clitoris و موجودیت غشایی که فوهه مهبل را مسدود می‌نماید معاینه شود.

۵. معاینه سیستم عصبی مرکزی:

- میتود معاینه سیستم عصبی مرکزی اطفال عیناً مانند کاهلان است:
- علامه Babinski مثبت است یعنی انگشت کلان پا تا ۱۸ ماهگی به صورت نارمل بلند می‌شود.
- عکسات باید به ترتیب معاینه شوند.
- در اطفال کوچک بهتر است تا عکسات با استفاده از انگشت تحریک شوند.
- عکسات وتری در نزد شیرخواران نسبتاً شدید است.





فصل سیزدهم

معاینه گوش، بینی و گلو

گوش

◆ آناتومی

دو گوش وجود دارد: راست و چپ. هر گوش از سه بخش ساخته شده است:

۱. **گوش خارجی:** متشکل از صیوان، مجرای سمع خارجی و سطح وحشی غشای طبل می‌باشد.

- **صیوان (pinna):** صیوان گوش از الیاف و غضروف که توسط جلد ستر شده ساخته شده است.

- **مجرای سمع خارجی:** کانال گوش از ساحه خارجی شروع شده و الی غشای طبل امتداد دارد. ثلث خارجی آن غضروفی و دو ثلث داخلی آن عظمی می‌باشد. قسمت خارجی آن حاوی موم بوده که توسط sebum و squamous debris ساخته می‌شود.

۲. **گوش متوسط:** متشکل است از:

- غشای طبل (tympanic membrane)
- جوف tympanic
- حجرات mastoid
- تیوب Eustachian
- در جوف tympanic سه استخوان کوچک شنوایی وجود دارند که شامل malleus، incus و stapes می‌باشد. این استخوان‌ها آواز را از گوش خارجی به گوش داخلی انتقال می‌دهند.
- تیوب Eustachian خارجاً به بلعوم باز می‌شود و وظیفه آن مساوی ساختن فشار گوش متوسط با فشار اتمسفر است.
- غشای tympanic به صورت مایل در بین گوش متوسط و گوش خارجی قرار دارد. این غشا نیمه شفاف بوده و خاکستری رنگ می‌باشد.
- غشای tympanic از دو بخش ساخته شده است: pars tensa و pars flaccida.
- حلقه لیفی که غشای tympanic را محصور می‌نماید آن را در محیط عظمی تثبیت می‌نماید.

۳. گوش داخلی: شامل دو بخش است:

- قوقعة (cochlea)
- دهلیز (vestibule)
- گوش داخلی با گوش متوسط توسط دریاچه‌های بیضوی (oval) و مدور (round) مرتبط می‌شود.
- cochlea مربوط شنوایی است در حالی که vestibule مسئولیت موازنه بدن را بر عهده دارد. cochlea متشکل از ۳ کانال نیم‌دایروی جنبی، علوی و خلفی است که با هم زاویه قائمه را می‌سازند؛ این کانال‌ها به دهلیز باز می‌شوند.

◆ اعراض معمول امراض گوش

اعراض عمده آن قرار ذیل اند:

- درد گوش (otalgia)

- افرازات گوش (otorrhea)
- ضیاع شنوایی (ناشنوایی)
- برنگس گوش (tinnitus)
- سرچرخی (vertigo)

درد گوش

درد گوش ممکن ناشی از امراض موضعی باشد یا ممکن از ناحیه دیگر نشأت کرده باشد (درد راجعه).

اسباب موضعی:

- التهاب گوش خارجی (otitis externa)
- التهاب گوش متوسط (otitis media)
- ترضیض
- انتان herpes

اسباب درد راجعه (Referred pain):

- التهاب تانسلها (tonsillitis)
- امراض دندان
- آفات مفصل temporomandibular
- امراض فقرات رقبی (cervical spondylitis)

با اخذ تاریخچه درست و معاینه دقیق هر کدام آنها قابل تشخیص هستند.

در حالات دردناک گوش خارجی درد در زمان جویدن و کش کردن صیوان گوش شدت کسب می‌کند.

در حالات دردناک گوش متوسط ممکن تاریخچه سرفه، ریزش، گلودردی و انتان طرق تنفسی علوی موجود باشد. در این حالت درد در زمان جویدن و کش کردن صیوان به وجود نمی‌آید.

برای دردهای گوش نکات ذیل باید در نظر گرفته شوند:

- آغاز درد: درد به صورت تدریجی آغاز می‌شود یا به صورت آتی و تیز؟

- **شدت درد:** خفیف، متوسط یا شدید.
- **وصف درد:** تیز، پرتابی، ثابت، تپنده.
- **ارتباط با جویدن و کش کردن صیوان گوش:** درد گوش خارجی با عمل جویدن و کش کردن صیوان شدت کسب می‌کند.

معاینه موضعی گوش:

- موجودیت علائم التهاب مانند تورم، احمرار و غیره (boil، carbuncle)
- خراشیده‌گی
- ترشیض
- تشکل vesicle در انتان herpes zoster

اگر درد راجعه موجود باشد باید علائم حالات ذیل دیده شوند:

- Sinusitis
- التهاب بلعوم (pharyngitis)
- التهاب تانسِل‌ها (tonsillitis)
- Caries دندان
- TMJ arthritis
- انتان حاد غده‌های لعابیه
- Cervical spondylitis

افرازات غیر نارمل گوش (Ear discharge)

در صورت موجودیت آن موارد ذیل ملاحظه شوند:

- مقدار
- رنگ
- بو
- قوام

افرازات گوش خارجی ممکن از سبب boil یا التهاب عمومی گوش خارجی باشد. افرازات ناشی از boil کم، غلیظ، زرد و قیقی می‌باشد.

در التهاب عمومی گوش خارجی افرازات رقیق و مانند weeping eczema وافر می‌باشند.

افرازات در التهاب تقیحی گوش متوسط مخاطی، قیحی، غلیظ، زردرنگ و متعفن می‌باشد.

افرازات در granulation و polypus معمولاً به رنگ خون می‌باشد.
در صورت موجودیت امراض malignant و ترصیض، ممکن در گوش خون موجود باشد.

ناشنوایی

ناشنوایی سه نوع است:

- انتقالی (conductive)
- آخذوی (perceptive)
- مختلط (mix)

ناشنوایی انتقالی: در این نوع ناشنوایی آواز از سبب موجودیت انسداد به گوش داخلی نمی‌رسد. اسباب آن قرار ذیل اند:

- امراض گوش خارجی مثلاً موم، فنگس، boil، یا التهاب (otitis externa)
 - امراض گوش متوسط مثلاً otitis media، امراض غشای طبل، otosclerosis (تثبیت foot plate عظم stapes در دریچه) و امراض تیوب Eustachian
- آواز از طریق عظام قحف منتقل خواهد شد، بناءً مریض آواز خود را شنیده می‌تواند؛ در نتیجه مریض به tone پایین صحبت می‌کند اما از دیگران می‌خواهد تا به آواز بلند صحبت نمایند.

ناشنوایی آخذوی: به نام ناشنوایی حسی عصبی (sensorineural) نیز یاد می‌شود. در این صورت آفت در بین cochlea و مرکز شنوایی دماغ واقع می‌باشد. چون در اکثر اوقات آفت در داخل گوش داخلی می‌باشد، بناءً به نام ناشنوایی ناشی از امراض گوش داخلی نیز یاد می‌شود.

در این صورت آواز حتی توسط عظام قحف نیز منتقل نمی‌شود؛ بناءً مریض قادر به شنیدن آواز خود نخواهد بود؛ در نتیجه وی همیشه با آواز بلند صحبت خواهد کرد، اما از سبب احساسات ناخوشایند ناشی از پدیده recruitment علاقه ندارد که دیگران به تون بلند صحبت کنند.

اسباب:

- موجودیت نقیصه در cochlea (امراض organ of Corti)
- تخریب اعصاب اتصال‌دهنده organ of Corti به مرکز شنوایی در قشر دماغ
- **ناشنوایی مختلط:** در این صورت هر دو نوع ناشنوایی به صورت همزمان موجود می‌باشد.

برای ارزیابی ناشنوایی سوالات ذیل را بپرسید:

- **شدت ناشنوایی:** یعنی خفیف، متوسط یا شدید.
- **شروع:** یعنی آیا به صورت آنی آغاز شده (از سبب موم) یا به صورت تدریجی (otosclerosis)؟
- **ثبات/نوسان:** یعنی به شکل ثابت است یا نوسانی؟ ناشنوایی نوسانی به انسداد تیوب Eustachian دلالت می‌کند.
- استعمال ادویه ototoxic مانند streptomycin و quinine.

برنگس گوش (Tinnitus)

عبارت از احساس ذهنی آواز بدون کدام منبه شنوایی است. Tinnitus می‌تواند به وصف ازدحام و شلوغی، خش‌خش یا آوازخوانی باشد.

اسباب: هر مرض دستگاه شنوایی می‌تواند باعث tinnitus شود. در بعضی حالات tinnitus ممکن از سبب bruit شریان کروتید، انوریزم داخل قحفی یا سؤاشکال شریانی وریدی باشد. بعضاً مریض از درک غیر نارمل آواز خودش شکایت می‌کند؛ این حالت به نام autophony یاد می‌شود.

سرچرخي (Vertigo)

عبارت از احساس حرکت چرخشی است. مریض احساس می‌کند که یا خودش یا اطرافش حرکت می‌کند. Vertigo می‌تواند متناوب (از سبب مشکلات دهلیزی مثلاً travel sickness) یا ثابت (از سبب آفات سیستم عصبی) باشد.

♦ معاینه گوش

یادداشت: قبل از معاینه گوش یا بینی یا بلعوم لازم است تا یک معاینه فیزیکی عمومی مختصر اجراء شود طوری که در شروع کتاب گذشت.

وضعیت مریض: مریض باید در مقابل داکتر بالای چوکی دورانی به وضعیت نشسته به فاصله ۲ فوت قرار داشته باشد. سویه ارتفاع چوکی باید طوری عیار گردد که هم برای داکتر و هم برای مریض راحت باشد. چوکی باید دور داده شود تا گوش ماؤوف در مقابل داکتر قرار بگیرد.

حالا گوش ماؤوف را معاینه نمایید:

- تفتیش
- جس
- معاینه داخلی

۱. تفتیش

اول‌تر از همه صیوان و mastoid را معاینه کنید ببینید که آیا کدام تورم در اطراف گوش وجود دارد یا خیر.

در صورت موجودیت تورم ممکن یک سؤشکل واضح در اطراف گوش موجود باشد. تورم ممکن از سبب ضخامه عقدات لمفاوی (در صورت موجودیت boil در مجرای سمع خارجی) یا از سبب آبسه mastoid باشد که در حالت اخیرالذکر میزابه خلفی گوش ممکن از سبب تپله شدن صیوان گوش به طرف سفلی و خلفی از بین رفته باشد. این حالت به نام انتعاذ صیوان گوش یاد می‌شود.

یادداشت: موقعیت غیر طبیعی گوش توسط دور دادن مریض به طوری که پشت گردن وی در مقابل داکتر قرار بگیرد تأیید می‌شود. حالا موقعیت هر دو گوش را ارزیابی کنید؛ گوش ماؤوف ممکن سؤشکل را نشان دهد.

بعد از معاینه صیوان گوش و mastoid حالا مجرای خارجی گوش ماؤوف را معاینه کنید.

موجودیت افرازاات را ملاحظه کنید اگر افرازاات موجود باشد، نکاتی که در شروع این فصل ذکر گردید را ملاحظه کنید.

حالا حالت جلد را نیز ملاحظه کنید یعنی هرگونه علایم التهاب، تفلس، موجودیت vesicle و غیره.

۲. جس

بعد از تفتیش حالا صیوان و mastoid را جس کنید.

کشش یا حتی لمس صیوان یا tragus ممکن در صورت موجودیت حالات التهابی گوش خارجی دردناک باشد.

در صورت mastoiditis فشار بالای mastoid process ممکن دردناک باشد. تلاش نمایید که عقدات لمفاوی ناحیوی را جس کنید در قدام، خلف و سفلی گوش. اگر بزرگ باشند نشان‌دهنده موجودیت boil در مجرای خارجی می‌باشد.

۳. معاینه داخلی (Otoscopy)

برای اوتوسکوپي auroscope استعمال می‌گردد. قبل از اجراء آن لازم است تا در مورد آن به مریض معلومات بدهیم.

طرز العمل:

- بزرگترین سپیکولم را که فکر می‌کنید برای سوراخ خارجی گوش مناسب باشد انتخاب کنید. حالا مریض را طوری وضعیت دهید که گوش ماؤوف وی به طرف شما باشد. حالا فرض می‌کنیم که گوش راست مریض ماؤوف است.

- داکتر با دست چپ خود صیوان گوش را به طرف علوی و خلف با ملایمت کش می‌کند که بدین وسیله قسمت غضروفی مجرای خارجی گوش مستقیم خواهد شد.
- حالا با دست راست (گوش راست دست راست و گوش چپ دست چپ) اورو سکوپ را در بین انگشت شست و انگشت اشاره مانند یک قلم محکم بگیرد. کنار زندی دست باید در مقابل رخسار مریض باشد تا از ترضیض که به اثر دور دادن رأس مریض بالای وی به وجود می‌آید جلوگیری شود. حالا سپیکولم را با ملایمت به داخل مجرای خارجی گوش داخل نمایید.
- جلد سوراخ خارجی گوش را تفتیش کنید موجودیت موم یا جسم اجنبی را مشاهده کنید.
- Speculum باید به طرز دورانی تا محل اتصال قسمت غضروفی و قسمت عظمی سوراخ خارجی داخل کرده شود.
- در صورت otitis media یا furunculosis اجراء otoscopy بسیار دردناک می‌باشد؛ بناءً تلاش نمایید تا آن را با ملایمت زیاد اجراء کنید.
- اگر مجرای خارجی با موم مسدود شده باشد آن را دور نمایید؛ اما اگر التهاب سبب انسداد شده باشد، در آن صورت بیشتر تلاش ننمایید.

معاینه غشای Tympanic:

- اگر گوش خارجی کدام مشکل نداشته باشد در آن صورت speculum را جهت معاینه غشای tympanic بیشتر داخل کنید.
- از سبب سطح مقعر غشای tympanic در هنگام معاینه یک مخروط روشن دیده خواهد شد.
- غشای tympanic به رنگ خاکستری مرواریدی دیده می‌شود.
- حالا تمامیت غشا را ببینید که آیا سالم است یا در آن کدام تثقب به وجود آمده است. موجودیت پلک‌های سفید نشان‌دهنده تشکل سکار در تثقب قبلی است.

- در صورت otitis media انبوهی از اوعیه دموی بالای دسته malleus دیده می‌شود. رنگ سرخ روشن طبل نشان‌دهنده التهاب است.
- در بعضی از حالات یک سویه مایع در خلف غشای طبل دیده می‌شود که otitis media مزمن را نشان می‌دهد.
- در صورت موجودیت otitis media حاد افزایش قیحی مخاطی به طور ثابت دیده می‌شود که از تثقب غشای tympanic به خارج سرازیر می‌شود.
- فرورفتگی غشای tympanic از سبب جذب هوای گوش متوسط از باعث اختلال وظیفه تیوب Eustachian می‌باشد؛ در این صورت short process عظم malleus بسیار برجسته معلوم می‌شود.
- غرض دیدن غشای tympanic از مریض تقاضا می‌گردد تا مانور Valsalva (زفیر جبری در مقابل glottis بسته) را اجراء نماید. در حالت نارمل غشای tympanic به طرف خارج حرکت خواهد کرد.

♦ تست‌های شنوایی

اگر مریض از اختلال شنوایی شکایت می‌کند در آن صورت موارد ذیل را معاینه نمایید:

- شدت ناشنوایی
- نوع ناشنوایی

تست‌ها برای ارزیابی شدت ناشنوایی

تست نجوا کردن (Whisper test): گوش دیگر مریض را با پنبه بسته کنید یا از مریض بخواهید که گوش دیگر خود را توسط تپله کردن tragus بسته کند. در عقب مریض ایستاد شوید در این صورت مریض قادر نخواهد بود که حرکات لب‌های شما را ببیند؛ حالا سوالات ساده را نجوا کنید. مثلاً، نام شما چیست؟ کجا زنده‌گی می‌کنید؟ چند خواهر و برادر دارید؟ یک شخص نارمل می‌تواند که آواز نجوایی را از فاصله ۲ فوت بشنود. هر گوش باید به صورت جداگانه معاینه شود.

تست ساعت دستی (Watch test): در این تست هر گوش به صورت جداگانه معاینه می‌شود. گوش دیگر را توسط پنبه بسته کنید یا از خود مریض بخواهید تا گوش دیگر خود را توسط تپله کردن tragus به طرف داخل بسته کند. ساعت دستی را از یک فاصله به گوش مریض تا زمانی نزدیک کنید که صدای تکتک آن را بشنود. فاصله را یادداشت کنید. حالا ساعت دستی را اولاً به گوش نزدیک کنید و بعداً آن را به تدریج تا زمانی از گوش دور کنید که مریض آواز ساعت را نشنود.

هر دو فاصله را یادداشت کنید؛ حالا اوسط هر دو فاصله را به دست آورید. این تست را توسط خودتان تکرار کنید و فاصله اوسط را یادداشت کنید. نسبت فیصدی شنوایی خود و مریض را محاسبه کنید: فرض کنید که فاصله برای مریض ۲۰ سانتی‌متر و برای داکتر ۳۰ سانتی‌متر است.

تست‌ها برای ارزیابی نوع ناشنوایی

قسمی که در ابتداء ذکر گردید ناشنوایی اساساً دو نوع است: ناشنوایی انتقالی و ناشنوایی آخذوی. جهت معاینه ناشنوایی از پنجه صوتی استفاده می‌گردد با اهتزاز دوچند (۲۵۶).

اساس معاینه: طول زمانی که در آن یک گوش نارمل یک پنجه صوتی را از طریق انتقال هوایی (air conduction - AC) می‌شنود ۲ چند انتقال عظمی (bone conduction - BC) است، یعنی $AC = 2BC$.

تست‌های ذیل اجراء می‌گردند:

Weber	Rinne (در گوش مصاب)	حالت
در وسط	مثبت ($AC > BC$)	نارمل
به طرف گوش مصاب	منفی ($BC > AC$)	کری انتقالی (conductive)
به طرف گوش سالم	مثبت (هر دو کاهش یافته)	کری حسی-عصبی (sensorineural)

جدول خلاصه ۱۳.۱: تفسیر تست‌های Rinne و Weber

تست Rinne: اولاً پنجه صوتی را توسط کوبیدن آن به زانوی تان به اهتزاز در بیاورید.

حالا قاعده پنجه صوتی اهتزازکننده را بالای mastoid process مریض بگذارید. از مریض بخواهید زمانی انگشت خود را بلند کند که آواز را نشنود.

پنجه صوتی را فوراً به مجرای خارجی گوش عین سمت نزدیک کنید. حالا از مریض بپرسید که آواز را می‌شنود یا خیر. اگر مریض آواز را می‌شنود نشان‌دهنده آن است که انتقال هوایی نسبت به انتقال عظمی بهتر است. این به نام Rinne مثبت یاد می‌شود. معنی آن اینست که مریض یا نارمل است یا ناشنوایی آخذوی دارد.

اگر مریض بگوید که آواز را نمی‌شنود به این معنی است که انتقال عظمی وی نسبت به انتقال هوایی بهتر است؛ این به نام Rinne منفی یاد می‌شود. معنی آن این است که مریض ناشنوایی انتقالی دارد.

تست Weber: قاعده پنجه صوتی اهتزازکننده را در بلندترین نقطه رأس مریض یا در وسط پیشانی وی بگذارید. حالا از مریض بپرسید که کدام گوش وی بهتر می‌شنود. اگر وی آواز را در هر دو سمت به طور مساویانه می‌شنود، نشان‌دهنده این است که شنوایی وی نارمل است یا این که ضیاع شنوایی در هر دو گوش به عین اندازه است. اگر مریض در یک گوش (گوش چپ) نسبت به گوش دیگر بهتر می‌شنود، نشان‌دهنده این است که گوش چپ وی ناشنوایی انتقالی دارد. تست این طور توضیح داده می‌شود: Weber به طرف چپ جانبی شده است.

اگر شنوایی در یک گوش از سبب ناشنوایی آخذوی مختل شده باشد، در آن صورت آواز در طرف نارمل بهتر شنیده خواهد شد. برای تشخیص تفریقی آن تست Weber باید توسط تست Rinne تعقیب شود.

Audiometry: غرض ارزیابی درجات مختلفه اختلالات شنوایی Audiometry توسط معاینه تون و تکلم اجراء می‌گردد.

♦ معاینه وظایف دهلیزی

اگر مریض از سرچرخی (vertigo) شکایت می‌کند در آن صورت تست‌های ذیل باید اجراء شوند:

تست وضعیتی Dix-Hallpike: در این تست از مریض تقاضا می‌گردد که در نزدیک کنار میز به وضعیت عمودی بنشیند.

حالا رأس وی را به اندازه ۴۵ درجه به یک طرف دور دهید و بعداً به صورت سریع وی را پایین نمایید طوری که رأس وی تقریباً ۳۰ درجه پایین‌تر از کنار میز قرار بگیرد. از مریض بخواهید که چشم‌های خود را باز نگهدارد. پدیدار شدن vertigo و nystagmus را مشاهده کنید.

تست fistula: مریض که مرض گوش متوسط و vertigo دارد، tragus گوش ماؤوف وی را در مقابل مجرای خارجی گوش فشار دهید تا آن را مسدود کند. این عمل مکرراً اجراء گردد.

اگر این پروسیجر احساس vertigo و nystagmus را ایجاد نماید، نشان‌دهنده موجودیت تثقب غشای طبل و ارتباط بین گوش متوسط و دستگاه دهلیزی است، یعنی ساییده‌گی کانال وحشی.



بینی

♦ اعراض امراض انفی

اگر یک مریض مصاب مرض بینی باشد وی اعراض ذیل را خواهد داشت:

- سؤشکل خارجی
- انسداد بینی
- افرازات انفی
- عطسه
- خون بینی (epistaxis)
- اختلال حس شامه
- درد وجهی و سردردی

۱. سؤشکل خارجی

اسباب آن قرار ذیل اند:

- ترضیض که منجر به کسر عظم انفی شده باشد.
- بینی ممکن از سبب تخریب حجاب انفی زمینمانند شده باشد.
- اگر پولیپ انفی موجود باشد بینی گشاد می‌باشد.
- در صورت موجودیت تومور مریض از تورم و افرازات خونی شاکی خواهد بود.
- موجودیت یک boil در دهلیز باعث تورم و احمرار نوک بینی می‌شود.
- امراض جلدی از قبیل lupus vulgaris و acne rosacea باعث تورم جلد بینی و تخریب انف می‌شود.
- سؤشکل بینی ممکن سبب ولادی داشته باشد.

۲. انسداد بینی

انسداد انف ممکن یک‌طرفه یا دوطرفه باشد. ممکن حاد یا مزمن باشد.

اسباب انسداد یک‌طرفه:

- جسم اجنبی
- پولیپ انفی
- تومور
- بزرگ شدن turbinate

اسباب انسداد دوطرفه:

- Rhinitis آلرژیک یا انتانی

● Sinusitis

● انحراف حجاب انف (DNS)

● Adenoids (در نزد اطفال)

انسداد متقطع از سبب تورم الرژیک مخاط انف (sinusitis و rhinitis) به وجود می‌آید.

انسداد حاد از سبب allergic rhinitis به وجود می‌آید.

مریض ممکن از این شاکی باشد که هنگام خواب، سوراخ بینی که در پایین قرار دارد مسدود می‌شود در حالی که سوراخ بالاتر آن باز باقی می‌ماند. این از سبب عکسه انفی ریوی به وجود می‌آید (ریه پایین‌تر که تحت فشار قرار گرفته به صورت عکسوی باعث بسته شدن سوراخ عین طرف می‌شود و یک پدیده نارمل است).

۳. افرازات بینی

اگر مریض از افرازات بینی شاکی باشد در آن صورت موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

● مقدار: مقدار وافر آن در allergic rhinitis دیده می‌شود در حالی که مقدار

اندک آن در امراض انتانی دیده می‌شود.

● قوام: در امراض الرژیک افرازات آب‌مانند می‌باشد، در حالی که در امراض انتانی

افرازات غلیظ و قیچی مخاطی می‌شود.

● رنگ: افرازات بدون رنگ یک علامه امراض الرژیک است در حالی که اگر رنگ

آن خاسف زرد یا زرد سبز باشد به امراض انتانی دلالت می‌کند. اگر با خون مخلوط باشد ممکن از سبب تومور یا جسم اجنبی باشد. اگر رنگ خون صاف باشد، نشان‌دهنده epistaxis است.

● بو: افرازات بدون بو در امراض الرژیک دیده می‌شود، در حالی که اگر بوی

متعفن داشته باشد به امراض انتانی دلالت می‌کند.

۴. عطسه

عطسه خفیف در آغاز اکثر امراض انفی موجود می‌باشد؛ عطسه‌های شدید علامه امراض الرژیک انف و انتانات وایرسی طرق تنفسی علوی است. عطسه ممکن توأم با افرازات بینی باشد.

۵. Epistaxis

آمدن خون روشن از بینی در ترصیضات موضعی، فرط فشار خون، امراض نزفی، استعمال ادویه ضد احتقانی و امراض انتانی عمومیت دارد.

۶. اختلالات بو

ضیاع مکمل احساس بو (anosmia) یا کاهش احساس بو (hyposmia) تظاهر hypertrophic rhinitis، پولیپ انفی و atrophic rhinitis است.

- **Anosmia:** کسر جوف قحفی قدامی از سبب ترصیض رأس باعث تخریب olfactory bulb می‌شود؛ در نتیجه anosmia به وجود می‌آید.
- **Hyposmia:** در انسدادهای میخانیکی بینی، تورم غشای مخاطی در allergic rhinitis، اجسام اجنبی و افرازات غلیظ به وجود می‌آید.
- **Casosmia (بوی ناخوشایند):** در sepsis مزمن به وجود می‌آید.

۷. درد وجهی و سردردی

در sinusitis زمانی که sinusها مسدود شوند، سردردی به وجود می‌آید. سردردی ناشی از امراض frontal sinus وصف دوره‌ای دارد. زمانی که مریض هنگام صبح از خواب بیدار می‌شود درد وجود ندارد، اما بعداً درد به تدریج پیشرفت نموده و در وسط روز به حد اعظمی خود می‌رسد و بعداً از شدت آن کاسته می‌شود تا این که در هنگام غروب فروکش نموده و از بین می‌رود. انحراف حجاب انفی از سبب فشار آن بالای turbinate متوسط باعث سردردی می‌شود.

◆ معاینه بینی

تفتیش

- منظره خارجی بینی را به دقت ببینید و حالت جلد و انحراف پل انفی را ارزیابی کنید. برای ارزیابی انحراف داکتر باید در خلف مریض قرار گرفته و بینی وی را از بالا ببیند در حالی که مریض به طرف بالا می‌بیند (منظره خط آسمانی).
- غرض ارزیابی سوراخ‌های قدامی انف، فقط بالا کردن نوک بینی معلومات خوبی را در مورد آفات انفی در نزد اطفال ارائه خواهد کرد.
- در نزد کاهلان معاینه به کمک اسپیکولم انفی صورت می‌گیرد.

میتود استفاده از اسپیکولم (Thudichum) انفی:

یک آلّه U شکل بوده دارای دو تیغه با اندازه‌های مختلف می‌باشد که باید در مطابقت با اندازه‌های سوراخ‌های بینی باشد.

آن را در دست چپتان طوری قرار دهید که تیغه‌های آن به طرف مریض متوجه باشند. انگشت اشاره در مقعریت لوپ از سمت مریض به طرف داکتر داخل کرده می‌شود. انگشت شستتان در بالای آن قرار داده می‌شود تا تثبیت گردد. حالا انگشت متوسط و حلقوی در دو طرف بازوهای U گذاشته می‌شود. حالا آلّه در بین انگشت متوسط و حلقوی گرفته شده می‌تواند با این عمل تیغه‌ها به هم نزدیک می‌شوند.

حالا تیغه‌ها را با ملایمت به سوراخ بینی داخل کنید. توسط شل کردن فشار بالای بازوهای U تیغه‌ها به تدریج از هم دور شده و داخل سوراخ بینی گشاد می‌شود. حالا حجاب انفی، جدار جنبی، سقف و زمین بینی را در روشنی تابیده از انعکاس نور آئینه رأس معاینه کنید.

هنگام اجرای این معاینه رأس مریض طبق نیاز از یک سو به سمت دیگر حرکت داده می‌شود.

- **معاینه حجاب انفی:** ببینید که آیا حجاب انفی در موقعیت مرکزی خود است یا خیر؟ به این منظور اندازه‌های سوراخ بینی را با هم مقایسه کنید.
- اگر کدام آفت در حجاب موجود باشد، آن را در نظر داشته باشید.

- اگر epistaxis موجود باشد ببینید که آیا کدام نقطه خونده یا کدام علقه در ناحیه Little در زاویه قدامی سفلی حجاب قرار دارد موجود است.
- ببینید که آیا حجاب تثقب کرده است.
- برای معاینه زمین انف راس مریض را کمی به طرف سفلی کج کنید.
- برای معاینه سقف جوف انف راس مریض را کمی به طرف بالا کج کنید.
- اگر افرازات، پولیپ یا تومور موجود باشد، آن را در نظر داشته باشید. پولیپ خاکستری خاسف، لشم و انگورمانند می‌باشد.
- **معاینه جدارهای جنبی انف:** نهایت قدامی turbinate سفلی را مشاهده کنید:
- در allergic rhinitis ضخیم بوده و غشای مخاطی آن خاسف و مرطوب می‌باشد.
- در vasomotor catarrhal rhinitis غشای مخاطی لشم، متورم و سرخ می‌باشد.
- سطوح آن در chronic hypertrophic rhinitis غیر منظم می‌باشد.
- در atrophic rhinitis در آن التواها موجود می‌باشند.
- موجودیت تورم خاکستری و خاسف که سبب انسداد سوراخ‌های بینی شود به پولیپ دلالت می‌کند.
- حالا turbinate متوسط را معاینه کنید اندازه، رنگ و موقعیت آن را به دقت ببینید:
- در امراض انتانی ضخاموی می‌شود.
- برای تشخیص تفریقی تورم داخل انف سه معاینه ذیل اجراء می‌گردد:
- از مریض بخواهید که هوا را از سوراخ‌های بینی خود خارج کند. بدین وسیله بینی از مخاط و قیح پاک شده و پولیپ بهتر دیده خواهد شد.
- سپری مقبض الوعایی یا pack تورم الرژیک را به اندازه قابل ملاحظه کاهش خواهد داد. تورم انتانی به اندازه کم کاهش خواهد یافت؛ اما بالای انحراف septum، اجسام اجنبی و تومور کدام تأثیر نخواهد داشت.

- برای مشخص ساختن طبیعت تورم از یک پروب انفی کند استفاده می‌شود.

Rhinoscopy خلفی

برای اجرای آن از یک آئینه rhinoscopy خلفی که با یک ساق گوشه‌دار وصل است استفاده می‌شود.

طرز العمل:

- اولاً آئینه توسط یک چراغ الکولی یا چراغ نوری گرم کرده شود.
- بعداً توسط حرکت دادن در هوا سرد کرده شود.
- درجه حرارت آن توسط گذاشتن آن بالای کف دست و بعداً بالای وجه ظهري دست معاینه شود.
- از مریض بخواهید که دهن خود را باز کند.
- به کمک depressor زبان، زبان اندکی به یک سمت تیره شود.
- حالا آئینه به جوف دهن داخل کرده شود.
- آن را به احتیاط به طرف بلعوم حرکت دهید و بدون تماس به uvula به داخل ناحیه فمی‌بلعومی بلغزانید. جهت آن باید به طرف بالا باقی بماند.
- به کمک روشنی، ناحیه فمی‌بلعومی را با حرکت دادن آئینه در مطابقت با وضعیت‌های مختلفه به صورت مکمل مشاهده کنید.
- جزئیات ساختمان‌های مختلفه سوراخ‌های خلفی بینی و نهایت خلفی turbinate که قابل دید هستند را ملاحظه نمایید.
- در جدارهای جنبی ناحیه فمی‌بلعومی، فوهات تیوب‌های Eustachian دیده می‌شوند.

یادداشت: در زمان اجرای rhinoscopy خلفی از مریض بخواهید که از طریق

بینی تنفس نماید. این عمل باعث خواهد شد که حنک نرم به طرف بالا حرکت نماید و بدین وسیله فضای خلفی بینی قابل دید می‌شود.

جس

جس بینی غرض دریافت حساسیت اجراء می‌گردد.

هر سوراخ بینی به نوبت مسدود شده و از مریض خواسته می‌شود که تنفس کند. این عمل برای ارزیابی انسداد بینی اجراء می‌گردد.



گلو

◆ اعراض امراض بلعوم

اعراض عمده آن قرار ذیل اند:

- **گلودردی:** مریض ممکن از درد یا خارش بلعوم شکایت نماید. درد از سبب انتان و التهاب بلعوم به وجود می‌آید؛ مثلاً pharyngitis, tonsillitis, quinsy (آبسه اطراف تانسِل). خارش از سبب الرژی بلعوم به وجود می‌آید. برای توضیح درد لازم است تا در مورد آغاز، مدت و شدت آن پرسیده شود.
- **سرفه:** سرفه که از سبب امراض بلعوم به وجود می‌آید بدون تقشع می‌باشد. ممکن از سبب tonsillitis یا pharyngitis باشد. سایر اسباب سرفه امراض ریوی هستند.
- **Dysphagia و Odynophagia:** به معنی مشکلات در فعل بلع است و odynophagia به بلع دردناک اطلاق می‌شود. التهابات بلعوم سبب بلع دردناک می‌شود. اگر کم‌خونی یا حالات اتروفیک موجود باشد، در آن صورت dysphagia از سبب فقدان ترشحات غده‌های مخاطی به وجود می‌آید. فلج حنک و بلعوم باعث مشکلات در فعل بلع می‌شود؛ در این صورت ممکن غذا در زمان بلع به بینی برگشت نماید. موجودیت کتله نیز سبب dysphagia می‌شود.
- **Dysphonia / Dysphasia:** مشکلات در تکلم در حالات هایپرتروفی تانسِل‌ها یا کدام کتله در بلعوم به وجود می‌آید.

- **Stridor:** آوازی است که در هنگام شهیق تولید می‌شود. Stridor از سبب تنگ شدن طرق هوایی علوی، مخصوصاً شزن به وجود می‌آید. در التهاب حنجره، التهاب اپیگلوتیس و تومور نیز به وجود آمده می‌تواند.

یادداشت: اگر stridor موجود باشد تلاش نکنید که بلعوم را معاینه کنید، زیرا ممکن سپازم شدید حنجره تحریک شده بالآخره به انسداد کامل طرق هوایی منتهی شود.

♦ معاینه گلو

تفتیش

- بعد از این که مریض در مقابل شما به وضعیت نشسته قرار گرفت از وی بخواهید که دهن خود را باز نموده و به آرامی تنفس نماید.
- با استفاده از روشنی چراغ قسمت داخلی جوف دهن را به صورت مکمل ببینید.
- برای مشاهده درست دهن باید از depressor زبان استفاده شود.
- تمام قسمت‌های دهن از قبیل قسمت داخلی رخسار و لب‌ها، زبان، حنک و دندان‌ها باید معاینه شوند؛ اگر کدام التهاب، قرحه یا کدام کتله موجود باشد آن را در نظر داشته باشید. با استفاده از depressor زبان رخسارها را از بیرها دور کنید.
- از مریض بخواهید تا زبان خود را به طرف بالا حرکت دهد، یعنی زبان را به تماس سقف دهن بیاورد. حالا زمین دهن را معاینه نمایید.
- بعداً خلف جوف دهن را معاینه نمایید؛ به این منظور زبان را با depressor فشار دهید. فشار باید در دو ثلث قدامی زبان باشد. در عین زمان از وی بخواهید که «آه» بگوید؛ با این عمل منظره داخلی حنک، uvula، tonsil و tonsillar pillars به خوبی نمایان خواهد شد.
- تناظر و حرکات حنک نرم را ملاحظه نمایید.
- اگر کام چاک موجود باشد، آن را ملاحظه کنید.

- تناظر، اندازه و رنگ تانسرها را معاینه کنید؛ اگر کدام قرحه یا قیح قابل دید در تانسرها موجود باشد آن را ملاحظه کنید.
- ببینید که آیا کدام تورم در جدار خلفی بلعوم یا در اطراف آن وجود دارد.

جس

عقدات لمفاوی jugulodigastric را که در تحت زاویه فک قرار دارند جس نمایید. این توسط گذاشتن انگشت شست دست راست بالای عقدات لمفاوی راست و انگشت اشاره بالای عقدات لمفاوی چپ انجام می‌شود. اگر التهاب بلعوم موجود باشد این عقدات لمفاوی قابل جس می‌گردند. در اخیر عقدات رقیبی خلفی را جس نمایید.

Laryngoscopy غیر مستقیم

- یک آئینه لارینگوسکوپی غیر مستقیم را گرفته آن را گرم نمایید. بعداً سرد نمایید.
- درجه حرارت آن را توسط تماس دادن آن به کف دست و بعداً به سطح ظهري دست آزمایش نمایید.
- از مریض بخواهید که دهن خود را باز نماید.
- حالا نوک زبان را با یک پارچه گاز در بین انگشت شست و انگشت شهادت دست چپ محکم بگیرید. زبان را هرگز کش نکنید.
- به کمک انگشت متوسط دست چپ لب علوی و دندانها را محکم بگیرید.
- حالا آئینه را در جوف دهن تا uvula پیش ببرید.
- آن را تا خلف uvula پیش ببرید؛ در زمان اجرای آن تنه آئینه باید در زاویه چپ دهن باشد.
- روشنی چراغ را بالای آن بتابانید. حالا شما می‌توانید hypopharynx، قاعده زبان، epiglottis و تانسرها را مشاهده نمایید.
- در صورتی که کدام التهاب یا قرحه موجود باشد، آن را ملاحظه کنید.






فصل چهاردهم

الکتروکاردیوگرافی (ECG)

الکتروفیزیولوژی عضله قلبی

ثبت فعالیت برقی عضله قلب از طریق اتصال بدن شخص با الکترودها و ماشین ECG به نام الکتروکاردیوگرافی یاد می‌شود.

در حالت استراحت (حالت polarized)، قسمت داخلی حجرات عضله قلبی منفی و بخش خارجی آن مثبت می‌باشد. زمانی که عضله قلبی توسط یک جریان برقی تحریک شود، چارج آن معکوس می‌شود؛ یعنی بخش داخلی حجرات عضلی مثبت و بخش خارجی آن منفی می‌گردد. این تغییر به نام depolarization یاد می‌شود. زمانی که موجه تحریک ختم شود حالت استراحت دوباره اعاده می‌شود؛ یعنی چارج داخل الیاف عضلی منفی و از خارج آن مثبت می‌گردد. این پروسه بازگشت به حالت استراحت به نام repolarization یاد می‌شود.



شکل ۱۴.۱: دیپولرایزیشن و ریپولرایزیشن

انتقال سیاله قلبی


ضربان‌ساز قلب (عقدۀ SA) در محل اتصال superior vena cava و صوان اذین راست قرار دارد که در سطح endocardial جدار خلفی مدفون می‌باشد. عقدۀ SA سیاله برقی را به شکل موجۀ depolarization آغاز می‌نماید، که به تمام عضله قلب منتشر می‌شود. از عقدۀ SA موجۀ depolarization به اذین‌ها انتشار می‌نماید.


بعد از تحریک اذین‌ها موجۀ depolarization به عقدۀ AV، سپس به بندل AV و بعداً به شعبات حزموی راست و چپ (right & left bundle branches) می‌رسد. بالآخره موجۀ از طریق الیاف سیستم Purkinje منتقل شده و depolarization بطین‌ها را آغاز می‌نماید. بعد از دیپولرایزیشن، repolarization آغاز می‌شود. قسمتی که مؤخرتر دیپولرایز می‌شود، زودتر ریپولرایز می‌گردد. ذروه قلب مؤخرتر دیپولرایز می‌شود، بناءً زودتر ریپولرایز می‌گردد. به این طریقه موجۀ repolarization از ذروه به قاعدۀ قلب انتشار می‌نماید.

محور قلبی (Cardiac axis)

حرکت جریانات برق از یک نقطه به نقطه دیگر توسط یک تیر نمایش داده می‌شود. این تیر به نام «وکتور» یاد می‌شود. یک وکتور نشان‌دهنده دو چیز است:

- جهت حرکت جریان‌ها؛ یعنی نوک تیر همیشه به طرف سمت مثبت قرار دارد.
 - طول تیر نشان‌دهنده ولتاژ است که توسط جریان تولید می‌شود؛ یعنی هر قدر ولتاژ زیاد باشد به همان تناسب طول تیر زیاد می‌باشد.
- سمت محور نارمل قلب به طرف پایین و چپ قرار دارد و به طور اوسط در حدود $+60^\circ$ می‌باشد. حدود نارمل آن از -30° تا $+90^\circ$ است. تجاوز از این حدود به نام انحراف (deviation) یاد می‌گردد.





لیدها (Leads)

ECG ستندرد از ۶ لیدهای اندامها و ۶ لیدهای صدری ترکیب یافته است.

◆ لیدهای اندامها (Limb leads)

اینها توسط گذاشتن الکترودها بالای دستهای راست و چپ و پای چپ ثبت می‌گردند:

- **لید I:** توسط گذاشتن الکتروده مثبت بالای دست چپ و الکتروده منفی بالای دست راست ثبت می‌شود.
- **لید II:** توسط گذاشتن الکتروده منفی بالای دست راست و الکتروده مثبت بالای پای چپ ثبت می‌شود.

- **لید III:** توسط گذاشتن الکتروود مثبت بالای پای چپ و الکتروود منفی بالای دست چپ ثبت می‌شود.


◆ **لیدهای تقویت شده (Augmented leads)**

- **لید aVR:** نشان‌دهنده پوتانشیل جوف راست است. در این لید، دست راست مثبت و سایر الکترودهای اندام‌ها منفی می‌باشند.
- **لید aVL:** نشان‌دهنده پوتانشیل جوف چپ است. در این لید، دست چپ مثبت و سایر الکترودهای اندام‌ها منفی می‌باشند.
- **لید aVF:** نشان‌دهنده پوتانشیل اپیکارد بطن چپ است. در این لید، پای چپ مثبت و سایر الکترودهای اندام‌ها منفی می‌باشند.

◆ **لیدهای صدری (Chest leads)**

برای این منظور الکترودهای مثبت در ۶ موقعیت مختلف جدار قدامی صدر گذاشته می‌شود:

- **V1:** الکتروود در مسافه بین‌الضلعی چهارم بالای کنار راست sternum گذاشته می‌شود.
- **V2:** الکتروود در مسافه بین‌الضلعی چهارم بالای کنار چپ sternum گذاشته می‌شود.
- **V3:** الکتروود در بین V2 و V4 گذاشته می‌شود.
- **V4:** الکتروود در مسافه بین‌الضلعی پنجم بالای خط متوسط ترقوی گذاشته می‌شود.
- **V5:** الکتروود در نقطه‌ای که خط ابطی قدامی چپ و یک خط افقی از V4 باهم تلاقی می‌نمایند گذاشته می‌شود.
- **V6:** الکتروود در نقطه‌ای که خط افقی از V4 با خط ابطی متوسط چپ تلاقی می‌نماید گذاشته می‌شود.



V1 و V2: مسافه بین الضلعی چهارم راست و چپ قص؛ V4: مسافه پنجم خط ترقوی متوسط؛ V3
 بین V2 و V4؛ V5 خط ابطنی قدامی؛ V6 خط ابطنی متوسط

شکل ۱۴.۴: لیدهای صدري

ECG نارمل

الکتروکاردیوگرام نارمل مرکب از موجه‌هایی است که توسط دیپولرایزیشن و ریپولرایزیشن اذین‌ها و بطین‌ها تولید می‌شود. موجه‌های ECG توسط حروف P، QRS و T نمایش داده می‌شود.



ECG نارمل: ریتم جیبی منظم، ریت حدود ۷۵ فی دقیقه (۴ مربع بزرگ بین دو موجه R)


شکل ۱۴.۵: ECG نارمل

♦ موج‌های نارمل

- **موج P:** توسط دیپولرایزیشن اذین‌ها تولید می‌شود. مدت آن کمتر از ۰/۱۲ ثانیه و ارتفاع آن تا ۲/۵ ملی‌متر می‌رسد. ممکن در لید aVR و V1 معکوس باشد.
- **کمپلکس QRS:** از آغاز موج Q تا انجام موج S را شامل می‌شود. مدت نارمل آن کمتر از ۰/۱۲ ثانیه (کمتر از ۳ مربع کوچک) است.
- **موج T:** ارتفاع آن در لیدهای اندام‌ها معمولاً کمتر از ۵ ملی‌متر و در لیدهای صدری کمتر از ۱۰ ملی‌متر می‌باشد. در تمام لیدها مثبت است، به استثنای لید aVR. در نزد افراد نارمل در لیدهای V1، aVF، III، و V2 معکوس بوده می‌تواند.

♦ انتروال‌های نارمل

- **PR interval:** از آغاز موج P الی آغاز موج Q را در بر می‌گیرد. مدت نارمل آن ۰/۱۲-۰/۲۰ ثانیه (۳-۵ مربع کوچک) است.
- **زمان فعال‌سازی بطن‌ها (VAT - Ventricular activation time):** عبارت از زمان لازم برای دیپولرایزیشن بطن‌ها است. از آغاز کمپلکس QRS الی قله موج R را در بر می‌گیرد. به صورت نارمل ۰/۰۳-۰/۰۵ ثانیه برای بطن چپ است.
- **QT interval:** از آغاز کمپلکس QRS الی انجام موج T را در بر می‌گیرد. طول آن نظر به ریت قلبی تغییر می‌کند؛ بناءً QT اصلاح‌شده (QTc) به کار می‌رود که به صورت نارمل در مردها کمتر از ۰/۴۴ و در خانم‌ها کمتر از ۰/۴۶ ثانیه است.



اندازه‌های نارمل (کاهلان):
 • موج P: کمتر از ۱۲/۱۰ ثانیه، ارتفاع کمتر از ۲/۵ میلی‌متر
 • PR interval: ۱۲۰-۲۰۰ میلی‌ثانیه (۳-۵ مربع کوچک)
 • QRS: کمتر از ۱۲/۱۰ ثانیه (کمتر از ۳ مربع کوچک)
 • QTc: مردها کمتر از ۴۴/۰، خانمها کمتر از ۴۶/۰ ثانیه
 • موج T: کمتر از ۵ میلی‌متر در لیدهای اندام‌ها و کمتر از ۱۰ میلی‌متر در لیدهای صدری

شکل ۱۴.۶: انتروال‌ها و سگمنت‌های ECG

مطالعه سیستماتیک ECG

ECG بر اساس شیمای ذیل خوانده می‌شود:


- ریت (rate)
- ریتم (rhythm)
- انحراف محور (axis deviation)
- هایپرتروفی بطنی (ventricular hypertrophy)
- موج P
- PR interval
- کمپلکس QRS
- سگمنت ST
- موج T

♦ ریت (Rate)

قبل از بحث در مورد محاسبه ریت قلبی لازم است تا در مورد کاغذ ECG معلومات داشته باشیم.

کاغذ ECG: کاغذ ECG یک کاغذ طویل است که از مربعات کوچک ساخته شده است. عرض این مربعات ۱ میلی‌متر و ارتفاع آن نیز ۱ میلی‌متر است. در کاغذ ECG

خطوط ضخیم نیز وجود دارند. در بین دو خط ضخیم، ۵ مربع کوچک وجود دارد. سرعت حرکت کاغذ ECG به طور استاندارد ۲۵ ملی‌متر فی ثانیه می‌باشد. بناءً گفته می‌توانیم که به صورت افقی، مربعات کوچک زمان را نشان می‌دهد. فلذا هر مربع کوچک نشان‌دهنده انتروال زمانی ۰/۰۴ ثانیه و هر مربع بزرگ که عرض آن ۵ ملی‌متر است نشان‌دهنده انتروال زمانی ۰/۲ ثانیه است.



مربع کوچک (سرخ): ۱ ملی‌متر = ۰/۰۴ ثانیه = ۰/۱ ملی‌ولت
 مربع بزرگ (سبز): ۵ ملی‌متر = ۰/۲ ثانیه = ۰/۵ ملی‌ولت
 ۵ مربع بزرگ = ۱ ثانیه (سرعت کاغذ ۲۵ ملی‌متر فی ثانیه)
 ریت قلبی = ۳۰۰ ÷ تعداد مربعات بزرگ بین دو موج R

شکل ۱۴.۷: مربعات ECG

به صورت عمودی، مربع کوچک نشان‌دهنده اندازه پوتانشیل برقی است. ماشین ECG طوری عیار گردیده که یک سیاله ۱ ملی‌ولت باعث انحراف ۱۰ مربع کوچک می‌شود.

چطور می‌توان ریت قلبی را محاسبه نمود؟

دو روش وجود دارد:

۱. زمانی که ریتم منظم باشد:

برای محاسبه ریت قلبی تعداد مربعات بزرگ را در بین قله‌های R عین لید بشمارید. بعداً ۳۰۰ را تقسیم آن کنید در نتیجه ریت قلبی در یک دقیقه حاصل خواهد شد.

یک روش سریع محاسبه ریت قلبی قرار ذیل است:

- اگر در بین دو قله R یک مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۳۰۰ فی دقیقه می‌گردد.
- اگر در بین دو قله R دو مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۱۵۰ فی دقیقه می‌گردد.
- اگر در بین دو قله R سه مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۱۰۰ فی دقیقه می‌گردد.
- اگر در بین دو قله R چهار مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۷۵ فی دقیقه می‌گردد.

- اگر در بین دو قله R پنج مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۶۰ فی دقیقه می‌گردد.
- اگر در بین دو قله R شش مربع بزرگ باشد، ریت قلبی ۵۰ فی دقیقه می‌گردد.

۲. زمانی که ریتم غیر منظم باشد:

در این صورت کمپلکس‌های QRS دارای فواصل مختلف خواهند بود. بناءً ریت قلبی طور ذیل محاسبه می‌شود:

کمپلکس‌های QRS را در ۱۵ مربع بزرگ محاسبه کنید، بعداً آن را ضرب ۲۰ کنید. در نتیجه ریت قلبی در یک دقیقه حاصل خواهد شد.

♦ ریتم (Rhythm)

ریتم زمانی منظم گفته می‌شود که فاصله بین دو موج R یا دو موج S در تمام لیدها مساوی باشد. اگر چنین نباشد گفته می‌شود که ریتم غیر منظم است. اگر بی‌نظمی بعد از انتروال‌های منظم باشد گفته می‌شود که ریتم به صورت منظم نامنظم (regularly irregular) است. اگر بی‌نظمی بعد از انتروال‌های نامنظم (irregularly irregular) باشد، گفته می‌شود که ریتم به صورت غیر منظم نامنظم (irregularly irregular) است.

ریتم غیر منظم به نام arrhythmia یاد می‌شود.

اریتمی (Arrhythmia)

تعریف: گروهی از تشوشاتی است که در آن اختلالات ریتم قلبی وجود دارد. به گروپ‌های ذیل تصنیف می‌شود:

- Sinus arrhythmia
- Atrial arrhythmia
- AV junctional (nodal) arrhythmia
- Ventricular arrhythmia
- حالات متفرقه:
- Accelerated conduction

● Heart block

◆ (۱) اریتمیای جیبی (Sinus arrhythmia)

ریت سیاله‌هایی که از عقده SA نشأت می‌نمایند با تنفس تغییر می‌نماید. با شهیق افزایش یافته و با زفیر کاهش می‌یابد. این هیچ گونه مرض ارگانیک قلب را نشان نمی‌دهد بلکه یک عکس‌العمل فزیولوژیک نارمل است.

سندروم bradycardia-tachycardia به نام sick sinus syndrome نیز یاد می‌شود. در این حالت sinus bradycardia قابل ملاحظه از سبب بعضی از امراض موجود می‌باشد. این دوره‌های برادی‌کاردیا دفعه‌تاً توسط tachycardia فوق البطنی دنبال می‌شود. نکته مهم اینست که این نوع تکی‌کاردیا نباید تداوی شود زیرا عوارض جانبی آن بالای عقده SA زمانی که به مرحله برادی‌کاردیا بر می‌گردد به میان می‌آید.

◆ (۲) اریتمیای اذینی (Atrial arrhythmia)

چهار نوع است:

- ضربان‌های اکتوپیک اذینی (Atrial ectopic beats): از یک محراق تحریک‌پذیر دیگر در اذین‌ها نشأت می‌نماید. این ضربان‌ها در نتیجه اخذ تنباکو، چای، قهوه و حتی از سبب سترس به وجود آمده می‌تواند. امراض ارگانیک قلب نیز باعث این حالت شده می‌تواند. منبع ضربان‌های اکتوپیک در محراق اکتوپیک می‌باشد.



شکل ۱۴.۸: Atrial ectopic beats

اگر محراق در اذین‌ها قرار داشته باشد سیاله‌ها به طرف سفلی حرکت می‌نمایند؛ یعنی در امتداد مسیر انتقالی. فلذا P شکل نارمل را خواهد داشت؛ یعنی در aVR معکوس و در aVF ایستاده خواهد بود. اگر محراق اکتوپیک پایین‌تر از اذین‌ها قرار داشته باشد، موج P در aVR ایستاده و در aVF معکوس خواهد بود. به هر صورت کمپلکس‌های QRS منظره نارمل را خواهند داشت. نکته دیگری که باید به خاطر داشت اینست که بعد از هر ضربان اکتوپیک یک مکث جبرانی (compensatory pause) موجود می‌باشد؛ یعنی انتروال بین قله R ضربان اکتوپیک و قله R ضربان نارمل بعدی، نسبت به انتروال بین دو قله‌های R ضربان‌های نارمل بیشتر خواهد بود.

- **تکی‌کاردیای اذینی (تکی‌کاردیای فوق بطنی):** عبارت از سلسله‌ای از ضربان‌های اکتوپیک اذینی منظم و سریع است که از یک محراق دیگر در اذین‌ها به غیر از عقده SA نشأت می‌نمایند. در این حالت، ریت قلبی ۱۵۰ - ۲۲۰ فی دقیقه خواهد بود. معمولاً کدام مرض ارگانیک قلبی را نشان نمی‌دهد. در حالت سترس به وجود می‌آید. سایر اسباب آن عبارت اند از: IHD، تضیق mitral و thyrotoxicosis.

یافته‌های ECG:

- ریت قلبی سریع می‌باشد.
- هر ضربان اکتوپیک توسط کمپلکس QRS دنبال خواهد شد.
- PR interval اکثراً طویل می‌باشد.
- موج P ممکن در کمپلکس‌های QRS بعدی مدغم شود.

یادداشت: با فشار carotid sinus (مانور Valsalva)، تکی‌کاردیای اذینی در مقایسه با sinus tachycardia دفعتهاً ختم می‌شود، در حالی که در اخیرالذکر ریت قلبی به تدریج بطی خواهد شد.

- **فبریلیشن اذینی (Atrial Fibrillation):** توسط سریع بودن و نامنظم بودن کامل ریت اذینی و بطنی مشخص می‌شود. ریت تقلص اذینی در بین


۳۰۰-۶۰۰ فی دقیقه خواهد بود. IHD سبب عمده آن را تشکیل می‌دهد. سایر امراض که سبب فبریلیشن اذینی می‌شوند عبارت اند از: مرض روماتیک دسام mitral و hyperthyroidism. بعضاً در نزد افراد نارمل ممکن موجود باشد.

علامت ECG:



شکل ۱۴.۹: Atrial fibrillation

- موج P توسط موج‌های متعدد f تعویض می‌شود. در لید V1 بهتر دیده می‌شود.
- کمپلکس QRS منظره نارمل دارد.
- انتروال بین قله‌های R متفاوت خواهد بود یعنی ریتم به صورت irregularly irregular خواهد بود.
- **فلوتر اذینی (Atrial Flutter):** در این صورت ریتم اذینی سریع و منظم می‌باشد (۲۵۰-۳۵۰ فی دقیقه، معمولاً حدود ۳۰۰) با AV block درجه ۲:۱، ۳:۱ یا ۴:۱ همراه می‌باشد. اسباب عمده آن عبارت اند از: IHD، مرض روماتیک دسام mitral و thyrotoxicosis. در اشخاص نارمل نیز واقع شده می‌تواند.



شکل ۱۴.۱۰: Atrial flutter

یافته‌های ECG:

- موج‌های P توسط موج‌های F مشابه دندان‌های اره تعویض می‌شود. در لیدهای aVF، III، II و V1 بهتر دیده می‌شود.
- کمپلکس QRS منظره نارمل دارد.
- ریتم منظم می‌باشد.
- اکثراً با AV block درجه ۲:۱، ۳:۱ یا ۴:۱ همراه می‌باشد.
- ریتم بطنی معمولاً منظم می‌باشد؛ یعنی ۱/۲ یا ۱/۴ ریت اذینی. بعضی اوقات از سبب AV block تغییرکننده ریتم بطنی غیر منظم می‌شود.

یادداشت: بعضاً ریت و ریتم ECG بین flutter و fibrillation تغییر می‌کند. در این حالت اصطلاح flutter-fibrillation یا coarse fibrillation به کار می‌رود.

♦ (۳) AV junctional (nodal) arrhythmia

ضربان‌های اکتوپیک (Ectopic beats): این‌ها از یک محراق در جنکشن اذینی بطنی منشأ می‌گیرند. محراق ممکن بالاتر یا پایین‌تر قرار داشته باشد.

یافته‌های ECG:

- موج P معمولاً در لید aVF معکوس و در لید aVR راست خواهد بود. بعضاً بر اساس محل محراق اکتوپیک در کمپلکس‌های QRS مدغم خواهد بود یا آن را تعقیب خواهد کرد.
- کمپلکس‌های QRS منظره نارمل می‌داشته باشند.



شکل ۱۴.۱۱: Junctional rhythm


♦ (۴) اریتمیای بطنی (Ventricular arrhythmia)

سه نوع اند:

- **ضربان‌های اکتوپیک بطنی (ventricular ectopic beats):** این‌ها از یک محرک اکتوپیک در مایوکارد بطنی منشأ می‌گیرند. IHD سبب معمول آن را تشکیل می‌دهد. سایر اسباب آن عبارت اند از: تسمم با digitalis و myocarditis.

یافته‌های ECG:

- موجه P قبل از ectopic beat موجود نخواهد بود.
- کمپلکس QRS منظره عجیب و غریب (bizarre) را نشان می‌دهد. اکثراً وسیع و بزرگ می‌باشد.
- بعد از هر ectopic beat یک compensatory pause موجود می‌باشد.




شکل ۱۴.۱۲: Ventricular ectopic beats - PVC

یادداشت: اگر محراق اکتوپیک در بطن چپ قرار داشته باشد، کمپلکس‌های QRS در لید V1 ایستاده و در لیدهای V5-V6 معکوس می‌باشند. اگر محراق اکتوپیک در بطن راست قرار داشته باشد کمپلکس‌های QRS در لید V1 معکوس و در لید V6 ایستاده خواهد بود.

ممکن سیاله‌های چند محراقی موجود باشد؛ یعنی تقلصات قبل از وقت (premature) بطنی از هر دو بطن.

بعضاً تقلصات premature بطنی ممکن در اوج یا در نزول موج T کمپلکس QRS ماقبل واقع شود. این به نام پدیده R بالای T (R on T phenomenon) یاد می‌شود. این حالت خطرناک است زیرا می‌تواند به تکی‌کاردیای بطنی و فبریلیشن بطنی منتهی شود.

- **تکی‌کاردیای بطنی (Ventricular Tachycardia):** توسط تعداد زیاد کمپلکس‌های QRS که به صورت عجیب و غریب (bizarre) هستند و به صورت سریع واقع می‌شوند مشخص می‌گردد. ریت معمولاً ۱۴۰-۲۲۰ فی دقیقه می‌باشد.



شکل ۱۴.۱۳: Ventricular tachycardia


یافته‌های ECG:

- موج P در کمپلکس QRS مدغم می‌باشد.
- کمپلکس‌های QRS وسیع می‌باشند.

- ممکن نیست که کمپلکس‌های QRS را از سگمنت‌های ST و موج‌های T تفکیک نماییم.

یادداشت: بعضاً کمپلکس QRS در هر لید در سمت‌های مخالف متناوب می‌باشد که نشان‌دهنده محراق در هر دو بطن می‌باشد. این حالت به نام ventricular bidirectional tachycardia یاد می‌شود.

- **فبریلیشن بطنی (Ventricular Fibrillation):** عبارت از یک ریتم سریع و نامنظم است. این حالت از سبب موجودیت محراقات تحریک‌پذیر در بطن‌ها به وجود می‌آید که سیاله‌ها را به گونه غیر منظم در تمام عضله بطنی پخش می‌نمایند.



شکل ۱۴.۱۴: Ventricular fibrillation

یافته‌های ECG:

ECG یک شکل غیر منظم و bizarre را نشان می‌دهد. موج‌ها کوچک بوده و هیچ گونه ریتم موجود نخواهد بود.

♦ (۵) اریتمیهای متفرقه

(الف) انتقال تسریع شده (Accelerated conduction):

مشمول است بر:

- **سندروم وولف-پارکینسون-وایت (Wolff-Parkinson-White syndrome)**

WPW (-): این سندروم یک مثال accelerated conduction است که در آن

سیاله از اذین‌ها به بطن‌ها از طریق مسیر فرعی (بندل Kent) عبور می‌نماید.

این بندل از اذین منشأ گرفته، عقده اذینی بطینی را bypass نموده و به مایوکارד بطین‌ها داخل می‌شود.

یافته‌های ECG:

- موج P نارمل
- PR interval کوتاه
- موجودیت موج‌های Delta در کمپلکس QRS
- کمپلکس‌های QRS وسیع
- انواع سندروم WPW بر اساس موقعیت بندل Kent به دو نوع است:
 - **نوع A:** در این نوع موج‌های R بلند در لید V1 موجود می‌باشد.
 - **نوع B:** در این نوع موج‌های R بلند در V5 و V6 موجود می‌باشد.

یادداشت: در موجودیت سندروم WPW تشخیص الکتروکاردیوگرافیک احتشای مایوکارد تصدیق نمی‌شود، زیرا بعضاً از سبب جهت‌یابی علوی موج دلتا، موج‌های Q در لید III و aVF به صورت نادرست احتشای جدار سفلی را نشان می‌دهد.

- **سندروم Lown-Ganong-Levine (LGL syndrome):** این یک مثال دیگر accelerated conduction است. در این حالت مسیر اضافی که به نام الیاف James یاد می‌شود در داخل node موجود می‌باشد. این الیاف «تأخیر» را bypass می‌کنند.

ب) بلاک قلبی (Heart Block):

انواع:

- بلاک ناتام قلب:
 - درجه I
 - درجه II
 - AV block (Mobitz type II) دوره‌ای یا غیر منظم

- AV block ثابت یا منظم
- Wenckebach AV block (Mobitz type I)
- بلاک تام قلب (درجه III): در این حالت اذین‌ها و بطن‌ها به صورت جدا از هم تقلص می‌نمایند.
- Bundle Branch Block

بلاک ناتام قلب:

۱. **بلاک درجه I:** در این حالت اختلال در انتقال از طریق عقده AV موجود می‌باشد. بلاک درجه I معمولاً از سبب rheumatic fever به وجود می‌آید. در اشخاص نارمل نیز به وجود آمده می‌تواند. Digitalis نیز منجر به بلاک درجه I شده می‌تواند.



شکل ۱۴.۱۵: بلاک درجه I

یافته‌های ECG:

- PR interval طویل (بیشتر از ۰٫۲ ثانیه)
 - ریتم نارمل می‌باشد
 - Dropped beat موجود نمی‌باشد
 - کمپلکس QRS منظره نارمل می‌داشته باشد.
۲. **بلاک درجه II:** در این حالت بطن به صورت پریودیک در مقابل تنبیه اذینی عکس‌العمل نموده نمی‌تواند. معمولاً از سبب IHD به وجود می‌آید؛ یعنی از سبب مرض شریان اکلیلی راست، زیرا بخش عمده عقده AV توسط آن اروا می‌شود.

انواع:

- **بلاک غیر منظم یا دوره‌ای (Mobitz type II):** در این صورت ضربان‌های از دست رفته (dropped beats) به صورت غیر منظم موجود می‌باشند.

یافته‌های ECG:

- هر موج P توسط کمپلکس QRS تعقیب نخواهد شد.
- PR interval طویل می‌باشد، اما مدت آن ثابت می‌باشد.



شکل ۱۴.۱۶: بلاک قلبی غیر منظم

- **بلاک ثابت یا منظم:** در این حالت کمپلکس بطنی به تعقیب ۲، ۳ یا ۴ موج P به وجود خواهد آمد.

یافته‌های ECG:

- موجودیت ۲، ۳ یا ۴ موج P در بین دو کمپلکس‌های QRS موجود خواهد بود، فلذا AV block درجه ۱، ۲:۱ یا ۳:۱ موجود خواهد بود.
- PR interval طویل بوده، اما مدت آن ثابت می‌باشد.




شکل ۱۴.۱۷: بلاک قلبی منظم ۲:۱

- **Wenckebach AV block (Mobitz type I)**: در این حالت PR interval به تدریج طولی می‌شود. بعد از چند ضربان تقلص اذینی باعث آغاز عکس‌العمل بطنی شده نمی‌تواند.

یافته‌های ECG:

- PR interval به تدریج تا زمانی طولی می‌شود که dropping کمپلکس QRS و به تعقیب آن PR interval نارمل به وجود آید.




شکل ۱۴.۱۸: Mobitz type I

بلاک تام یا بلاک درجه III:

در این حالت، اذین‌ها و بطن‌ها به صورت مستقل از همدیگر تقلص می‌نمایند. از لحاظ اتیولوژی مانند بلاک درجه دوم می‌باشد.

یافته‌های ECG:

- موج P با کمپلکس QRS هیچ‌گونه ارتباط نمی‌داشته باشد.
- PR interval‌های مختلف موجود می‌باشند.
- ریت اذینی نارمل، منظم و sinusal می‌باشد؛ ممکن تکی‌کاردیای اذینی موجود باشد.
- ریت بطنی ۲۰-۶۰ فی دقیقه می‌باشد. ریت منظم خواهد بود.
- کمپلکس‌های QRS به اساس فاصله محراق بطنی از عقده AV ممکن نارمل یا bizarre باشند.



شکل ۱۴.۱۹: بلاک تام قلب

:Bundle branch block (B.B.B)

انواع:

● BBB راست:


- موج‌های S در لیدهای aVL، I و V5-V6 وسیع می‌باشند.
- موج‌های R در لیدهای V1-V2 وسیع می‌باشند.
- محور به طرف راست منحرف می‌باشد.



شکل ۱۴.۲۰: BBB راست

● BBB چپ:

- موج R در لیدهای I و aVL وسیع می‌باشد.
- موج S در لید III و aVF وسیع می‌باشد.
- محور قلبی معمولاً به طرف چپ منحرف می‌باشد.



شکل ۱۴.۲۱: BBB چپ

- **BBB ناتام راست یا چپ:** در این صورت سایر تشوشات کمپلکس QRS به استثنای طویل شدن زمان آن مشابه به حالات فوق می‌باشد.

انحراف محور (Axis deviation)

انواع:

۱. **انحراف محور به طرف راست:** قسمی که قبلاً ذکر گردید، محور اساسی قلب به صورت نارمل در بین -30° درجه و $+90^\circ$ درجه قرار دارد. اگر اندازه آن از 90° درجه بیشتر باشد به نام انحراف محور به طرف راست یاد می‌شود.

یافته‌های ECG:

- موجودیت موجه‌های S عمیق در لیدهای I و aVL
- موجودیت موجه‌های R بلند در لیدهای III و aVF

یادداشت: اگر لید I بالا و لید aVF پایان گذاشته شود انحنای QRS در صورت انحراف محور به طرف راست به همدیگر نزدیک می‌شود.




شکل ۱۴.۲۲: Right axis deviation

۲. **انحراف محور به طرف چپ:** اگر محور قلبی منفی‌تر از -۳۰ درجه باشد، به نام انحراف محور به طرف چپ یاد می‌شود.

یافته‌های ECG:

- موجودیت موج‌های R بلند در لیدهای I و aVL
- موجودیت موج‌های S عمیق در لیدهای III و aVF

یادداشت: اگر لید I بالا و لید aVF پایان گذاشته شود انحنای QRS در انحراف محور به طرف چپ از هم دور خواهند شد.




شکل ۱۴.۲۳: Left axis deviation

حدود	لید aVF	لید I	محور
$-30^{\circ} \dots +90^{\circ}$	+	+	نارمل
$-30^{\circ} \dots -90^{\circ}$	- (هم II)	+	انحراف به چپ
$+90^{\circ} \dots +180^{\circ}$	+	-	انحراف به راست
$-90^{\circ} \dots \pm 180^{\circ}$	-	-	انحراف شدید


شکل ۱۴.۲۴: محوره‌های نارمل و غیر نارمل قلبی

هایپرتروفی بطنی (Ventricular hypertrophy)

نکات مهم الکتروفیزیولوژیک وابسته به ECG هایپرتروفی بطنی ذیلآ بیان می‌شود:



A: ST (digitalis) ناوه‌مانند



B: strain pattern (LVH)



C: T معکوس متناظر (اسکیمیا)

شکل ۱۴.۲۵: B: strain ; A: scooping ST changes in digitalis effect
C: T inversion ; pattern متناظر در اسکیمیا

تغییرات ECG (موج R، سگمنت ST و موج T) در هایپرتروفی بطن چپ و Strain و

- ولتاژ در مقابل ضخامت: در بین ولتاژ موجه‌های R و ضخامت عضله رابطه مستقیم وجود دارد. هر قدر عضله ضخیم‌تر باشد به همان تناسب

ارتفاع (ولتاژ) موج‌های R بیشتر می‌باشد. فلذا در لیدهای مسلسل بطینی موج‌های R برجسته موجود می‌باشد.

- **تأخیر انتقال در مقابل ضخامت:** هر قدر عضله ضخیم باشد به همان تناسب زمان لازم برای پخش سیاله بیشتر می‌باشد.
- **تغییرات سگمنت ST و موج T:** از سبب اسکیمیای اندوکارد سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای مسلسل بطینی به وجود می‌آید. در صورتی که تنها تغییرات سگمنت ST و موج T بدون تغییرات دیگر موجود باشد به نام strain pattern یاد می‌شود.

انواع هایپرتروفی بطینی:

الف) هایپرتروفی بطن راست (Right ventricular hypertrophy):

معمولاً از سبب تضییق مایترل، Cor pulmonale و تتراوژی فالوت به وجود می‌آید.

تغییرات ECG:

- ارتفاع موج R نسبت به عمق موج S در لید V1 بیشتر می‌باشد.
- نسبت R/S از لید V1 تا V6 به تدریج کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
- موج S در لیدهای V5 و V6 باقی می‌ماند.
- انحراف محور به طرف راست.
- سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای V1-3.




شکل ۱۴.۲۶: هایپرتروفی بطن راست

ب) هایپرتروفی بطن چپ (Left ventricular hypertrophy):

معمولاً از سبب فرط فشار خون، آفات دسام ابهر، عدم کفایه مایترل و امراض ولادی قلب از قبیل PDA، VSD و coarctation ابهر به وجود می‌آید.

تغییرات ECG:

- موج R در لید V5 یا V6 جمع موج S در لید V1 یا V2 اضافه‌تر از ۳۵ mm می‌باشد.
- موج R در لید aVL ۱۱ mm یا بیشتر می‌باشد.
- سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موج T در لیدهای aVL، II، I و V5-V6.
- وسیع شدن کمپلکس QRS.



شکل ۱۴.۲۷: هایپرتروفی بطن چپ

ج) هایپرتروفی هر دو بطن (Biventricular hypertrophy):

معیارهای تشخیصیه آن عبارت اند از:

- لیدهای precordial هایپرتروفی بطن چپ را نشان می دهد.
- لیدهای frontal انحراف محور به طرف راست را نشان می دهد.

موج P

ببینید که آیا موج P نارمل است یا غیر نارمل.

موج P توسط تقلصات هر دو اذین راست و چپ از سبب تنبیه سیاله قلبی تشکیل می شود. قسمی که در شکل نمایش داده می شود نصف اول موج P از سبب تقلص اذین راست و نصف دیگر آن از سبب تقلص اذین چپ ایجاد می شود.



P pulmonale: P بلند و نوک‌تیز ($> ۲/۵$ میلی‌متر) در لید II



P mitrale: P دوکوهانه و عریض ($\geq ۰/۱۲$ ثانیه)

شکل ۱۴.۲۸: P-Mitrale و P-Pulmonale

موج‌های P غیر نارمل:

- **P Pulmonale**: یک موج بلند و نوک‌تیز است که از سبب هایپرتروفی اذین راست به وجود می‌آید. در لیدهای II، III و aVF بهتر دیده می‌شود.
- **P Mitrale**: از سبب هایپرتروفی اذین چپ تولید می‌شود. معمولاً در تضییق مایترل دیده می‌شود. یک موج بزرگ، عریض و دو قله‌ای است. قله اول آن از سبب فعالیت اذین راست و قله دوم آن از سبب فعالیت اذین چپ به میان می‌آید. در لیدهای II، I و V5 بهتر دیده می‌شود.
- موج P معکوس به صورت نارمل در لیدهای aVF، III و V1-V2 موجود بوده می‌تواند. اسباب دیگر آن عبارت‌اند از:
 - ریتم عقدوی (nodal rhythm)
 - Dextrocardia
 - اگر الکترودهای لیدهای اندام‌ها به صورت نادرست گذاشته شوند.
 - تعویض موج‌های P توسط موج‌های f/F

انتروال PR

نارمل آن قبلاً ذکر گردید. PR interval غیر نارمل می‌تواند حالات ذیل را داشته باشد:

● PR interval طویل: اگر بیش از ۰/۲ ثانیه باشد طویل گفته می‌شود. در حالات

ذیل به وجود می‌آید:

● تداوی با digitalis

● بلاک درجه I

● Hypokalemia

● Myocarditis

● PR interval کوتاه: اگر کمتر از ۰/۱۲ ثانیه باشد کوتاه گفته می‌شود. در حالات

ذیل به وجود می‌آید:

● سندروم WPW

● Nodal rhythm

● سندروم LGL

● PR interval متغیر: در حالات ذیل به وجود می‌آید:

● پدیده Wenckebach

● ضربان‌ساز سرگردان (wandering pacemaker)

موجه Q

موجه Q برجسته ۰/۰۴ ثانیه بوده، وسیع می‌باشد و بیش از ۲۵٪ امپلیتود موجه R عین کمپلکس می‌باشد. در بخش احتشای مایوکارد به تفصیل ذکر خواهد شد.

کمپلکس QRS

کمپلکس QRS نارمل قبلاً مورد بحث قرار گرفت. حالات غیر نارمل آن قرار ذیل اند:

- **وسیع بودن کمپلکس QRS:** قبلاً ذکر گردید.
- **کمپلکس QRS با ولتاژ پایین:** اگر ارتفاع موج R یا عمق موج S در لیدهای اندام‌ها بیشتر از ۵ میلی‌متر نباشد گفته می‌شود که کمپلکس QRS ولتاژ پایین دارد. در حالات ذیل دیده می‌شود:
 - Hypothyroidism
 - Pericardial effusion
 - جدار ضخیم صدر
 - مرض Beriberi
 - اگر ولتاژ ماشین ECG پایین باشد.
- **کمپلکس QRS با ولتاژ بلند:** در هایپرتروفی بطن چپ موجود می‌باشد. قبلاً مطالعه شد.
- **تغییر در شکل کمپلکس QRS:** قبلاً مورد بحث قرار گرفت.

سگمنت ST

- سگمنت ST نارمل قبلاً مطالعه شد. حالات غیر نارمل آن قرار ذیل اند:
- **صعود سگمنت ST (segment elevation):** نشان‌دهنده حالات ذیل است:
 - MI جدید
 - Pericarditis
 - Hyperkalemia
 - انوریزم بطن چپ
 - **سقوط سگمنت ST (segment depression):** نشان‌دهنده حالات ذیل است:
 - IHD
 - تداوی با digitalis
 - Hypokalemia

- Ventricular strain
- Myocarditis
- احتشای subendocardial

موجه T

موجه T نارمل قبلاً مطالعه شد. موجه‌های T غیر نارمل می‌توانند به صورت ذیل باشند:

● **موجه T بلند و نوک‌تیز:** نشان‌دهنده hyperkalemia است.

● **موجه T معکوس:** نشان‌دهنده حالات ذیل است:

● IHD

● Pericarditis

● هایپرتروفی بطنی

● Myocarditis

● **موجه T هموار:** در حالات ذیل دیده می‌شود:

● IHD

● Pericarditis

● Myocarditis

● Hypothyroidism


یادداشت: تغییرات موجه T در مبحث IHD به تفصیل ذکر می‌گردد.

اروای دموی قلب

♦ احتشا، صدمه و اسکیمیای مایوکارد

عضله قلب توسط شرایین اکلیلی (coronary arteries) چپ و راست اروا می‌گردد که بالترتیب از aortic sinus‌های چپ و راست منشأ می‌گیرند. شریان اکلیلی چپ

به دو شعبه تقسیم می‌شود: شریان نازله قدامی چپ و شریان circumflex چپ. شریان قدامی چپ عمدتاً قلب چپ و قسمت قدامی septum را اروا می‌کند. شریان اکلیلی راست عمدتاً قلب راست و قسمت خلفی septum را اروا می‌کند. شریان circumflex چپ جدار جنبی و قسمت apical جدار خلفی بطن چپ را اروا می‌کند. عقده SA در ۷۵٪ واقعات توسط شریان اکلیلی راست اروا می‌شود. عقده AV در ۹۰٪ واقعات توسط شریان اکلیلی راست اروا می‌شود. فلهاذا ساحه مأووفه عضله قلب وابسته به اوعیه مأووفه است.




◆ الکتروفیزیولوژی مایوکارد تخریب شده

عضله قلبی که به اثر از بین رفتن اروای دموی تخریب شده باشد سه ساحه را نشان می‌دهد:

تغییرات ECG احتشای مایوکارد:


- **ساحه احتشا (infarct area):** در این ساحه عضله قلبی مرده است و حجات depolarize و repolarize شده نمی‌تواند. بناءً با گذاشتن الکتروود بالای ساحه احتشایی موجه Q دیده می‌شود.



- **ساحه آسیب دیده (area of injury):** ساحه احتشایی توسط ساحه آسیب دیده محشور می‌باشد. زمانی که یک قسمتی از عضله قلبی آسیب ببیند، از لحاظ برقی اگر با قسمت سالم مقایسه شود منفی می‌باشد. فلهدا حتی در حالت استراحت نیز از بخش صدمه‌دیده به بخش سالم جریانات حرکت می‌کند. این حرکت جریانات از بخش آسیب‌دیده به بخش سالم منجر به تغییرات ST می‌شود.
- **ساحه اسکیمیا (area of ischemia):** در مجاورت ساحه آسیب‌دیده، یک ساحه اسکیمیا نیز موجود می‌باشد که باعث معکوس شدن موجه T می‌شود.

◆ اسکیمای کورونری (Coronary ischemia)

اسکیمیا از لحاظ ادبیات به معنی «کاهش اروا» است. این اصطلاح برای فقر اروا نیز به کار می‌رود. ECG تغییرات موجه T که ممکن نسبتاً هموار، انحطاط یافته یا عمیقاً معکوس باشد را نشان دهد. موجه T وصفی اسکیمیا متناظر، معکوس و توأم با ST segment ایزوالکتریک و اندکی محدب به طرف بالا می‌باشد. این به نام coronary T یا Pardee T یاد می‌شود.



T معکوس، متناظر و نوک‌تیز در اسکیمیا

شکل ۱۴.۳۱: T inversion in ischemia

◆ آسیب یا احتشای تازه (Injury or fresh infarct)

- صعود سگمنت ST موجود خواهد بود طوری که محدبیت آن به طرف بالا می‌باشد.
- موجه T معکوس می‌باشد.

◆ احتشای مایوکارد (Myocardial infarction)

مرگ و نکروز مایوکارد از سبب قطع اروای آن به نام احتشای مایوکارد یاد می‌شود. از لحاظ اناتومی دو نوع احتشا وجود دارد:

- **احتشای subendocardial:** در این حالت نصف endocardial مایوکارد مأووف می‌شود.
- **احتشای transmural:** در این حالت احتشا تمام ضخامت مایوکارد را در بر می‌گیرد.

علام ECG احتشای (Transmural) مایوکارد

تغییر مهم الکتروکاردیوگرافیک احتشای مایوکارد به وجود آمدن موج Q پتالوژیک است.


تولید موج Q:

ساحه احتشایی از لحاظ برقی مرده می‌باشد؛ یعنی هیچ گونه فعالیت برقی در این ساحه تولید نمی‌شود. از نقطه نظر الکتروفیزیولوژی هر ساحه که فعالیت برقی را نشان ندهد مانند یک کلکین است؛ یعنی الکتروود که بالای ساحه قرار داده می‌شود فعالیت قسمت مقابل را ثبت می‌نماید. این منتج به پدیدار شدن موج Q می‌شود.

معیارات موج Q پتالوژیک:

موج Q زمانی پتالوژیک گفته می‌شود که:

- عرض آن 0.04 ثانیه باشد.
- در عین کمپلکس موج R باید از 5 میلی‌متر بیشتر باشد به اندازه 25% یا بیشتر از موج R باشد.



Q نامرمل: کوچک و باریک



Q پتالوژیک: ≥ 0.04 ثانیه یا $\geq 25\% R$

شکل ۱۴.۳۲: پیدایش موج Q - Genesis of 'Q' wave

یادداشت:

- موجودیت موج Q تنها در لیدهای aVR، III یا aVL نشان‌دهنده احتشای مایوکارد نمی‌باشد. در ۴۰٪ افراد نارمل در لید III موج Q پتالوژیک موجود می‌باشد. برای دانستن این که آیا موج Q از سبب احتشای مایوکارد است یا کدام حالت دیگر، لازم است تا لید III را هنگام شهیق ثبت نماییم؛ اگر موج Q تا هنوز هم موجود باشد نشان‌دهنده احتشا است. به هر صورت این آزمایش توسط تمام کاردیولوژیست‌ها پذیرفته نشده است.
- Slurring موج Q (یا QS) نشان‌دهنده موجودیت عضلات زنده در ساحه احتشایی است.

تغییرات سگمنت ST

قسمی که قبلاً ذکر گردید در احتشای تازه (احتشای حاوی کتلای عضلی زنده) صعود ST segment که محدبیت آن به طرف بالا می‌باشد در لیدهایی به وجود خواهد آمد که بالای ساحه احتشایی قرار دارند و سقوط ST segment در لیدهایی که در مقابل ساحه احتشایی قرار دارند به وجود خواهد آمد.

چگونه صعود / سقوط ST segment دیده شود؟

سگمنت ST کمپلکس مورد نظر با خط TP کمپلکس بعدی مقایسه شود؛ اگر خط ST حد اقل به اندازه ۱ مربع کوچک صعود یا سقوط کرده باشد، غیر نارمل پنداشته می‌شود.

تغییرات موج T

موج T تغییرات ذیل را نشان می‌دهد:

- در لیدهایی که بالای ساحه احتشایی قرار دارند، موج T در دو ساعت اول احتشا بلند و ایستاده (giant T) دیده می‌شود.
- بعد از چند روز تا چند هفته سگمنت ST به خط ایزوالکتریک می‌آید و موج T معکوس می‌شود. با وجود صعود سگمنت ST موج T معکوس خواهد ماند.
- موج T معکوس احتشاء متناظر می‌باشد؛ یعنی نقطه اوج آن در بین آغاز و انجام آن قرار می‌داشته باشد.


یادداشت: موج T معکوس احتشا معمولاً بعد از چند ماه به حالت نارمل بر می‌گردد. در بعضی اشخاص برای مدت زیادی معکوس باقی می‌ماند.

♦ احتشای قدامی

انواع:

- **احتشای قدامی حجابی (Antero-septal):** در این نوع موج Q با سایر تغییرات سگمنت ST و موج T در لیدهای صدری V1-V3 موجود می‌باشد. لیدهای I و aVL کدام تغییر را نشان نمی‌دهد زیرا ساحه احتشایی محدود بوده و به جدارهای جنبی توسعه نیافته است.
- **احتشای قدامی ذروه‌ای (Antero-apical):** لیدهای صدری V3-V5 تغییرات احتشا را نشان می‌دهد. لید I و aVL کدام تغییر را نشان نمی‌دهد.
- **احتشای قدامی جنبی (Anterolateral):** در این صورت لیدهای I، aVL و لیدهای صدری V4-V6 احتشا را نشان می‌دهد.

یادداشت: اگر احتشای antero-lateral بالاتر قرار داشته باشد، فقط لید I و aVL تغییرات احتشا را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴.۳۳: احتشای قدامی

♦ احتشای سفلی


موجودیت موج Q در لیدهای II، III و aVF نشان‌دهنده احتشای سفلی است.



شکل ۱۴.۳۴: احتشای سفلی

◆ احتشای خلفی

از سبب انسداد شریان اکلیلی راست به وجود می‌آید. یافته‌های ECG آن برخلاف احتشای قدامی است یعنی:



شکل ۱۴.۳۵: احتشای خلفی

- موج‌های R برجسته در لیدهای V1 و V2
- صعود سگمنت ST و موج Q در احتشای قدامی → سقوط سگمنت ST و موج R بزرگ در احتشای خلفی

◆ Subendocardial احتشای

قسمی که قبلاً ذکر گردید در احتشای subendocardial، یک نسج زنده در بین الکتروکاردیوگرافی و ساحه احتشایی موجود می‌باشد. فلذا یافته‌های ECG آن عبارت اند از:

- عدم موجودیت موجه Q
- سقوط سگمنت ST و معکوس شدن موجه T در لیدهای بالای ساحه

نکته مهم و عملی هنگام خناق (Angina):

- لیدهای صدری که سقوط ST را ثبت می‌کنند، نشان‌دهنده احتشای subendocardial است.
- لیدهای صدری که صعود ST را ثبت می‌نمایند، نشان‌دهنده Prinzmetal's angina است. این یافته نشان‌دهنده transmural است.

◆ ارزش تشخیصی ECG در IHD

قبل از کاربرد ECG منحنی وسیله تشخیصی IHD، لازم است تا موارد ذیل در نظر باشد:

- ECG نارمل نمی‌تواند IHD را رد کند. تاریخچه IHD نسبت به ECG با ارزش‌تر است.
- تغییرات سگمنت ST و موجه T در ECG واحد تشخیصی نمی‌باشد. زیرا امراض دیگری از قبیل هایپرتروفی بطن چپ، myocarditis، pericarditis، امبولی ریوی، اخذ digitalis و hypokalemia نیز تغییرات مشابه را نشان می‌دهد. فلذا این مطالعه ECG‌های مسلسل است که ارزش تشخیصی دارد.

◆ تست تحمل تمرین برای تشخیص IHD

قسمی که در آغاز این بخش ذکر گردید یک ECG نارمل IHD را رد کرده نمی‌تواند فلذا لازم است تا چندین ECG در هنگام تمرین ثبت گردد. تست‌های معمول که استفاده می‌شوند عبارت اند از:

- Master's test
- Bicycle ergometer test
- Treadmill test
- Atrial pacing

معیارها برای مثبت بودن تست تحمل تمرین:

- سقوط افقی یا نزولی سگمنت ST به اندازه ۱ ملی‌متر یا بیشتر
- تغییر موج T از شکل ایستاده به هموار یا معکوس و برعکس آن در هر لید (به استثنای لید III)
- پدیدار شدن اریتمیا

یادداشت: قبل از اجرای تست تمرین، تست hyperventilation در یک دقیقه باید اجراء شود، زیرا در حالات متعدد تغییرات ST ممکن از سبب hyperventilation به وجود آید.


مضاد استطباب تست تحمل تمرین:

- MI مشکوک
- اگر مرض ارگانیک قلب اثبات شده باشد
- ECG غیر نارمل در زمان استراحت
- اگر ECG هایپرتروفی بطنی را نشان دهد
- اگر مریض digitalis گرفته باشد
- سندروم WPW
- Hypokalemia

♦ دوام IHD و تغییرات ECG

برای تشخیص این که آیا احتشا سابقه است یا جدید؛ ببینید که آیا صعود سگمنت ST موجود است زیرا احتشای جدید را نشان می‌دهد. بعد از شفا، اولین تغییری که به وجود می‌آید در سگمنت ST است یعنی سگمنت ST نارمل می‌شود. بعداً موج T بعد از چند ماه نارمل می‌شود.

موج Q دائمی بوده و هرگز ناپدید نمی‌شود.



- صعود سگمنت ST و سقوط reciprocal سگمنت ST در لیدهای مقابل نشان‌دهنده احتشای جدید است.
- اگر سگمنت ST تغییرات قهقرایی را نشان دهد یعنی قسمت بالایی سگمنت انحنای محدب را نشان دهد و تغییرات reciprocal سگمنت ST سقوط یافته در لیدهای مقابل دیده شود، احتشای سابقه را نشان می‌دهد.
- اگر سگمنت ST ایزوالکتریک باشد در حالی که موج T عمیقاً معکوس باشد، احتشای سابقه را نشان می‌دهد.
- اگر سگمنت ST ایزوالکتریک باشد در حالی که موج T نارمل شود و موج Q تا هنوز موجود باشد، احتشای بسیار سابقه را نشان می‌دهد.

حالات متفرقه


♦ تأثیر سویه پوتاشیم

هر دو هایپرکلیمیا و هایپوکلیمیا تغییرات الکتروکاردیوگرافیک را ایجاد می‌کند. با مشاهده این تغییرات می‌توان سویه پوتاشیم را در سیروم تخمین زد.

Hypokalemia:

اگر سویه تا 3.6 mEq/L برسد، باعث ST depression و موج U برجسته می‌شود. اگر سویه K از 3.5 mEq/L پایین شود باعث تغییرات ذیل می‌شود:

- طول شدن PR interval
- ST depression
- موج T معکوس
- موج U برجسته




Hypokalemia: T هموار، ST↓، موج U برجسته

شکل ۱۴.۳۷: Hypokalemia

Hyperkalemia:

اگر سویه تا 7 mEq/L برسد یگانه تغییر ECG آن عبارت از موج T بلند و نوک‌تیز می‌باشد.

اگر سویه K از 7 mEq/L زیادت‌ر شود، باعث تغییرات ذیل می‌شود:




Hyperkalemia: T بلند و نوک‌تیز، P کوچک، عریض QRS

شکل ۱۴.۳۸: Hyperkalemia

- عدم موجودیت موج P
- کمپلکس QRS وسیع و slurred
- ممکن تکی‌کاردیای بطینی موجود باشد اگر سوبه آن در سیروم از 8.5 mEq/L بیشتر شود.

Myxedema ♦ یافته‌های ECG:


- Bradycardia
- طویل شدن انتروال PR
- ولتاژ پایین
- هموار شدن موج T



شکل ۱۴.۳۹: Myxedema

Pericarditis ♦

صعود سگمنت ST طوری که مقعریت آن به طرف بالا باشد برخلاف احتشای مایوکارد که در آن صعود سگمنت ST موجود است طوری که محدبیت آن به طرف بالا می‌باشد در تمام لیدهای ECG یافته وصفی pericarditis است.



شکل ۱۴.۴۰: Pericarditis

بعد از مدتی ST segment باید پایین آید و موج T معکوس می‌شود. در یک تعداد واقعات، موج T معکوس می‌شود، در حالی که سگمنت ST تا هنوز هم

بلند باقی می‌ماند. در pericarditis موجه‌های Q یا QS موجود نمی‌باشد. ولتاژ ECG ممکن پایین باشد.

◆ Dextrocardia


عبارت از یک انومالی ولادی است که در آن بطن چپ و اذین چپ به طرف راست و بطن راست و اذین راست به طرف چپ موقعیت می‌داشته باشند. از سبب معکوس شدن سیاله برقی، وکتور موجه P در لید I معکوس می‌باشد و در لید aVR راست می‌باشد. سایر تغییرات آن قرار ذیل اند:

- کمپلکس‌ها در لید I معکوس خواهند بود؛ یعنی موجه‌های QRS، P و T معکوس می‌باشند.
- کمپلکس‌ها در لید II مانند لید III قلب نارمل خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید III مانند لید II قلب نارمل خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید aVR مانند aVL قلب نارمل خواهند بود، یعنی موجه P، QRS و T راست خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید aVL مانند aVR قلب نارمل خواهند بود.
- کمپلکس‌ها در لید aVF عیناً مانند لید aVF قلب نارمل خواهند بود.
- لیدهای صدی از V1 تا V6 کمپلکس‌های epicardial بطن چپ را نشان خواهند داد.

یادداشت: اگر الکترودهای بازوی راست و چپ با هم تعویض شوند ECG ثبت شده technical dextrocardia را نشان خواهد داد. برای تشخیص تفریقی آن از dextrocardia واقعی، لیدهای صدی باید مطالعه شوند.

◆ تأثیر Digitalis

مریض که digitalis می‌گیرد تغییرات در سگمنت ST را زمانی نشان خواهد داد که به حد کافی دیجیتالایز شود. در این صورت سگمنت ST در لیدهای I، II، III، aVF و V4-V6 سقوط خواهند نمود. سقوط سگمنت ST وصفی می‌باشد؛ یعنی سگمنت ST مدور و مقعر می‌باشد.



تأثیر ST Digitalis: ناوه مانند (reverse)
(tick)

شکل ۱۴.۴۱: تأثیر Digitalis

♦ انوریزم بطنی (Ventricular aneurysm)

یکی از اختلالات احتشای مایوکارد به وجود آمدن انوریزم بطنی چپ است. لیدهایی که کمپلکس‌های بطنی چپ را ثبت می‌نمایند ST elevation را نشان می‌دهند. برخلاف آسیب مایوکارد، ST elevation انوریزم بطنی حتی بعد از چند سال نیز به حالت نارمل بر نمی‌گردد.



ضمیمه

اندازه‌های نارمل لابراتواری

Blood

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
0-3 U/dl	Acid phosphatase (prostatic)
30-120 U/L	Alkaline phosphatase
30-220 U/L (60-120 Somogyi units/dl)	Amylase
0.3-1.0 mg/100ml	Bilirubin
9-10.5 mg/100ml (2.25-2.62 mmol/L)	Calcium (total)
21-28 mEq/L	Bicarbonate (HCO_3)
337-373 mg/100ml or 98-106 mEq/L	Chlorides
70-99 mg/100ml	Glucose (fasting)
0.6-1.2 mg/100ml (men), 0.5-1.1 mg/100ml (women)	Creatinine
< 200 mg/100ml (desirable)	Cholesterol (total)
50-150 μg /100ml	Iron (serum)
100-190 U/L	L.D.H.
0-160 U/L	Lipase
7.35-7.45	pH (arterial)
3.5-5.0 mEq/L (13.7-19.5 mg/100ml)	Potassium
6.4-8.3 gm/100ml	Proteins (total)
3.5-5.5 gm/100ml	– Albumin
2-3 gm/100ml	– Globulin
0.2-0.4 gm/100ml (200-400 mg/100ml)	– Fibrinogen

200-520 mg/100ml (men) 126-145

– Serum (mg)

mg/100ml (women)

Hematology

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
150,000-400,000/c.m.m.	Blood platelets
4.5-5.9 million/c.m.m.	RBC (men)
4.0-5.2 million/c.m.m.	RBC (women)
4000-11000/c.m.m.	W.B.C. (T.L.C.)
—	D.L.C.
40-75% (2500-7500/c.m.m.)	— Neutrophils
20-45% (1500-3500/c.m.m.)	— Lymphocytes
2-10% (200-800/c.m.m.)	— Monocytes
1-3% (50-250/c.m.m.)	— Eosinophils
0-1% (0-100/c.m.m.)	— Basophils
2-9 min (Ivy)	Bleeding time
3-10 min	Clotting time
up to 15 mm/hr (Westergren)	E.S.R. (men)
up to 20 mm/hr (Westergren)	E.S.R. (women)
14-18 Gm %	Hb. (men)
12-16 Gm %	Hb. (women)

Absolute values

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
0.9	Color index
80-100 fl	M.C.V.
27-32 pg	M.C.H.
32-36 g/dl	M.C.H.C.

CSF

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
7-20 cm H ₂ O	Pressure
45-80 mg/100ml ($\approx$ 60% of blood glucose)	Glucose
15-45 mg%	Proteins
680-760 mg%	Chlorides
less than 5 c.m.m (all lymphocytes)	Cells

Urine

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
1-2 L/day (Avr. 1.5 L/day)	Volume
1015-1028	Sp. Gr.
acidic (pH 4.6-8)	Reaction
amber-pale	Color
aromatic	Smell

Stool

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
< 200 gm/day	Bulk
< 66 gm/day	Dry matter
< 7 gm/day	Total fat
< 2 gm/day	Total nitrogen
40-280 mg/day	Urobilinogen

Semen

اندازه نارمل (Normal value)	آزمایش (Test)
≥ 1.4 ml	Volume
complete 15 min	Liquefaction
≥ 7.2	pH
occasional or absent	Cells
≥ 16 million/ml	Count (concentration)
$\geq 42\%$ (progressive $\geq 30\%$)	Motility (total)
$\geq 4\%$ (strict criteria)	Morphology (normal forms)