


NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

Cahier de cours

Mathématiques 4^e



Période 2

- ☐ **N3** Calcul littéral 1
- ☐ **G2** Théorème de Pythagore
- ☐ **N4** Résolution d'équations

Mme Le Guern 2025 - 2026

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviensCalcule sans calculatrice : $(-3) + (-5) =$ et $(-4) \times 6 =$ Que vaut 7^2 ?

I. Simplifier l'écriture d'une expression littérale (rappels)

Définition

Une **expression littérale** est une expression contenant une ou plusieurs **lettres**. Ces lettres désignent des nombres.

Règle

Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole « $\times$ » lorsqu'il est :

- Devant ou derrière une ;
- Devant ou derrière une

Par convention, on place **le nombre** la lettre, et on place **les parenthèses** les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $4 \times a =$
- $a \times b =$
- $6 \times (3 - a) =$
- $10 + 5 \times a =$
- $x \times 7 =$
- $(3 - x) \times 4 =$
- $2 \times a \times 5 =$
- $4 \times 5 - 2 \times a =$

Notations — a désigne un nombre

- $a \times a = \dots$ (lire « a au carré »)
- $a \times a \times a = \dots$ (lire « a au cube »)
- $a \times 1 = 1 \times a = \dots$
- $a \times 0 = 0 \times a = \dots$

Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $5 \times 5 = \dots$
- $b \times b \times b = \dots$
- $3 \times a \times a = \dots$
- $a \times b \times a = \dots$
- $a \times a + a \times b = \dots$
- $4 \times 4 - x \times x = \dots$

Règle algébrique des signes — x et y sont des nombres relatifs

- $(-x) \times y = x \times (-y) = -xy$
- $(-x) \times (-y) = x \times y = xy$

Exemples :

- $(-1) \times x = \dots$
- $(-3) \times (-x) = \dots$
- $(-56) \times x = \dots$

II. Réduire une expression

Définition

Réduire une expression littérale revient à

.....

Règle

Pour réduire une expression littérale :

- on regroupe les termes,
- puis on effectue

En général, on regroupe les termes

Exemples : Réduire les expressions suivantes :

$$A = 4x + 3x$$

$$A = \dots\dots\dots$$

$$B = 2a + 4 - 3a + 6 - 2a + 8a - 8$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$B = \dots\dots\dots$$

III. Appliquer une formule

Règle

Pour utiliser une expression littérale sur certaines valeurs, on **remplace** dans l'expression littérale toutes les **lettres** par leurs **valeurs**.

J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- Pour simplifier, on supprime le « $\times$ » devant une ou une
- $a \times a$ s'écrit et se lit « »
- **Réduire**, c'est
- $(-1) \times x = \dots\dots\dots$ et $(-3) \times (-x) = \dots\dots\dots$

Critères de réussite

- ☐ J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur.
- ☐ J'ai pensé au signe « $\times$ » sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Je me souviensCalcule : $9^2 = \dots$ et $12^2 = \dots$.Range dans l'ordre croissant : 3 ; $\sqrt{4}$; 1. $\rightarrow \dots$ **I. Racine carrée d'un nombre positif****Définition**

La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre **positif**, noté $\sqrt{a}$ (lire « racine carrée de a »), dont le carré est a .

Exemples :

- $5^2 = \dots$ donc $\sqrt{25} = \dots$
- $1^2 = \dots$ donc $\sqrt{1} = \dots$

Propriété

Quel que soit le nombre positif a : $\sqrt{a} \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{a^2} = a$.

Exemple : $(\sqrt{3})^2 = \sqrt{3^2} = \dots$

Définition

Un **carré parfait** est le carré d'un nombre entier.

Exemples :

- $1^2 = \dots$ donc $\sqrt{1} = \dots$ $6^2 = \dots$ donc $\sqrt{36} = \dots$ $11^2 = \dots$ donc $\sqrt{121} = \dots$
- $2^2 = \dots$ donc $\sqrt{4} = \dots$ $7^2 = \dots$ donc $\sqrt{49} = \dots$ $12^2 = \dots$ donc $\sqrt{144} = \dots$
- $3^2 = \dots$ donc $\sqrt{9} = \dots$ $8^2 = \dots$ donc $\sqrt{64} = \dots$ $13^2 = \dots$ donc $\sqrt{169} = \dots$
- $4^2 = \dots$ donc $\sqrt{16} = \dots$ $9^2 = \dots$ donc $\sqrt{81} = \dots$ $14^2 = \dots$ donc $\sqrt{196} = \dots$
- $5^2 = \dots$ donc $\sqrt{25} = \dots$ $10^2 = \dots$ donc $\sqrt{100} = \dots$ $15^2 = \dots$ donc $\sqrt{225} = \dots$

Liste des 16 premiers carrés parfaits :

Encadrer $\sqrt{17}$ entre 2 entiers consécutifs (on s'aide des carrés parfaits) :

17 n'est pas un carré parfait mais $< 17 <$

donc

Ainsi :

II. Le théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore

Dans un **triangle rectangle**, le carré de la longueur de l'**hypoténuse** est égal à la **somme des carrés** des longueurs des deux autres côtés.

Le théorème de Pythagore permet, dans un triangle rectangle, de calculer :

- soit la longueur de l'**hypoténuse** ;
- soit la longueur de l'un des **côtés adjacents** à l'angle droit.

Cas 1 — Calcul de la longueur de l'hypoténuse

ABC est le triangle rectangle en C ci-contre. **Calculer AB.**

On sait que : le triangle ABC est rectangle en C, avec $AC = 6$ cm et $BC = 8$ cm ; $[AB]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + CB^2$$


$$AB^2 = \dots\dots\dots$$

$$AB^2 = \dots\dots\dots$$

$$AB^2 = \dots\dots\dots$$

$$\text{Donc : } AB = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\text{Donc : la longueur } \dots\dots\dots .$$



Cas 2 — Calcul d'un côté adjacent à l'angle droit

DEF est le triangle rectangle en E ci-contre. **Calculer DE** (valeur exacte, puis arrondie au dixième de cm).

On sait que : le triangle DEF est rectangle en E, avec $EF = 6$ cm et $DF = 8$ cm ; $[DF]$ est l'hypoténuse.

Or, d'après le théorème de Pythagore :

$$DF^2 = DE^2 + EF^2$$

Donc : $DE^2 =$

$DE^2 =$


$DE^2 =$

$DE^2 =$

Donc : $DE =$ (valeur exacte)

À la calculatrice : $DE \approx$ (valeur approchée)

Donc : la longueur



J'ai retenu

Sans regarder le cours, réponds de mémoire :

- $\sqrt{49} = \dots\dots$ et $\sqrt{144} = \dots\dots$
- Énonce le théorème de Pythagore :
- Dans un triangle rectangle, quel côté est le plus long ?
- Pour trouver un côté de l'angle droit, j'**ajoute** ou je **soustrais** les carrés ?

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié l'hypoténuse (côté opposé à l'angle droit).
- ☐ J'ai écrit l'égalité de Pythagore avant de calculer.
- ☐ J'ai distingué valeur exacte ($\sqrt{}$) et valeur approchée ($\approx$).

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique**Mo2** Traduire en langage mathématique une situation réelle**Ca2** Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)**Ca3** Calculer en utilisant le langage algébrique**Co1** Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique**Je me souviens**Réduis : $5x - 2 + 3x + 6 =$ Calcule $(-7) \times (-2) =$

I. Notion d'équation

Définition

Une **équation** est une égalité qui comporte au moins un **nombre inconnu**, généralement désigné par une lettre.

Exemple : L'égalité $3 + x = 11$ est

Définition

Une **solution** de l'équation est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est **vraie**.

Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Exemple : On considère l'équation $3 + x = 11$.

- Si $x = 8$: $3 + x =$ Les deux membres ont la **même valeur**, donc l'égalité est On dit que de l'équation.
- Si $x = 4$: $3 + x =$ et $7 \neq 11$. Les deux membres n'ont **pas** la même valeur, donc l'égalité est On dit que

II. Égalités et opérations

Propriété (addition / soustraction)

Une égalité reste vraie lorsque l'on **ajoute** (ou **soustrait**) le même nombre à chacun de ses membres.

a, b et k désignent des nombres. Si $a = b$, alors $a + k = b + k$ et $a - k = b - k$.

Exemple : Résoudre $x - 5 = 2$.

On ajoute à chacun des membres : $x - 5 + 5 =$

.....

Vérification : $7 - 5 = \dots\dots\dots$ ✓ . Donc $\dots\dots\dots$.

Propriété (multiplication / division)

Une égalité reste vraie lorsque l'on **multiplie** (ou **divise**) chacun de ses membres par un même nombre **non nul**.

Si $a = b$ (et $k \neq 0$), alors $a \times k = b \times k$ et $a \div k = b \div k$.

Exemples :

Résoudre $x \div 2 = 3$: on multiplie par 2 $\rightarrow \dots\dots\dots$

Résoudre $6x = 21$: on divise par 6 $\rightarrow \dots\dots\dots$

III. Résoudre une équation du premier degré

Définition

a, b, c, d désignent des nombres (avec $a \neq 0$ ou $c \neq 0$). Une équation de la forme **$ax + b = cx + d$** est dite **du premier degré** à une inconnue.

Méthode

1. Regrouper les termes « en x » dans un membre ;
2. Regrouper les termes « sans x » dans l'autre membre ;
3. Calculer la valeur de x ;
4. Vérifier, puis conclure.

Exemple 1 : Résoudre $-7x + 5 = 19$

$-7x + 5 - 5 = \dots\dots\dots$ (on retire 5)

$-7x = \dots\dots\dots$

$-7x \div (-7) = \dots\dots\dots$

$x = \dots\dots\dots$

Vérification : $(-7) \times (-2) + 5 = \dots\dots\dots$ ✓

Conclusion : $\dots\dots\dots$.

Exemple 2 : Résoudre $3x + 2 = 18 - x$

$3x + 2 + x = \dots\dots\dots$ (on ajoute x)

$4x + 2 = 18$

$4x = \dots\dots\dots$

$x = \dots\dots\dots$

Vérification : d'une part $3 \times 4 + 2 = \dots\dots\dots$; d'autre part $18 - 4 = \dots\dots\dots$ ✓

Conclusion :

IV. Modéliser une situation

Méthode

1. Choisir l'inconnue selon ce que l'on cherche ;
2. Traduire l'énoncé par une équation ;
3. Résoudre l'équation ;
4. Interpréter le résultat.

Exemple : Anna a acheté 19 bonbons de trois parfums : fraise, réglisse, menthe. Elle a 4 bonbons à la menthe et 2 fois plus de bonbons à la réglisse qu'à la fraise. Combien a-t-elle de bonbons à la fraise ?

- On appelle
- Réglisse = 2 fois la fraise, donc réglisse = Total : $f + 2f + 4 = 19$.
- On résout : ; ;
- Vérification : $3 \times 5 + 4 = \dots\dots\dots \checkmark$
- **Conclusion :**

J'ai retenu

Sans regarder :

- Que veut dire **résoudre** une équation ?
- Pour isoler x , je fais la **même opération** sur
- Donne les 4 étapes d'une équation du 1^{er} degré :
- Pourquoi vérifie-t-on à la fin ?

Critères de réussite

- ☐ J'effectue la même opération sur les deux membres.
- ☐ Je regroupe les x d'un côté, les nombres de l'autre.
- ☐ Je vérifie ma solution dans l'équation de départ.