Clase 1

Manuel Garcia.

August 14, 2023

1 Constante de planck

 $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34} Js$ $[\hbar] : Energia * tiempo < - > Accion$ $E = hf = \hbar \omega \quad \omega : frec.angular.$ $[\hbar] : momentum \times longitud$ $N_{av} = 6 \times 10^{23}$ (1) (2) (3) (4) (5)

2 Ket

ket
$$|\alpha\rangle - > \text{``vector''} n dim.complejo. \tag{6}$$

$$c |\alpha\rangle = |\alpha\rangle c \tag{7}$$

$$c_{\alpha} + c_{\beta} = |\delta\rangle \quad lineal. \tag{8}$$

Mas adelante de considerara el espacio ket como un vector no numerable e infinito cuyo espacio será llamado espacio de Hilbert.

El espacio dual es la traspuesta conjugada del espacio original.

Conjugado de
$$|\alpha\rangle$$
: $\langle \alpha|$

$$\langle \alpha| = C_{\alpha}^* \langle \alpha| + C_{\beta}^* \langle \beta| \qquad (9)$$

$$\langle \delta| \approx (\delta_1^*, \delta_2^*, ..., \delta_n^*) \qquad (10)$$

$$\langle \alpha| \approx \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ ... \\ \delta_n \end{bmatrix} \qquad (11)$$

Este espacio dual nos sirve para definir un producto punto.

producto punto

$$\langle \alpha | \delta \rangle = z = \delta_1^* \alpha_1 + \delta_2^* \alpha_2 + \dots + \delta_n^* \alpha_n \tag{12}$$

$$\langle \beta | \alpha \rangle = \langle \alpha | \beta \rangle^* \tag{13}$$

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = \sum_{n=1}^{N} |\alpha|^{2} >= 0$$

$$|\bar{\alpha}\rangle = \frac{|\alpha\rangle}{\sqrt{\langle \alpha | \alpha\rangle}} \qquad \langle \bar{\alpha} | \bar{\alpha} \rangle = 1$$

$$(14)$$

$$|\bar{\alpha}\rangle = \frac{|\alpha\rangle}{\sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle}} \qquad \langle\bar{\alpha}|\bar{\alpha}\rangle = 1$$
 (15)

Si $\langle \alpha | \beta \rangle = 0$ entonces son ortogonales.

operadores 3

operadores

Para representar cantidades fisicas necesitamos operadores. $|\alpha\rangle$ es un estado.

$$X(|\alpha\rangle) = X |\alpha\rangle = |\beta\rangle \tag{16}$$

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = 1 \qquad \langle \beta | \beta \rangle \neq 1$$
 (17)

$$X |\alpha\rangle dc \langle\alpha| X^{\dagger} \tag{18}$$

Si $X = X^{\dagger}$ entonces X es hermitico.

Aquí algunas propiedades de los operadores:

$$XY \neq YX$$
 $X(YZ) = (XY)Z = XYZ$ (19)

$$X(Y|\alpha\rangle) = (XY)|\alpha\rangle = XY|\alpha\rangle, \qquad (\langle \beta | X)Y = \langle \beta | (XY) = \langle \beta | XY$$
 (20)