جمع آوری : رویا درستکار

نکات مروری دستگاه تولید مثل و تقسیم یاخته :

- در لولهٔ رحمی اووسیت ثانویه، تخمک، گویچه‌های قطبی و اسپرم ممکن است مشاهده شود که این یاخته‌ها همگی تک‌لاد هستند .
- نمیتوان گفت ، هر یاخته‌ای که در هستهٔ خود دارای یک مجموعهٔ کروموزومی است و امکان دارد در لولهٔ رحمی یک زن سالم و بالغ دیده شود ، به کمک زنش مژک‌های بافت پوششی در لولهٔ رحمی حرکت می کند.

- در فرآیند تولیدمثل جانوران تک‌جنسی، زمانی که تولید زادهٔ جدید به دنبال تولید تخمک واجد مواد مغذی صورت بگیرد، قطعاً تأمین مواد غذایی لازم برای رشد جنین، بر عهدهٔ جنس ماده است.

- در خزندگان و پرندگان، گامت نر وارد دستگاه تولیدمثلی ماده می‌شود، ولی جنین تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور ندارد.

- در لقاح خارجی که تعداد زیادی گامت به درون آب رها می‌شود. هر تخمک دارای لایه‌ای ژله‌ای است (نه لایه‌های ژله‌ای) که پس از لقاح تخمک‌ها را به‌هم می‌چسباند. سپس آن‌ها را در برابر عوامل محیطی محافظت می کند و در نهایت، مورد تغذیهٔ جنین قرار می گیرد.

- اسپرماتید و اسپرم تقسیم نمیشوند بنابر این مانند پلاسمویت از اکتین و میوزین برای کمربند انقباضی استفاده نمی کنند .

- سلولهایِ سرتولی مانند ماکروفاژ و بعضی انواع یاخته های پشتیبان توانایی بیگانه خواری دارند .

- اسپرم برای عبور از لوله ی اسپرم ساز انرژی مصرف نمیکند . (در لوله ی اسپرم ساز اسپرم توانایی حرکت ندارد)
- در مراحل تقسیم میتوز، کروموزومها در مرحله ی پروفاز قابل رؤیت میشوند و در مرحله ی آنافاز و متافاز هم قابل رویت هستند. در مرحله ی آنافاز از آن جا که کروماتیدهای خواهری از هم جدا میشوند، تعداد کروموزومها با کروماتیدها برابر است.

در حالی که در مرحله ی پروفاز و متافاز تعداد کروماتیدها دو برابر کروموزوم هاست چون کروموزوم ها دو کروماتیدی اند.

- در مرحلهٔ پرومتافاز، سانترومر کروموزوم ها به رشته های دوک متصل می شوند. در این مرحله پوشش هسته تجزیه می شود و نمی توان گفت 46 کروموزوم در هسته قرار دارند. بلکه در سیتوپلاسم یاخته رها می شوند.
- گیاهان نهاندانه ، سانتریول ندارد.
- دربارهٔ هر یاخته ای که در نیمهٔ چرخهٔ جنسی از تخمدان به درون حفرهٔ شکمی آزاد می شود، بعد از ایجاد رابطهٔ بازخوردی مثبت بین هورمون های جنسی و هیپوفیزی از تخمدان آزاد می شوند.

- نمی توان گفت ، در تقسیم هر سلول یوکاریوتی کمربندی از رشته های پروتئین در وسط سلول تشکیل می شود. (سلول گیاهی)

- نمی توان گفت ، تامین انرژی لازم برای رسیدن اسپرم از محل تولید به محل ذخیره اسپرم بر عهده ی قطعه میانی اسپرم است.
- تأمین مایع قلیایی برای خنثی کردن مقدار کم ادرار میزراه (نه میزنای)، بر عهدهٔ غدد پیازی – میزراهی است.

- نمی توان گفت ، هر هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می‌شود، توسط غددی تولید می‌شود که پایین ترین غدد درون ریز بدن مردان محسوب می‌شوند. (به دلیل ترشح هورمون های جنسی از غدد فوق کلیه)
- نمی توان گفت ، هر هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می‌شود، تحت تأثیر ترشح هورمون‌های FSH و LH از غدهٔ هیپوفیز تنظیم می‌شود.

- در بدن هر دوجنس زن و مرد همه ی انواع هورمونهای جنسی ترشح می شود ، بنابر این نمیتوان گفت هر هورمون جنسی که در بدن مردان ترشح می شود در ایجاد صفات ثانویه ی جنسی موثر است .

- هر هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می‌شود، توسط یاخته‌های دولاد(دیپلوئید) بدون قدرت تقسیم میوز تولید می‌شوند.

- در لولهٔ رحمی اووسیت ثانویه، تخمک، گویچه‌های قطبی و اسپرم ممکن است مشاهده شود که این یاخته‌ها همگی تک لاد هستند.

- در ارتباط با هر یاخته‌ای که در هستهٔ خود دارای یک مجموعهٔ کروموزومی است و امکان دارد در لولهٔ رحمی یک زن سالم و بالغ دیده شود نمیتوان گفت ، حدوداً در روز چهاردهم چرخهٔ جنسی از فولیکول بالغ موجود در تخمدان آزاد می‌شوند. (اسپرم هم در لوله ی رحمی دیده می شود)

- تقسیم میوز 2اووسیت ثانویه در صورت برخورد با اسپرم و شروع فرایند لقاح، در لولهٔ رحمی کامل می‌شود نه درون تخمدان.

- نوعی تقسیم یاخته، تعدادی کروموزوم در سطح استوایی یاخته ردیف شده‌اند که در بین آن‌ها هیچ دو کروموزوم همتایی یافت نمی‌شود، این یاخته ممکن است سلول هاپلوئید و یا سلول در حال میوز 2 باشد .

- در مراحل تقسیم میوز، برای تولید اسپرم در بدن مردی سالم، اخته‌ای با 4 کروموزوم X نمی توان مشاهده کرد اما یاخته ای با دو کروموزوم X میتوان دید .
- خون مادر پس از خروج از رگ‌ها، از طریق انتشار، به اطراف زوائد انگشتی کوریون منتشر می‌شوند.
- در بند ناف رگ‌های با پیچ‌خوردگی بیشتر مربوط به بند ناف حاوی خون فقیر از اکسیژن هستند.
- رگ‌های با پیچ‌خوردگی بیشتر، مربوط به سرخرگ‌های بند ناف هستند. این رگ‌ها دارای خون تیره هستند.
- امکان ورود پروتئین‌های دفاعیِ مادر به خون جنین وجود دارد.

- هر یاختهٔ حاصل از تقسیم اسپرماتوگونی ، دارای کروموزوم‌هایی است که ژن یا ژن‌های مسئول تعیین جنسیت را دارد.

- در نوعی تقسیم هسته در یاخته‌ها که اشتباه در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، قطعاً در طی هر آنافاز، تعداد کروماتیدهای سلول نسبت به متافاز قبل از آن تغییر نمی کند.

- در بدن یک مرد سالم و بالغ، به‌طور طبیعی هر یاختهٔ شرکت کننده در فرایند اسپرم زایی که در پی تکمیل شدن تقسیم میان یاخته به‌وجود آمده است، الزاماً دارای تاژکی بدون قدرت حرکت می‌باشد.

- در تخمدان، در پی هر تقسیم میوزی، تقسیم نامساوی سیتوپلاسم انجام می‌شود.

- مراحل تخمک‌زایی پس از شروع در دو مرحلهٔ مختلف، متوقف می‌شود.

- هر چند که تقسیم نامساوی سیتوپلاسم منجر به تولید گویچه‌های قطبی می‌شود، اما این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتری از سیتوپلاسم و اندامک‌ها به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیهٔ رشد و نمو جنین، نیازهای آن را بر آورده کند.

- گویچه‌های قطبی به ندرت ممکن است با اسپرم لقاح یابند.

- در نوعی تقسیم هسته بدون کاهش عدد کروموزومی در مرحله‌ای که پوشش هستهٔ یاختهٔ جانوری شروع به تخریب شدن می کند الزاماً بین سانتریول‌ها دوک میتوزی تشکیل می‌شود.