



التعامل مع هبوط السكر

هدوء، ملاحظة العلامات، ومساعدة آمنة

"حالة قد تحدث بشكل مفاجئ، وتحتاج إلى تعرّف مبكر، وتصرف آمن، وطلب الطوارئ عند الخطورة"



لماذا نهتم بهبوط السكر؟

الوعي يحمي المصاب قبل تدهور الحالة



تعرف مبكر

على العلامات



مساعدة المصاب

قبل التدهور



منع الأخطاء

كإطعام غير الواعي




دعم المصابين

في كل مكان



معرفة وقت

الاتصال بـ 999



ثقافة الإسعاف

الأولي الآمن

تذكّر: هبوط السكر قد يبدو بسيطًا، لكنه قد يصبح طارئًا إذا صاحبه فقدان وعي أو ضعف شديد



ما المقصود بهبوط السكر؟

انخفاض مستوى السكر عن المستوى المناسب للجسم



المصابون بالسكري



تأخير الوجبات



مجهود بدني دون
استعداد



أدوية تنظيم السكر



المرض أو الإرهاق



حالات تحتاج
لمختصين

تنبيه: هذا العرض توعوي ولا يغني عن توجيهات الطبيب أو خطة العلاج الخاصة بالمصاب



من الأكثر عرضة لهبوط السكر؟

فئات تحتاج إلى متابعة ووعي



المصابون بالسكري



مستخدمو أدوية
السكر



أطفال السكري



كبار السن



من يتأخرون عن
الوجبات



بذل مجهود دون
غذاء

رسالة توعوية: معرفة الحالة الصحية للمصاب — إذا أفصح عنها — تساعد على سرعة التصرف وقت الطوارئ



علامات هبوط السكر المبكرة

اكتشاف الحالة قبل أن تتدهور



جوع شديد



رجفة أو ارتعاش



تعرق



دوخة أو ضعف



صداع



قلق أو توتر مفاجئ



صعوبة في التركيز



شحوب أو تعب غير
معتاد

تصرف صحيح: إن كان الشخص واعيًا وقادرًا على البلع، ساعده بهدوء واتبع خطته الصحية إن كانت معروفة



علامات هبوط السكر الشديدة

تستدعي طلب المساعدة فورًا



1 ارتباك أو تصرف غير معتاد

2 صعوبة في الكلام والفهم

3 ضعف شديد لا يقف معه

4 نعاس شديد أو فقدان وعي

5 تشنجات

6 عدم القدرة على البلع

7 تدهور سريع في الحالة

إجراء عاجل: اتصل بـ 999 عند فقدان الوعي، تشنجات، عدم القدرة على البلع، أو تدهور واضح



تأمين المكان قبل المساعدة

حماية المصاب ومن حوله



لا حركة مركبات أو
سقوط



لا أدوات حادة قريبة



مكان جيد التهوية



مساحة كافية حوله



أبعد المتجمهرين



شخص للاتصال
بالطوارئ

رسالة مهمة: تأمين المكان يقلل احتمال إصابة إضافية. خاصة عند الدوخة أو الضعف



التصرف مع شخص واعٍ قادر على البلع

مساعدة آمنة وفق خطته الصحية

5 راقب تحسن الحالة

6 اطلب المساعدة عند عدم التحسن

7 اتصل بـ 999 عند الشك

1 اجعله يجلس في مكان آمن

2 اسأله عن السكري أو خطته

3 ساعده بمصدر سريع للسكر

4 لا تتركه وحده

تنبيه: لا تُجبر المصاب على تناول شيء إذا كان غير قادر على البلع بشكل طبيعي




أمثلة عامة لمصدر سريع للسكر

للشخص الواعي القادر على البلع



عصير محلى

إذا كان مناسباً لخطته



أقراص جلوكوز

إذا كانت متوفرة لديه



مشروب بسكر

حسب الحالة



حلوى مناسبة

سهلة البلع

رسالة توعوية: لا تعط كميات كبيرة بشكل عشوائي، ولا تعط أي شيء لشخص غير واع



ماذا تفعل بعد تحسن الحالة؟

لا تتجاهل الحالة بعد التحسن



أبقه جالسًا حتى
يستقر



لا قيادة فورًا



إبلاغ الأهل أو
المسؤول



اتباع خطته الصحية



راقب عودة الأعراض



اطلب المساعدة
عند التكرار

تنبيه: تحسن الأعراض لا يعني إهمال السبب، خاصة إذا كانت الحالة متكررة أو شديدة



التصرف مع شخص غير واع

حالة طارئة — اتصل فوراً بـ 999



1 تأكد من سلامة المكان

2 اتصل فوراً بـ 999

3 تحقق من التنفس الطبيعي

4 لا طعام أو شراب

5 لا تضع شيئاً في الفم

6 لا تتركه وحده

7 اتبع تعليمات موظف الطوارئ

تنبيه مهم: إعطاء الطعام أو الشراب لشخص غير واع قد يسبب اختناقاً



إذا ظهرت تشنجات أو ضعف شديد

استجابة سريعة وآمنة



أبعد الأشياء
الخطرة



لا تقيد حركته بالقوة



لا تضع شيئاً في
الفم



اتصل فوراً بـ 999



راقب التنفس
والاستجابة



اتبع تعليمات
الموظف

رسالة مهمة: التشنجات أو فقدان الوعي علامات تستدعي طلب المساعدة فوراً



إذا كان المصاب معروفًا بالسكري

قد يحمل بطاقة طبية أو خطة علاج



اسأله إن كان واعيًا



ابحث عن سوار طبي



لا تستخدم أدوية لا
تعرفها



ساعده في الوصول
لأدواته



اتصل بـ 999 عند
الفقدان



أبلغ المختصين
بالمعلومات

تنبيه: لا تعط المصاب دواءً أو حقناً ما لم تكن مخولاً ومدرّباً وضمن تعليمات واضحة



هبوط السكر لدى الأطفال

انتبه للتغيرات المفاجئة في السلوك



تعب أو بكاء غير
معتاد



تعرق أو رجفة



جوع شديد



صعوبة في التركيز



نعاس أو ضعف



تصرف غير معتاد

تصرف صحيح: أبلغ ولي الأمر، ساعد الطفل وفق خطته، واتصل بـ 999 عند علامات الخطورة



هبوط السكر في المدرسة أو العمل

إجراءات منظمة للحالات الصحية



معرفة الحالات
المعلنة



أرقام التواصل
بأمان



تدريب المشرفين



لا تتركه وحده



لا تجمهر أو تصوير



اتصال بـ 999 عند
الخطورة



توثيق الوقت
والملاحظات

رسالة مهمة: الاستعداد المسبق يحمي المصاب ويقلل الارتباك وقت الطوارئ

ماذا لا تفعل عند هبوط السكرك؟

تصرفات قد تزيد الخطر



لا طعام لغير الواعي



لا تجبره على البلع



لا تتركه وحده مرتبًا



لا قيادة قبل
الاستقرار



لا حقن دون تدريب



لا تتجاهل التكرار



لا تؤخر الاتصال بـ
999

رسالة توعوية: المساعدة الصحيحة تبدأ بمعرفة متى نساعد ومتى نطلب المختصين



متى نتصل برقم الطوارئ 999؟

لا تنتظر عند علامات الخطورة

1 فقدان الوعي

2 تشنجات

3 عدم القدرة على البلع

4 ارتباك أو تدهور سريع

5 عدم تحسن بعد المساعدة

6 إصابة أو سقوط بسبب الدوخة

7 عدم معرفة سبب الحالة

8 حالة لطفل أو كبير سن

رسالة مهمة: عند الشك، اطلب المساعدة فورًا ولا تنتظر تدهور الحالة



الوقاية من هبوط السكر

الالتزام بالخطة الصحية والوعي بالعوامل



الالتزام بتوجيهات
الطبيب



عدم تأخير الوجبات



حمل مصدر مناسب
للسكر



انتباه قبل النشاط
الطويل



إبلاغ الأسرة
والعمل



متابعة الأعراض
المتكررة

تنبيه: هذه إرشادات عامة ولا تغني عن الخطة الطبية الخاصة بكل شخص



دور الموجودين في المكان

تنظيم الاستجابة وتقليل الارتباك



شخص يبقى مع
المصاب



شخص يتصل بـ
999



شخص يبعد
المتجمهرين



شخص يبحث عن
المسؤول



شخص يفتح
الطريق للإسعاف



شخص يجهز وقت
الأعراض

رسالة مهمة: تنظيم الأدوار يساعد المصاب ويمنع الفوضى والتأخير



افعل ولا تفعل عند هبوط السكر

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ✕

- 1 لا طعام لغير الواعي
- 2 لا تجبره على البلع
- 3 لا أدوية أو حقن دون توجيه
- 4 لا قيادة قبل الاستقرار
- 5 لا تتجمهر حوله
- 6 لا تصور الحالة
- 7 لا تؤخر الاتصال بالطوارئ

افعل ✓

- 1 اجلسه في مكان آمن
- 2 ساعد الواعي وفق خطته
- 3 راقب تحسن الحالة
- 4 اتصل بـ 999 عند الخطورة
- 5 لا تتركه وحده مرتبًا
- 6 أبلغ المختصين بالمعلومات
- 7 احترم خصوصية المصاب



سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

سيناريو 2

ظهرت عليه علامات هبوط ثم فقد الوعي

التصرف الصحيح: اتصل فورًا بـ 999، لا تعطه طعامًا أو شرابًا، وراقب التنفس حتى المختصين

سيناريو 1

مصاب بالسكري شعر برجفة وتعرق ودوخة وهو واعٍ

التصرف الصحيح: أجلسه في مكان آمن، ساعده وفق خطته بمصدر سريع للسكر، وراقب التحسن

سيناريو 4

بعد التحسن أراد قيادة المركبة مباشرة

التصرف الصحيح: لا تسمح بالقيادة حتى تستقر حالته، وتأكد من وجود شخص لمساعدته

سيناريو 3

طالب في المدرسة أصبح مرتبكًا ويتعرق

التصرف الصحيح: أبلغ المشرف، لا تتركه وحده، ساعده وفق خطته، واتصل بـ 999 عند الخطورة



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: ما علامات هبوط السكر المبكرة؟



الإجابة: قد تشمل الرجفة والتعرق والجوع الشديد والدوخة والصداع وصعوبة التركيز

س2: هل يجوز إعطاء طعام لشخص غير واعٍ؟



الإجابة: لا، لا يُعطى الشخص غير الواعي أي طعام أو شراب — اتصل فورًا بـ 999

س3: ماذا نفعل إذا كان واعيًا قادرًا على البلع؟



الإجابة: نجلسه في مكان آمن ونساعده وفق خطته أو بمصدر مناسب للسكر مع المراقبة

س4: متى يجب الاتصال بـ 999؟



الإجابة: عند فقدان الوعي أو التشنجات أو عدم البلع أو تدهور الحالة أو عدم التحسن



شكراً لكم

التعرف المبكر على العلامات وتقديم مساعدة آمنة يحميان المصاب

لاحظ العلامات • ساعد الواعي وفق خطته • لا طعام لغير الواعي • اتصل بـ 999 عند الخطورة

"الوعي السريع بهبوط السكر والتصرف الآمن يحمي المصاب في اللحظة المناسبة"