



التعامل مع الإغماء ووضعية الإفاقة

هدوء، تأمين، ومراقبة التنفس

"الإغماء حالة تحتاج إلى هدوء، وتأمين المكان، ومراقبة التنفس والاستجابة، وطلب المساعدة عند الحاجة"



لماذا نهتم بالإغماء؟

قد يحدث في المنزل أو المدرسة أو العمل أو الأماكن العامة



حماية المصاب

من السقوط والإصابة



سلامة التنفس

ومراقبة الاستجابة



منع التجمهر

والارتباك




طلب المساعدة

عند علامات الخطر



طمأنة المصاب

بعد الإفاقة



ثقافة الإسعاف

الأولي الآمن

تذكّر: الإغماء المتكرر أو المصحوب بألم شديد أو صعوبة تنفس يحتاج اتصالاً فورياً بـ 999



ما المقصود بالإغماء؟

فقدان مؤقت للوعي أو ضعف مفاجئ في الاستجابة



فقدان وعي مؤقت



دوخة شديدة



ضعف مفاجئ



تعرق أو شحوب



عدم القدرة على
الوقوف



ارتباك بعد الإفاقة

تنبيه: ليس كل إغماء بسيطًا — يجب الانتباه للعلامات المصاحبة للحالة



أسباب شائعة للإغماء

بعضها يحتاج إلى تقييم طبي



وقوف لفترة طويلة



إرهاق أو قلة نوم



جفاف أو قلة سوائل



حرارة شديدة أو
ازدحام



انفعال أو خوف
شديد



انخفاض السكر



حالات صحية أو
أدوية



إصابة أو ألم شديد

رسالة توعوية: معرفة السبب تساعد في التعامل الأولي، لكنها لا تغني عن طلب المساعدة عند الخطورة



علامات ما قبل الإغماء

تدخل مبكر يمنع السقوط



1 دوخة وعدم توازن

2 شحوب في الوجه

3 تعرق مفاجئ

4 غثيان وضعف عام

5 تشوش في الرؤية

6 طنين في الأذن

7 صعوبة في الوقوف

تصرف صحيح: ساعد الشخص على الجلوس أو الاستلقاء في مكان آمن قبل أن يسقط



تأمين المكان قبل المساعدة

تحقق من المخاطر القريبة



حركة مركبات أو
دراجات



سلاسل أو حواف
مرتفعة



أرضية زلقة أو مبللة



ازدحام أو تدافع



حرارة أو دخان



أدوات حادة أو عوائق

تصرف صحيح: أبعد المخاطر، ووفر مساحة حول المصاب، ولا تعرض نفسك للخطر



التصرف عند الشعور بقرب الإغماء

تصرف بسرعة وهدوء



ساعده على
الجلوس أو
الاستلقاء



أبعده عن الحرارة أو
الزحام



تهوية مناسبة في
المكان



شجّعه على التنفس
بهدوء



لا تجعله يقف
بسرعة



راقب حالته واطلب
المساعدة

رسالة مهمة: التدخل قبل السقوط قد يمنع إصابة إضافية



التصرف عند فقدان الوعي

تقييم سريع دون ارتباك

1 تأكد من سلامة المكان

2 تحقق من استجابة المصاب بلطف

3 اطلب الاتصال بـ 999

4 تحقق من وجود تنفس طبيعي

5 لا طعام أو شراب لغير الوعي

6 لا تحركه عند اشتباه الإصابة

7 اتبع تعليمات موظف الطوارئ

تنبيه: إذا كان غير مستجيب ولا يتنفس طبيعيًا، تعامل كحالة طارئة واتصل بـ 999



متى نستخدم وضعية الإفاقة؟

غير مستجيب لكنه يتنفس طبيعيًا



فقدان وعي مع
تنفس طبيعي



حماية مجرى
التنفس



انتظار وصول
المساعدة



لا اشتباه بإصابة
خطيرة



اتباع تعليمات
موظف 999

تنبيه مهم: إذا كان هناك اشتباه بإصابة في الرأس أو الرقبة أو الظهر، لا تحرك المصاب



وضعية الإفاقة بشكل عام

تساعد على إبقاء المصاب في وضع آمن نسبيًا



1 تأكد أنه يتنفس طبيعيًا

2 لا تستخدمها مع إصابة الظهر

3 اطلب المساعدة من شخص آخر

4 اتبع تعليمات موظف 999

5 راقب التنفس باستمرار

6 لا تترك المصاب وحده

رسالة توعوية: وضعية الإفاقة مفيدة في حالات محددة، لكنها لا تعني أن الحالة لا تحتاج متابعة



مراقبة التنفس والاستجابة

استمر في المراقبة بعد الإغماء



1 هل يتنفس بشكل طبيعي؟

2 هل يستعيد الوعي؟

3 هل توجد دوخة بعد الإفاقة؟

4 هل ألم في الصدر أو الرأس؟

5 هل توجد إصابة من السقوط؟

6 هل تتكرر الحالة أو تسوء؟

تصرف صحيح: إذا تغير التنفس أو ضعفت الاستجابة أو ظهرت علامات خطورة، اتصل فورًا بـ 999



بعد استعادة الوعي

لا تستعجل في إيقافه أو تركه



تحدث بهدوء
وطمأنه



لا تجعله يقف
مباشرة



اسأله عن الألم
والدوخة



أبقه جالساً حتى
يستقر



لا طعام لمن هو
مرتبك



اطلب المساعدة
عند التكرار

رسالة مهمة: التحسن السريع لا يعني تجاهل سبب الإغماء، خاصة إذا كان غير معتاد



متى يكون الإغماء حالة طارئة؟

اتصل بـ 999 عند ظهور هذه العلامات

1 عدم استعادة الوعي بسرعة

2 صعوبة التنفس

3 ألم في الصدر

4 صداع شديد بعد السقوط

5 إصابة الرأس أو الرقبة

6 تشنجات أو ارتباك شديد

7 إغماء بعد حادث قوي

8 تكرار الإغماء

تنبيه: عند الشك في خطورة الحالة، اتصل بالطوارئ ولا تنتظر



الإغماء بسبب الحرارة أو الازدحام

إجهاد أو جفاف أو ضعف تهوية



انقله لمكان مهوّو



أبعده عن الشمس
والحرارة



ساعده على
الجلوس



راقب وعيه وتنفسه



لا شراب لمن هو
غير واعٍ



اتصل بـ 999 عند
الاستمرار

رسالة توعوية: التهوية والراحة وشرب الماء بانتظام تقلل الدوخة والإغماء في الأجواء الحارة



الإغماء بعد السقوط أو الإصابة

تعامل بحذر أكبر



لا تحركه مع ألم
الرأس



لا تستعجل في
إيقافه



تحقق من التنفس



اتصل بـ 999 عند
الإصابة



أبعد المتجمهرين



انتظر المختصين

تنبيه: الإغماء بعد إصابة قد يدل على حالة تحتاج إلى تقييم عاجل

ماذا لا تفعل عند الإغماء؟

تصرفات قد تزيد الخطر



لا ترش الماء
عشوائياً



لا طعام أو شراب
لغير الواعي



لا تجبره على
الوقوف فوراً



لا تحركه عند إصابة



لا تتجمعر حوله



لا تؤخر الاتصال بـ
999



لا تصور المصاب أو
تنشره

رسالة توعوية: الهدوء وطلب المساعدة أهم من التصرفات العشوائية



الوقاية من الإغماء المتكرر

انتباه للعوامل المسببة



شرب الماء بانتظام



لا وقوف طويل دون
حركة



اجلس فور الدوخة



تجنب الحرارة
والازدحام



تناول الطعام
بانتظام



راجع المختصين عند
التكرار



أبلغ الأسرة أو
العمل

تنبيه: الإغماء المتكرر يحتاج إلى تقييم من مختصين صحيين



دور الموجودين في المكان

تنظيم الأدوار يقلل الفوضى



شخص يتصل بـ
999



شخص يبعد
المتجمهرين



شخص يفتح
الطريق للإسعاف



شخص يراقب
التنفس



شخص يجمع
المعلومات



شخص يطمئن
المصاب

رسالة مهمة: التعاون والتنظيم أفضل من التجمهر أو التصوير



افعل ولا تفعل عند الإغماء

ممارسات صحيحة وأخرى يجب تجنبها

لا تفعل ✕

- 1 لا طعام أو شراب لغير الواعي
- 2 لا تجبره على الوقوف بسرعة
- 3 لا تحركه عند اشتباه إصابة
- 4 لا وضعية إفاقة مع إصابة الظهر
- 5 لا ترش الماء عشوائيًا
- 6 لا تؤخر الاتصال بالطوارئ
- 7 لا تصور المصاب أو تنشره

افعل ✓

- 1 تأكد من سلامة المكان
- 2 ساعده على الجلوس عند الدوخة
- 3 راقب التنفس والاستجابة
- 4 اتصل بـ 999 عند الخطورة
- 5 لا تتركه إن كان غير مستقر
- 6 أبعد المتجمهرين ووفر تهوية
- 7 اتبع تعليمات موظف الطوارئ



سيناريوهات تفاعلية

تطبيق عملي لما تعلمته

شخص شعر بدوخة في مكان مزدحم وقال إنه قد يفقد وعيه

سيناريو 1

التصرف الصحيح: ساعده على الجلوس في مكان آمن ومهوى، راقبه، واطلب المساعدة عند الحاجة

شخص فقد الوعي لكنه يتنفس طبيعيًا ولا توجد علامات إصابة

سيناريو 2

التصرف الصحيح: راقب تنفسه، استخدم وضعية الإنفاقة إن كنت تعرفها، واتصل بـ 999 عند الحاجة

شخص أغمي عليه بعد سقوط ويشتكى من ألم الرقبة بعد الإنفاقة

سيناريو 3

التصرف الصحيح: لا تحركه، طمئنه، ابق المكان آمنًا، واتصل فورًا بـ 999

بعد الإنفاقة حاول المصاب الوقوف بسرعة

سيناريو 4

التصرف الصحيح: امنعه من الوقوف، وساعده على البقاء جالسًا حتى تستقر حالته



اختبر معلوماتك

أسئلة سريعة لتقييم فهمك

س1: ما أول إجراء عند رؤية شخص يشعر بدوخة شديدة؟



الإجابة: مساعدته على الجلوس أو الاستلقاء في مكان آمن لتقليل خطر السقوط

س2: هل يجوز إعطاء طعام أو شراب لمصاب غير واع؟



الإجابة: لا، لا يُعطى طعام أو شراب لمن هو غير واع أو غير قادر على البلع

س3: متى يتم الاتصال بـ 999 في حالات الإغماء؟



الإجابة: عند عدم استعادة الوعي، أو صعوبة التنفس، أو ألم الصدر، أو إصابة الرأس، أو تكرار الإغماء

س4: متى لا نستخدم وضعية الإفاقة؟



الإجابة: عند اشتباه إصابة في الرأس أو الرقبة أو الظهر، إلا عند خطر مباشر ووفق المختصين



شكراً لكم

الإغماء يحتاج هدوءًا، وتأمين المكان، ومراقبة التنفس، وطلب المساعدة عند الحاجة

ساعده على الجلوس • لا طعام لغير الواعي • لا تحركه عند الإصابة • اتصل بـ 999

"التصرف الواعي عند الإغماء يبدأ بالهدوء وينتهي بطلب المساعدة في الوقت المناسب"