

Für wen ist das Arzneimittel?

Für mich selbst

Welche Symptome sind vorhanden?

Wie groß ist das betroffene Areal? Wie viele Nägel sind betroffen?

Wurde bereits eine Diagnose vom Arzt gestellt?
Wurden die Beschwerden schon durch den Arzt abgeklärt?

Was wurde bereits unternommen?

Wie stark ist der Nagel betroffen, mit oder ohne Befall der Wachstumszone?



ich werde Ihnen das Medikament geben, es ist 1 g Salbe enthält 10 mg Bifonazol und 400 mg Harnstoff, 1 Aluminiumtube mit 10 g Salbe, 15 wasserfeste Hygienepflaster, 1 Spatel, es ist zur Behandlung von - Pilzinfektionen der Nägel an Händen und Füßen mit gleichzeitiger antimykotischer Wirkung die Salbe mit dem Pflaster : 1 mal täglich für 7 – 14 Tage

- Bifonazol Creme über ca. 4 Wochen nach der Entfernung infizierter Nagelbereiche jetzt erkläre ich Ihnen, wie Sie richtig dieses Medikament anwenden können.

1-Die Beschaffenheit der Salbe ist sehr fest, um ein punktgenaues Auftragen zu ermöglichen, deshalb müssen Sie die Tube kräftig drücken, um die gewünschte Menge auftragen zu können.

2-Die Fingernägel oder Zehennägel werden anschließend mit dem Pflaster für jeweils 24 entsprechend der Größe des Nagels

3-Berühren Sie nicht die Klebefläche des Pflasters mit den Fingern.



4-Bei dem täglichen Verbandswechsel, reinigen Sie die Nägel mit warmem Wasser für 10 Minuten und entfernen Sie die aufgeweichte pilzinfectierte Nagelsubstanz mit dem Spatel

5-Nach dem Abtrocknen wird erneut Salbe aufgetragen und der Nagel mit dem Pflaster zugeklebt.

6-muss täglich sorgfältig und so lange durchgeführt werden bis das Nagelbett glatt ist und sich keine aufgeweichte, pilzbefallene Nagelsubstanz mehr entfernen

7-Nach der Entfernung infizierter Nagelbereiche, soll Bifonazol Creme 1 mal täglich über ca. 4 Wochen durchgeführt werden.

ich möchte Sie darauf hinweisen dass diese Medikamente Nebenwirkungen haben kann. wie z.B. - Hautirritation, Kontaktdermatitis, Mazeration, Hautabschuppung, Nagelfehlbildungen, Nagelverfärbungen, Erythem, Pruritus, Exanthem, Schmerzen am Verabreichungsort, Schmerzen in den Extremitäten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Arzt.

Die Salbe des Canesten Extra Nagelset nicht in die Augen bringen.

Nicht einnehmen Canesten Extra Nagelset hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Lagern Sie bitte das Medikament bei normaler Raumtemperatur aber nicht über 30 Grad Celsius. Nach Anbruch der Tube ist die Salbe 3 Monate verwendbar!

.Das leere Dosieraerosol kann im normalen Hausmüll entsorgt werden.

- die Packungsbeilage und die Verpackung in Papiermüll

- ❑ Falls sich im Laufe der Anwendung noch Fragen ergeben, können Sie sich jederzeit an uns wenden
- ❑ Haben Sie noch Fragen?

Die Behandlung mit Canesten® Extra Nagelset und Canesten® Extra Creme:



Figure 1 Mazeration

Würden Sie mir bitte die ersten Buchstaben von Ihrem vor und Nachname sagen?

Margerta Muster

Dann sagen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum?

20.Juni 19xx

Wann sind Sie geboren?

Darf ich nach Ihrem Gewicht fragen?

73 KG

Und wie groß sind Sie?

168 cm

Welche Beschwerden haben Sie genau?

Mazeration

Sagen Sie mir bitte nochmal welche NW aufgetreten sind?

Wann sind die Beschwerden zum ersten mal aufgetreten?

Das war im letzten Jahr , im Sommer

Wann genau sind Sie die Beschwerden aufgetreten?

Wie lange dauerten die Beschwerden an?

Ca. eine Woche

Wie lange hat es dauert?



Nehmen Sie andere Medikamente? Welche?

Canesten Nagelset

Um welches Arzneimittel handelt es sich?

Welche Darreichungsform haben sie eingenommen?

Canesten Nagelset

Wie stark waren die Spray ? Wie waren Sie dosiert?

die Salbe mit dem Pflaster : 1 mal täglich für 7 – 14 Tage

- Bifonazol Creme über ca. 4 Wochen

Haben Sie die Leerverpackung mitgebracht?

Nein

Können Sie mir bitte genau sagen,wie sie das Medikament genommen haben ?

Liegen noch andere Erkrankungen vor?

Nur Fuß Nagel

Sind Sie Allergisch gegen ein Medikament oder etwas anders? Sind Allergien bei Ihnen bekannt?

Allergie gegen Konservierungsmittel

Rauchen Sie ? Trinken Sie Alkohol? Haben Sie Leber- oder Nierenfunktionsstörungen

Nein

Waren Sie beim Arzt, um diese NW abzuklären?

Hat der Arzt schon Untersuchungen vorgenommen?

Was war die Folge der Nebenwirkungen?

Es ist alles wieder abgeheilt, ohne Schaden erholt

Wie ging es Ihnen nach dem Therapieabbruch?

Haben Sie sich erholt nach der NW?

Haben Sie das Medikament nochmal eingenommen?

Ja

Wenn ja, Wie ging es Ihnen? Haben sich die Symptome wieder verschlechtert?

habe es nicht nochmal genommen, weiß ich nicht

1) Eine 67 jährige Patientin kam in die Apotheke, sie klagte über die Gelbfärbung der Fußnägel, brüchige Fußnägel und Veränderungen der Nagelplatte seit zwei Jahren.

2) Die fünf Fußnägel des linken Fußes und der rechte große Zeh waren befallen.

3) Sie hat niemals den Arzt aufgesucht, sie hatte keine Erfahrungen mit Antimykotika gegen Nagelpilz.

4) Ich habe ihr empfohlen, dass sie zuerst zum Arzt gehen muss, damit der Arzt bei ihr richtig diagnostizieren kann.

5) Seit einem halben Jahr nimmt sie morgens vor dem Essen regelmäßig eine Tablette L-Tyroxin gegen ihre Hypofunktion der Schilddrüse ein.

6) Sie ging zum Arzt, der Arzt hat bei ihr Nagelpilz diagnostiziert und ihr Canesten Extra Nagelset für 14 Tage, dann Canesten Extra Creme für 4 Wochen empfohlen.

7) Ich habe ihr Canesten Extra Nagelset und Canesten Extra Creme abgegeben:

8) Dann kam sie nochmal in die Apotheke und berichtete uns, dass sie zwei Tage nach der Anwendung von Canesten Extra Nagelset eine Hautirritation, eine Hautabschuppung und Nagelverfärbungen bekommen hat.

9) Die Symptome haben 8 Tage gedauert.

10) Ich habe ihr empfohlen, dass sie zum Arzt gehen soll.