

Fenistil

I. Prüfungsteil - Apotheker-Patienten-Gespräch (20 Minuten)

Aufgabenteil A: Symptomschilderung

A. 1 Gesprächseinstieg: Gegenseitige Begrüßung

Allgemeine Begrüßung	Allgemeine Begrüßung
Symptomschilderung	histaminbedingte Juckreiz;
Anwender des Arzneimittels	Er/Sie selbst

A. 2 Hinterfragen der Symptomschilderung und Grenzen der Selbstmedikation

Gesprächseinstieg: Begrüßung	
Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Oder ... Wie kann ich Ihnen helfen?	Guten Tag, Ich habe Magen Probleme
Person, für die das Arzneimittel bestimmt ist	
Für wen ist das Arzneimittel ? Ist das Medikament für Sie selbst?	Ja
Art bzw. Stärke der Beschwerden	
Welche Beschwerden liegen vor? Welche Beschwerden haben Sie? Aha und Seit wann ? Könnten Sie mir bitte die Beschwerden näher beschreiben? Ich meine, wo sind genau die Beschwerden ?	
Zeitliches Auftreten der Beschwerden	
Wann treten die Beschwerden auf?	
Dauer der Beschwerden	
Seit wann liegen die Beschwerden vor? Seit wann? Und wie häufig?	
Häufigkeit der Beschwerden	
Wie häufig treten die Beschwerden auf?	
Begleitsymptome	
Weitere Begleitsymptome? Gibt es weiter Begleitsymptome? Haben Sie auch andere Beschwerden? Oder weitere Begleitsymptome?	
Rat eines Arztes	
Wurden die Beschwerden schon durch den Arzt abgeklärt? Waren Sie schon beim Arzt wegen diesen Beschwerden?	
Was hat der Arzt geraten?	

Erfahrungen mit Arzneimitteln zur Behandlung der Symptome	
Welche Erfahrungen wurden mit dem Arzneimittel gemacht?	
Bekannte Erkrankungen beim Patienten	
Liegen noch andere Erkrankungen vor?	Keine weiteren Erkrankungen
Weitere Arzneimittelanwendungen	
Welche Arzneimittel werden regelmäßig bzw. zur Zeit angewendet? Ahh gut, nehmen Sie weiter medikament ein? Oder haben Sie noch andere Erkrankungen? Nehmen Sie bisher weiter medikament ein? Nehmen Sie noch andere Medikamente zurzeit ein?	
Könnte es sein, dass Sie Schwanger sind? في حال كانت المريضة امرأة	Falls Sie schwanger sind, dürfen Sie Fenistil Tropfen nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt einnehmen. Die Einnahme von Fenistil Tropfen in der Stillzeit wird nicht empfohlen.

Aufgabenteil B: Information und Beratung

B. I Über das Arzneimittel informieren und beraten

Dosierung: Geben Sie bitte Ihrem Kind (ihm) 10-15 Tropfen 3 mal täglich. sleepiness/ tend	Kinder von 1 – 8 Jahren 3 mal täglich je 10 – 15 Tropfen, ab 9 Jahren je 20 Tropfen, Erwachsene 3 mal täglich je 20 – 40 Tropfen. Für Patienten, die zu Schläfrigkeit neigen, wird empfohlen, 40 Tropfen vor dem Schlafengehen und 20 Tropfen am Morgen einzunehmen
Art der Anwendung	Zum Antropfen die Flasche mit dem Tropfer senkrecht(عمودي) nach unten halten. Bei Antropf Schwierigkeiten mit dem Finger mehrmals auf den Flaschenboden klopfen (دق).
Behandlungsdauer	
Fenistil Tropfen dürfen nicht eingenommen werden, – wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Dimetindenmaleat oder einem der sonstigen Bestandteile von Fenistil Tropfen sind. -- Säuglinge und Kinder unter 1 Jahr dürfen Fenistil Tropfen nicht einnehmen.	
Nebenwirkungen	Wie alle Arzneimittel können Fenistil Tropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Mögliche Nebenwirkungen Nebenwirkungen wie Schläfrigkeit können besonders am Behandlungsbeginn auftreten. In sehr seltenen Fällen können allergische Reaktionen auftreten. Selten: Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, trockener Mund, trockener Rachen throat

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen	Beachten Sie bitte, dass dieses M wie viele andere Antihistaminika bei einigen Menschen Müdigkeit verursachen oder die Aufmerksamkeit beeinträchtigen kann. In diesem Fall ist beim Führen von Fahrzeugen oder Bedienen von Maschinen Vorsicht geboten
Wechselwirkungen	Fenistil Tropfen sollten nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden, wenn Sie folgende Arzneimittel einnehmen/anwenden: – Antidepressiva (trizyklische Antidepressiva und Monoaminoxidase-Hemmer) – Arzneimittel gegen Magen- oder Bauchkrämpfe (Anticholinergika) – Arzneimittel, die dämpfend auf das zentrale Nervensystem wirken (Sedativa), angstlösende Medikamente (Anxiolytica) oder Schlafmittel (Hypnotika, Neuroleptika) – Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie (Antikonvulsiva) – starke, zentral-wirksame Schmerzmittel (Opioid-Analgetika) – Antihistaminika – Arzneimittel gegen Übelkeit und Erbrechen (Antiemetika) – Procarbazin (Zytostatikum).
Trinken Sie Alkohol? Beachten Sie bitte, dass das AM die Wirkung von Alkohol verstärkt.	Fenistil Tropfen können wie viele Antihistaminika die Wirkung von Alkohol verstärken.
In welchem Fall der Arzt aufgesucht werden sollte	
Wenn sich Ihre Beschwerden nicht in ... Tagen bessern, wenden Sie sich bitte an uns oder an Ihren Arzt	
Aufbewahrung: Bewahren Sie bitte das Arzneimittel beim Raumtemperatur an einem trockenen Ort auf	Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.
Entsorgung	
B. 2 Gesprächsabschluss:	
Rückfrage beim Patienten, ob noch weitere Fragen bestehen!	
Haben Sie noch Fragen? Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ok, dann kriege ich von Ihnen 14,90 €, bitte.	Nein, das war's
Falls sich im Laufe der Anwendung noch Fragen ergeben, können Sie sich jederzeit an uns wenden .	