

۱- نشان دهید تابع

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

در $(0, 0)$ پیوسته نیست. بنابراین نمودار تابع در این نقاط هموار نیست. با وجود این نشان دهید $f_1(x, y)$ و $f_2(x, y)$ هر دو وجود دارند. (آدامز)

پاسخ) ابتدا حد تابع f را در نقطه $(0, 0)$ بررسی می‌کنیم. دو مسیر متفاوت زیر را در نظر می‌گیریم:

مسیر اول: مسیر $x = 0$ را انتخاب می‌کنیم. در این حالت داریم:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

مسیر دوم: مسیر $y = x$ را انتخاب می‌کنیم. در این حالت داریم:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{2xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{2x^2} = 1$$

انتخاب دو مسیر مناسب به نحوی که حدهای متفاوتی را تولید کنند و بتوان عدم وجود حد را نتیجه گرفت

اگر $(x, y) \neq (0, 0)$ ، $f_1(x, y)$ و $f_2(x, y)$ موجود هستند

برای $f_1(0, 0)$ و $f_2(0, 0)$ باید از تعریف اصلی مشتقات جزئی استفاده کنیم

۱- نشان دهید تابع

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

در $(0, 0)$ پیوسته نیست. بنابراین نمودار تابع در این نقاط هموار نیست. با وجود این نشان دهید $f_1(x, y)$ و $f_2(x, y)$ هر دو وجود دارند. (آدامز)

ادامه پاسخ) چون جواب حد روی دو مسیر متفاوت، اعداد متمایزی هست، پس تابع f در $(0, 0)$ حد ندارد و در نتیجه تابع f در $(0, 0)$ پیوسته نیست.

اگر $(x, y) \neq (0, 0)$ باشد، آنگاه $f_1(x, y)$ موجود و برابر است با

$$f_1(x, y) = \frac{2y(x^2 + y^2) - 2x(2xy)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2x^2y + 2y^3}{(x^2 + y^2)^2}$$

همچنین اگر $(x, y) \neq (0, 0)$ باشد، آنگاه $f_2(x, y)$ نیز موجود و برابر است با

$$f_2(x, y) = \frac{2x(x^2 + y^2) - 2y(2xy)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2xy^2 + 2x^3}{(x^2 + y^2)^2}$$

انتخاب دو مسیر مناسب به نحوی که حدهای متفاوتی را تولید کنند و بتوان عدم وجود حد را نتیجه گرفت

اگر $(x, y) \neq (0, 0)$ ، $f_1(x, y)$ و $f_2(x, y)$ موجود هستند

برای $f_1(0, 0)$ و $f_2(0, 0)$ باید از تعریف اصلی مشتقات جزئی استفاده کنیم

۱- نشان دهید تابع

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

در $(0, 0)$ پیوسته نیست. بنابراین نمودار تابع در این نقاط هموار نیست. با وجود این نشان دهید $f_1(x, y)$ و $f_2(x, y)$ هر دو وجود دارند. (آدامز)

ادامه پاسخ) حال به بررسی $f_1(0, 0)$ می‌پردازیم:

$$f_1(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

همچنین برای $f_2(0, 0)$ نیز داریم:

$$f_2(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

بنابراین برای هر x و y ، $f_1(x, y)$ و $f_2(x, y)$ موجود است.

انتخاب دو مسیر مناسب به نحوی که حدهای متفاوتی را تولید کنند و بتوان عدم وجود حد را نتیجه گرفت

اگر $(x, y) \neq (0, 0)$ ، $f_1(x, y)$ و $f_2(x, y)$ موجود هستند

برای $f_1(0, 0)$ و $f_2(0, 0)$ باید از تعریف اصلی مشتقات جزئی استفاده کنیم

۲- اگر

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^3 + y) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

مطلوبست تعیین $f_1(0, 0)$ و $f_2(0, 0)$ در صورت وجود. (آدامز)

پاسخ) به بررسی $f_1(0, 0)$ می‌پردازیم:

$$f_1(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 \sin \frac{1}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin \frac{1}{h^2} = 0$$

حال به بررسی $f_2(0, 0)$ می‌پردازیم:

$$f_2(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin \frac{1}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h^2}$$

حد بالا موجود نیست (می‌توان دو دنباله متفاوت $a_n = \sqrt{\frac{1}{2n\pi}}$ و $b_n = \sqrt{\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{4}}}$ را

در نظر گرفت که جواب‌های متفاوتی تولید می‌کنند) و در نتیجه $f_2(0, 0)$ موجود نیست.

برای $f_1(0, 0)$ و $f_2(0, 0)$ باید از تعریف اصلی مشتقات جزئی استفاده کنیم

صفر = کراندار \times صفر

برای $\lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h^2}$ ، از دو دنباله برای اثبات عدم وجود حد استفاده می‌کنیم.

۳- اگر $z = f(x^2 + y^2)$ در آن f یک تابع یک متغیره مشتق پذیر دلخواه است، نشان دهید معادله دیفرانسیل جزئی زیر برقرار است: (آدامز)

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

پاسخ)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'(x^2 + y^2)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2yf'(x^2 + y^2)$$

در نتیجه:

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 2xyf'(x^2 + y^2) - 2xyf'(x^2 + y^2) = 0$$

مشتق تابع مرکب

۴- فرض کنید $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی دو بار مشتق پذیر باشد و

$$z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$$

نشان دهید: (توجه کنید که x, y, z به گونه‌ای هستند که هیچ یک از مخرج‌ها صفر نمی‌شوند) (میان ترم ۱۴۰۱)

$$\frac{xz_{xy} + yz_{yy}}{xz_x + yz_y} = \frac{x}{xy + z}$$

پاسخ) ابتدا z_x و z_y را به دست می‌آوریم:

$$z_x = y + f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) \times x = y + f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$z_y = x + \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \times x = x + f'\left(\frac{y}{x}\right)$$

حال z_{xy} و z_{yy} را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} z_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(y + f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{x} \left[f'\left(\frac{y}{x}\right) + \frac{y}{x} f''\left(\frac{y}{x}\right) \right] \\ &= 1 + \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x^2} f''\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

۴- فرض کنید $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی دو بار مشتق پذیر باشد و

$$z = xy + xf\left(\frac{y}{x}\right)$$

نشان دهید: (توجه کنید که x, y, z به گونه‌ای هستند که هیچ یک از مخرج‌ها صفر نمی‌شوند) (میان ترم ۱۴۰۱)

$$\frac{xz_{xy} + yz_{yy}}{xz_x + yz_y} = \frac{x}{xy + z}$$

ادامه پاسخ

$$z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(x + f' \left(\frac{y}{x} \right) \right) = \frac{1}{x} f'' \left(\frac{y}{x} \right)$$

حال داریم:

$$\begin{aligned} \frac{xz_{xy} + yz_{yy}}{xz_x + yz_y} &= \frac{x \left(1 + \frac{1}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{1}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{y}{x^2} f'' \left(\frac{y}{x} \right) \right) + y \left(\frac{1}{x} f'' \left(\frac{y}{x} \right) \right)}{x \left(y + f \left(\frac{y}{x} \right) - \frac{y}{x} f' \left(\frac{y}{x} \right) \right) + y \left(x + f' \left(\frac{y}{x} \right) \right)} \\ &= \frac{x - \frac{y}{x} f'' \left(\frac{y}{x} \right) + \frac{y}{x} f'' \left(\frac{y}{x} \right)}{xy + xf \left(\frac{y}{x} \right) - yf' \left(\frac{y}{x} \right) + yx + yf' \left(\frac{y}{x} \right)} \\ &= \frac{x}{xy + z} \end{aligned}$$

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

۵- فرض کنیم

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2z}{x^4 + y^4 + z^4} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

مقادیر $f_1(0, 0, 0), f_2(0, 0, 0), f_3(0, 0, 0)$ را بیابید. آیا f_1, f_2, f_3 در $(0, 0, 0)$ پیوسته هستند؟ (آدامز)

(پاسخ)

$$f_1(0, 0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0, 0) - f(0, 0, 0)}{h} = 0$$

$$f_2(0, 0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h, 0) - f(0, 0, 0)}{h} = 0$$

$$f_3(0, 0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0, 0 + h) - f(0, 0, 0)}{h} = 0$$

استفاده از تعریف اصلی مشتقات جزئی برای مبدأ یا همان $(0, 0, 0)$

باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را برای نقاط غیر از $(0, 0, 0)$ پیدا کنیم (با استفاده از قواعد مشتق گیری)

استفاده از مسیر $x = y = z$ برای اثبات عدم وجود حد و در نتیجه عدم پیوستگی

۵- فرض کنیم

استفاده از تعریف اصلی
مشتقات جزئی برای مبدأ یا
همان $(0,0,0)$

باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را
برای نقاط غیر از $(0,0,0)$ پیدا
کنیم (با استفاده از قواعد مشتق
گیری)

استفاده از مسیر $x = y = z$
برای اثبات عدم وجود حد و در
نتیجه عدم پیوستگی

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2z}{x^4 + y^4 + z^4} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

مقادیر $f_1(0,0,0), f_2(0,0,0), f_3(0,0,0)$ را بیابید. آیا f_1, f_2, f_3 در $(0,0,0)$ پیوسته هستند؟ (آدامز)

ادامه پاسخ) حال باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را مشخص کنیم. اگر $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ ، آنگاه داریم:

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &= \frac{y^2z(x^4 + y^4 + z^4) - 4x^3(xy^2z)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} = \frac{-3x^4y^2z + y^6z + y^2z^5}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} \\ &= \frac{(y^2z)(-3x^4 + y^4 + z^4)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} \end{aligned}$$

۵- فرض کنیم

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2z}{x^4 + y^4 + z^4} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

مقادیر $f_1(0, 0, 0), f_2(0, 0, 0), f_3(0, 0, 0)$ را بیابید. آیا f_1, f_2, f_3 در $(0, 0, 0)$ پیوسته هستند؟ (آدامز)

ادامه پاسخ

$$\begin{aligned} f_2(x, y, z) &= \frac{2xyz(x^4 + y^4 + z^4) - 4y^3(xy^2z)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} = \frac{-2xy^5z + 2x^5yz + 2xyz^5}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} \\ &= \frac{2xyz(x^4 - y^4 + z^4)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} \end{aligned}$$

استفاده از تعریف اصلی مشتقات جزئی برای مبدأ یا همان $(0, 0, 0)$

باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را برای نقاط غیر از $(0, 0, 0)$ پیدا کنیم (با استفاده از قواعد مشتق گیری)

استفاده از مسیر $x = y = z$ برای اثبات عدم وجود حد و در نتیجه عدم پیوستگی

۵- فرض کنیم

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2z}{x^4 + y^4 + z^4} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

مقادیر $f_1(0, 0, 0), f_2(0, 0, 0), f_3(0, 0, 0)$ را بیابید. آیا f_1, f_2, f_3 در $(0, 0, 0)$ پیوسته هستند؟ (آدامز)

ادامه پاسخ

$$\begin{aligned} f_3(x, y, z) &= \frac{xy^2(x^4 + y^4 + z^4) - 4z^3(xy^2z)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} = \frac{-3xy^2z^4 + x^5y^2 + xy^6}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} \\ &= \frac{xy^2(x^4 + y^4 - 3z^4)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2} \end{aligned}$$

استفاده از تعریف اصلی مشتقات جزئی برای مبدأ یا همان $(0, 0, 0)$

باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را برای نقاط غیر از $(0, 0, 0)$ پیدا کنیم (با استفاده از قواعد مشتق گیری)

استفاده از مسیر $x = y = z$ برای اثبات عدم وجود حد و در نتیجه عدم پیوستگی

۵- فرض کنیم

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2z}{x^4 + y^4 + z^4} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

مقادیر $f_1(0, 0, 0), f_2(0, 0, 0), f_3(0, 0, 0)$ را بیابید. آیا f_1, f_2, f_3 در $(0, 0, 0)$ پیوسته هستند؟ (آدامز)

استفاده از تعریف اصلی مشتقات جزئی برای مبدأ یا همان $(0, 0, 0)$

باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را برای نقاط غیر از $(0, 0, 0)$ پیدا کنیم (با استفاده از قواعد مشتق گیری)

استفاده از مسیر $x = y = z$ برای اثبات عدم وجود حد و در نتیجه عدم پیوستگی

ادامه پاسخ) حال باید حد f_1, f_2, f_3 را در $(0, 0, 0)$ محاسبه کنیم. برای هر سه تابع، بعد از جایگذاری به حالت $\frac{0}{0}$ می‌رسیم. برای f_1 ، مسیر $x = y = z$ را انتخاب می‌کنیم:

$$f_1(x, y, z) = \frac{(y^2z)(-3x^4 + y^4 + z^4)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3(-x^4)}{(3x^4)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^7}{9x^8} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{9x}$$

حد بالا وجود ندارد و بنابراین f_1 در $(0, 0, 0)$ حد ندارد و در نتیجه در مبدأ پیوسته نیست.

۵- فرض کنیم

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2z}{x^4 + y^4 + z^4} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

مقادیر $f_1(0, 0, 0), f_2(0, 0, 0), f_3(0, 0, 0)$ را بیابید. آیا f_1, f_2, f_3 در $(0, 0, 0)$ پیوسته هستند؟ (آدامز)

ادامه پاسخ) برای f_2 نیز مسیر $x = y = z$ را انتخاب می‌کنیم:

$$f_2(x, y, z) = \frac{2xyz(x^4 - y^4 + z^4)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3(x^4)}{(3x^4)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^7}{9x^8} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{9x}$$

حد بالا وجود ندارد و بنابراین f_2 در $(0, 0, 0)$ حد ندارد و در نتیجه در مبدأ پیوسته نیست.

استفاده از تعریف اصلی مشتقات جزئی برای مبدأ یا همان $(0, 0, 0)$

باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را برای نقاط غیر از $(0, 0, 0)$ پیدا کنیم (با استفاده از قواعد مشتق گیری)

استفاده از مسیر $x = y = z$ برای اثبات عدم وجود حد و در نتیجه عدم پیوستگی

۵- فرض کنیم

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xy^2z}{x^4 + y^4 + z^4} & (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

مقادیر $f_1(0, 0, 0), f_2(0, 0, 0), f_3(0, 0, 0)$ را بیابید. آیا f_1, f_2, f_3 در $(0, 0, 0)$ پیوسته هستند؟ (آدامز)

ادامه پاسخ) برای f_3 نیز مسیر $x = y = z$ را انتخاب می‌کنیم:

$$f_3(x, y, z) = \frac{xy^2(x^4 + y^4 - 3z^4)}{(x^4 + y^4 + z^4)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3(-x^4)}{(3x^4)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^7}{9x^8} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{9x}$$

حد بالا وجود ندارد و بنابراین f_3 در $(0, 0, 0)$ حد ندارد و در نتیجه در مبدأ پیوسته نیست.

استفاده از تعریف اصلی مشتقات جزئی برای مبدأ یا همان $(0, 0, 0)$

باید ضابطه توابع f_1, f_2, f_3 را برای نقاط غیر از $(0, 0, 0)$ پیدا کنیم (با استفاده از قواعد مشتق گیری)

استفاده از مسیر $x = y = z$ برای اثبات عدم وجود حد و در نتیجه عدم پیوستگی

۶- فرض کنید f دارای مشتقات جزئی مرتبه دوم پیوسته باشد. (آدامز)


الف) اگر $z = f(x, y)$ ، $x = 2s + 3t$ و $y = 3s - 2t$ ، مطلوبست محاسبه $\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t}$.

پاسخ الف) می‌دانیم

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)$$

پس ابتدا $\frac{\partial z}{\partial t}$ را پیدا می‌کنیم:

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$



قاعده زنجیره‌ای

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)$$

برای z_x و z_y نیز دیاگرامی

مشابه z را می‌توان نوشت

با توجه مفروضات مسأله، داریم:

$$z_{xy} = z_{yx}$$



۶- فرض کنید f دارای مشتقات جزئی مرتبه دوم پیوسته باشد. (آدامز)

الف) اگر $z = f(x, y)$ ، $x = 2s + 3t$ و $y = 3s - 2t$ ، مطلوبست محاسبه $\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t}$.
ادامه پاسخ الف)

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = z_x \times 3 + z_y \times (-2) = 3z_x - 2z_y$$

حال داریم:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial s} (3z_x - 2z_y) = 3 \frac{\partial z_x}{\partial s} - 2 \frac{\partial z_y}{\partial s}$$



$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)$$

برای z_x و z_y نیز دیاگرامی مشابه z را می‌توان نوشت

با توجه مفروضات مسأله، داریم:

$$z_{xy} = z_{yx}$$

۶- فرض کنید f دارای مشتقات جزئی مرتبه دوم پیوسته باشد. (آدامز)

(الف) اگر $z = f(x, y)$ ، $x = 2s + 3t$ و $y = 3s - 2t$ ، مطلوبست محاسبه $\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t}$.

ادامه پاسخ الف) بنابراین

قاعده زنجیره‌ای

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} &= 3 \frac{\partial z_x}{\partial s} - 2 \frac{\partial z_y}{\partial s} = 3 \left(\frac{\partial z_x}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z_x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) - 2 \left(\frac{\partial z_y}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z_y}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \right) \\ &= 3(z_{xx} \times 2 + z_{xy} \times 3) - 2(z_{yx} \times 2 + z_{yy} \times 3) \end{aligned}$$

$$= 6z_{xx} + 9z_{xy} - 4z_{yx} - 6z_{yy}$$

حال بنابر مفروضات سوال، رابطه $z_{xy} = z_{yx}$ برقرار است و در نتیجه:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = 6z_{xx} + 5z_{xy} - 6z_{yy}$$

برای z_x و z_y نیز دیاگرامی

مشابه z را می‌توان نوشت

با توجه مفروضات مسأله، داریم:

$$z_{xy} = z_{yx}$$

۶- فرض کنید f دارای مشتقات جزئی مرتبه دوم پیوسته باشد. (آدامز)


ب) اگر $x = t \sin s$ و $y = t \cos s$ ، مطلوبست محاسبه $\frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t}(x, y)$.

پاسخ ب) می‌دانیم

$$\frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)$$

پس ابتدا $\frac{\partial f}{\partial t}$ را به کمک قاعده زنجیره‌ای پیدا می‌کنیم:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$



قاعده زنجیره‌ای

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)$$

برای z_x و z_y نیز دیاگرامی

مشابه z را می‌توان نوشت

با توجه مفروضات مسأله، داریم:

$$f_{12} = f_{21}$$

۶- فرض کنید f دارای مشتقات جزئی مرتبه دوم پیوسته باشد. (آدامز)



ب) اگر $x = t \sin s$ و $y = t \cos s$ ، مطلوبست محاسبه $\frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t}(x, y)$.

ادامه پاسخ ب)

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = f_1 \times \sin s + f_2 \times \cos s = (\sin s) f_1 + (\cos s) f_2$$

حال داریم:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial s} ((\sin s) f_1 + (\cos s) f_2)$$



$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)$$

برای z_x و z_y نیز دیاگرامی مشابه z را می‌توان نوشت

با توجه مفروضات مسأله، داریم:

$$f_{12} = f_{21}$$

۶- فرض کنید f دارای مشتقات جزئی مرتبه دوم پیوسته باشد. (آدامز)

ب) اگر $x = t \sin s$ و $y = t \cos s$ ، مطلوبست محاسبه $\frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t}(x, y)$.

ادامه پاسخ ب) بنابراین

$$\frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} = (\cos s)f_1 + (\sin s)\frac{\partial f_1}{\partial s} - (\sin s)f_2 + (\cos s)\frac{\partial f_2}{\partial s}$$

و در نتیجه طبق قاعده زنجیره‌ای داریم:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial s \partial t} = (\cos s)f_1 + (\sin s)\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f_1}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}\right) - (\sin s)f_2 + (\cos s)\left(\frac{\partial f_2}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f_2}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}\right)$$

$$= (\cos s)f_1 + (\sin s)(f_{11}(t \cos s) - f_{12}(t \sin s)) - (\sin s)f_2 + (\cos s)(f_{21}(t \cos s) - f_{22}(t \sin s))$$

$$= \cos s f_1 + t \sin s \cos s f_{11} - t \sin^2 s f_{12} - \sin s f_2 + t \cos^2 s f_{21} - t \sin s \cos s f_{22}$$

$$= \cos s f_1 - \sin s f_2 + t \sin s \cos s (f_{11} - f_{22}) + t(\cos^2 s - \sin^2 s)f_{12}$$

قاعده زنجیره‌ای

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial z}{\partial t} \right)$$

برای z_x و z_y نیز دیاگرامی مشابه z را می‌توان نوشت

با توجه مفروضات مسأله، داریم:

$$f_{12} = f_{21}$$

۷- اگر $u(x,y) = r^2 \ln r$ و $r^2 = x^2 + y^2$ ، نشان دهید (آدامز)

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0$$

پاسخ) با استفاده از قاعده زنجیره‌ای برای $\frac{\partial u}{\partial x}$ داریم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x}$$

برای $\frac{\partial r}{\partial x}$ از طرفین رابطه $r^2 = x^2 + y^2$ نسبت به x مشتق می‌گیریم:

$$r^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 2r \frac{\partial r}{\partial x} = 2x \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$$

بنابراین:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (2r \ln r + r) \frac{x}{r} = x(1 + 2 \ln r)$$

حال $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ را به دست می‌آوریم:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (x + 2x \ln r) = 1 + 2 \left(\ln r + \frac{x}{r} \frac{\partial r}{\partial x} \right) = 1 + 2 \left(\ln r + \frac{x^2}{r^2} \right)$$

ابتدا باید دومین پرانتز را محاسبه کنیم

قاعده زنجیره‌ای

مشتق‌گیری از طرفین رابطه

$$r^2 = x^2 + y^2$$

به منظور دستیابی به $\frac{\partial r}{\partial x}$ و $\frac{\partial r}{\partial y}$

باید دقت داشته باشیم که هنگام مشتق‌گیری از r نسبت به x ،

عبارت $\frac{\partial r}{\partial x}$ نیز ظاهر می‌شود

(برای مشتق‌گیری نسبت به y نیز به طریق مشابه)

۷- اگر $u(x,y) = r^2 \ln r$ و $r^2 = x^2 + y^2$ ، نشان دهید (آدامز)

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0$$

ادامه پاسخ) حال با استفاده از قاعده زنجیره‌ای برای $\frac{\partial u}{\partial y}$ داریم:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y}$$

برای $\frac{\partial r}{\partial y}$ از طرفین رابطه $r^2 = x^2 + y^2$ نسبت به y مشتق می‌گیریم:

$$r^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 2r \frac{\partial r}{\partial y} = 2y \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$$

بنابراین:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (2r \ln r + r) \frac{y}{r} = y(1 + 2 \ln r)$$

حال $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ را به دست می‌آوریم:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (y + 2y \ln r) = 1 + 2 \left(\ln r + \frac{y}{r} \frac{\partial r}{\partial y} \right) = 1 + 2 \left(\ln r + \frac{y^2}{r^2} \right)$$

ابتدا باید دومین پرانتز را محاسبه کنیم

قاعده زنجیره‌ای

مشتق‌گیری از طرفین رابطه

$$r^2 = x^2 + y^2$$

به منظور دستیابی به $\frac{\partial r}{\partial x}$ و $\frac{\partial r}{\partial y}$

باید دقت داشته باشیم که هنگام

مشتق‌گیری از r نسبت به x ،

عبارت $\frac{\partial r}{\partial x}$ نیز ظاهر می‌شود

(برای مشتق‌گیری نسبت به y

نیز به طریق مشابه)

۷- اگر $u(x,y) = r^2 \ln r$ و $r^2 = x^2 + y^2$ ، نشان دهید (آدامز)

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0$$

ادامه پاسخ) حال داریم:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 1 + 2 \left(\ln r + \frac{x^2}{r^2} \right) + 1 + 2 \left(\ln r + \frac{y^2}{r^2} \right) \\ &= 2 + 4 \ln r + 2 \left(\frac{x^2 + y^2}{r^2} \right) \\ &= 4 + 4 \ln r \end{aligned}$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) (4 + 4 \ln r) \\ &= \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) (4 + 4 \ln r) + \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) (4 + 4 \ln r) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \left(4 \frac{x}{r^2} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \left(4 \frac{y}{r^2} \right) \end{aligned}$$

ابتدا باید دومین پرانتز را محاسبه کنیم

قاعده زنجیره‌ای

مشتق‌گیری از طرفین رابطه

$$r^2 = x^2 + y^2$$

به منظور دستیابی به $\frac{\partial r}{\partial x}$ و $\frac{\partial r}{\partial y}$

باید دقت داشته باشیم که هنگام مشتق‌گیری از r نسبت به x ، عبارت $\frac{\partial r}{\partial x}$ نیز ظاهر می‌شود (برای مشتق‌گیری نسبت به y نیز به طریق مشابه)

۷- اگر $u(x,y) = r^2 \ln r$ و $r^2 = x^2 + y^2$ ، نشان دهید (آدامز)

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0$$

(ادامه پاسخ)

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \left(2 \frac{x}{r^2} \right) + \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \left(2 \frac{y}{r^2} \right) \\ &= 2 \left(\frac{r^2 - 2rx \frac{\partial r}{\partial x}}{r^4} \right) + 2 \left(\frac{r^2 - 2ry \frac{\partial r}{\partial y}}{r^4} \right) \\ &= 2 \left(\frac{r^2 - 2x^2}{r^4} \right) + 2 \left(\frac{r^2 - 2y^2}{r^4} \right) \\ &= 2 \left(\frac{2(x^2 + y^2) - 2x^2 - 2y^2}{r^4} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

ابتدا باید دومین پرانتز را محاسبه کنیم

قاعده زنجیره‌ای

مشتق‌گیری از طرفین رابطه

$$r^2 = x^2 + y^2$$

به منظور دستیابی به $\frac{\partial r}{\partial x}$ و $\frac{\partial r}{\partial y}$

باید دقت داشته باشیم که هنگام مشتق‌گیری از r نسبت به x ،

عبارت $\frac{\partial r}{\partial x}$ نیز ظاهر می‌شود (برای مشتق‌گیری نسبت به y

نیز به طریق مشابه)

قاعده زنجیره‌ای

به کار بردن قاعده زنجیره‌ای

 برای $\frac{\partial w}{\partial x}$ به منظور پیدا کردن

 رابطه‌ای برای z_x و به کار بردن

 قاعده زنجیره‌ای برای $\frac{\partial w}{\partial y}$ به

منظور پیدا کردن رابطه‌ای برای

 z_y

 باید دقت داشته باشیم که z

 تابعی از x و y است و باید این

مطلب را در مشتق‌گیری‌ها لحاظ

کنیم

 ۸- فرض کنید $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی با مشتقات جزئی مرتبه اول پیوسته و z تابعی

 مشتق پذیر بر حسب x و y باشد. اگر داشته باشیم $f(u, v) = (x - y)^2$ به طوری که

$$u = 3z - 2y, v = 3z - 2y, f_u \neq -f_v \text{ و } z_x + z_y = \frac{2}{3} \text{ نشان دهید}$$

(تمرین تحویلی بهمن ۱۴۰۱)

 پاسخ) قرار می‌دهیم $w = f(u, v)$. حال قاعده زنجیره‌ای را برای $\frac{\partial w}{\partial x}$ استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = w_u \times (3z_x - 2) + w_v \times (3z_x)$$

 باید دقت داشته باشیم که در این جا z تابعی از x است و باید در محاسبات، مشتق آن

 نسبت به x را لحاظ کنیم. حال با توجه به این که $(x - y)^2 = \frac{\partial w}{\partial x}$ ، داریم:

$$2(x - y) = 3w_u z_x - 2w_u + 3w_v z_x$$

$$\Rightarrow z_x(3w_u + 3w_v) = 2(x - y) + 2w_u$$

$$\Rightarrow z_x = \frac{2(x - y) + 2w_u}{3w_u + 3w_v}$$

قاعده زنجیره‌ای

به کار بردن قاعده زنجیره‌ای

 برای $\frac{\partial w}{\partial x}$ به منظور پیدا کردن

 رابطه‌ای برای z_x و به کار بردن

 قاعده زنجیره‌ای برای $\frac{\partial w}{\partial y}$ به

منظور پیدا کردن رابطه‌ای برای

 z_y

 باید دقت داشته باشیم که z

 تابعی از x و y است و باید این

مطلب را در مشتق‌گیری‌ها لحاظ

کنیم

۸- فرض کنید $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی با مشتقات جزئی مرتبه اول پیوسته و z تابعی مشتق پذیر بر حسب x و y باشد. اگر داشته باشیم $f(u, v) = (x - y)^2$ به طوری که

$$u = 3z - 2y, v = 3z - 2y, f_u \neq -f_v \text{ و } z_x + z_y = \frac{2}{3} \text{ نشان دهید}$$

(تمرین تحویلی بهمن ۱۴۰۱)

 ادامه پاسخ) حال قاعده زنجیره‌ای را برای $\frac{\partial w}{\partial y}$ استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = w_u \times (3z_y) + w_v \times (3z_y - 2)$$

 باید دقت داشته باشیم که در این جا z تابعی از y است و باید در محاسبات، مشتق آن

 نسبت به y را لحاظ کنیم. حال با توجه به این که $(x - y)^2 = \frac{\partial w}{\partial y}$ ، داریم:

$$-2(x - y) = 3w_u z_y + 2w_v z_y - 2w_v$$

$$\Rightarrow z_y(3w_u + 3w_v) = -2(x - y) + 2w_v$$

$$\Rightarrow z_y = \frac{-2(x - y) + 2w_v}{3w_u + 3w_v}$$

قاعده زنجیره‌ای

به کار بردن قاعده زنجیره‌ای

برای $\frac{\partial w}{\partial x}$ به منظور پیدا کردن

رابطه‌ای برای z_x و به کار بردن

قاعده زنجیره‌ای برای $\frac{\partial w}{\partial y}$ به

منظور پیدا کردن رابطه‌ای برای

z_y

باید دقت داشته باشیم که z

تابعی از x و y است و باید این

مطلب را در مشتق‌گیری‌ها لحاظ

کنیم

۸- فرض کنید $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ تابعی با مشتقات جزئی مرتبه اول پیوسته و z تابعی مشتق پذیر بر حسب x و y باشد. اگر داشته باشیم $f(u, v) = (x - y)^2$ به طوری که

$$u = 3z - 2y, v = 3z - 2y, f_u \neq -f_v \text{ و } z_x + z_y = \frac{2}{3} \text{ نشان دهید}$$

(تمرین تحویلی بهمن ۱۴۰۱)

ادامه پاسخ) حال که z_x و z_y را به دست آوردیم، جمع آن‌ها به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned} z_x + z_y &= \frac{2(x - y) + 2w_u}{3w_u + 3w_v} + \frac{-2(x - y) + 2w_v}{3w_u + 3w_v} \\ &= \frac{2w_u + 2w_v}{3w_u + 3w_v} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$