

شماًره دانشجویی: ۹۶۱۰۸۳۷۸

نام و نام خانوادگی: علی بنی اسد

عنوان تمرین: تمرین ۹۹/۲/۱۰ bezier curve

سوال اول:


$$B_{0,2}(u) = C(0,2)u^{0}(1-u)^{2} = (1-u)^{2}$$

$$B_{1,2}(u) = C(1,2)u^{1}(1-u)^{1} = 2u(1-u)$$

$$B_{2,2}(u) = C(2,2)u^{2}(1-u)^{0} = u^{2}$$

نمودار به صورت زیر است(figure 1).

Figure 1



بر اساس نمودار ها داریم:

$$\begin{split} B_{0,2(u)_{max}} &= 1, \quad B_{0,2(u)_{min}} = 0 \\ B_{1,2(u)_{max}} &= 0.5, \quad B_{1,2(u)_{min}} = 0 \\ B_{2,2(u)_{max}} &= 1, \quad B_{2,2(u)_{min}} = 0 \end{split}$$



شمآره دانشجویی: ۹۶۱۰۸۳۷۸

نام و نام خانوادگی: علی بنی اسد

عنوان تمرین: تمرین: تمرین ۹۹/۲/۱۰ bezier curve

ب)


$$C_{(u)} = \sum_{k=0}^{n} P_k B_{k,n}(u), \quad 0 \le u \le 1$$

$$C_{(u)_x} = x_0 B_{0,2(u)} + x_1 B_{1,2(u)} + x_2 B_{2,2(u)} = -1(1-u)^2 + 0(2u(1-u)) + 2u^2 = u^2 + 2u - 1$$

$$C_{(u)_y} = y_0 B_{_{0,2}(u)} + y_1 B_{_{1,2}(u)} + y_2 B_{_{2,2}(u)} = 0(1-u)^2 + 1(2u(1-u)) + 0u^2 = 2u - 2u^2$$

رسم نمودار در پایین آمده است(figure 2).

Figure 2





شماره دانشجویی: ۹۶۱۰۸۳۷۸

نام و نام خانوادگی: علی بنی اسد


عنوان تمرین: تمرین ۹۹/۲/۱۰ bezier curve

ج)

$$C_{(0.25)} = (-0.4375, 0.375)$$

.در شکل داده شده است. (figure 3) در شکل مکان (شکل داده شده است.

Figure 3



سوال دوم

برای اینکه در دو نمودار شرط C^1 برقرار باشد باید ابتدا شرط C^0 نیز برقرار باشد.

$$C^0 \to P_4 = Q_1 \to a = 90, \quad b = 50$$

 $C^1 \to 3(P_4 - P_3) = 3(Q_1 - Q_0) \to c = 100$

مجهولات

$$a = 90, \quad b = 50, \quad c = 100$$



شماًره دانشجویی: ۹۶۱۰۸۳۷۸

نام و نام خانوادگی: علی بنی اسد

عنوان تمرین: تمرین ۹۹/۲/۱۰ bezier curve

نمودار منحنی در اینجا آورده شده است(Figure 4).

Figure 4

