


A


Hypervariability score
1.0
0.5
0.0
−0.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y M
Chromosome


B


Hypervariability−score enrichment by feature type
log2(observed / 10% expected)
promoter +0.98 +0.16 −0.07 −0.18 −0.24 −0.26 −0.25 −0.22 −0.21 −0.26
exon +0.01 +0.19 +0.19 +0.14 +0.08 +0.02 −0.04 −0.11 −0.20 −0.36
intron −0.04 +0.11 +0.08 +0.06 +0.04 +0.01 −0.01 −0.04 −0.08 −0.17
intergenic −1.14 −0.52 −0.23 −0.08 +0.03 +0.10 +0.16 +0.22 +0.32 +0.51
Bottom 10%
10−20th
20−30th
30−40th
40−50th
50−60th
60−70th
70−80th
80−90th
Top 10%
Hypervariability score (percentile band)

C


TE class enrichment of top 1% hvCpGs (0−1kb from centre)
(black box = mean element size)
RC
LINE
DNA
LTR
SINE
Retroposon
***
***
***
0−1kb
distance from TE centre
Mean Kimura divergence
(CpG−corrected %)
as proxy for age
30
25
20
15
log2 OR
0.2
0.0
−0.2

D


TE family enrichment of top 1% hvCpGs (0−1kb from centre)
(black box = mean element size)
CR1
tRNA−RTE
L2
tRNA
RTE−BovB
MIR
RTE−X
Gypsy
5S−Deu−L2
LTR
hAT−Ac
DNA
Helitron
Penelope
hAT−Tip100
ERVL
hAT−Charlie
TcMar−Tc2
hAT−Blackjack
L1
ERVL−MaLR
hAT
TcMar−Tigger
ERV1
TcMar−Mariner
MULE−MuDR
SVA
PiggyBac
ERVK
Alu
**
***
*
.
***
***
**
***
***
***
***
***
***
**
***
***
0−1kb
distance from TE centre
Mean Kimura divergence
(CpG−corrected %)
as proxy for age
30
20
10
log2 OR
0.4
0.2
0.0
−0.2