

| Behnke 1976 age categories | Body weight | Negative (pinworms) | Positive (pinworms) | Total (pinworms) | Prevalence per group (pinworms) | Negative (Eimeria) | Positive (Eimeria) | Total (Eimeria) | Prevalence per group (Eimeria) |
|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| “Weanlings” | under 5 gms | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 33% |
| “Young” | 6-9 gms | 22 | 14 | 36 | 39% | 28 | 5 | 33 | 15% |
| “Juvenile” | 10-13 gms | 57 | 49 | 106 | 46% | 68 | 22 | 90 | 24% |
| “Mature” | 14-17 gms | 81 | 102 | 183 | 56% | 107 | 23 | 130 | 18% |
| “Adult” | 18-21 gms | 62 | 82 | 144 | 57% | 87 | 13 | 100 | 13% |
| “Old” | over 21 gms | 54 | 60 | 114 | 53% | 22 | 6 | 28 | 21% |
| | Sex | Negative (pinworms) | Positive (pinworms) | Total (pinworms) | Prevalence per sex (pinworms) | Negative (Eimeria) | Positive (Eimeria) | Total (Eimeria) | Prevalence per sex (Eimeria) |
| | Female | 155 | 166 | 321 | 52% | 176 | 40 | 216 | 19% |
| | Male | 123 | 141 | 264 | 53% | 138 | 30 | 168 | 18% |