

# Provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho

## AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA MECÂNICA

#### DO INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

#### **PROVA 2017**

Duração da prova: 120 minutos

Nome:	
CC/BI/Passaporte N.º	Validade:/

### INSTRUÇÕES (leia com atenção, por favor)

- Os candidatos que tenham obtido aprovação em cursos preparatórios para o ingresso no ensino superior, organizados no âmbito de uma área departamental, poderão optar pela creditação das notas aí obtidas como sendo a classificação do conjunto das perguntas da prova relativas às matérias já avaliadas nesses cursos. Só se consideram os cursos que previamente tenham sido objeto de homologação pelo conselho técnico-científico.
- Indique em todas as folhas o número do seu CC, BI ou Passaporte. Coloque esse documento de identificação sobre a mesa para validação de identidade.
- As respostas devem ser efetuadas nos locais apropriados de resposta, nesta mesma prova, utilizando caneta preta ou azul.
- As questões de desenvolvimento devem ser também respondidas nas folhas de prova. Se necessitar de mais folhas de resposta solicite-as aos professores vigilantes. Numere todas as folhas suplementares que utilizar.
- Não utilize corretor ou borracha para eliminar respostas erradas. Caso se engane, risque a resposta errada e volte a responder.
- Se responder a alguma questão fora do local apropriado de resposta, indique no local da resposta que esta foi efetuada em folha anexa.
- Para a realização desta prova será permitido o seguinte material de apoio: caneta, lápis e máquina de calcular.
- Durante a realização da prova os telemóveis e outros meios de comunicação <u>deverão estar desligados</u>. A utilização deste equipamento implica a anulação da prova.

#### ESTRUTURA DA PROVA

- **Grupo 1** Três questões de resposta múltipla de matemática.
- Grupo 2 Um problema de matemática.
- **Grupo 3** Três questões de resposta múltipla de física.
- **Grupo 4** Um problema de física.
- Grupo 5 Seis questões de resposta múltipla enquadradas nos conteúdos do curso.
- **Grupo 6** Questão para desenvolvimento de assunto de cultura científica na área do curso.



## Grupo 1

(Cotação total: 3,0 valores; cotação parcial: 1,0 valor por questão; por cada resposta errada: -1/5 de valor)

Para cada uma das questões indique <u>a resposta correta</u> do seguinte modo X.

- 1. Qual das seguintes equações tem duas soluções em  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ?
  - $\Box$  (A)  $\sin x = 0$
  - $\Box$  (B)  $\tan x = -1$
  - $\square (C) \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
  - $\square$  (D)  $\cos x = \frac{1}{2}$
  - $\square$  (E)  $\sin x = 1$
- 2. Seja S o conjunto de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos, com  $A \subseteq S$  e  $B \subseteq S$ . Sabe-se que P[A] = 0,3, e  $P[A \cap B] = 0,1$  e  $P[A \cup B] = 0,8$ . Qual é o valor de  $P[\overline{B}]$ ?
  - $\Box$  (A) 0,1
  - □ (B) 0,2
  - □ (C) 0,3
  - □ (D) 0,6
  - □ (E) 0,4
- 3. Considere a sucessão definida por  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 2u_n 3 \end{cases}$  se  $n \ge 1$ . Quanto vale o terceiro termo?
  - □ (A) 1
  - □ (B) 4
  - □ (C) −1
  - □ (D) 2
  - □ (E) -2



CC /BI / Passaporte N.º .....

## Grupo 2

(Cotação total: 2,0 valores; cotação parcial: 1,0 valor por alínea)

Resolva o problema proposto na folha de prova e indique claramente a resposta final do mesmo. Se o espaço para responder se mostrar insuficiente poderá usar o verso desta folha para continuar a resposta.

Recorra somente a métodos analíticos e não utilize a calculadora.

Considere a função 
$$f$$
 definida por  $f(x) = \begin{cases} x + \ln(1+x) & \text{se } x > 0 \\ xe^{1-x} & \text{se } x \le 0 \end{cases}$ 

- a) Averigue se a função é contínua no ponto x = 0.
- b) Determine a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f, no ponto de abcissa x=-1.




## Grupo 3

(Cotação total: 3,0 valores; cotação parcial: 1,0 valor por questão; por cada resposta errada: -1/5 de valor)

Indique <u>a resposta correta</u> do seguinte modo ⊠.

1. Um corpo move-se numa trajetória retilínea durante 2 segundos, sendo a sua velocidade em função do tempo representada no seguinte gráfico.



Considere as seguintes afirmações:

I – Ao fim de 1 segundo o corpo percorreu 10 metros.

II – A velocidade final do corpo é de  $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ .

III – A aceleração entre os instantes t = 1s e t = 2s foi de  $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ .

Quais as afirmações corretas?

- ☐ (A) apenas I e II
- ☐ (B) apenas I e III
- ☐ (C) apenas II e III
- $\square$  (D) nenhuma
- $\square$  (E) todas
- 2. Um corpo encontra-se sob a ação de várias forças de intensidades,  $F_1 = 10 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ,  $F_2 = 3 \times 10^5 \text{ g} \cdot \text{cm} \cdot \text{s}^{-2}$  e  $F_3 = 5 \text{ N}$ . A relação entre as intensidades das forças é:
  - $\square (A) F_1 < F_2 < F_3$
  - $\Box$  (B)  $F_1 < F_3 < F_2$
  - $\Box$  (C)  $F_3 < F_1 < F_2$
  - $\Box$  (D)  $F_3 < F_2 < F_1$
  - $\Box$  (E)  $F_2 < F_3 < F_1$



CC/BI/	Passaporte N.	0
CC/BI/	Passaporte N.	0


3.	Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio $R$ , com velocidade angular $\omega$ constante
	Qual a afirmação correta?
	☐ (A) A força resultante sobre a partícula é nula.
	☐ (B) A aceleração total da partícula é igual a zero.
	$\square$ (C) A aceleração total da partícula é igual a $\omega^2$ .R.
	$\square$ (D) A aceleração centrípeta da partícula é igual a $\omega^2/R$ .
	☐ (E) Nenhuma das anteriores.

## Grupo 4

(Cotação total: 2,0 valores; cotação parcial: 0,5 valor por alínea)

Um bloco, de massa 2 kg, desliza sem atrito ao longo da superfície como se mostra na figura, no sentido  $A \rightarrow B \rightarrow C$ , até parar no ponto C.

Sabe-se que no ponto A o módulo da velocidade é  $8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ . Considere  $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ .



### Determine:


- a) A energia cinética do bloco no ponto A.
- b) A variação da energia mecânica do bloco quando este se desloca entre os pontos A e B.
- c) O módulo da velocidade no ponto B.
- d) A altura h, quando o bloco atinge o ponto C.



CC/BI/Passa	porte N.º	
CC/DI/ Fa55a	porte iv.	

Para cada uma das questões indique <u>a resposta correta</u> do seguinte modo ⊠.

1 – Qual o símbolo que designa uma unidade de pressão equivalente ao Pascal?  □ (A) N/m² □ (B) kg/cm² □ (C) bar □ (D) mm Hg
<ul> <li>2 – Depois de retirada do forno uma batata que aí foi assada, envolta numa folha de alumínio verifica-se que:</li> <li>□ (A) A folha de alumínio e a batata arrefecem simultaneamente</li> <li>□ (B) A folha de alumínio arrefece mais depressa que a batata</li> <li>□ (C) A batata arrefece mais depressa que a folha de alumínio</li> <li>□ (D) Só a folha de alumínio arrefece</li> </ul>
3 – Quando se mede uma diferença de temperaturas usando as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenhe o valor obtido é:  ☐ (A) Igual nas escalas Celsius e Kelvin e diferente na escala Fahrenheit ☐ (B) Igual nas escalas Celsius e Fahrenheit e diferente na escala Kelvin ☐ (C) Igual nas três escalas ☐ (D) Diferente nas três escalas
4 – Um mesmo corpo, na Terra e na Lua, tem:  ☐ (A) Igual peso mas diferente massa ☐ (B) Igual massa mas diferente peso ☐ (C) Iguais peso e massa ☐ (D) Diferentes peso e massa
5 – Quando a velocidade de um automóvel duplica, o que acontece à sua energia cinética?  ☐ (A) Mantém-se constante ☐ (B) Duplica ☐ (C) Quadruplica ☐ (D) Reduz-se a metade
6 – Qual das quatro grandezas não é escalar?  ☐ (A) Massa ☐ (B) Peso ☐ (C) Temperatura ☐ (D) Potência





**Grupo 6** (Cotação: 4,0 valores)

(Responda ou desenvolva o tema proposto. Escreva entre 15 a 25 linhas)

 emplos.			
 	 	 <del> </del>	