

MELOXI PET 40 (Uso Veterinario)

Nombre del medicamento Meloxi pet 40 tabletas orales.

Composición cualitativa y cuantitativa Cada tableta contiene:

Principio activo: Meloxicam 4mg. Excipientes: c.s.p. una tableta.

Forma farmacéutica: Tableta oral.

Datos clínicos

Especies de destino: Perros

Indicaciones de uso: Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos musculoesqueléticos agudos y crónicos.

Posología y forma de administración

Vía de administración: Oral.

La dosis total diaria debe administrarse en una sola toma. Las tabletas pueden administrarse directamente en la boca del animal o mezcladas con una pequeña cantidad de alimento.

Perros: Tratamiento inicial (Día 1): Una dosis única de 0,2 mg de meloxicam/kg de peso vivo. Lo que representa a 1 tableta por 20 kg. de peso vivo.

Tratamiento de mantenimiento (Días siguientes): Una dosis oral diaria de 0,1 mg de meloxicam/kg de peso vivo (a intervalos de 24 horas). Lo que representa a 1 tableta por 40 kg. de peso vivo.

Contraindicaciones:

No usar en animales gestantes o lactantes.

No usar en animales con trastornos gastrointestinales (como úlceras o hemorragias), disfunción hepática, cardíaca o renal.

No usar en casos de hipersensibilidad al meloxicam o a cualquiera de los excipientes.

No usar en gatos de menos de 6 semanas de edad ni en perros de menos de 4 semanas de edad..

Advertencias y precauciones especiales de uso

Evitar el uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, ya que existe un riesgo potencial de toxicidad renal.

El uso concurrente con otros AINE, corticosteroides, diuréticos o anticoagulantes debe evitarse.

Si se observan reacciones adversas, como vómitos, diarrea, heces sanguinolentas, apatía o pérdida de apetito, el tratamiento debe interrumpirse y se debe consultar a un médico veterinario.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. No administrar.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Otros AINE, diuréticos, anticoagulantes y sustancias con alta afinidad a proteínas pueden competir por la unión y producir efectos tóxicos.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Ocasionalmente se han registrado reacciones adversas típicas de los AINE, como pérdida de apetito, vómitos, diarrea, heces sanguinolentas, apatía y, de forma muy rara, insuficiencia renal aguda.

Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacodinámicas

El mecanismo de acción central radica en la inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas (PG), mediadores clave del proceso inflamatorio, el dolor y la fiebre. Selectividad COX-2: A dosis terapéuticas, el meloxicam inhibe preferencialmente la COX-2 (inducida por estímulos inflamatorios) sobre la COX-1 (constitutiva en riñón, mucosa gástrica y plaquetas). En perros, el ratio de selectividad IC50 es significativamente favorable hacia COX-2, lo que reduce, pero no elimina, el riesgo de citotoxicidad gastrointestinal. **Modulación de citocinas:** Inhibe la infiltración de leucocitos en el tejido inflamado y suprime la liberación de mediadores como el tromboxano B2 inducido por colágeno, aunque con un efecto mínimo sobre la agregación plaquetaria sistémica en comparación con AINES no selectivos. **Efecto condroprotector:** Estudios in vitro sugieren que, a diferencia de otros AINES, el meloxicam no inhibe la síntesis de proteoglicanos por los condrocitos en concentraciones terapéuticas, lo que lo hace idóneo para patologías articulares crónicas.

FarmacocinéticaLa cinética en el modelo canino destaca por su alta biodisponibilidad y una vida media de eliminación prolongada.Absorción:Vía oral: Absorción casi completa (Biodisponibilidad del ~90-100%).Tmax: Alcanza concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) entre las 4 y 8 horas post-administración.Distribución:Alta unión a proteínas plasmáticas (>97%), principalmente a la albúmina.

Volumen de distribución (Vd): Relativamente bajo (0.3 L/kg), reflejando su confinamiento en el compartimento vascular y fluidos extracelulares del tejido inflamado.**Metabolismo:**Biotransformación hepática extensiva a través de procesos de oxidación y glucuronidación.En perros, el principal metabolito es el 5-hidroximetil-meloxicam (inactivo).Eliminación:Vida media (t1/2): Aproximadamente 24 horas (rango 12-36h), lo que permite la dosificación única diaria.Vía de excreción: Se elimina equitativamente por vía fecal (bilis) y urinaria, principalmente como metabolitos.Consideraciones Críticas de SeguridadAclaramiento renal: Aunque es preferencial COX-2, la inhibición de prostaglandinas renales (PGE2 y PGI2) puede comprometer la perfusión renal en estados de hipotensión o deshidratación (efecto hemodinámico).Sensibilidad individual: Existe una variabilidad interindividual en el metabolismo del citocromo P450, lo que justifica el monitoreo de enzimas hepáticas en tratamientos a largo plazo.

Naturaleza y contenido del envase

Blíster de Aluminio/PVC/PVDCconteniendo 40 o 100 tabletas.

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o de los residuos derivados de su uso

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Toxicidad del meloxicam en perros y gatos está principalmente relacionada con los efectos adversos típicos de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), especialmente a nivel gastrointestinal y renal. Los gatos tienen un margen de seguridad terapéutico más estrecho que los perros, por lo que son más susceptibles a la sobredosis.

Signos y Síntomas de Toxicidad (Sobredosis o Uso Prolongado)

Los signos clínicos de toxicidad en perros y gatos pueden variar de leves a graves e incluso mortales. Síntomas Gastrointestinales (los más comunes): Vómitos (a veces intensos). Diarrea. Pérdida del apetito (anorexia). Heces oscuras o alquitranadas (melenas), indicando sangrado gastrointestinal. Heces sanguinolentas. Ulceración gastrointestinal o perforación del estómago/intestinos, que puede ocurrir sin previo aviso y ser mortal.

Síntomas Renales y Urinarios: Aumento de la sed y la micción.

Insuficiencia renal aguda (disfunción renal), especialmente si el animal está deshidratado, hipovolémico o hipotenso. Orina turbia, descolorida o con sangre.

Síntomas Neurológicos y Sistémicos:

Apatía, letargo o debilidad. Falta de coordinación. Respiración rápida o pesada. Convulsiones o coma (en casos de intoxicación aguda grave).

Ictericia (coloración amarillenta de piel u ojos), indicando daño hepático.

Factores de Riesgo y Prevención

Dosis y Especie: Los gatos son particularmente sensibles.

Interacciones: El riesgo de toxicidad aumenta significativamente si se administra concurrentemente con otros AINE, corticosteroides, diuréticos o medicamentos anticoagulantes.

Condiciones Preexistentes: No debe usarse en animales con disfunción hepática, renal, cardíaca o trastornos hemorrágicos.

Manejo de la Intoxicación

Si sospecha que su mascota ha ingerido una sobredosis de meloxicam o muestra alguno de estos síntomas, debe interrumpir el tratamiento inmediatamente y buscar atención veterinaria de urgencia. El tratamiento puede incluir la descontaminación (inducción del vómito si es reciente), protectores gástricos y manejo del fallo renal agudo.

Condiciones de Almacenamiento a Temperatura ambiente: Debe guardarse en un lugar fresco, idealmente entre 15 °C y 30 °C. Protección de la luz: Mantén el producto en su empaque original (caja o blíster) para evitar la degradación por exposición solar. Humedad: Asegúrate de que el envase esté bien cerrado para proteger las tabletas de la humedad ambiental. Seguridad: Guárdalo siempre en un lugar fuera del alcance de los niños y otras mascotas para evitar ingestas accidentales peligrosas. Advertencias importantes No refrigerar: A menos que la etiqueta específica de tu marca indique lo contrario, este medicamento suele conservarse bien a temperatura ambiente y no requiere frío. Caducidad: Nunca utilices tabletas que hayan superado la fecha de vencimiento indicada en el blíster y/o cajas ya que la potencia del fármaco disminuye y puede no ser segura.

REG. SENASA: F.99.31.N.0111

Fabricado en Perú por:

INVERSIONES VETLUNX E.I.R.L.

RUC20557077741

Para: **B&V PRODUCTS SAC**

Director Técnico:

M.V. E. Angelo Barrios Falcón

Reg. CMVP 3599

Telf. + 51 961586541