

PREDNI TOP 20

Composición: Cada tableta contiene:

Prednisolona 20 mg, Excipientes c.s.p. 1 Tableta.

Forma Farmacéutica: Tabletas orales. Indicaciones La prednisolona está indicada para el tratamiento de: Afecciones inflamatorias. Enfermedades autoinmunes. Trastornos alérgicos. Enfermedades neoplásicas. Terapia de reemplazo en casos de insuficiencia adrenal.

Modo de Acción : La prednisolona es un glucocorticoide sintético que actúa como un potente antiinflamatorio e inmunosupresor. Su acción se basa en la modulación de la respuesta inmune y la reducción de la inflamación a través de la inhibición de la síntesis de mediadores proinflamatorios. su mecanismo No genómico favorece en una respuesta rápida al proceso anti inflamatorio ya que actúa a nivel de membrana celular, y el mecanismo genómico que actúa a nivel del ADN de las células inhibiendo factores inflamatorios.

Farmacocinética- Absorción: La prednisolona se absorbe rápidamente a través del tracto gastrointestinal tras la administración oral, basicamente a nivel del yeyuno.- **Distribución:** Se une en gran medida a las proteínas plasmáticas (albúmina y transcortina). La prednisolona atraviesa la barrera hematoencefálica y la placenta.- **Metabolismo:** Se metaboliza principalmente en el hígado, transformándose en metabolitos inactivos.- **Eliminación:** La vida media de eliminación es de aproximadamente 2 a 4 horas en perros y gatos. Se excreta principalmente por orina, heces y leche materna.

Mecanismo de Acción: La prednisolona es un glucocorticoide de acción intermedia con escasa actividad mineralocorticoide. Su mecanismo de acción principal es a través de la unión a receptores de glucocorticoides (GCR), que se encuentran en el citoplasma de casi todas las células del cuerpo.

Los pasos clave del mecanismo de acción son:

Difusión y Unión: La prednisolona, debido a su estructura lipofílica, atraviesa fácilmente la membrana celular y se une al GCR en el citoplasma.

Translocación Nuclear: El complejo formado por la prednisolona y el receptor migra hacia el núcleo de la célula.

Modulación Genética: En el núcleo, el complejo se acopla a la cromatina y activa o reprime la transcripción de genes específicos que codifican la síntesis de determinadas proteínas (ARNm).

Inhibición de Mediadores Inflamatorios: Uno de los efectos más importantes es la inhibición de la enzima fosfolipasa A2 (PLA2). Esto previene la liberación de ácido araquidónico y, por ende, la producción de mediadores proinflamatorios como las prostaglandinas y los leucotrienos. (No genómico)

Supresión de la Respuesta Inmune: La prednisolona reduce la inflamación y el enrojecimiento al cambiar la forma en que funciona el sistema inmunológico, disminuyendo la migración de leucocitos y la proliferación capilar asociada a la inflamación. También suprime la afluencia de linfocitos T a la sangre, lo que resulta en un efecto linfocitopénico.

Efectos Farmacológicos

Los efectos farmacológicos de la prednisolona son amplios y se deben a los cambios en la síntesis de proteínas y la función celular:

Efecto Antiinflamatorio: Disminuye los signos y síntomas de la inflamación, como edema, eritema y dolor.

Efecto Inmunosupresor: Reduce la respuesta inmunológica, lo cual es útil en el tratamiento de enfermedades autoinmunes o trasplantes de órganos.

Efectos Metabólicos: Influye en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos (similar al cortisol natural).

La vía oral es tan efectiva como otras vías de administración y se considera de elección siempre que sea bien tolerada, alcanzando concentraciones plasmáticas máximas en 1 o 2 horas después de su administración

Dosis y Modo de Uso Perros : La dosis se administrará 1 vez por día preferentemente por la mañana. En caso de alergias, se sugiere iniciar el tratamiento con 1 mg/kg día, en 1 toma, durante la primera semana y luego ir reduciendo la dosis semanalmente hasta la suspensión o hasta la mínima dosis efectiva. Como inmunosupresor, la dosis es de 2-4 mg/kg día, en 2 tomas, durante la primer semana y luego ir reduciéndola gradualmente hasta finalizar el tratamiento.

1 tableta / 20 kg. peso vivo

1/2 tableta / 10 kg. peso vivo

Ajustar según respuesta clínica y efectos adversos.

Efectos Secundarios Los efectos adversos pueden incluir:- Aumento de la sed y la micción.- Aumento del apetito.- Supresión del sistema inmunológico.- Alteraciones gastrointestinales (vómitos, diarrea).- Cambios en el comportamiento.

Contraindicaciones Infecciones sistémicas no tratadas. Úlceras pépticas. Diabetes mellitus. Hipersensibilidad a la prednisolona.

Precauciones Utilizar con precaución en animales con enfermedades cardíacas o renales. Supervisar a los animales tratados a largo plazo para detectar efectos secundarios.- No interrumpir el tratamiento abruptamente; reducir la dosis gradualmente.

Almacenamiento Conservar en un lugar fresco y seco, entre 15 a 30 °C, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

Información Adicional La prednisolona debe ser utilizada bajo la supervisión de un veterinario. Es esencial realizar un monitoreo regular durante el tratamiento para ajustar la dosis según sea necesario.

Antes de iniciar el tratamiento, es fundamental realizar un examen exhaustivo y pruebas diagnósticas para evaluar la gravedad de la enfermedad cardíaca o renal. Monitoreo Frecuente: Controlar regularmente la función cardíaca y renal durante el tratamiento con prednisolona. Esto puede incluir análisis de sangre, pruebas de función renal y monitoreo de la presión arterial. Ajuste de Dosis: Considerar la posibilidad de ajustar la dosis de prednisolona. Las mascotas con enfermedades cardíacas o renales pueden requerir dosis más bajas para minimizar el riesgo de efectos secundarios.

Observación de Síntomas: Estar atento a signos de empeoramiento, como aumento de la sed, micción excesiva, cambios en el apetito, letargo o cualquier signo de descompensación cardíaca o renal. Evitar Deshidratación: Asegurarse de que la mascota tenga acceso constante a agua fresca y limpia, ya que la prednisolona puede aumentar la sed y la micción.

Interacción con Otros Medicamentos: Informar al veterinario sobre otros medicamentos que la mascota esté tomando, ya que la prednisolona puede interactuar con fármacos utilizados para tratar enfermedades cardíacas o renales. Considerar Alternativas: En algunos casos, explorar opciones de tratamiento alternativas que sean más seguras para mascotas con estas condiciones. Educación al Propietario: Informar al dueño sobre los posibles efectos secundarios y la importancia de seguir las indicaciones del veterinario. Estas precauciones son cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar de las mascotas que requieren tratamiento con prednisolona y que padecen enfermedades cardíacas o renales.

REG. SENASA: F.106.031.N.00038

Fabricado en Perú por:

ALIFARSE E.I.R.L.

RUC 2060335881

Director Técnico:

M.V. E. Angelo Barrios Falcón

Reg. CMVP 3599

Telf. + 51 918 654 554

