

PORQUE MI FUTURO TODAVÍA NO ESTÁ ESCRITO

Mi historia continúa con las pastillas LONSURF®
(trifluridina/tipiracilo)

LONSURF es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos con

- cáncer colorrectal que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, que han recibido tratamiento antes o que no pueden recibir ciertos agentes de quimioterapia.
- un tipo de cáncer de estómago llamado cáncer gástrico, incluido el cáncer de la unión gastroesofágica que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, que han recibido tratamiento antes o que no pueden recibir ciertos agentes de quimioterapia.

No se sabe si LONSURF es seguro y efectivo en niños

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23,
y la información completa de uso incluida en la solapa.



Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

¿Qué es el cáncer de colon o rectal metastásico?

Probablemente haya leído mucho sobre el cáncer de colon o rectal desde que se lo diagnosticaron. Como ya sabrá, los cánceres de colon y rectal juntos son el tercer cáncer más común, tanto en hombres como en mujeres.

Metastásico significa que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Acerca de esta guía

Usted ha pasado por muchas cosas desde que le diagnosticaron cáncer. Ha recibido varios tratamientos, ha sufrido ciertos efectos secundarios y ha tenido que lidiar con muchas emociones distintas. Saber que un tratamiento ha dejado de tener efecto nunca es fácil, pero las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) le ofrecen otra opción de tratamiento. Ya sea que le hayan recetado LONSURF o que solamente quiera saber más al respecto, este cuadernillo es para usted.

La información que contiene este cuadernillo no sustituye el consejo de su proveedor de atención médica. Si tiene alguna pregunta sobre LONSURF o el cáncer de colon o rectal, consulte a su proveedor de atención médica.

Siempre puede obtener más información en LONSURF.com/tomorrow



¿Qué es LONSURF?

Las pastillas LONSURF son un medicamento con receta para el cáncer de colon o rectal.

LONSURF es una pastilla oral, lo que significa que se administra por la boca. Es una pastilla quimioterápica de venta con receta, formada por dos partes. LONSURF le ofrece la oportunidad de continuar el tratamiento del cáncer. Puede ayudarle a vivir más tiempo y retardar o detener el crecimiento del cáncer en su cuerpo durante un tiempo.

LONSURF fue estudiado en un ensayo clínico de 800 pacientes con cáncer de colon o rectal que se había diseminado a otras partes del cuerpo y que se había tratado antes con ciertos medicamentos quimioterápicos.

- La mitad de los pacientes tratados con LONSURF continuaban con vida después de 7.1 meses y la mitad de los pacientes que recibieron placebo continuaban con vida después de 5.3 meses
- En el 88% de los pacientes tratados con LONSURF y el 94% de los pacientes que recibieron placebo se produjo un agravamiento de la enfermedad o la muerte



Vivir con cáncer de colon o rectal puede ser difícil, pero no está solo. Lo enfrenta con su familia, sus amigos y seres queridos. LONSURF puede darle la oportunidad de continuar su trayectoria con ellos durante más tiempo.

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf[®]
(trifluridine and tipiracil) tablets

¿Quiénes deberían tomar LONSURF?

Las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) son para aquellas personas que:

- Viven con cáncer de colon o rectal que se ha diseminado a otras partes del cuerpo
- Han recibido anteriormente o no pueden recibir ciertos medicamentos quimioterápicos
- Que pueden necesitar otra opción ahora

Esos medicamentos anteriores pueden ser:

- Fluoropirimidina, como el 5-fluorouracilo, también conocido como 5-FU
- Un tratamiento basado en oxaliplatino, como FOLFOX (5-FU, leucovorina, y oxaliplatino), CAPOX (capecitabina y oxaliplatino), o Eloxatin® (oxaliplatino)
- Un tratamiento basado en irinotecán, como FOLFIRI (5-FU, leucovorina, e irinotecán), CAPIRI (capecitabina e irinotecán) o Camptosar® (irinotecán)
- Un tratamiento biológico anti-VEGF, como Avastin® (bevacizumab) o Zaltrap® (ziv-aflibercept)
- Un tratamiento anti-EGFR, como Erbitux® (cetuximab) o Vectibix® (panitumumab)

Si no sabe con certeza qué tratamientos recibió antes, pregunte a su proveedor de atención médica.

No tome LONSURF si es alérgico a alguno de los ingredientes de LONSURF. Hable con su proveedor de atención médica si no sabe con certeza si es alérgico a alguno de los ingredientes de LONSURF.

Las marcas comerciales, registradas o no, son propiedad de sus respectivos dueños.



Puede obtener más información sobre el cáncer de colon o rectal a través de estas organizaciones

Puede encontrar información sobre el cáncer de colon o rectal, apoyo y una comunidad en:

CancerCare®

Visite cancercares.org o llame al 1-800-813-HOPE (4673)

Cancer Support Community®

Visite cancersupportcommunity.org o llame al 1-888-793-9355

Colontown®

Visite colontown.org o llame al 1-410-881-3160

Colorectal Cancer Alliance

Visite ccalliance.org o llame al 1-877-422-2030

Fight Colorectal Cancer®

Visite fightcolorectalcancer.org o llame al 1-877-427-2111

The Raymond Foundation

Visite TheRaymondFoundation.org o llame al 1-646-598-2001

Resumen de la información importante sobre la seguridad

- **Conteos bajos de células sanguíneas.** Es común tener los conteos de células sanguíneas bajas con LONSURF, y a veces pueden estar muy bajas y poner en peligro la vida. LONSURF puede hacer que bajen los conteos de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los conteos bajos de glóbulos blancos pueden hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían causar la muerte. Su proveedor de atención médica debe hacerle análisis de sangre antes de que comience a tomar LONSURF, a los 15 días de iniciado el tratamiento y según sea necesario para vigilar sus conteos de células sanguíneas. Su proveedor de atención médica puede reducir su dosis de LONSURF o suspenderla por completo si sus conteos de glóbulos blancos o plaquetas están bajos

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

¿Qué es el cáncer de estómago metastásico?

Probablemente haya leído mucho sobre el cáncer de estómago desde que se lo diagnosticaron. Como ya sabrá, el cáncer de estómago no es tan común como otros cánceres, tanto en hombres como en mujeres.

Metastásico significa que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Al cáncer de estómago a veces se le llama cáncer gástrico.

- Es posible que su proveedor de atención médica le haya dicho que tiene cáncer en la unión gastroesofágica, que es un tipo de cáncer de estómago ubicado en la parte inferior del esófago que se conecta con el estómago

Acerca de esta guía

Usted ha pasado por muchas cosas desde que le diagnosticaron cáncer. Ha recibido varios tratamientos, ha sufrido ciertos efectos secundarios y ha lidiado con muchas emociones distintas. Saber que un tratamiento ha dejado de tener efecto nunca es fácil, pero las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) le ofrecen otra opción de tratamiento.

La información que contiene este cuadernillo no sustituye el consejo de su proveedor de atención médica. Si tiene alguna pregunta sobre LONSURF y el cáncer de estómago, consulte a su proveedor de atención médica.

Siempre puede obtener más información en LONSURF.com/tomorrow



¿Qué es LONSURF?

Las pastillas LONSURF son un medicamento con receta para el cáncer de estómago.

LONSURF es una pastilla oral, lo que significa que se administra por la boca. Es una pastilla quimioterápica de venta con receta, formada por dos partes. LONSURF le ofrece la oportunidad de continuar el tratamiento del cáncer. Puede ayudarle a vivir más tiempo y retardar o detener el crecimiento del cáncer en su cuerpo durante un tiempo.

LONSURF fue estudiado en un ensayo clínico de 507 pacientes con cáncer de estómago que se había diseminado a otras partes del cuerpo y que se había tratado antes con ciertos medicamentos quimioterápicos.

- La mitad de los pacientes tratados con LONSURF continuaban con vida después de 5.7 meses y la mitad de los pacientes que recibieron placebo continuaban con vida después de 3.6 meses
- En el 85% de los pacientes tratados con LONSURF y el 92% de los pacientes que recibieron placebo se produjo un agravamiento de la enfermedad o la muerte



Vivir con cáncer de estómago puede ser difícil, pero no está solo. Lo enfrenta con su familia, sus amigos y seres queridos. LONSURF puede darle la oportunidad de continuar su trayectoria con ellos durante más tiempo.

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

¿Quiénes deberían tomar LONSURF?

Las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) son para aquellas personas que:

- Viven con cáncer de estómago que se ha diseminado a otras partes del cuerpo
- Han recibido anteriormente o no pueden recibir ciertos medicamentos quimioterápicos
- Pueden necesitar otra opción ahora

Esos medicamentos anteriores pueden ser:

- Fluoropirimidina, como 5-fluorouracilo, también conocido como 5-FU y Xeloda® (capecitabina)
- Platino
- Un tratamiento basado en taxano y/o irinotecán, como FOLFIRI (5-FU, leucovorina, e irinotecán) y Camptosar® (irinotecán)
- Un inhibidor de HER-2

Si no sabe con certeza qué tratamientos recibió antes, pregunte a su proveedor de atención médica.

No tome LONSURF si es alérgico a alguno de los ingredientes de LONSURF. Hable con su proveedor de atención médica si no sabe con certeza si es alérgico a alguno de los ingredientes de LONSURF.

Las marcas comerciales, registradas o no, son propiedad de sus respectivos dueños.



Puede obtener más información sobre el cáncer de estómago a través de estas organizaciones

Puede encontrar información sobre el cáncer de estómago, apoyo y una comunidad en:

CancerCare®

Visite cancercares.org o llame al 1-800-813-HOPE (4673)

Cancer Support Community®

Visite cancersupportcommunity.org o llame al 1-888-793-9355

Debbie's Dream Foundation

Visite debbiesdream.org o llame al 1-855-475-1200

Gastric Cancer Foundation

Visite gastriccancer.org

Hope for Stomach Cancer

Visite stocan.org o llame al 1-424-239-9943

No Stomach For Cancer®

Visite nostomachforcancer.org o llame al 1-608-692-5141

The Raymond Foundation

Visite TheRaymondFoundation.org o llame al 1-646-598-2001

Resumen de la información importante sobre la seguridad

Avise a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de infección durante el tratamiento con LONSURF: fiebre, escalofríos o dolores corporales.

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

¿Cómo me puede ayudar LONSURF?

Gracias a resultados comprobados de que ayudan a los pacientes a vivir más tiempo, las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) pueden permitirle seguir combatiendo el cáncer.

LONSURF ha demostrado:

- Permitir que algunos pacientes vivan más tiempo
- Retardar o detener el crecimiento del cáncer durante un tiempo

Cómo funciona

LONSURF es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos con cáncer colorrectal o de estómago que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, y que han recibido tratamiento anteriormente o no pueden recibir ciertos agentes quimioterápicos. LONSURF contiene dos medicamentos:

- Uno (tipiracilo) ayuda a que el otro (trifluridina) continúe actuando y funcione correctamente, impidiendo que las células se reproduzcan. Esto puede ayudar a evitar que los tumores crezcan



¿Qué es lo más importante que debo saber sobre LONSURF?

Es importante que sepa qué esperar para que pueda reconocer los efectos secundarios de inmediato y hablar con su proveedor de atención médica. Hay cosas que puede hacer para controlarlos, mientras los encargados de su tratamiento monitorean sus síntomas.

Su proveedor de atención médica debe controlar sus conteos de células sanguíneas antes de que comience a tomar LONSURF, 15 días después de iniciado el tratamiento y según sea necesario.

- Es común tener los conteos de células sanguíneas bajos con LONSURF, y a veces pueden estar muy bajas y poner en peligro la vida. LONSURF puede hacer que bajen los conteos de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los conteos bajos de glóbulos blancos pueden hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían causar la muerte. Es por esto que podría reducirse su dosis de LONSURF o suspenderla por completo
- Avise a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta algún signo de infección como fiebre, escalofríos o dolores corporales

Resumen de la información importante sobre la seguridad

Antes de usar LONSURF, díglele a su proveedor de atención médica todas las enfermedades que padece, incluso si:

- Tiene problemas de riñón o de hígado
- Está embarazada o planea quedarse embarazada. Se desconoce si LONSURF puede afectar al feto.

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

Cómo se toma LONSURF

Las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) se toman y degluten:

- Dos veces al día con alimentos
- Con cualquier tipo de comida

LONSURF viene en 2 concentraciones: pastillas (tabletas) de 15 mg y 20 mg.*

Su proveedor de atención médica puede recetarle ambas concentraciones como su dosis.



Comprimido de 15 mg



Comprimido de 20 mg

Las pastillas se muestran en su tamaño natural.

*La concentración de las pastillas LONSURF se basa en el componente activo del medicamento. Los tamaños de los comprimidos son: 7 mm la dosis de 15 mg y 8 mm la dosis de 20 mg.









Recomendaciones para la administración de la dosis de LONSURF durante 28 días



Primera dosis diaria



Segunda dosis diaria

Día 1:  	Día 2:  	Día 3:  	Día 4:  	Día 5:  	Día 6: DESCANSO	Día 7: DESCANSO
Día 8:  	Día 9:  	Día 10:  	Día 11:  	Día 12:  	Día 13: DESCANSO	Día 14: DESCANSO
Día 15: DESCANSO	Día 16: DESCANSO	Día 17: DESCANSO	Día 18: DESCANSO	Día 19: DESCANSO	Día 20: DESCANSO	Día 21: DESCANSO
Día 22: DESCANSO	Día 23: DESCANSO	Día 24: DESCANSO	Día 25: DESCANSO	Día 26: DESCANSO	Día 27: DESCANSO	Día 28: DESCANSO

Usted tomará LONSURF después del desayuno y la cena durante 5 días a la semana, y luego descansará 2 días. Hará esto durante 2 semanas.

En las 2 semanas (14 días) siguientes, no tomará LONSURF.

Esto se repite durante todo el tiempo que su proveedor de atención médica le diga. Siempre siga cuidadosamente todas las recomendaciones de su proveedor de atención médica.

Use el calendario digital que encontrará en LONSURF.com/mycalendar para llevar un registro de su tratamiento. Su proveedor de atención médica puede darle también un calendario de tratamiento.

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.



Otras cosas a tener en cuenta al tomar LONSURF

- Guarde las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C)
- No guarde LONSURF con otros medicamentos. Mantenga las pastillas LONSURF en su propio envase
- Si guarda las pastillas LONSURF fuera del envase original, las pastillas no utilizadas deben tirarse pasados 30 días
- Lávese las manos después de manipular LONSURF. Aunque se presente en forma de pastillas, sigue siendo quimioterapia
- Asegúrese de que su cuidador o cuidadora use guantes al manipular LONSURF
- Tenga en cuenta que hay un sobrecito dentro del frasco que sirve para absorber la humedad. No trague ese material
- Mantenga LONSURF fuera del alcance de los niños



Póngase en contacto con su proveedor de atención médica si:

- Omite una dosis. No tome dosis adicionales para compensar la dosis que omitió. Si omite una dosis, llame a su proveedor de atención médica para que le diga qué hacer
- Le sobraron pastillas. El proveedor de atención médica o el farmacéutico le dirá cómo eliminarlas de la manera correcta

Resumen de la información importante sobre la seguridad

- **Mujeres** en condiciones de quedar embarazadas: Su proveedor de atención médica verificará que no esté embarazada antes de que comience el tratamiento con LONSURF. Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis de LONSURF. Avísele a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada
- **Hombres**, Deberá usar un condón cada vez que tenga relaciones sexuales durante el tratamiento y hasta 3 meses después de la última dosis de LONSURF si su pareja es una mujer en condiciones de quedar embarazada. Avísele de inmediato a su proveedor de atención médica si su compañera se queda embarazada mientras usted está tomando LONSURF
- Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si LONSURF pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LONSURF hasta 1 día después de su última dosis de LONSURF

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de LONSURF?

Casi todos los pacientes tratados con las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) sufren efectos secundarios en algún momento. Algunos efectos secundarios comunes que podría usted sufrir son:

- Cansancio (fatiga/debilidad)
- Náuseas
- Vómitos
- Disminución del apetito
- Diarrea
- Dolor abdominal
- Fiebre

Dígale a su proveedor de atención médica si tiene náuseas, vómitos o diarrea fuerte o que no desaparece. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LONSURF.

Si tiene un kit inicial de LONSURF, puede usar el termómetro para tomarse la temperatura. Escriba su temperatura y cualquier efecto secundario que tenga, y lleve esa información para compartirla con el proveedor de atención médica en su próxima cita.

También puede llamar a la línea telefónica abierta 24/7 de Taiho Oncology si tiene preguntas sobre los efectos secundarios de LONSURF al **1-844-US-TAIHO (1-844-878-2446)**. Puede notificar sus efectos secundarios a la FDA llamando al **1-800-FDA-1088**.

Cómo controlar los efectos secundarios

Su proveedor de atención médica puede ayudarle a controlar algunos de los efectos secundarios de las pastillas LONSURF. Estas medidas podrían incluir ajustar su plan de tratamiento, ya sea cambiando la dosis o suspendiendo el tratamiento.

La siguiente información también podría ayudarle a controlar algunos de los efectos secundarios de LONSURF mientras se encuentre bajo la supervisión de su proveedor de tratamiento.

Esta información no pretende reemplazar las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Comuníquese siempre los efectos secundarios.

Cansancio (fatiga/debilidad)	
<ul style="list-style-type: none">• Cada día, haga las cosas que son más importantes. No se sobrepase• Dedique tiempo a descansar• Duerma siestas de menos de una hora. Si las siestas son breves, podrá dormir mejor por la noche• Intente hacer actividad física todos los días. Pregunte a su proveedor de atención qué ejercicios pueden ser benéficos, como salir a caminar 15 minutos, hacer yoga o bicicleta fija	<ul style="list-style-type: none">• Establezca una rutina a la hora de acostarse. Tomar un baño, leer, escuchar música o meditar antes de ir a la cama son cosas que pueden ayudarle a relajarse• Procure dormir al menos 8 horas cada noche• Pida a sus familiares y amigos que lo ayuden con sus tareas, o que lo lleven a las citas médicas, hagan las compras o cocinen• Hable con su proveedor de atención médica, quien tal vez le pueda recetar medicamentos para reducir el cansancio

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.



Cómo controlar los efectos secundarios (continuación)

Náuseas y vómitos

- Una buena manera de prevenir los vómitos es prevenir las náuseas. Evitar ciertos alimentos también puede ayudar. No coma alimentos grasosos, fritos, dulces o picantes si después de comerlos tiene náuseas
- Consuma 5 o 6 comidas pequeñas al día, en lugar de 3 grandes (esto no cambia el esquema de administración del tratamiento)
- Consuma alimentos y bebidas tibios en vez de calientes o fríos
- Intente comer trocitos de paleta helada o helado de fruta. Puede probar chupar cubos de hielo para ver si eso ayuda (deje de hacerlo si le molesta la temperatura fría)
- Hable con su proveedor de atención médica, quien tal vez pueda recetarle algo para ayudarlo. También puede preguntarle si puede recibir acupuntura

Disminución del apetito

- Los pacientes con cáncer de estómago deben preguntar a su proveedor de atención médica si tienen necesidades alimentarias especiales debido a su enfermedad
- Consuma 5 o 6 comidas pequeñas al día, en lugar de 3 grandes (esto no cambia el esquema de administración del tratamiento)
- Beba licuados (batidos) a base de leche o fruta, jugos o sopa si no tiene ganas de alimentos sólidos
- Elija alimentos con muchas calorías y/o proteínas
- La actividad física puede mejorar su apetito. Pregunte a su proveedor de atención qué ejercicios pueden ser benéficos, como salir a caminar 15 minutos, hacer estiramientos, nadar o ir en bicicleta
- Hable con su proveedor de atención médica, quien puede sugerirle tomar vitaminas o suplementos alimenticios

Diarrea / dolor abdominal

En caso de diarrea:

- Consuma 5 o 6 comidas pequeñas al día, en lugar de 3 grandes (esto no cambia el esquema de administración del tratamiento)
- Pregunte a su proveedor de atención médica sobre alimentos con alto contenido de sodio y potasio. Debido a que su organismo puede perder estos minerales al tener diarrea, es importante reponerlos. Los alimentos con alto contenido de sodio y potasio son: plátanos, naranjas, néctar de melocotón y albaricoque, y papas hervidas o en puré
- Consuma alimentos con alto contenido de fibra
- Beba de 8 a 12 tazas de líquidos claros (transparentes) al día
- Beba los líquidos de forma lenta y a temperatura ambiente
- Pregunte a su proveedor de atención médica si puede recetarle algún medicamento que le ayude. No tome ningún medicamento sin que se lo haya autorizado
- Intente practicar respiración profunda, yoga u otras maneras de relajarse. Esto puede ayudar con la tensión muscular, la ansiedad y el dolor

Para el dolor abdominal:

- Haga ejercicio con regularidad
- Consuma abundantes alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras
- Evite los alimentos que produzcan gases
- Dígale a su cuidador/a si le duele, para que pueda intentar ayudarlo

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf[®]
(trifluridine and tipiracil) tablets

Cómo controlar los efectos secundarios (continuación)

Fiebre

- Beba abundantes líquidos, como agua, jugo y caldo, porque la fiebre puede hacer que pierda líquido y se deshidrate
- Descanse
- Manténgase fresco vistiendo ropa liviana y durmiendo con una sábana solamente
- **Llame a su proveedor de atención médica de inmediato** si tiene fiebre u otro signo de infección. Puede usar el termómetro incluido en el kit inicial para tomarse la temperatura todos los días

Puede llamar a la línea telefónica abierta 24/7 de Taiho Oncology con preguntas sobre los efectos secundarios de las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) al **1-844-US-TAIHO (1-844-878-2446)**.

Las marcas comerciales, registradas o no, son propiedad de sus respectivos dueños.



Resumen de la información importante sobre la seguridad

Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas que toma.

Los **efectos secundarios más comunes** de LONSURF incluyen cansancio (fatiga, debilidad), náuseas, disminución del apetito, diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

Dígale al médico si tiene náuseas, vómitos o diarrea fuerte o que no desaparece.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LONSURF. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica. Llame a su médico para que le dé consejos sobre cómo enfrentar los efectos secundarios.

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

Información importante sobre la seguridad

LONSURF puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Conteos bajos de células sanguíneas.** Es común tener los conteos de células sanguíneas bajas con LONSURF, y a veces pueden estar muy bajas y poner en peligro la vida. LONSURF puede hacer que bajen los conteos de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los conteos bajos de glóbulos blancos pueden hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían causar la muerte. Su proveedor de atención médica debe hacerle análisis de sangre antes de que comience a tomar LONSURF, a los 15 días de iniciado el tratamiento y según sea necesario para vigilar sus conteos de células sanguíneas. Su proveedor de atención médica puede reducir su dosis de LONSURF o suspenderla por completo si sus conteos de glóbulos blancos o plaquetas están bajos

Avise a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de infección durante el tratamiento con LONSURF: fiebre, escalofríos y dolores corporales.

Antes de usar LONSURF, dígame a su proveedor de atención médica todas las enfermedades que padece, incluso si:

- Tiene problemas de riñón o de hígado
- Está embarazada o planea quedarse embarazada. LONSURF puede afectar al feto.
- **Mujeres** en condiciones de quedar embarazadas: Su proveedor de atención médica verificará que no esté embarazada antes de que comience el tratamiento con LONSURF. Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis de LONSURF. Avísele a su proveedor de atención médica de inmediato si se queda embarazada

- **Hombres,** Deberá usar un condón cada vez que tenga relaciones sexuales durante el tratamiento y hasta 3 meses después de la última dosis de LONSURF si su pareja es una mujer en condiciones de quedar embarazada. Avísele de inmediato a su proveedor de atención médica si su compañera queda embarazada mientras usted está tomando LONSURF
- Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si LONSURF pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LONSURF hasta 1 día después de su última dosis de LONSURF

Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas que toma.

Los **efectos secundarios más comunes** de LONSURF incluyen cansancio (fatiga, debilidad), náuseas, disminución del apetito, diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

Dígale al médico si tiene náuseas, vómitos o diarrea fuerte o que no desaparece.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LONSURF. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica. Llame a su médico para que le dé consejos sobre cómo enfrentar los efectos secundarios.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (U.S. Food and Drug Administration)
Fecha de emisión: 02/2019

Consejos para sus citas médicas

Cómo ir preparado

Escriba las preguntas que tenga para su proveedor de atención médica y llévelas consigo.

Escriba sus preguntas cuando tenga alguna duda. Puede usar el diario incluido en esta guía, el Calendario de Tratamiento de LONSURF (LONSURF.com/mycalendar), otro diario o un papel. Lleve sus apuntes a sus visitas médicas. De esa manera, tendrá un recordatorio de sus preguntas.

Lleve un registro de los efectos secundarios.

Escriba cuándo es que ocurren. Puede usar el diario incluido en esta guía y llevarlo a sus citas para que su proveedor de atención médica pueda ayudar a controlar ciertos efectos secundarios.

Lleve toda la información sobre el seguro de salud y otra información relacionada con la enfermedad o el tratamiento.

Puede usar la solapa en la parte posterior de este cuadernillo o una carpeta para guardar todo en un mismo lugar.



Cómo aprovechar al máximo sus citas médicas

No sienta que tiene que ir solo a sus citas médicas.

Vaya con un cuidador, un familiar o un amigo de confianza a sus citas. Esa persona podrá ayudarle a recordar lo que dice su proveedor de atención médica y servirle de apoyo.

Tome notas durante las citas.

Puede hacerlo usted mismo o su cuidador, un familiar o amigo. Puede usar el diario incluido en la parte posterior de este cuadernillo.

Obtenga la información de contacto de su proveedor de atención médica.

Asegúrese de tener los números de teléfono o direcciones de correo electrónico por si tiene más preguntas. Puede escribirlos en el diario proporcionado al final de este cuadernillo.

Tenga un plan de emergencia.

Pregunte a su proveedor de atención médica qué hacer en una emergencia, incluso:

- Con quién ponerse en contacto durante el horario de atención y fuera del horario de oficina
- Cómo ponerse en contacto con ellos
- Adónde ir

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf[®]
(trifluridine and tipiracil) tablets

DIARIO

Puede usar estas hojas para escribir las preguntas que quiera hacerle a su proveedor de atención médica, tomar notas durante sus citas o anotar cualquier otra cosa que quiera recordar. Es conveniente que incluya la fecha junto a cada anotación.









Taiho Oncology tiene el compromiso de brindar servicios continuos que incluyen apoyo durante el tratamiento, ponerlo en contacto con servicios de ayuda financiera para ayudarle a pagar su medicamento, darle información por correo electrónico y acceso directo a nuestro centro de llamadas, donde podrá obtener las respuestas a sus preguntas sobre las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo).

Para obtener más asistencia con LONSURF:

- Llame al **1-844-TAIHO-4U (1-844-824-4648)** de lunes a viernes, de 8 A.M. a 8 P.M., hora del este
- Visite **TaihoPatientSupport.com**
- Vea el folleto de acceso para el paciente que puede obtener en **LONSURF.com/resources**

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.



© TAIHO ONCOLOGY, INC. 03/2020 Todos los derechos reservados. LON-PM-US-1353



Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets