



# RECURSOS Y APOYO

---

Para el recorrido de su tratamiento con  
**LONSURF®** (trifluridina/tipiracilo) [Lónserf] en comprimidos

---

LONSURF es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con

- cáncer colorrectal que se ha diseminado a otras partes del cuerpo y que han recibido tratamiento previo o no pueden recibir ciertos medicamentos quimioterapéuticos.
- un tipo de cáncer de estómago llamado cáncer gástrico, que incluye cáncer de la unión gastroesofágica, que se ha diseminado a otras partes del cuerpo y que han recibido tratamiento previo o no pueden recibir ciertos medicamentos quimioterapéuticos.

No se sabe si LONSURF es seguro y efectivo en los niños.

**Consulte la Información Importante Sobre La Seguridad en la contratapa y la Información Completa Para La Prescripción en el bolsillo.**

# PARA LOS PACIENTES QUE TOMAN LONSURF


Los siguientes recursos son solo algunas de las herramientas disponibles para asistirlo mientras esté tomando LONSURF® (trifluridine/tipiracilo) en comprimidos



- **Calendario de dosis:** le ayuda a llevar un registro de sus dosis, temperatura y los efectos secundarios que pueda sufrir. Su médico puede darle un calendario de tratamiento, o bien puede crearse un calendario personalizado en [LONSURF.com/mycalendar](https://lonsurf.com/mycalendar).



- **Kit de inicio de LONSURF:** el kit tiene la finalidad de ayudarle con su plan de tratamiento. Incluye elementos útiles, algunos de los cuales también puede descargar del sitio web. El kit incluye el Folleto para el paciente, el Folleto para el cuidador, un termómetro para que lleve un registro de su temperatura, y 2 pastilleros: uno para los días 1 a 5 y otro para los días 8 a 12, como ayuda para organizar su medicamento. Su médico puede darle un kit, o bien puede solicitar uno llamando al **1-844-TAIHO-4U** (1-844-824-4648) o visitando el enlace, abajo.



- **Folleto para el paciente:** Contiene información útil sobre la manera en que LONSURF trata el cáncer colorrectal y el cáncer gástrico / de la unión gastroesofágica, así como consejos para controlar los efectos secundarios y para obtener asistencia financiera. El folleto se incluye en el kit de inicio de LONSURF, o bien puede descargarlo en el enlace, abajo.

Para obtener más ayuda durante el recorrido de su tratamiento, visite [LONSURF.com/resources](https://lonsurf.com/resources)

## Información Importante Seleccionada Sobre La Seguridad

- **Recuentos bajos de células sanguíneas.** Es común tener recuentos bajos de células sanguíneas con LONSURF, que a veces pueden ser graves y potencialmente mortales. LONSURF puede causar una disminución de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Un recuento bajo de glóbulos blancos puede hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían causarle la muerte. Su médico debe hacerle un análisis de sangre antes de que reciba LONSURF, el día 15 durante el tratamiento con LONSURF y según sea necesario para llevar un control de sus recuentos de células sanguíneas. El médico puede reducirle la dosis de LONSURF o suspender el tratamiento con LONSURF si tiene recuentos bajos de glóbulos blancos o plaquetas.

# PARA LOS CUIDADORES DE QUIENES TOMAN LONSURF

El siguiente folleto se le brinda para que ayude a su ser querido que toma LONSURF



- **Folleto para el cuidador:** Le brinda información general sobre LONSURF y cómo se toma, consejos útiles que pueden ayudar a controlar efectos secundarios comunes, y estrategias para cuidar de sí mismo y de su ser querido. El folleto viene incluido en el kit de inicio de LONSURF, o también puede descargarlo del enlace, abajo.

Para obtener asistencia adicional, visite [LONSURF.com/caregivers](https://lonsurf.com/caregivers)

Los materiales proporcionados no reemplazan el consejo de su médico.

Siempre consulte a su médico si tiene preguntas o algo le preocupa, para que pueda crearle un plan de tratamiento personalizado basado en sus necesidades.



**Taiho Oncology Patient Support™** es su centro de recursos en línea y por teléfono para responder sus preguntas y atender sus necesidades relacionadas con la asistencia financiera, el reembolso y su tratamiento con los comprimidos de LONSURF.

Para obtener más información, visite [TaihoOncologyCopay.com](https://TaihoOncologyCopay.com).

Si no ha recibido su kit de inicio de LONSURF, llame al **1-844-TAIHO-4U** (1-844-824-4648).

Vea la Información Importante De Seguridad en la contratapa y la Información Completa Para La Prescripción en el bolsillo.

**Lonsurf®**  
(trifluridine and tipiracil) tablets

## Información Importante Sobre La Seguridad

### LONSURF puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- **Recuentos bajos de células sanguíneas.** Es común tener recuentos bajos de células sanguíneas con LONSURF, que a veces pueden ser graves y potencialmente mortales. LONSURF puede causar una disminución de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Un recuento bajo de glóbulos blancos puede hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían causarle la muerte. Su médico debe hacerle un análisis de sangre antes de que reciba LONSURF, el día 15 durante el tratamiento con LONSURF y según sea necesario para llevar un control de sus recuentos de células sanguíneas. El médico puede reducirle la dosis de LONSURF o suspender el tratamiento con LONSURF si tiene recuentos bajos de glóbulos blancos o plaquetas.

Avise al médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de infección durante el tratamiento con LONSURF: fiebre, escalofríos o dolores corporales.

### Antes de tomar LONSURF, díglele al médico todos los problemas de salud que tenga, incluso si:

- Tiene problemas de riñón o hígado
- Está embarazada o planea quedar embarazada. LONSURF puede dañar al feto.
- **Mujeres** que pueden quedar embarazadas: su médico comprobará si está embarazada antes de que usted inicie el tratamiento con LONSURF. Debe usar un anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis de LONSURF. Avise a su médico de inmediato si queda embarazada
- **Varones:** Durante el tratamiento y hasta 3 meses después de su última dosis de LONSURF debe usar un condón cada vez que tenga relaciones sexuales con una mujer que pueda quedar embarazada. Avise a su médico de inmediato si su pareja queda embarazada mientras usted toma LONSURF
- Está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si LONSURF pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LONSURF y hasta 1 día después de la última dosis de LONSURF

Dígale al médico todos los medicamentos de venta con o sin receta, vitaminas y suplementos de hierbas que usa.

Los efectos secundarios **más comunes** de LONSURF incluyen cansancio (fatiga, debilidad), náuseas, disminución del apetito, diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

Dígale al médico si tiene náuseas, vómitos o diarrea que es fuerte o que no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LONSURF. Para obtener más información, pregunte a un profesional de la salud. Llame al médico si necesita consejo médico sobre los efectos secundarios.

### Vea la Información Completa Para La Prescripción en el bolsillo.

LONSURF es una marca registrada de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., utilizada bajo licencia por Taiho Oncology, Inc.



© TAIHO ONCOLOGY, INC. 11/2020 Todos los derechos reservados. LON-PM-US-1439



**Lonsurf®**  
(trifluridine and tipiracil) tablets

