

PORQUE MI FUTURO, TODAVÍA NO ESTÁ ESCRITO

Ayude a su ser querido a continuar su historia con las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo)

LONSURF es un medicamento de venta con receta que se usa en el tratamiento de adultos con

- cáncer colorrectal que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, que han recibido tratamiento antes o que no pueden recibir ciertos agentes de quimioterapia.
- un tipo de cáncer de estómago llamado cáncer gástrico, incluido el cáncer de la unión gastroesofágica que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, que han recibido tratamiento antes o no pueden recibir ciertos agentes de quimioterapia.

No se sabe si LONSURF es seguro y efectivo en niños

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.



Lonsurf[®]
(trifluridine and tipiracil) tablets

INTRODUCCIÓN

Acerca de esta guía

Usted y su ser querido han pasado por muchas cosas: ciclos de tratamiento, efectos secundarios y una manera de vivir completamente nueva. Lo que es normal cambia constantemente, y también cambian las prioridades. Es importante aceptar todos estos cambios. También es importante que apoye la manera en que su ser querido elige transitar la próxima parte de su recorrido.

Este cuadernillo tiene la finalidad de ayudarle a entender:

- El tratamiento de su ser querido con las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo)
- Cómo ayudar a su ser querido con su plan de tratamiento
- Que también es importante que cuide de usted mismo

En el interior, encontrará información sobre:

- Dos cánceres distintos: cáncer de colon/rectal y cáncer de estómago
- El cáncer de su ser querido
- El cuidador
- Tratamiento con LONSURF (para quién es y cómo funciona)
- Cómo se toma LONSURF
- Efectos secundarios y cómo controlarlos

También encontrará respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre LONSURF, información importante de seguridad y lugares donde encontrar apoyo adicional.



El rol del cuidador

Un cuidador brinda más que atención al paciente. Un cuidador es muchas cosas:

- Un defensor del paciente
- Un amigo
- Un par de manos extra
- Una fuente de consuelo y una guía a lo largo del tratamiento

Aquí le comentamos algunas cosas que es posible que usted ya haga, pero que es bueno recordar sobre el papel del cuidador:

- Conocer y mantenerse informado sobre el plan y el esquema de tratamiento de su ser querido
- Organizar una lista de contactos de emergencia y una carpeta con recursos de salud importantes
- Saber cuáles son los límites de su ser querido
- Acompañar a su ser querido a las visitas de control. Es posible que la persona no entienda lo que dice el proveedor de atención médica. Escuche atentamente para poder explicarle después a su ser querido
- Ser sincero y claro

Escuchar a su ser querido es tan importante como hablarle. Tome en serio lo que dice. No tiene obligación de saber todas las respuestas, pero con solo escuchar puede ayudar a su ser querido a encontrar respuestas y a sentir que lo escuchan.

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

Cómo cuidar de usted mismo

Usted tiene un papel importante en el proceso de tratamiento de su ser querido, pero no está solo. Hay familiares, médicos, enfermeros, un equipo de atención médica y otros recursos para ayudarlos a usted y a su ser querido a atravesar este proceso.

Ser cuidador no es fácil. El cáncer tiene un gran impacto no solo en el paciente sino también en quienes lo rodean. Puede afectarlo emocional y físicamente. A veces, es fácil olvidarse de uno mismo. Su bienestar tiene un efecto directo en la calidad del cuidado que le brinda a su ser querido.

Es importante mantener el equilibrio en la vida. Busque un momento en el día para relajarse y cuidar de usted mismo. Tómese algo de tiempo para participar en cosas que disfruta. Planee tiempo para:

- Salud mental: Tome un café con un amigo o salga a cenar con su cónyuge o pareja; mire una película, lea un libro o escuche música
- Salud física: Haga ejercicio con regularidad, salga a caminar, estírese, haga yoga, continúe con cualquier deporte o club en el que participe. Recuerde que unos pocos minutos cada día pueden hacer una diferencia
- Salud emocional/espiritual: Considere hacer meditación, mantenerse en contacto con su comunidad religiosa y/o sus redes de apoyo social, y procure apreciar las cosas buenas y las personas que hay en su vida



Consiga la ayuda que necesita

No tiene que hacerse responsable usted mismo de todo el cuidado del paciente. No tema pedir ayuda. Forme una red de apoyo. Podrían ser familiares o amigos. Planee un calendario de actividades para la semana y compártalo con sus familiares y amigos para que puedan ayudar. El médico, los enfermeros y el personal del consultorio pueden ayudarle a encontrar un psicoterapeuta, un grupo de apoyo u otras formas de apoyo.

Resumen de la información importante sobre la seguridad

- **Conteos bajos de células sanguíneas.** Es común tener los conteos de células sanguíneas bajos con LONSURF, y a veces pueden estar muy bajos y poner en peligro la vida. LONSURF puede hacer que bajen los conteos de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los conteos bajos de glóbulos blancos pueden hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían causar la muerte. Su proveedor de atención médica debe hacerle análisis de sangre antes de que comience a tomar LONSURF, a los 15 días de iniciado el tratamiento y según sea necesario para vigilar sus conteos de células sanguíneas. Su proveedor de atención médica puede reducir su dosis de LONSURF o suspenderlo por completo si sus conteos de glóbulos blancos o plaquetas están bajos

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridina and tipiracil) tablets

ACERCA DEL CÁNCER DE COLON O RECTAL

Acercas del cáncer de colon o rectal metastásico (mCRC)

- Es el tercer cáncer más frecuente, tanto en hombres como en mujeres
- En EE.UU., a aproximadamente 1 de cada 22 hombres y 1 de cada 24 mujeres se les diagnosticará cáncer de colon o rectal a lo largo de su vida
- En el 2017, se proyectó que el número aproximado de personas con diagnóstico de cáncer de colon o rectal en Estados Unidos sería:
 - 71.400 hombres
 - 64.000 mujeres
- En conjunto, el cáncer de colon y el rectal constituyen la tercera causa de muerte relacionada con el cáncer tanto en hombres como en mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, las tasas de muerte han ido disminuyendo, especialmente en los últimos 10 años. Estas disminuciones se cree que se deben, en parte, a:
 - Un aumento de los exámenes de detección
 - Mejores tratamientos

Metastásico significa que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Las marcas comerciales, registradas o no, son propiedad de sus respectivos dueños.



Manténgase informado y consiga apoyo

Las siguientes organizaciones pueden brindarle recursos para el cáncer de colon o rectal metastásico, defensoría, una comunidad y apoyo:

CancerCare®

Visite cancercares.org o llame al 1-800-813-HOPE (4673)

Cancer Support Community®

Visite cancersupportcommunity.org o llame al 1-888-793-9355

Colontown®

Visite colontown.org o llame al 1-410-881-3160

Colorectal Cancer Alliance

Visite ccalliance.org o llame al 1-877-422-2030

Fight Colorectal Cancer®

Visite fightcolorectalcancer.org o llame al 1-877-427-2111

The Raymond Foundation

Visite TheRaymondFoundation.org o llame al 1-646-598-2001

Resumen de la información importante sobre la seguridad

Avise a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de infección durante el tratamiento con LONSURF: fiebre, escalofríos o dolores corporales.

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

Acerca del cáncer de estómago metastásico

- El cáncer de estómago metastásico no es tan común como otros cánceres
- En 2016, hubo unas 113.054 personas con cáncer de estómago en Estados Unidos
- En el 2019:
 - Aproximadamente 27.510 personas recibieron un diagnóstico de cáncer de estómago
 - El cáncer de estómago constituyó el 1,6% de todos los nuevos casos de cáncer en Estados Unidos
- A aproximadamente el 0.9% de los hombres y las mujeres se les diagnosticará cáncer de estómago en algún momento de su vida
- El cáncer de la unión gastroesofágica, un tipo de cáncer de estómago, es el diagnóstico de cáncer que más rápido está aumentando

Metastásico significa que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Al cáncer de estómago a veces se le llama cáncer gástrico.

- Es posible que su proveedor de atención médica le haya dicho que su ser querido tiene cáncer en la unión gastroesofágica, que es un tipo de cáncer de estómago ubicado en la parte inferior del esófago que se conecta con el estómago

Las marcas comerciales, registradas o no, son propiedad de sus respectivos dueños.



Manténgase informado y consiga apoyo

Las siguientes organizaciones pueden brindarle recursos para el cáncer de estómago metastásico, defensoría, una comunidad y apoyo:

CancerCare®

Visite cancercares.org o llame al 1-800-813-HOPE (4673)

Cancer Support Community®

Visite cancersupportcommunity.org o llame al 1-888-793-9355

Debbie's Dream Foundation

Visite debbiesdream.org o llame al 1-855-475-1200

Gastric Cancer Foundation

Visite gastriccancer.org

Hope for Stomach Cancer

Visite stocan.org o llame al 1-424-239-9943

No Stomach For Cancer®

Visite nostomachforcancer.org o llame al 1-608-692-5141

The Raymond Foundation

Visite TheRaymondFoundation.org o llame al 1-646-598-2001

Resumen de la información importante sobre la seguridad

Antes de usar LONSURF, díglele a su proveedor de atención médica todas las enfermedades que padece, incluso si:

- Tiene problemas de riñón o de hígado
- Está embarazada o planea quedarse embarazada. LONSURF puede afectar al feto.

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

El tratamiento con LONSURF

Las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo), un medicamento de venta solo con receta, es para personas:

- Cuyo cáncer de colon/rectal se ha diseminado a otras partes del cuerpo
- Quienes han recibido anteriormente o no pueden recibir ciertos medicamentos quimioterápicos
- Quienes pueden necesitar otra opción ahora

LONSURF ha sido aprobado para ayudar a algunos pacientes con cáncer a vivir más tiempo. LONSURF consta de 2 medicamentos en 1:

- Uno (tipiracilo) ayuda a que el otro (trifluridina) continúe actuando y funcione correctamente, impidiendo que las células se reproduzcan. Esto puede ayudar a parar el crecimiento de los tumores

LONSURF fue estudiado en un ensayo clínico de 800 pacientes con **cáncer de colon o rectal** que se había diseminado a otras partes del cuerpo y que se había tratado antes con ciertos medicamentos quimioterápicos.

- La mitad de los pacientes tratados con LONSURF continuaban con vida después de 7.1 meses y la mitad de los pacientes que recibieron placebo continuaban con vida después de 5.3 meses
- En el 88% de los pacientes tratados con LONSURF y el 94% de los pacientes que recibieron placebo se produjo un agravamiento de la enfermedad o la muerte

LONSURF fue estudiado en un ensayo clínico de 507 pacientes con **cáncer de estómago** que se había diseminado a otras partes del cuerpo y que se había tratado antes con ciertos medicamentos quimioterápicos.

- La mitad de los pacientes tratados con LONSURF continuaban con vida después de 5.7 meses y la mitad de los pacientes que recibieron placebo continuaban con vida después de 3.6 meses
- En el 85% de los pacientes tratados con LONSURF y el 92% de los pacientes que recibieron placebo se produjo un agravamiento de la enfermedad o la muerte

Cómo se toma LONSURF

LONSURF es una pastilla oral en dos concentraciones: 15 mg y 20 mg.* El profesional de atención médica podría recetar ambas como dosis de tratamiento para su ser querido.



Comprimido de 15 mg



Comprimido de 20 mg

Las pastillas se muestran en su tamaño natural.

Contribuya a asegurarse de que su ser querido toma LONSURF:

- Dos veces al día con alimentos
- Con cualquier tipo de comida

*La concentración de las pastillas LONSURF se basa en el componente activo del medicamento. Los tamaños de los comprimidos son: 7 mm la dosis de 15 mg y 8 mm la dosis de 20 mg.

Resumen de la información importante sobre la seguridad

- **Mujeres** en condiciones de quedar embarazadas: Su proveedor de atención médica verificará que no esté embarazada antes de que comience el tratamiento con LONSURF. Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis de LONSURF. Avísele a su proveedor de atención médica de inmediato si se queda embarazada
- **Hombres**, Deberá usar un condón cada vez que tenga relaciones sexuales durante el tratamiento y hasta 3 meses después de la última dosis de LONSURF si su pareja es una mujer en condiciones de quedar embarazada. Avísele de inmediato a su proveedor de atención médica si su compañera se queda embarazada mientras usted está tomando LONSURF
- Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si LONSURF pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LONSURF hasta 1 día después de su última dosis de LONSURF

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

Así es el esquema de administración de la dosis de LONSURF durante 28 días

1.ra dosis

Primera dosis diaria

2.da dosis

Segunda dosis diaria

El esquema de administración de las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) es de 5 días a la semana con 2 días de descanso durante 2 semanas, luego se interrumpe el tratamiento durante 2 semanas (14 días). El ciclo puede repetirse. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones del proveedor de atención médica.

Use el calendario digital que encontrará en LONSURF.com/mycalendar para llevar un registro del tratamiento de su ser querido. Su proveedor de atención médica puede darle también un calendario de tratamiento.



Otras cosas a tener en cuenta sobre el tratamiento con LONSURF

- Guarde las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C)
- No guarde LONSURF con otros medicamentos. Mantenga las pastillas LONSURF en su envase
- Si guarda las pastillas LONSURF fuera del envase original, las pastillas no utilizadas deben tirarse pasados 30 días
- Asegúrese de usar guantes al manipular LONSURF
- Lávese las manos después de manipular LONSURF. Aunque se presente en forma de pastillas, sigue siendo quimioterapia
- Tenga en cuenta que hay un sobrecito dentro del frasco que sirve para absorber la humedad. No deje que la persona bajo su cuidado trague ese material
- Mantenga LONSURF fuera del alcance de los niños

Póngase en contacto con el proveedor de atención médica de su ser querido si:

- Si su ser querido omite una dosis de LONSURF, no debe tomar la dosis omitida. En su lugar, pregunte al proveedor de atención médica qué debe hacer
- Si por algún motivo a su ser querido le sobraron pastillas, pregunte a un proveedor de atención médica o farmacéutico cómo eliminarlas de la manera correcta

Resumen de la información importante sobre la seguridad

Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas que toma.

Los **efectos secundarios más comunes** de LONSURF incluyen cansancio (fatiga, debilidad), náuseas, disminución del apetito, diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 y 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.



Efectos secundarios

Es importante que sepa qué esperar para que pueda reconocer los efectos secundarios de inmediato y hablar con el proveedor de atención médica. Hay cosas que puede hacer para ayudar a su ser querido a controlarlos, mientras el equipo de tratamiento monitorea sus síntomas.

Su proveedor de atención médica debe controlar los conteos de células sanguíneas de su ser querido antes de que reciba tabletas de LONSURF® (trifluridine/tipiracil), 15 días después de iniciado el tratamiento y según sea necesario.

- Es común tener los conteos de células sanguíneas bajos con LONSURF, y a veces pueden estar muy bajos y poner en peligro la vida. LONSURF puede hacer que bajen los conteos de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los conteos bajos de glóbulos blancos pueden hacer que su ser querido tenga más probabilidades de contraer infecciones graves que podrían causar la muerte. El proveedor de atención médica puede reducir la dosis de LONSURF o suspenderlo por completo si su ser querido tiene conteos bajos de glóbulos blancos o plaquetas
- Avise al proveedor de atención médica de inmediato si su ser querido presenta algún signo de infección como fiebre, escalofríos o dolores corporales

La fiebre suele ser el primer signo de infección en las personas con cáncer. Puede usar el termómetro incluido en el kit inicial para tomarle la temperatura a su ser querido todos los días.

Esté atento a la aparición de otros signos de infección, como:

- Escalofríos o sudores
- Tos o falta de aliento
- Dolor de garganta
- Ardor o dolor al orinar



Cosas que se pueden hacer para evitar las infecciones:

- Lavarse las manos con frecuencia
- Seguir una dieta equilibrada
- Mantenerse hidratado
- Limpiar los cortes y raspones en la piel
- Limpiar el ano con toallitas de papel húmedas o pañitos para bebés después de las deposiciones intestinales
- Dormir lo suficiente

Efectos secundarios más comunes

Casi todos los pacientes tratados con LONSURF sufren efectos secundarios en algún momento.

Los efectos secundarios más comunes de LONSURF incluyen:

- Cansancio (fatiga/debilidad)
- Náuseas
- Vómitos
- Disminución del apetito
- Diarrea
- Dolor abdominal
- Fiebre



Dígale al proveedor de atención médica de su ser querido si la persona tiene náuseas, vómitos o diarrea fuerte o que no desaparece. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LONSURF.

También puede llamar a la línea telefónica abierta 24/7 de Taiho Oncology si tiene preguntas sobre los efectos secundarios de LONSURF al **1-844-US-TAIHO (1-844-878-2446)**. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al **1-800-FDA-1088**.

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

Consejos para controlar los efectos secundarios

El proveedor de atención médica puede ayudarle a controlar algunos de los efectos secundarios de las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo). Estas medidas podrían incluir ajustar el plan de tratamiento de su ser querido, ya sea cambiando la dosis o suspendiendo el tratamiento.

La siguiente información también podría ayudarle a usted o a su ser querido a controlar algunos de los efectos secundarios de LONSURF mientras se encuentre bajo la supervisión de un proveedor de tratamiento.

Esta información no pretende reemplazar las recomendaciones del proveedor de atención médica de su ser querido. Siempre coménteles los efectos secundarios. Si su ser querido tiene cáncer de estómago, pregunte al proveedor de atención médica si hay necesidades alimentarias especiales debidas a la enfermedad antes de tratar cualquier efecto sobre el apetito.



Cansancio (fatiga/debilidad)

Ayude a su ser querido a:

- Fijarse objetivos razonables cada día y no le permita que los sobrepase
- Priorizar las tareas importantes sobre las menos importantes. Planee tiempo para que el paciente descanse o duerma una siesta (de menos de una hora). Si las siestas son breves, el paciente podrá dormir mejor por la noche
- Mantenerse activo. Pregunte a un proveedor de atención qué ejercicios pueden ser benéficos, como salir a caminar 15 minutos, hacer yoga o bicicleta fija
- Dormir al menos 8 horas cada noche
- Establecer una rutina a la hora de acostarse. Tomar un baño o escuchar música relajante antes de ir a la cama puede ayudar

Náuseas y vómitos

Recuerde a su ser querido que debe de:

- Consumir 5 o 6 comidas pequeñas al día, en lugar de 3 grandes (esto no cambia el esquema de administración del tratamiento)
- Consumir alimentos y bebidas tibios en vez de calientes o fríos
- Evitar ciertos alimentos. No debe comer alimentos grasosos, fritos, dulces o picantes si después de comerlos tiene náuseas
- Tomar el medicamento que le recete el proveedor de atención médica para aliviar las náuseas
- Elija, junto con el paciente, alimentos que sean fáciles de digerir, como galletas saladas (crackers)

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets

Disminución del apetito

Recuerde a su ser querido que debe de:

- Consumir 5 o 6 comidas pequeñas al día, en lugar de 3 grandes (esto no cambia el esquema de administración del tratamiento)
- Beber licuados (batidos) a base de leche o frutas, jugos o sopa en lugar de alimentos sólidos
- Elegir alimentos con muchas calorías y/o proteínas
- Mantenerse activo. Pregunte a un proveedor de atención médica qué ejercicios pueden ser benéficos, como salir a caminar 15 minutos
- Planificar algunas comidas con amigos y seres queridos
- Preguntar al proveedor de atención médica qué aderezos o especias pueden ayudar a que algunos alimentos sepan mejor
- Tomar nota de cuánto come y bebe cada día
- Si su ser querido tiene cáncer de estómago, pregunte al proveedor de atención médica si hay necesidades alimentarias especiales debidas a su enfermedad



Diarrea / dolor abdominal

Para la diarrea, recomiende a su ser querido que debe de:

- Consumir 5 o 6 comidas pequeñas al día, en lugar de 3 grandes (esto no cambia el esquema de administración del tratamiento)
- Consumir alimentos con bajo contenido de fibra. Los alimentos con alto contenido de fibra pueden empeorar la diarrea. Algunos alimentos con bajo contenido de fibra son plátanos, arroz blanco, pan blanco tostado y yogur natural o de vainilla
- Comer alimentos suaves en lugar de grasosos, fritos, dulces o picantes
- Evitar los lácteos como leche, queso y crema agria
- Evitar el alcohol y la cafeína
- Beber abundantes líquidos para reponer los líquidos que pierde
- Usar agua tibia y una toallita si la zona anal está lastimada, y mantenerla seca. También, pregunte al proveedor de atención médica qué cremas pueden ayudar
- Tomar todos los medicamentos que le recete el proveedor de atención médica para aliviar la diarrea

Para el dolor abdominal, recomiende a su ser querido que debe de:

- Consumir abundantes alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras
- Evitar los alimentos que produzcan gases
- Hacer ejercicio con regularidad

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Fiebre

Recuerde a su ser querido que debe de:

- Beber abundantes líquidos, como agua, jugo y caldo, porque la fiebre puede hacer que pierda líquido y se deshidrate
- Descansar
- Mantenerse fresco vistiendo ropa liviana y durmiendo con una sábana solamente
- **Llame a un proveedor de atención médica de inmediato** si la persona bajo su cuidado tiene fiebre u otro signo de infección, como escalofríos o dolores corporales. Puede usar el termómetro incluido en el kit inicial para tomarle la temperatura todos los días

Dígale al proveedor de atención médica de su ser querido cuando la persona tenga náuseas, vómitos o diarrea fuerte o que no desaparece.

Usted o su ser querido pueden usar el Calendario de Tratamiento digital de LONSURF que encontrará en **LONSURF.com/mycalendar** para llevar un registro de los efectos secundarios y comentárselos al proveedor de atención médica en la siguiente cita.



Resumen de la información importante sobre la seguridad

Dígale al médico si tiene náuseas, vómitos o diarrea fuerte o que no desaparece.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LONSURF. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica. Llame a su médico para que le dé consejos sobre cómo enfrentar los efectos secundarios.

Consulte la información importante de seguridad adicional en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

Lonsurf[®]
(trifluridine and tipiracil) tablets

Información importante sobre la seguridad

Las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) pueden causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- **Conteos bajos de células sanguíneas.** Es común tener los conteos de células sanguíneas bajos con LONSURF, y a veces pueden estar muy bajos y poner en peligro la vida. LONSURF puede hacer que bajen los conteos de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Los conteos bajos de glóbulos blancos pueden hacerlo más propenso a contraer infecciones graves que podrían causar la muerte. Su proveedor de atención médica debe hacerle análisis de sangre antes de que comience a tomar LONSURF, a los 15 días de iniciado el tratamiento y según sea necesario para vigilar sus cifras de células sanguíneas. Su proveedor de atención médica puede reducir su dosis de LONSURF o suspenderlo por completo si sus conteos de glóbulos blancos o plaquetas están bajos

Avise a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de infección durante el tratamiento con LONSURF: fiebre, escalofríos y dolores corporales.

Antes de usar LONSURF, dígame a su proveedor de atención médica todas las enfermedades que padece, incluso si:

- Tiene problemas de riñón o de hígado
- Está embarazada o planea quedarse embarazada. LONSURF puede afectar al feto.
- **Mujeres** en condiciones de quedar embarazadas: Su proveedor de atención médica verificará que no esté embarazada antes de que comience el tratamiento con LONSURF. Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis de LONSURF. Avísele a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada

- **Hombres,** Deberá usar un condón cada vez que tenga relaciones sexuales durante el tratamiento y hasta 3 meses después de la última dosis de LONSURF si su pareja es una mujer en condiciones de quedar embarazada. Avísele de inmediato a su proveedor de atención médica si su compañera se queda embarazada mientras usted está tomando LONSURF
- Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si LONSURF pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LONSURF hasta 1 día después de su última dosis de LONSURF

Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas que toma.

Los **efectos secundarios más comunes** de LONSURF incluyen cansancio (fatiga, debilidad), náuseas, disminución del apetito, diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre.

Dígale al médico si tiene náuseas, vómitos o diarrea fuerte o que no desaparece.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LONSURF. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica. Llame a su médico para que le dé consejos sobre cómo enfrentar los efectos secundarios.

Esta información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (U.S. Food and Drug Administration)
Fecha de emisión: 02/2019

Preguntas frecuentes

¿Cómo actúan las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo) contra el cáncer de colon/rectal y el cáncer de estómago?

LONSURF es una quimioterapia oral que contiene dos medicamentos en uno. Interfiere en la replicación celular durante el ciclo de vida de las células.

- Un componente ayuda al otro a continuar activo y a funcionar correctamente
- El otro componente impide que las células se reproduzcan. Esto puede ayudar a evitar que los tumores crezcan

¿Qué hago si mi ser querido o yo tenemos una pregunta sobre LONSURF y el consultorio del proveedor de atención médica está cerrado?

Llame a nuestro centro de llamadas con atención las 24 horas donde podrán responderles sus preguntas sobre LONSURF, al **1-844-US-TAIHO** (1-844-878-2446), o visite **LONSURF.com/caregivers**.

¿Dónde puedo obtener ayuda para saber qué costos asociados habrá con LONSURF y averiguar opciones sobre ayuda financiera?

El programa de Asistencia al Paciente de Taiho Oncology ofrece:

- Ayuda para entender la cobertura del seguro de su ser querido y qué costos deberá pagar
- Asistencia con los copagos en **TaihoOncologyCopay.com**
- Ayuda financiera para pacientes sin seguro que cumplan los requisitos

Para obtener más información sobre el programa de Asistencia para el Paciente de Taiho Oncology:

- Llame al **1-844-TAIHO-4U** (1-844-824-4648) de lunes a viernes, de 8 A.M a 8 P.M., hora del este
- Visite **TaihoPatientSupport.com**
- Vea el folleto de acceso para el paciente que puede obtener en **LONSURF.com/resources**



NOTAS

Puede usar estas hojas para escribir las preguntas que quiera hacerle al proveedor de atención médica, tomar notas durante las citas o anotar cualquier otra cosa que quiera recordar. Es conveniente que incluya la fecha junto a cada anotación.









Taiho Oncology tiene el compromiso de brindar servicios continuos que incluyen apoyo durante el tratamiento, ponerlo en contacto con servicios de ayuda financiera para ayudarlo a pagar el medicamento de su ser querido, darle información por correo electrónico y acceso directo a nuestro centro de llamadas, donde podrá obtener las respuestas a sus preguntas sobre las pastillas LONSURF® (trifluridina/tipiracilo).

Para obtener más asistencia con LONSURF:

- Llame al **1-844-TAIHO-4U** (1-844-824-4648) de lunes a viernes, de 8 A.M. a 8 P.M., hora del este
- Visite **TaihoPatientSupport.com**
- Vea el folleto de acceso para el paciente que puede obtener en **LONSURF.com/resources**

Consulte la información importante de seguridad en las páginas 22 a 23, y la información completa de uso incluida en la solapa.

LONSURF es una marca registrada de Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., que Taiho Oncology, Inc. utiliza bajo licencia.



© TAIHO ONCOLOGY, INC. 03/2020 Todos los derechos reservados. LON-PM-US-1354



Lonsurf®
(trifluridine and tipiracil) tablets