برنامه حرفه‌ای رشد سرشانه

دلتوئید سه‌بخشی · بلوک ۸ هفته‌ای · سطح متوسط · باشگاه کامل · ۱۰ RIR تا ۲

۱ روز اختصاصی + دوز دوم | حدود ۲۶ ست مستقیم در هفته | ۵۰ تا ۶۰ دقیقه | دیلود در هفته ۴ و ۸

۱. اصولی که موتور رشد شانه‌اند

اگر سرشانه با وجود تمرین زیاد رشد نمی‌کند، تقریباً همیشه یکی از این شش مورد خراب است، نه ژن.

بخش میانی، ماشین عرض شانه

و پهن نشان می‌دهد بخش جانبی است.
چیزی که شانه را گرد

یعنی نشر از پهلو، مستقیم بار می‌گیرد.
این بخش فقط با ابداکشن،

بخش خلفی، نقطه کور

نادیده می‌گیرند و شانه جلو افتاده می‌شود.
بیشتر افراد آن را

پشت شانه کمتر از جلوی شانه نیست.
در این برنامه حجم

بخش قدامی، تقریباً مفت

سینه و سرشانه جلوی دلتوئید را پر می‌کند.
هر پرس

فقط یک حرکت پرس سنگین کافی است.
پس

ست مؤثر، پنج تکرار آخر

رشد، تکرارهای نزدیک به ناتوانی است.
محرک

در آخرین ست هر حرکت RIR صفر تا یک.
هدف: RIR یک تا دو و

اضافه‌بار پیشرونده

بدن دلیلی برای ساختن عضله ندارد.
بدون پیشروی،

اول تکرار را زیاد کن، بعد وزنه را ۲.۵ درصد.
روش:

تنش در دامنه کشیده

در وضعیت کشیده محرک قوی‌تری است.
بارگذاری عضله

جانبی یعنی دست از عقب بدن شروع کند.
در نشر

۲. آناتومی: دقیقاً چه چیزی را بزرگ می‌کنیم؟

بخش	وظیفه اصلی	ست مستقیم در هفته
میانی (جانبی)	ابداکشن، عرض شانه و نمای V شکل	۱۰ تا ۱۴
خلفی (پشتی)	اکستنشن و چرخش خارجی، تعادل و ضخامت	۸ تا ۱۲
قدامی (جلویی)	فلکسن، بیشتر از پرس‌ها غیرمستقیم	۰ تا ۴



تقسیم حجم یکسان روی ۲ جلسه نتایجی کمی بهتر از ۱ جلسه می‌دهد؛ به همین دلیل روز اختصاصی سرشانه با یک دوز دوم سبک همراه شده است. پژوهش‌ها به‌طور کلی نشان می‌دهند

نکته تناوب

یا فقط همان یک روز اختصاصی را انجام بده و رشد بگیر؛ دوز دوم بازده را بالاتر و خستگی هر جلسه را کمتر می‌کند.

۳. گرم‌کردن اختصاصی شانه، ۱۰ دقیقه، غیرقابل مذاکره

با سابقه تق‌تق و درد خفیف، این بخش بیشترین اثر را روی بدون درد ماندن و کیفیت جلسه دارد.

#	حرکت	حجم	هدف
۱	دوچرخه یا تردمیل سبک	۳ تا ۵ دقیقه	افزایش دمای عمومی بدن
۲	کشش کش از جلو (Band Pull-apart)	۲۰ × ۲	فعال‌سازی پشت شانه و بین‌کتفی
۳	چرخش خارجی با کش	۱۵ × ۲ هر دست	گرم‌کردن روتاتور کاف
۴	روی میز شیب‌دار Y-T-W	۱۰ × ۲ هر حرف	پایین‌تراپز و کنترل تیغه شانه
۵	اسلاید دیوار و کشش سراتوس	۱۰ × ۲	سراتوس و چرخش بالایی کتف
۶	دو ست سبک از حرکت اول	۵۰٪ و ۷۰٪ وزنه کار	آماده‌سازی اختصاصی پرس

قانون گرم‌کردن مؤثر

گرم‌کردن باید خود حرکت را شبیه‌سازی کند، نه اینکه خسته‌ات کند. ست سبک را هرگز تا نزدیک ناتوانی نزن.

۴. جلسه اختصاصی سرشانه — Session A

نیست: از سنگین به سبک، از چندمفصلی به تک‌مفصلی و در انتها کار سلامت شانه. کل ست کاری: ۲۰ ست به‌همراه ۲ ست سلامت شانه. ترتیب حرکات تصادفی

A1 پرس سرشانه دمبل نشسته با پشتی ۸۰ تا ۸۵ درجه

۴ ست · ۶ تا ۱۰ تکرار · ۲ تا ۱ RIR · استراحت ۲ تا ۳ دقیقه · قدامی + میانی

دمبل را با گریپ خنثی یا ۴۵ درجه نگه دار و آرنج را حدود ۳۰ درجه جلوتر از تنه بیاور. پرس را در دامنه‌ای تمام کن که بدون درد است. پشتی را روی ۸۰ تا ۸۵ درجه بگذار؛ کاملاً صاف فشار شانه را زیاد می‌کند.

جایگزین شانه‌دوست: پرس دستگاه با گریپ خنثی یا پرس لندماین که مسیرش برای شانه حساس مهربان‌تر است.

A2 نشر جانبی کابل تک‌دست از پشت بدن

۴ ست · ۱۲ تا ۱۸ تکرار · ۱ RIR · استراحت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه · میانی

بده تا دست عقب‌تر از بدن شروع کند. آرنج ۱۰ تا ۲۰ درجه خم و ثابت، حرکت فقط از مفصل شانه، تنه بدون تاب. فاز منفی ۲ تا ۳ ثانیه. قرقره در پایین‌ترین حالت، دست مقابل کابل بایست و کابل را از پشت بدن عبور

A3 نشر جانبی دستگاه یا دمبل خم‌شده (Lean-away)

۳ ست · ۱۲ تا ۱۵ تکرار · ۱ تا ۰ RIR · استراحت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه · میانی

استراحت ادامه بده. اگر بدون درد بود، چند تکرار پارشال در نیمه کشیده اضافه کن؛ این ناحیه محرک قوی‌تری برای بخش میانی است. ست آخر را با دراپ‌ست یا رست‌پاز تمام کن: وزنه را ۲۵ تا ۳۰ درصد کم کن و بدون

A4 فیس‌پول با طناب روی کابل

۳ ست | ۱۵ تا ۲۰ تکرار | تا ۲ RIR ۱ | استراحت ۶۰ ثانیه | خلفی + پایین‌تراپز

از مچ، و در انتها یک چرخش خارجی کوچک اضافه کن. تیغه‌های شانه را عقب و پایین ببر و شانه را بالا نکش. وزنه سبک و کیفیت بالا. قرقره در ارتفاع صورت. طناب را به سمت پیشانی بکش، آرنج بالاتر

A5 نشر خم (پشت شانه) با دستگاه یا کابل

۳ ست | ۱۲ تا ۲۰ تکرار | RIR ۱ | استراحت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه | خلفی

بدن. آرنج کمی خم و ثابت. حرکت را با کشیدن آرنج انجام بده، نه با فشار کف دست. در نقطه اوج یک توقف یک‌ثانیه‌ای داشته باش. سینه و پیشانی روی پد، گردن در راستای

A6 نشر Y روی میز شیب‌دار یا با کابل

۳ ست | ۱۲ تا ۱۵ تکرار | RIR ۱ | استراحت ۶۰ ثانیه | خلفی + پایین‌تراپز

خنثی، همان الگویی که برای تقویت کتف و روتاتور کاف استفاده می‌شود. از ۱ تا ۲ کیلو شروع کن؛ اینجا کیفیت کامل مهم است، نه وزنه. شانه‌دوست‌ترین حرکت این برنامه: مسیر ۴۵ درجه بالای سر با گریپ

A7 چرخش خارجی کابل (فینیشر سلامت شانه)

۲ ست | ۱۵ تکرار هر دست | سبک، بدون ناتوانی | استراحت ۴۵ تا ۶۰ ثانیه | روتاتور کاف

بیرون بچرخان و کنترل‌شده برگردان. این حرکت برای رشد دلتوئید نیست؛ برای این است که جلسه بعد هم بتوانی بدون درد پرس کنی. آرنج ۹۰ درجه و چسبیده به پهلو، ساعد را به

چطور ست را دقیق بزنم؟

تمپو: ۱ ثانیه بالا، ۱ ثانیه توقف در اوج، ۲ تا ۳ ثانیه پایین.

دامنه: کامل تا جایی که بدون درد ممکن است؛ نیمه‌کاره هیچ‌وقت.

تنفس: دم در فاز منفی و بازدم در فاز مثبت.

بین ست‌ها تایمر بگذار؛ کوتاه‌کردن خودسرانه استراحت وزنه را پایین می‌آورد و از حجم کم می‌کند.

۵. دوز دوم هفتگی — کلید رشد سریع‌تر

این دو حرکت را در انتهای روز پرس یا پشت اضافه کن: ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از جلسه اختصاصی.

حرکت	ست × تکرار	شدت	کجا بچینی
نشر جانبی کابل تک‌دست یا دستگاه	۳ × ۱۲ تا ۲۰	RIR ۱	انتهای روز پرس سینه
نشر خم کابل	۲ تا ۳ × ۱۵ تا ۲۰	RIR ۱ تا ۲	انتهای روز پرس یا روز پشت

۵ تا ۶ ست در دوز دوم | ۲ بار در هفته هر بخش | فاصله ۴۸ تا ۷۲ ساعت

۶. نقشه ۸ هفته‌ای پیشروی

هفته	حجم	شدت	تمرکز جلسه
هفته ۱	۹۰٪	RIR ۳	یادگیری تکنیک و ثبت وزنه پایه
هفته ۲	۱۰۰٪	RIR ۲ تا ۳	یک تکرار بیشتر در هر ست نسبت به هفته ۱
هفته ۳	۱۰۰٪	RIR ۱ تا ۲	سنگین‌ترین هفته بلوک اول، آخرین ست RIR صفر
هفته ۴	۵۰ تا ۶۰٪	RIR ۴	دیلود: وزنه را نگه دار، نصف ست‌ها
هفته ۵	۱۰۰٪ +	RIR ۱ تا ۲	شروع بلوک شدت: دراپ‌ست یا رست‌پاز در ست آخر
هفته ۶	۱۰۵٪	RIR ۱	اضافه‌کردن تکرار پارشال در حرکت A3
هفته ۷	۱۰۵ تا ۱۱۰٪	RIR ۰ تا ۱	هفته رکورد: عبور از وزنه هفته ۳
هفته ۸	۵۰٪	RIR ۴ تا ۵	دیلود، اندازه‌گیری و عکس، شروع بلوک بعد

قانون پیشروی دوگانه

گام ۱: در بازه تکرار بمان و هر جلسه یک تکرار اضافه کن تا به سقف بازه برسی.

گام ۲: وقتی در همه ست‌ها به سقف رسیدی، وزنه را ۲.۵ درصد زیاد کن و تکرار را از کف بازه شروع کن.

گام ۳: این چرخه را تکرار کن. معیار واقعی پیشرفت همین است، نه سوزش یا کوفتگی.

اگر پیشروی متوقف شد: خواب و کالری را چک کن، یک هفته دیلود بزن، ترتیب حرکات را عوض کن تا حرکت ضعیف اول بیاید.

۷. شانه‌ای که تق‌تق می‌دهد — پروتکل مراقبت

درد معمولاً بی‌خطر است و در بیشتر افراد هم وجود دارد. مسئله وقتی شروع می‌شود که تق‌تق همراه درد، ضعف یا محدودشدن دامنه باشد.

تق‌تق بدون

بکن

- گرم‌کردن کامل قبل از هر جلسه، بدون استثنا.
- نسبت کشش به پرس در هفته حداقل یک به یک، بهتر دو به یک.
- تقویت روتاتور کاف دو تا سه بار در هفته، سبک و پرتکرار.
- تمرین در دامنه بدون درد و سخت‌کردن عضله در همان دامنه.
- پرس با گریپ خنثی یا دمبل که مسیر آزادتری دارد.
- تحرک قفسه سینه: فوم‌رول و کشش درگاه.
- خواب به پشت یا پهلو با بالش کوتاه، دست زیر سر نگذار.

نکن

- پرس از پشت گردن در هر شرایطی.
- زیربغل سیم‌کش با گریپ بسته و آرنج بالاتر از شانه.
- بالا بردن وزنه از سطح شانه همراه با درد.
- دیپ و شنا با عمق بیش از حد.
- اصرار روی پرس سنگین در روزی که درد داری.
- بازکردن اجباری شانه برای صدا دادن.
- تمرین روزانه سرشانه؛ این عضله به ۴۸ ساعت فاصله نیاز دارد.

کِی باید به فیزیوتراپیست یا پزشک مراجعه کنی؟

دست؛ کاهش واضح دامنه حرکت؛ درد پس از یک ضربه یا کشیدگی ناگهانی. در این موارد تمرین را متوقف کن و ارزیابی تخصصی بگیر.
درد شبانه یا دردی که خوابت را می‌برد؛ ضعف ناگهانی در بلند کردن

۸. تغذیه و ریکاوری

شاخص	مقدار	توضیح
مازاد کالری	۱۰ تا ۱۵ درصد	حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ کیلوکالری بالای نیاز روزانه
پروتئین	۱.۶ تا ۲.۲ گرم بر کیلوگرم	در ۳ تا ۵ وعده تقسیم شود
کراتین	۳ تا ۵ گرم در روز	مونوهیدرات، هر روز و ساعتش مهم نیست
خواب	۷ تا ۹ ساعت	کمبود خواب مستقیماً سنتز پروتئین عضله را کم می‌کند
آب	۳۰ تا ۴۰ میلی‌لیتر بر کیلوگرم	کم‌آبی عملکرد را در ست‌های آخر پایین می‌آورد

یک نکته صادقانه درباره انتظارها

۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد. کسی که ۶ ماه با یک برنامه پیش برود، از کسی که ۶ برنامه را در ۶ ماه عوض کرده وضع بسیار بهتری دارد.
درست، ۱ تا ۲ سانتی‌متر اضافه‌شدن دور شانه در یک بلوک ۸ هفته‌ای واقع‌بینانه است، اما تغییر ظاهری مشهود عرض شانه معمولاً با تمرین منظم و پیشروی

۹. سنجش پیشرفت، با عدد نه با حس

شاخص	روش سنجش	هر چند وقت
عرض شانه	فاصله دو استخوان آکرومیون با متر پارچه‌ای، بازوها شل	۴ هفته
دور سینه	ارتفاع نوک سینه، پایان بازدم، نوار افقی	۴ هفته
دور بازو	نقطه اوج بازوی سفت‌شده، همیشه همان نقطه	۴ هفته
عکس پیشرفت	نور و فاصله یکسان، روبه‌رو و پهلو و پشت، صبح ناشتا	۴ هفته
لاگ تمرین	وزنه و تکرار و RIR هر ست، همان جدول صفحه آخر	هر جلسه

معیارهای غلط

سوزش حین ست و خستگی زیاد هیچ‌کدام ملاک رشد نیستند. تکرار بیشتر یا وزنه بیشتر با همان کیفیت تکنیک، تنها معیار درست است.
کوفتگی عضلانی،

Sports (فاصله از ناتوانی) · Berton و همکاران، ۲۰۲۲ Front Sports Act Living (متاآنالیز چتر) · Schoenfeld و همکاران، ۲۰۱۹ J Sports Sci (تناوب هفتگی).

منابع کلیدی: Schoenfeld و همکاران، ۲۰۱۷ J Sports Sci (حجم هفتگی و هایپرتروفی) · Refalo و همکاران، ۲۰۲۳ Med

باشگاه کامل و بدون آسیب حاد شانه است. در صورت وجود درد، سابقه دررفتگی، پارگی یا جراحی شانه، پیش از اجرا با پزشک ورزشی یا فیزیوتراپیست مشورت کن.
هشدار: این سند یک راهنمای آموزشی برای فرد با سابقه تمرینی متوسط، دسترسی به

کارت جلسه سرشانه – قابل چاپ

این صفحه را جدا چاپ کن و در باشگاه همراه داشته باش · جلسه A

۲۰ ست کاری + ۲ ست سلامت | ۵۰ تا ۶۰ دقیقه | تاریخ: .....

#	حرکت	ست × تکرار	شدت	استراحت	وزنه و تکرار هر ست (پر کن)			
A1	پرس سرشانه دمبل نشسته	۴ × ۶ تا ۱۰	RIR ۱–۲	۲ تا ۳ دقیقه	۱)	۲)	۳)	۴)
A2	نشر جانبی کابل تک‌دست	۴ × ۱۲ تا ۱۸	RIR ۱	۶۰ تا ۹۰ ثانیه	۱)	۲)	۳)	۴)
A3	نشر جانبی دستگاه یا خم‌شده	۳ × ۱۲ تا ۱۵	RIR ۰–۱	۶۰ تا ۹۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A4	فیس‌پول با طناب	۳ × ۱۵ تا ۲۰	RIR ۱–۲	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A5	نشر خم دستگاه یا کابل	۳ × ۱۲ تا ۲۰	RIR ۱	۶۰ تا ۹۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A6	نشر Y روی میز شیب‌دار	۳ × ۱۲ تا ۱۵	RIR ۱	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A7	چرخش خارجی کابل	۲ × ۱۵	سبک	۴۵ تا ۶۰ ثانیه			۱)	۲)
د۲	نشر جانبی کابل (روز پرس)	۳ × ۱۲ تا ۲۰	RIR ۱	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
د۲	نشر خم کابل (روز پرس/پشت)	۲ تا ۳ × ۱۵ تا ۲۰	RIR ۱–۲	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)

پیشروی این هفته

هدف: یک تکرار بیشتر از جلسه قبل در هر ست، با همان تکنیک.

ست‌ها به سقف بازه رسیدی، جلسه بعد وزنه را ۲.۵ درصد زیاد کن.

اگر در همه

قانون درد

تکنیک درست و دامنه بدون درد، نه بیشتر.

اگر درد همان روز از ۳ از ۱۰ گذشت، حرکت را تمام کن.

درد شبانه یا ضعف ناگهانی یعنی توقف و ارزیابی تخصصی.

یادآوری سریع تکنیک

۱ ثانیه توقف اوج، ۲ تا ۳ ثانیه پایین · نشر جانبی: تنه ثابت، بدون شراگ، دامنه از پشت بدن · هرگز ست سبک را تا نزدیک ناتوانی نزن.
تمپو: ۱ ثانیه بالا،