برنامه حرفه‌ای رشد سرشانه

دلتوئید سه‌بخشی · بلوک ۸ هفته‌ای · سطح متوسط · باشگاه کامل · ۱۰ RIR تا ۲

۱ روز اختصاصی + دوز دوم | حدود ۲۶ ست مستقیم در هفته | ۵۰ تا ۶۰ دقیقه | دیلود در هفته ۴ و ۸

۱. اصولی که موتور رشد شانه‌اند

اگر سرشانه با وجود تمرین زیاد رشد نمی‌کند، تقریباً همیشه یکی از این شش مورد خراب است، نه ژن.

بخش میانی، ماشین عرض شانه

و پهن نشان می‌دهد بخش جانبی است.
چیزی که شانه را گرد

یعنی نشر از پهلو، مستقیم بار می‌گیرد.
این بخش فقط با ابداکشن،

بخش خلفی، نقطه کور

نادیده می‌گیرند و شانه جلو افتاده می‌شود.
بیشتر افراد آن را

پشت شانه کمتر از جلوی شانه نیست.
در این برنامه حجم

بخش قدامی، تقریباً مفت

سینه و سرشانه جلوی دلتوئید را پر می‌کند.
هر پرس

فقط یک حرکت پرس سنگین کافی است.
پس

ست مؤثر، پنج تکرار آخر

رشد، تکرارهای نزدیک به ناتوانی است.
محرک

در آخرین ست هر حرکت RIR صفر تا یک.
هدف: RIR یک تا دو و

اضافه‌بار پیشرونده

بدن دلیلی برای ساختن عضله ندارد.
بدون پیشروی،

اول تکرار را زیاد کن، بعد وزنه را ۲.۵ درصد.
روش:

تنش در دامنه کشیده

در وضعیت کشیده محرک قوی‌تری است.
بارگذاری عضله

جانبی یعنی دست از عقب بدن شروع کند.
در نشر

۲. آناتومی: دقیقاً چه چیزی را بزرگ می‌کنیم؟

بخش	وظیفه اصلی	ست مستقیم در هفته
میانی (جانبی)	ابداکشن، عرض شانه و نمای V شکل	۱۰ تا ۱۴
خلفی (پشتی)	اکستنشن و چرخش خارجی، تعادل و ضخامت	۸ تا ۱۲
قدامی (جلویی)	فلکسن، بیشتر از پرس‌ها غیرمستقیم	۰ تا ۴



تقسیم حجم یکسان روی ۲ جلسه نتایجی کمی بهتر از ۱ جلسه می‌دهد؛ به همین دلیل روز اختصاصی سرشانه با یک دوز دوم سبک همراه شده است. پژوهش‌ها به‌طور کلی نشان می‌دهند

نکته تناوب

یا فقط همان یک روز اختصاصی را انجام بده و رشد بگیر؛ دوز دوم بازده را بالاتر و خستگی هر جلسه را کمتر می‌کند.

۳. گرم‌کردن اختصاصی شانه، ۱۰ دقیقه، غیرقابل مذاکره

با سابقه تق‌تق و درد خفیف، این بخش بیشترین اثر را روی بدون درد ماندن و کیفیت جلسه دارد.

#	حرکت	حجم	هدف
۱	دوچرخه یا تردمیل سبک	۳ تا ۵ دقیقه	افزایش دمای عمومی بدن
۲	کشش کش از جلو (Band Pull-apart)	۲۰ × ۲	فعال‌سازی پشت شانه و بین‌کتفی
۳	چرخش خارجی با کش	۱۵ × ۲ هر دست	گرم‌کردن روتاتور کاف
۴	روی میز شیب‌دار Y-T-W	۱۰ × ۲ هر حرف	پایین‌تراپز و کنترل تیغه شانه
۵	اسلاید دیوار و کشش سراتوس	۱۰ × ۲	سراتوس و چرخش بالایی کتف
۶	دو ست سبک از حرکت اول	۵۰٪ و ۷۰٪ وزنه کار	آماده‌سازی اختصاصی پرس

قانون گرم‌کردن مؤثر

گرم‌کردن باید خود حرکت را شبیه‌سازی کند، نه اینکه خسته‌ات کند. ست سبک را هرگز تا نزدیک ناتوانی نزن.

۴. جلسه اختصاصی سرشانه — Session A

نیست: از سنگین به سبک، از چندمفصلی به تک‌مفصلی و در انتها کار سلامت شانه. کل ست کاری: ۲۰ ست به‌همراه ۲ ست سلامت شانه. ترتیب حرکات تصادفی

A1 پرس سرشانه دمبل نشسته با پشتی ۸۰ تا ۸۵ درجه

۴ ست · ۶ تا ۱۰ تکرار · ۲ تا ۱ RIR · استراحت ۲ تا ۳ دقیقه · قدامی + میانی

دمبل را با گریپ خنثی یا ۴۵ درجه نگه دار و آرنج را حدود ۳۰ درجه جلوتر از تنه بیاور. پرس را در دامنه‌ای تمام کن که بدون درد است. پشتی را روی ۸۰ تا ۸۵ درجه بگذار؛ کاملاً صاف فشار شانه را زیاد می‌کند.

جایگزین شانه‌دوست: پرس دستگاه با گریپ خنثی یا پرس لندماین که مسیرش برای شانه حساس مهربان‌تر است.

A2 نشر جانبی کابل تک‌دست از پشت بدن

۴ ست · ۱۲ تا ۱۸ تکرار · ۱ RIR · استراحت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه · میانی

بده تا دست عقب‌تر از بدن شروع کند. آرنج ۱۰ تا ۲۰ درجه خم و ثابت، حرکت فقط از مفصل شانه، تنه بدون تاب. فاز منفی ۲ تا ۳ ثانیه. قرقره در پایین‌ترین حالت، دست مقابل کابل بایست و کابل را از پشت بدن عبور

A3 نشر جانبی دستگاه یا دمبل خم‌شده (Lean-away)

۳ ست · ۱۲ تا ۱۵ تکرار · ۱ تا ۰ RIR · استراحت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه · میانی

استراحت ادامه بده. اگر بدون درد بود، چند تکرار پارشال در نیمه کشیده اضافه کن؛ این ناحیه محرک قوی‌تری برای بخش میانی است. ست آخر را با دراپ‌ست یا رست‌پاز تمام کن: وزنه را ۲۵ تا ۳۰ درصد کم کن و بدون

A4 فیس‌پول با طناب روی کابل

۳ ست | ۱۵ تا ۲۰ تکرار | تا ۲ RIR | استراحت ۶۰ ثانیه | خلفی + پایین‌تراپز

از مچ، و در انتها یک چرخش خارجی کوچک اضافه کن. تیغه‌های شانه را عقب و پایین ببر و شانه را بالا نکش. وزنه سبک و کیفیت بالا. قرقره در ارتفاع صورت. طناب را به سمت پیشانی بکش، آرنج بالاتر

A5 نشر خم (پشت شانه) با دستگاه یا کابل

۳ ست | ۱۲ تا ۲۰ تکرار | ۱ RIR | استراحت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه | خلفی

بدن. آرنج کمی خم و ثابت. حرکت را با کشیدن آرنج انجام بده، نه با فشار کف دست. در نقطه اوج یک توقف یک‌ثانیه‌ای داشته باش. سینه و پیشانی روی پد، گردن در راستای

A6 نشر Y روی میز شیب‌دار یا با کابل

۳ ست | ۱۲ تا ۱۵ تکرار | ۱ RIR | استراحت ۶۰ ثانیه | خلفی + پایین‌تراپز

خنثی، همان الگویی که برای تقویت کتف و روتاتور کاف استفاده می‌شود. از ۱ تا ۲ کیلو شروع کن؛ اینجا کیفیت کامل مهم است، نه وزنه. شانه‌دوست‌ترین حرکت این برنامه: مسیر ۴۵ درجه بالای سر با گریپ

A7 چرخش خارجی کابل (فینیشر سلامت شانه)

۲ ست | ۱۵ تکرار هر دست | سبک، بدون ناتوانی | استراحت ۴۵ تا ۶۰ ثانیه | روتاتور کاف

بیرون بچرخان و کنترل‌شده برگردان. این حرکت برای رشد دلتوئید نیست؛ برای این است که جلسه بعد هم بتوانی بدون درد پرس کنی. آرنج ۹۰ درجه و چسبیده به پهلو، ساعد را به

چطور ست را دقیق بزنم؟

تمپو: ۱ ثانیه بالا، ۱ ثانیه توقف در اوج، ۲ تا ۳ ثانیه پایین.

دامنه: کامل تا جایی که بدون درد ممکن است؛ نیمه‌کاره هیچ‌وقت.

تنفس: دم در فاز منفی و بازدم در فاز مثبت.

بین ست‌ها تایمر بگذار؛ کوتاه‌کردن خودسرانه استراحت وزنه را پایین می‌آورد و از حجم کم می‌کند.

۵. دوز دوم هفتگی — کلید رشد سریع‌تر

این دو حرکت را در انتهای روز پرس یا پشت اضافه کن: ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از جلسه اختصاصی.

حرکت	ست × تکرار	شدت	کجا بچینی
نشر جانبی کابل تک‌دست یا دستگاه	۳ × ۱۲ تا ۲۰	RIR ۱	انتهای روز پرس سینه
نشر خم کابل	۲ تا ۳ × ۱۵ تا ۲۰	RIR ۱ تا ۲	انتهای روز پرس یا روز پشت

۵ تا ۶ ست در دوز دوم | ۲ بار در هفته هر بخش | فاصله ۴۸ تا ۷۲ ساعت

۶. نقشه ۸ هفته‌ای پیشروی

هفته	حجم	شدت	تمرکز جلسه
هفته ۱	۹۰٪	RIR ۳	یادگیری تکنیک و ثبت وزنه پایه
هفته ۲	۱۰۰٪	RIR ۲ تا ۳	یک تکرار بیشتر در هر ست نسبت به هفته ۱
هفته ۳	۱۰۰٪	RIR ۱ تا ۲	سنگین‌ترین هفته بلوک اول، آخرین ست RIR صفر
هفته ۴	۵۰ تا ۶۰٪	RIR ۴	دیلود: وزنه را نگه دار، نصف ست‌ها
هفته ۵	۱۰۰٪ +	RIR ۱ تا ۲	شروع بلوک شدت: دراپ‌ست یا رست‌پاز در ست آخر
هفته ۶	۱۰۵٪	RIR ۱	اضافه‌کردن تکرار پارشال در حرکت A3
هفته ۷	۱۰۵ تا ۱۱۰٪	RIR ۰ تا ۱	هفته رکورد: عبور از وزنه هفته ۳
هفته ۸	۵۰٪	RIR ۴ تا ۵	دیلود، اندازه‌گیری و عکس، شروع بلوک بعد

قانون پیشروی دوگانه

گام ۱: در بازه تکرار بمان و هر جلسه یک تکرار اضافه کن تا به سقف بازه برسی.

گام ۲: وقتی در همه ست‌ها به سقف رسیدی، وزنه را ۲.۵ درصد زیاد کن و تکرار را از کف بازه شروع کن.

گام ۳: این چرخه را تکرار کن. معیار واقعی پیشرفت همین است، نه سوزش یا کوفتگی.

اگر پیشروی متوقف شد: خواب و کالری را چک کن، یک هفته دیلود بزن، ترتیب حرکات را عوض کن تا حرکت ضعیف اول بیاید.

۷. شانه‌ای که تق‌تق می‌دهد — پروتکل مراقبت

درد معمولاً بی‌خطر است و در بیشتر افراد هم وجود دارد. مسئله وقتی شروع می‌شود که تق‌تق همراه درد، ضعف یا محدودشدن دامنه باشد.
تق‌تق بدون

بکن

گرم‌کردن کامل قبل از هر جلسه، بدون استثنا.
نسبت کشش به پرس در هفته حداقل یک به یک، بهتر دو به یک.
تقویت روتاتور کاف دو تا سه بار در هفته، سبک و پرتکرار.
تمرین در دامنه بدون درد و سخت‌کردن عضله در همان دامنه.
پرس با گریپ خنثی یا دمبل که مسیر آزادتری دارد.
تحرک قفسه سینه: فوم‌رول و کشش درگاه.
خواب به پشت یا پهلو با بالش کوتاه، دست زیر سر نگذار.

نکن

پرس از پشت گردن در هر شرایطی.
زیربغل سیم‌کش با گریپ بسته و آرنج بالاتر از شانه.
بالا بردن وزنه از سطح شانه همراه با درد.
دیپ و شنا با عمق بیش از حد.
اصرار روی پرس سنگین در روزی که درد داری.
بازکردن اجباری شانه برای صدا دادن.
تمرین روزانه سرشانه؛ این عضله به ۴۸ ساعت فاصله نیاز دارد.

کِی باید به فیزیوتراپیست یا پزشک مراجعه کنی؟

دست؛ کاهش واضح دامنه حرکت؛ درد پس از یک ضربه یا کشیدگی ناگهانی. در این موارد تمرین را متوقف کن و ارزیابی تخصصی بگیر.
درد شبانه یا دردی که خوابت را می‌برد؛ ضعف ناگهانی در بلند کردن

۸. تغذیه و ریکاوری

شاخص	مقدار	توضیح
مازاد کالری	۱۰ تا ۱۵ درصد	حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ کیلوکالری بالای نیاز روزانه
پروتئین	۱.۶ تا ۲.۲ گرم بر کیلوگرم	در ۳ تا ۵ وعده تقسیم شود
کراتین	۳ تا ۵ گرم در روز	مونوهیدرات، هر روز و ساعتش مهم نیست
خواب	۷ تا ۹ ساعت	کمبود خواب مستقیماً سنتز پروتئین عضله را کم می‌کند
آب	۳۰ تا ۴۰ میلی‌لیتر بر کیلوگرم	کم‌آبی عملکرد را در ست‌های آخر پایین می‌آورد

یک نکته صادقانه درباره انتظارها

۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد. کسی که ۶ ماه با یک برنامه پیش برود، از کسی که ۶ برنامه را در ۶ ماه عوض کرده وضع بسیار بهتری دارد.
درست، ۱ تا ۲ سانتی‌متر اضافه‌شدن دور شانه در یک بلوک ۸ هفته‌ای واقع‌بینانه است، اما تغییر ظاهری مشهود عرض شانه معمولاً
با تمرین منظم و پیشروی

۹. سنجش پیشرفت، با عدد نه با حس

شاخص	روش سنجش	هر چند وقت
عرض شانه	فاصله دو استخوان آکرومیون با متر پارچه‌ای، بازوها شل	۴ هفته
دور سینه	ارتفاع نوک سینه، پایان بازدم، نوار افقی	۴ هفته
دور بازو	نقطه اوج بازوی سفت‌شده، همیشه همان نقطه	۴ هفته
عکس پیشرفت	نور و فاصله یکسان، روبه‌رو و پهلو و پشت، صبح ناشتا	۴ هفته
لاگ تمرین	وزنه و تکرار و RIR هر ست، همان جدول صفحه آخر	هر جلسه

معیارهای غلط

سوزش حین ست و خستگی زیاد هیچ‌کدام ملاک رشد نیستند. تکرار بیشتر یا وزنه بیشتر با همان کیفیت تکنیک، تنها معیار درست است.
کوفتگی عضلانی،

Sports (فاصله از ناتوانی) · Berton و همکاران، ۲۰۲۲ Front Sports Act Living (متاآنالیز چتر) · Schoenfeld و همکاران، ۲۰۱۹ J Sports Sci (تناوب هفتگی).

منابع کلیدی: Schoenfeld و همکاران، ۲۰۱۷ J Sports Sci (حجم هفتگی و هایپرتروفی) · Refalo و همکاران، ۲۰۲۳ Med

باشگاه کامل و بدون آسیب حاد شانه است. در صورت وجود درد، سابقه دررفتگی، پارگی یا جراحی شانه، پیش از اجرا با پزشک ورزشی یا فیزیوتراپیست مشورت کن.
هشدار: این سند یک راهنمای آموزشی برای فرد با سابقه تمرینی متوسط، دسترسی به


پیوست — راهنمای تصویری A5، A6 و A7

شکل‌ها شماتیک‌اند و برای انتقال «وضعیت بدن و مسیر حرکت» طراحی شده‌اند · تمپو: ۱ ثانیه بالا، ۱ ثانیه توقف اوج، ۲ تا ۳ ثانیه پایین


A5 — نشر خم — پشت شانه

بخش خلفی دلتوئید + پایین‌تراپز و بین‌کتفی

۳ ست | ۱۲ تا ۲۰ تکرار | RIR ۱ | استراحت ۶۰ تا ۹۰ ثانیه



شکل ۱ — تنظیم دستگاه و وضعیت بدن (نمای پهلو)



شکل ۲ — مسیر حرکت دست‌ها (نمای از بالا)

کدام نسخه را انتخاب کنم؟

- پک‌دک معکوس (سینه روی پد) — بهترین گزینه برای شروع دستگاه
- کابل ایستاده با دو دست متقاطع (کابل چپ در دست راست)
- دمبل روی میز شیب‌دار ۳۰ درجه، سینه روی میز

خودآزمایی بعد از ست

- بود، یعنی آرنج‌ها را باز نکرده‌ای و کف دست‌ها را کشیده‌ای. فشار داشته باشی. اگر حس اصلی در گردن، بالای کتف یا ساعد بعد از ست باید در پشت شانه و بین تیغه‌های شانه حس

مراحل اجرا — به همین ترتیب

1. ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کن که دستگیره‌ها هم‌ارتفاع شانه باشند (خط‌چین «سطح شانه» در شکل ۱ را معیار بگیر).
2. سینه را کامل روی پد بگذار و پیشانی را به لبه بالای پد تکیه بده؛ سر را بالا نگیر تا گردن در راستای ستون فقرات بماند.
3. دستگیره‌ها را با گریپ خنثی (کف دست‌ها رو به هم) بگیر؛ آرنج را ۱۰ تا ۲۰ درجه خم کن و در تمام ست همین زاویه را نگه دار.
4. شکم را سفت کن و لگن را به صندلی بچسبان تا تنه نتواند تاب بخورد.
5. را با «باز کردن آرنج‌ها به سمت بیرون» شروع کن، نه با کشیدن کف دست‌ها. تصور کن می‌خواهی آرنج‌ها را به دیوارهای دو طرف برسانی. حرکت
6. تا جایی باز کن که آرنج‌ها هم‌سطح شانه شوند (نه بیشتر) و همان‌جا ۱ ثانیه توقف کن.
7. برگشت را ۲ تا ۳ ثانیه کنترل‌شده انجام بده و وزنه را رها نکن؛ کشش پشت شانه در همین فاز ساخته می‌شود.

نکات کلیدی

- تیغه‌های شانه را کمی به عقب و پایین ببر و همان‌جا نگه دار. قبل از هر ست،
- شانه است؛ در نسخه دمبل، ساعد کمی رو به بالا می‌چرخد. در نسخه کابلی، مسیر دست‌ها افقی و هم‌سطح
- تکرار دوازدهم، تکنیک شروع به خراب شدن کند — نه هشتم. وزنه‌ای انتخاب کن که در
- هفته انجام بده: یک بار در جلسه اختصاصی، یک بار در دوز دوم. این حرکت را دو بار در

اشتباهات رایج


- به‌جای بازکردن آرنج: حرکت به ساعد و گردن منتقل می‌شود. فشار دادن کف دست
- بالا کشیدن شانه‌ها در نقطه اوج (تبدیل شدن به شراگ).
- گرفتن سر برای دیدن دستگاه؛ گردن باید در راستای بدن بماند. بالا
- رها کردن وزنه در فاز برگشت و از دست دادن دامنه کشیده.
- بیشتر از سطح شانه: فشار بی‌دلیل روی جلوی کپسول مفصل. دامنه
- کمک گرفتن با تاب تنه، در حالی که لگن از صندلی جدا می‌شود. وزنه سنگین و

A6


Y نشر — A6

بخش خلفی دلتوئید + پایین‌تراپز و کنترل کتف

۳ ست | ۱۲ تا ۱۵ تکرار | RIR ۱ | استراحت ۶۰ ثانیه



شکل ۱ — وضعیت بدن روی میز شیب‌دار (نمای پهلو)



شکل ۲ — مسیر ۴۵ درجه و شکل Y (نمای از روبه‌رو)

کدام نسخه را انتخاب کنم؟

- روی میز شیب‌دار ۳۰ تا ۴۵ درجه با دمبل سبک (شکل ۱)
- ایستاده روبه‌روی قرقره پایین با کابل، دست‌ها متقاطع
- بدون وزنه (وزن بدن) برای گرم‌کردن و یادگیری الگو

خودآزمایی بعد از ست

- کتف می‌سوزد، یا وزنه سنگین است یا شانه‌ها را بالا کشیده‌ای. و پایین تیغه‌های شانه باشد و گردن کاملاً آرام. اگر گردن یا بالای در پایان ست باید حس اصلی در پشت شانه

مراحل اجرا — به همین ترتیب

1. میز را روی شیب ۳۰ تا ۴۵ درجه بگذار و با سینه و شکم کامل روی میز دراز بکش؛ کمر بدون قوس و پاها ثابت روی زمین.
2. دمبل‌های سبک را با گریپ خنثی بگیر به‌طوری که انگشت شست رو به بالا بماند و دست‌ها آویزان شوند.
3. قبل از حرکت، تیغه‌های شانه را کمی به سمت پایین و عقب (دور از گوش) ببر و قفسه سینه را به میز فشار بده.
4. دست‌ها را در مسیر ۴۵ درجه نسبت به محور بدن، به سمت بالا و جلو ببر؛ در دید از روبه‌رو باید شکل Y ساخته شود (شکل ۲).
5. آرنج کمی خم و در تمام ست ثابت بماند؛ حرکت فقط از مفصل شانه است و گردن هیچ نقشی ندارد.
6. در بالاترین نقطه ۱ ثانیه توقف کن و با ۲ تا ۳ ثانیه برگردان.
7. وزنه را سبک نگه دار: ۱ تا ۳ کیلو در هفته‌های اول و ۵ کیلو برای بیشتر افراد سقف منطقی است. اگر شراگ می‌زنی، وزنه سنگین است.

نکات کلیدی

- اوج حرکت، شست‌ها بالاتر از شانه‌ها و کمی جلوتر از سر باشند. معیار درست انجام‌شدن: در
- اگر دست‌ها کامل به طرفین بروند، تبدیل به نشر جانب می‌شود. مسیر باید «بالا و جلو» باشد، نه «به طرفین»؛
- فعال کن: قبل از بلند کردن دست، شانه را از گوش دور کن. پایین‌تراپز را در همان ابتدای حرکت
- حرکت برنامه است؛ آن را با کیفیت و بدون عجله انجام بده. این حرکت شانه‌دوست‌ترین


اشتباهات رایج

- سنگین: حرکت بلافاصله به شراگ و بالاتراپز منتقل می‌شود. وزنه
- بالا کشیدن شانه‌ها به سمت گوش در نقطه اوج.
- کاملاً به طرفین (مسیر T) به‌جای مسیر ۴۵ درجه (مسیر Y). باز کردن دست‌ها
- و بسته کردن آرنج برای کمک گرفتن؛ زاویه آرنج باید ثابت بماند. باز
- قوس دادن کمر یا بلند کردن سر برای جبران کمبود قدرت.
- نبودن توقف در نقطه اوج و برگشت سریع با رها کردن وزنه.


A7 — چرخش خارجی کابل — فینیشر سلامت شانه

روتاتور کاف (اینفراسپیناتوس و تریس مینور) — پیشگیری، نه رکورد

۲ ست | ۱۵ تکرار هر دست | سبک، بدون ناتوانی | استراحت ۴۵ تا ۶۰ ثانیه



شکل ۱ — وضعیت ایستاده و زاویه آرنج (نمای پهلو)



شکل ۲ — چرخش ساعد از رو به شکم تا بیرون (نمای از بالا)

کدام نسخه را انتخاب کنم؟

- کنار دستگاه کابل با حوله کوچک بین آرنج و پهلو (شکل ۱) ایستاده
- نشسته روی میز با آرنج تکیه‌داده به میز (گزینه شانه‌دوست‌تر)
- با کش مقاومتی در خانه، دقیقاً با همان الگو

خودآزمایی بعد از ست

- یا دردناک باشد؛ اگر بود، وزنه کمتر و تکرارهای کنترل‌شده‌تر. داشته باشی، بدون هیچ درد تیزی. فردا نباید شانه‌ات خسته در پایان باید حس کار کردن و گرمای ملایم در پشت و کناره شانه

مراحل اجرا — به همین ترتیب

1. قرقره را هم‌ارتفاع آرنج تنظیم کن و پهلو به سمت دستگاه بایست؛ در نسخه تک‌دست، دست عمل‌کننده دورتر از دستگاه باشد.
2. یک حوله کوچک بین آرنج و پهلو بگذار؛ این حوله تا آخر ست باید همان‌جا بماند (شکل ۱).
3. آرنج را ۹۰ درجه خم کن و مچ را صاف نگه دار، بدون چرخش.
4. ساعد را طوری بیاور که مچ رو به شکم/وسط بدن باشد — این حالت شروع (چرخش داخلی) است.
5. با یک حرکت آرام، ساعد را به سمت بیرون بچرخان تا مچ کمی عقب‌تر از پهلو برسد؛ آرنج ثابت و چسبیده به پهلو بماند (شکل ۲).
6. در نقطه پایانی ۱ ثانیه نگه دار و با ۲ تا ۳ ثانیه به حالت شروع برگرد.
7. وزنه‌ای بردار که ۱۵ تکرار آن راحت و کنترل‌شده انجام شود؛ این حرکت برای توان‌بخشی و پیشگیری است، نه برای رکورد.

نکات کلیدی

- تاب دادن تنه — هر دو را با همان حوله و نگاه به آینه کنترل کن. دو خطای اصلی این حرکت: جدا شدن آرنج از پهلو و
- کردی، وزنه را سبک‌تر کن یا دامنه را کم کن؛ هرگز از درد رد نشو. اگر درد تیز در جلوی شانه حس
- انجام بدهی، حتی روزهایی که سرشانه سنگین تمرین نمی‌کنی. این حرکت را می‌توانی در دو تا سه جلسه در هفته
- این حرکت، کمی کشش ملایم جلوی سینه و زیربغل انجام بده. بعد از

اشتباهات رایج

- جدا شدن آرنج از پهلو و تبدیل حرکت به چرخش کل بازو.
- تاب دادن تنه یا کشیدن کابل با کل بدن.
- چرخاندن مچ یا بالا بردن ساعد از سطح مچ (بالاتر از ۹۰ درجه).
- دست دادن کنترل؛ این حرکت با وزنه سبک هم نتیجه می‌دهد. وزنه سنگین و از
- ادامه دادن با وجود درد تیز؛ نشانه‌ای است که باید متوقف شوی.

قوانین مشترک این سه حرکت

توقف اوج، ۲ تا ۳ ثانیه پایین · دامنه کامل تا مرز بدون درد · آرنج در تمام ست با زاویه ثابت · وزنه‌ای که تکنیک را در تکرار آخر خراب نکند. تمپو ۱ ثانیه بالا، ۱ ثانیه

هشدار

یا جراحی شانه داری، پیش از اجرا با پزشک ورزشی یا فیزیوتراپیست مشورت کن. شکل‌ها شماتیک‌اند و جایگزین آموزش حضوری نیستند. اگر درد، سابقه دررفتگی، پارگی

کارت جلسه سرشانه – قابل چاپ

این صفحه را جدا چاپ کن و در باشگاه همراه داشته باش · جلسه A

۲۰ ست کاری + ۲ ست سلامت | ۵۰ تا ۶۰ دقیقه | تاریخ: .....

#	حرکت	ست × تکرار	شدت	استراحت	وزنه و تکرار هر ست (پر کن)			
A1	پرس سرشانه دمبل نشسته	۴ × ۶ تا ۱۰	RIR ۱–۲	۲ تا ۳ دقیقه	۱)	۲)	۳)	۴)
A2	نشر جانبی کابل تک‌دست	۴ × ۱۲ تا ۱۸	RIR ۱	۶۰ تا ۹۰ ثانیه	۱)	۲)	۳)	۴)
A3	نشر جانبی دستگاه یا خم‌شده	۳ × ۱۲ تا ۱۵	RIR ۰–۱	۶۰ تا ۹۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A4	فیس‌پول با طناب	۳ × ۱۵ تا ۲۰	RIR ۱–۲	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A5	نشر خم دستگاه یا کابل	۳ × ۱۲ تا ۲۰	RIR ۱	۶۰ تا ۹۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A6	نشر Y روی میز شیب‌دار	۳ × ۱۲ تا ۱۵	RIR ۱	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
A7	چرخش خارجی کابل	۲ × ۱۵	سبک	۴۵ تا ۶۰ ثانیه			۱)	۲)
د۲	نشر جانبی کابل (روز پرس)	۳ × ۱۲ تا ۲۰	RIR ۱	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)
د۲	نشر خم کابل (روز پرس/پشت)	۲ تا ۳ × ۱۵ تا ۲۰	RIR ۱–۲	۶۰ ثانیه		۱)	۲)	۳)

پیشروی این هفته

هدف: یک تکرار بیشتر از جلسه قبل در هر ست، با همان تکنیک.

ست‌ها به سقف بازه رسیدی، جلسه بعد وزنه را ۲.۵ درصد زیاد کن.

اگر در همه

قانون درد

تکنیک درست و دامنه بدون درد، نه بیشتر.

اگر درد همان روز از ۳ از ۱۰ گذشت، حرکت را تمام کن.

درد شبانه یا ضعف ناگهانی یعنی توقف و ارزیابی تخصصی.

یادآوری سریع تکنیک

۱ ثانیه توقف اوج، ۲ تا ۳ ثانیه پایین · نشر جانبی: تنه ثابت، بدون شراگ، دامنه از پشت بدن · هرگز ست سبک را تا نزدیک ناتوانی نزن.
تمپو: ۱ ثانیه بالا،