

 Fiche d'exercices — Logique mathématique Date : 01/07/2026 Questions : 5**Question 1**

ERT : 105s | Score : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Dans la table de vérité de « $P \vee Q$ », quelle est la valeur quand P est Vraie et Q est Vraie ?

- A) Vraie
- B) Vraie — car Q est vraie, donc l'implication l'est aussi
- C) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi
- D) Fausse

Réponse : _____

Question 2

ERT : 105s | Score : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Dans la table de vérité de « $P \Leftrightarrow Q$ », quelle est la valeur quand P est Fausse et Q est Vraie ?

- A) Vraie
- B) La table ne permet pas de décider
- C) Fausse
- D) Vraie — car Q est vraie, donc l'implication l'est aussi

Réponse : _____

Question 3

ERT : 105s | Score : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Dans la table de vérité de « $P \Leftrightarrow Q$ », quelle est la valeur quand P est Fausse et Q est Fausse ?

- A) La table ne permet pas de décider
- B) Vraie
- C) Fausse — car les deux propositions doivent avoir la même valeur
- D) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi

Réponse : _____

Question 4

ERT : 105s | Score : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Dans la table de vérité de « $P \vee Q$ », quelle est la valeur quand P est Vraie et Q est Fausse ?

- A) Fausse
- B) Vraie
- C) Fausse — car les deux propositions doivent avoir la même valeur
- D) Vraie — car Q est vraie, donc l'implication l'est aussi

Réponse : _____

Question 5

ERT : 105s | Score : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Dans la table de vérité de « $P \wedge Q$ », quelle est la valeur quand P est Vraie et Q est Fausse ?

- A) Fausse
- B) Vraie
- C) La table ne permet pas de décider
- D) Fausse — car si P est vraie, Q doit l'être aussi

Réponse : _____