



زیر کاشت : اکتان کے کل رقبے میں سے تقریباً پندرہ فیصد رقبے پر کہاں کاشت کی جاتی ہے۔ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہاں کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں



کاشت کا موسم : یاکتان کے تمام صوبوں میں کیاں خریف میں کاشت کی جاتی ہے۔



موزوں وقت کاشت: پاکستان کے آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر کیاس کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں کیاس کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 15 اپریل ہے۔ سندھ ممیں کیاس کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 15 اپریل ہے۔ بلوچستان میں کیاس کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 30 اپریل ہے۔ خیبر پختو نخواہ ممیں کیاس کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 30 اپریل ہے۔ خیبر پختو نخواہ ممیں کیاس کی کاشت کے لئے موزوں وقت 15 مارچ تا 30 اپریل ہے۔



موزول زمین: کپاس کی فصل کے لئے موزول زمین میں کپنی مٹی، بھل میرا، میرااور کپنی میرا شامل ہیں۔



زمین کی تیاری:

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لینے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نِج کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک بھینی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مختلف علاقوں میں مختلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونونکس " زراعت بحال کسان خوشحال" ایپ کا استعمال کریں۔

بوائی کے طریقے اور شرح جج:

دھان کی بوائی اور نیج کی مقدار علاقے کی مناسبت، زمین کی زر خیزی، پانی کی دستیابی، آب و ہوا

اور او قات کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ ہم آ بکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تحقیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آ یکے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آپکو آسانی سے میسر ہو اس طریقے اور زمین کے کل رقبے کے لحاظ سے شرح سے ایگرونو مکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری سیکولیٹر سے معلوم کریں۔





بہج کی اقسام:

بہج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، بہج کی قشم ،زمین کی ساخت آور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے "ایگرونومکس" زراعت بحال ، کسان خوشحال " ایپ کے ذریع فراہم کی جاتی ہے۔



آبیا ثی موجودہ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔

آبیاً تی کے متعلق برونت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونومکس آیپ کیر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعمال:

زمین کی ذرخیزی کسی بھی فصل کی نشو نماکیلئے اہم کردار اداکرتی ہے۔ یہ بات ریسری سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر قصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تباری کے دوران اس کی ذرخیزی کا پیتہ لگانے کیلئے سوائل طیسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیرتی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناماتی اور غیر ناماتی کھادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے پیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونو کمس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ کیاس کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیروں کے حملے کے خلاف بروفت انسداد اور کیڑے مار ادویات کا مناسب استعال ہے۔



پاکستان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاری ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق بچھلے سالوں سے قصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

بياريال:

كياس كى بياريول مين بليك روث راث،روث ناث نيالود، بودول كا مر جهاؤ، كياس كا پية مرورُ وانرُس، کیاس کے پتوں کا جراتیمی حھلساؤ، کراؤن گال، انتھر کنوز اور کیاس کے ٹینیڈوں کا گلنا شامل ہیں۔





کیڑے مکوڑے : کیاں پر حملہ آور ہونے والے کیڑوں میں دیمک ، ست تیلہ، چست تیلہ ، سفید مکھی ، ٹوکا ، لشکری سٹری، مکنی کا گڑوواں اور بول ورم شامل ہیں۔



جڑی بوٹیاں: کپاس میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں نٹ گراس، بھھرا، برمودہ گراس، لو گراس اور نیٹل لیف گوس فوٹ شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے بروقت اقدامات کے لئے ایگرونو کس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسان خوشحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچ دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



