

جی کی بی اوار ایگرونوکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ



زیر کاشت:

پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً 2.31 ملین ، یکٹیر پر چارہ کاشت کیاجاتا ہے۔ جس میں سے تقریباً 35 فیصد رقبے پر جمع کاشت کی جاتی ہے۔ موسمی اور زینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعی کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔



کاشت کا موسم : یاکستان کے تمام صوبوں میں جئی ربیع کے موسم میں کاشت کی جاتی ہے۔



موزول وقت كاشت:

پاکستان کے آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر جئی کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں جئی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 25 ستمبر تا 25 اکتوبر ہے۔ سندھ میں جئی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 25 ستمبر تا 25 اکتوبر ہے۔

سندھ میں جی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 25 ستمبر تا 25 اکتوبر ہے۔ بلوچستان میں جی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 25 اکتوبر تا پچیس نومبر ہے۔ خیبر پختونخواہ میں جی کی کاشت کے لئے موزوں وقت 30 اکتوبر تا 30 نومبر ہے۔



موزوں زمین: جئی کی فصل کے لئے موزوں زمین میں کچنی میرا، ریتلی میرا، میرا، ریتلی کچنی میرااور میرا ریت شامل ہیں۔



زمین کی تیاری:

کسی بھی فصل سے زیادہ پیداوار لینے کے لئے اس فصل کا اگاؤ سو فیصد ہونا چاہئے۔ نیج کے زیادہ اگاؤ کیلئے زمین کی تیاری ایک بیٹی عمل ہے۔ زمین کی تیاری مخلف علاقوں میں مخلف او قات، طریقوں اور فصل کی نشاندہی کے مطابق کی جاتی ہے۔ اپنے علاقے اور فصل کی مناسبت کے لحاظ سے زمین کی تیاری کی معلومات کیلئے ایگرونومکس " زراعت بحال کسان خوشحال" ایپ کا استعمال کریں۔

بوائی کے طریقے اور شرح نیج:



بیج کی اقسام:

نیج کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نیج کی قسم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے"ایگرونو مکس" زراعت بحال ،کسان خوشحال ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔

آ بیاشی : آ بیاشی موجودہ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔

آبیاتی موجودہ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔ آبیاشی کے متعلق بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



نامياتي اور غير نامياتي كطادون كا استعال:

زمین کی ذر خیزی کسی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تیاری کے دوران اس کی ذر خیزی کا پنہ لگانے کیلئے سوائل ٹمیسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذر خیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادول کی مقدار اور موسمی حالات کے بیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے انگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ جنی کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیروں کے حملے کے خلاف بروقت انسداد اور کیروے مار ادویات کا مناسب استعال ہے۔



فصل كا بحاؤ :

پاکستان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے فصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

بياريال:

جنی کی بیاریوں میں لیف رسٹ، یلو ڈوارف، سپٹوریا ایوانا بلوچ، سٹم رسٹ، لوز سٹ اور انتھر اکنوز شامل ہیں۔





کیرے مکوڑے:

جئی پر حملہ آور ہونے والے کیروں میں گئری سنڈی ، سیریل لیف بلیٹل ، پلانٹ بگ اور اوٹ تھر پس شامل ہیں۔



جڑی بوٹیاں:

جئی میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں کوچیہ، لمبز قعار ٹر، ریگویڈ، ریڈ روٹ پیگویڈ اور کو کلیبر شامل ہیں۔ فصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے بروقت اقدامات کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں

مزید معلومات کے لیے ایگرونو مکس " زراعت بحال کسا<mark>ن</mark> خوشحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچے دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



