

باجره کی بہتر پیداوار

ایگرونومکس" زراعت بحال کسان خوشحال" پروگرام کے ساتھ

زىر كاشت: پاکستان کے کل رقبے میں سے تقریباً 0.548 ملین ، بیکٹیر پر باجرہ کاشت کیا جاتا ہے۔ موسی اور زمین حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے باجرہ کو بہترین طریقے سے اگانے کیلئے مل جل کر قدم بڑھائیں۔



كاشت كا موسم: یاکتان کے تمام صوبوں میں باجرہ خریف میں کاشت کیا جاتا ہے۔




موزول وقت كاشت: یاکتان کے آبیاش ، خشک اور بارانی علاقوں میں ہر صوبے کی آب و ہوا کے مطابق مختلف او قات پر باجرہ پنجاب میں خریف کے موسم میں باجرہ کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 جون تا 31 جولائی ہے۔ خیبر پختون خواہ میں خریف کے موسم میں باجرہ کی کاشت کے لئے موزوں وقت 1 جون تا 1 جُولائی ہے۔ بلو چتان میں خریف کے موسم میں 'باجرہ کی کاشت کے لئے موزوں وقت 20 فروری تا 15 جولائی ہے۔ سندھ میں خریف کے موسم میں باجرہ کی کاشت کے لئے موزوں وقت 20 فروری تا 15 جولائی ہے۔





زمین کی تیاری:



بوائی کے طریقے اور شرح بہج:

باجرہ کی بوائی اور نیج کی مقدار علاقے کی مناسبت، زمین کی زرخیزی، پانی کی دستمالی، آپ و ہوا اور اوقات کو مد نظر آر کھ کر کی جاتی ہے۔ہم آپکو ان تمام تر پہلووں کی مدد سے تحقیق سے ثابت شدہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آئے وسائل کے مطابق جو طریقہ کار آپکو آسانی سے میسر ہو اس طریقے اور زمین کے کل رقبے کے لحاظ سے شرح بہتج ایگرونومکس ایپ پر اپنی زمین کی نشاندہی کرنے کے بعد ایگری کیکولیٹر سے معلوم کریں۔



بنج کی اقسام:

جبح کی تصدیق شدہ اقسام کی معلومات، پاکستان کے تمام آبیاش، خشک اور بارانی علاقوں کی مناسبت، نہج کی قشم ،زمین کی ساخت اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگرونومکش "زراعت بحال ،کسان خوشحال" ایپ کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔



آبیا ثلی موجودہ موسمی اور زمینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی ضرورت کے مطابق کی جاتی ہے۔

آبیا ثی کے متعلق بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لئے ایگرونومکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد ' کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔



نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعال:

زمین کی ذرخیزی کسی بھی فصل کی نشو نما کیلئے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بات ریسر چ سے ثابت شدہ ہے کہ زمین کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر فصل کی کٹائی کے بعد اور اگلی فصل کی بوائی سے پہلے زمین کی تاری کے دوران اس کی ذر خیزی کا پیۃ لگانے کیلئے سوائل لیسٹ ایک لازمی عمل ہے۔ زمین کی ذرخیزی، علاقے کی مناسبت اور دوسرے موجودہ زینی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نامیاتی اور غیر نامیاتی کھیادوں کی مقدار اور موسمی حالات کے بیش نظر ان کے استعال کی معلومات حاصل کرنے کیلئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔ باجرہ کی قصل سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بیاریوں اور کیروں کے حملے کے خلاف بروقت انسداد اور کیڑے مار ادوبات کا مناسب استعال ہے۔



یا کتان کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ہر سال نئی نئی بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق پچھلے سالوں سے قصل پر اثر انداز ہونے والی بیاریاں، کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں بياريال:

باجره كى بياريون مين سيكثيريل سياف، سيكثيريل ليف سرب، سركوسپورا ليف سياف، داوني ملڈ یو، رسٹ اور سمٹ شامل ہیں۔





کیرٹے مکوڑے: باجرہ پر حملہ آ ور ہونے والے کیروں میں لیف فولڈر، فلی بیٹل، گراس ھوپر، سٹم بورراور پنک بورر شامل ہیں۔



جڑی بوٹیاں: یاجرہ میں اگنے والی جڑی بوٹیوں میں اٹ سٹ، ونتی ویڈاور مدھانہ شامل ہیں۔ قصل کو مزید نقصانات سے بچانے کے لئے اور بیاریوں اور کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچاؤ اور انسداد کے لئے بروقت اقدامات کے لئے ایگرونو مکس ایپ پر سائن اپ کرنے کے بعد کراپ سیمولیٹر استعال کریں۔

مزید معلومات کے لیے ایگرونومکس" زراعت بحال کسا<mark>ن</mark> خوشحال" ایپ انسٹال کرنے کے لیے نیچ دیے گیے کوڈ کو اسکین کریں۔



