

SGLT2i
Control
Odds Ratio
Odds Ratio
Study or Subgroup
Events Total Events Total Weight M-H, Fixed, 95% CI
M-H, Fixed, 95% CI
19.6.5 eGFR >=90
EMPA Hadjadj 2016-2 2 341 0 170 5.3% 2.51 [0.12, 52.60]
IPRA Inoue 2019 1 24 0 24 3.8% 3.13 [0.12, 80.68]
Subtotal (95% CI) 365 194 9.1% 2.77 [0.30, 25.75]
Total events 3 0
Heterogeneity: Chi² = 0.01, df = 1 (P = 0.92); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.89 (P = 0.37)
19.6.6 eGFR 60-89
CANA Schernthaner 2013 0 377 1 378 12.0% 0.33 [0.01, 8.21]
CANA Stenlof 2013 2 392 0 192 5.3% 2.46 [0.12, 51.59]
DAPA Araki 2017 0 123 1 60 16.0% 0.16 [0.01, 4.00]
DAPA Bailey 2015 3 199 1 75 11.4% 1.13 [0.12, 11.06]
DAPA Cho 2018 1 36 0 35 3.9% 3.00 [0.12, 76.16]
DAPA Weber 2016 7 225 4 224 31.1% 1.77 [0.51, 6.12]
TOFO Kaku 2014 1 174 0 56 6.0% 0.98 [0.04, 24.32]
Subtotal (95% CI) 1526 1020 85.7% 1.23 [0.54, 2.76]
Total events 14 7
Heterogeneity: Chi² = 3.02, df = 6 (P = 0.81); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.49 (P = 0.62)
19.6.8 eGFR ＜45
CANA Yale 2013 1 179 0 90 5.3% 1.52 [0.06, 37.71]
Subtotal (95% CI) 179 90 5.3% 1.52 [0.06, 37.71]
Total events 1 0
Heterogeneity: Not applicable
Test for overall effect: Z = 0.26 (P = 0.80)
Total (95% CI) 2070 1304 100.0% 1.38 [0.66, 2.89]
Total events 18 7
Heterogeneity: Chi² = 3.46, df = 9 (P = 0.94); I² = 0%
Test for overall effect: Z = 0.86 (P = 0.39)
Test for subgroup differences: Chi² = 0.46, df = 2 (P = 0.80), I² = 0%
0.01
0.1
1
10
100
Favours SGLT2i
Favours control